

ارزیابی کارایی چند علف کش روی علف‌های هرز و عملکرد گوجه فرنگی در کشت مستقیم

داریوش قنبری بیرگانی^۱، محمدرضا کرمی نژاد^{۲*}، رضا طباطبایی نیم‌آورد^۳، ناصر ظریفی نیا^۱

۱. بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دزفول، ایران. ۲. بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، ایران. ۳. بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، ایران.

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۵/۲۰

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۹

چکیده

به منظور بررسی کارایی و اثر چند علف کش روی علف‌های هرز و عملکرد گوجه فرنگی در کشت مستقیم در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ آزمایشی در مراکز تحقیقات کشاورزی صفائی‌آباد دزفول، اصفهان و تهران (کرج) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۹ تیمار در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از کاربرد علف‌کش‌های: متربی بوزین (سنکور[®] 70% WP) به میزان ۰/۷۵ و ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش‌رویشی و پس‌رویشی در مرحله ۴ برگی گوجه فرنگی، آکسی فلورفن (گل[®] EC 24%) به میزان ۲ لیتر در هکتار به صورت پیش‌کاشت و مخلوط با خاک، ناپروپامید (دورینول[®] FL 45%) به میزان ۰/۵ و ۰/۵ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش‌کاشت و مخلوط با خاک، و شاهدهای با و بدون علف هرز. نتایج آزمایشات در صفائی‌آباد دزفول نشان داد در تیمار متربی بوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش‌رویشی و آکسی فلورفن موثرترین تیمارها در کنترل مجموع تعداد علف‌های هرز بودند. در افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی شاهد بدون علف هرز و متربی بوزین به میزان ۰/۷۵ و ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پس‌رویشی مؤثرترین تیمارها بودند. در اصفهان، در کاهش مجموع تعداد علف‌های هرز علف کش آکسی فلورفن و متربی بوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پس‌رویشی و در افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی شاهد بدون علف هرز، ناپروپامید به میزان ۰/۵ کیلوگرم در هکتار و متربی بوزین به میزان ۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش‌رویشی و ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پس‌رویشی مؤثرترین تیمارها بودند. نتایج آزمایشات کرج نشان داد تیمار متربی بوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش‌رویشی و آکسی فلورفن موثرترین در کاهش مجموع تعداد علف‌های هرز و در افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی، شاهد بدون علف هرز، متربی بوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش‌رویشی و آکسی فلورفن مؤثرترین تیمارها بودند.

واژه‌های کلیدی: آکسی فلورفن، متربی بوزین، ناپروپامید، کنترل شیمیایی، عملکرد.

مقدمه

در ایران کاربرد علف‌کش متری‌بوزین به میزان ۱۰۰۰-۳۰۰ گرم از ماده تجاری در هکتار برای کنترل علف‌های هرز گوجه فرنگی نشایی توصیه شده است (Mousavi and Rastegar, 1997). علف‌کش آکسی‌فلورفن از خانواده دیفنیل اترها و کنترل کننده بسیاری از علف‌های هرز یک ساله پهن برگ و باریک برگ می‌باشد (Tomlin, 1997). نتایج تحقیقات در امریکا نشان داده است که علف‌کش آکسی‌فلورفن علف‌های هرز پهن برگ متعددی را در زراعت گوجه فرنگی کنترل می‌کند (Bonnano, 1987). آکسی‌فلورفن علف‌کشی انتخابی و دو منظوره است که برای کنترل تعدادی از علف‌های هرز پهن برگ و نازک برگ در گروهی از محصولات کشاورزی به صورت پیش‌رویشی و پس‌رویشی مصرف می‌شود (Afrah et al., 2011). این علف‌کش به شدت جذب خاک می‌شود. تجزیه آن توسط نور در آب سریع ولی در سطح خاک کند است (Mousavi and Rastegar, 1997). کاربرد ۱-۵ کیلوگرم ماده موثر در هکتار از علف‌کش آکسی‌فلورفن برای کنترل علف‌های هرز پهن برگ در گوجه فرنگی توصیه شده است (Anonymous, 2012).

ناپروپامید علف‌کش دو منظوره بوده که می‌توان آن را پیش از کاشت، پیش‌رویشی و پیش از انتقال نشاء گوجه فرنگی مصرف نمود. کاربرد علف‌کش ناپروپاماید به میزان ۱-۲ کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار به صورت پیش کاشت و مخلوط با خاک برای کنترل علف‌های هرز پهن و باریک برگ یک ساله در زراعت گوجه فرنگی توصیه می‌شود (Meister, 1994; Zandstra, 2013).

نتایج آزمایشی که در سال ۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد، نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد گوجه فرنگی به ترتیب در تیمارهای کاربرد علف‌کش متری‌بوزین + روپیواتور و روپیواتور مشاهده شد و تیمار وجین دستی و ترکیب آن با علف‌کش بهتر از سایر تیمارها علف‌های هرز

گوجه فرنگی در ایران سالیانه در سطحی معادل ۱۳۲۰۷۰ هکتار با متوسط عملکرد ۳۶۷۶۲ کیلوگرم در هکتار کشت می‌شود. سطح زیر کشت این محصول در استان‌های تهران، اصفهان و خوزستان به ترتیب ۶۷۷۱، ۱۶۲۴ و ۲۷۲۷ هکتار با متوسط عملکرد ۳۵۷۲۳، ۳۳۵۷۲ و ۹۰۲۹ کیلوگرم در هکتار می‌باشد (Anonymous, 2008).

علف‌های هرز برای کسب آب، مواد غذایی، فضای نور با نبات گوجه فرنگی رقابت نموده و باعث کاهش میزان محصول گوجه فرنگی می‌شوند. به طوری که طبق تحقیقات بعمل آمده در ایالت کالیفرنیای امریکا، میزان افت عملکرد محصول در حضور علف هرز سورووف (*Echinochloa crus-galli* L.) P. Beauv. شده است (Norris et al., 2001).

در امریکا کاربرد علف‌کش متری‌بوزین برای کنترل علف‌های هرز مزارع گوجه فرنگی به میزان ۰/۱۲ - ۰/۲۸ کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار به صورت پیش کاشت و پس Meister, 1994; Ahrens, 1994). علف‌کش متری‌بوزین از علف‌کش‌های انتخابی بوده که در زراعت‌های سویا، سیب زمینی، نیشکر و گوجه فرنگی نشایی به کار می‌رود. این علف‌کش بیشتر از طریق ریشه و اندکی از طریق برگ جذب می‌شود. از جمله علف‌های هرز حساس به این علف‌کش تاج خروس، گاوپنه و تاتوره است (Mousavi and Rastegar, 1997).

متری‌بوزین را به میزان ۰/۵ تا ۱ کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار قبل از انتقال نشاء گوجه فرنگی می‌توان برای کنترل علف‌های هرز بکار برد و هم چین کاربرد ۰/۵ کیلوگرم در هکتار از این علف‌کش پس از کاشت بذر در کشت مستقیم و یا پس از انتقال نشاء و در مرحله ۵ تا ۶ برگی گوجه فرنگی نیز توصیه شده است (Ahrens, 1994; Zandstra, 2013).

و کرج به ترتیب P.S. و Early Urbana CH میزان مصرف کود پایه در هر سه منطقه به طور متوسط شامل، کودهای شیمیایی N ۳۵ کیلوگرم در هکتار از منبع اوره، P₂O₅ به میزان ۸۳ کیلوگرم در هکتار از منابع فسفات آمونیم و سوپرفسفات تریپل K₂O به میزان ۷۰ کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم براساس نتایج آزمون خاک در هنگام تهیه زمین بوده است. تاریخ‌های کاشت گوجه فرنگی در دو سال آزمایش در صفحه آباد دزفول، ۱۳۸۵/۴/۱۸ و ۱۳۸۶/۴/۲۶، در اصفهان ۱۳۸۵/۳/۱۵ و ۱۳۸۶/۲/۲۵ و در کرج ۱۳۸۵/۲/۲۸ و ۱۳۸۶/۳/۱۱ بود.

سمپاشی تیمارهای آزمایش به وسیله دستگاه سمپاش پشتی با نازل خط پاش^۱، با فشار ۲/۵ بار و میزان مصرف آب ۳۰۰ لیتر در هکتار انجام شد. بعد از کاربرد تیمارهای علف‌کش پیش کاشت و پیش رویشی مزارع آزمایشی گوجه فرنگی بالاصله آبیاری شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از کاربرد علف‌کش‌های: متربوزین (سنکور® WP 70%) به میزان ۰/۷۵ و ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و پس رویشی در مرحله ۴ برگی گوجه فرنگی، آکسی فلورفن (گل® SE 24%) به میزان ۲ لیتر در هکتار به صورت پیش کاشت و مخلوط با خاک (توسط شن‌کش)، ناپروپامید (دورینول® FL 45%) به میزان ۲/۵ و ۴/۵ کیلوگرم در هکتار پیش کاشت و مخلوط با خاک (توسط شن‌کش)، شاهد با علف هرز و شاهد بدون علف هرز که در این تیمار علف‌های هرز در طول دوره رشد گوجه فرنگی و جین دستی شدند.

ارزیابی شامل تعیین اثرات گیاه‌سوزی علف‌کش‌ها روی گوجه فرنگی طبق روش ارزیابی انجمان تحقیقات علف‌های هرز اروپا (Camper, 1986) به طور هفتگی، تعیین تراکم علف‌های هرز پهن برگ به تفکیک گونه یک ماه بعد از سمپاشی به وسیله

پهن برگ را کنترل نمود (Kazerooni Monfared *et al.*, 2005a). همچنین مشخص شد که تیمارهای وجین دستی و علف‌کش + وجین دستی علف‌های هرز باریک برگ را بهتر از سایر تیمارها کنترل کردند. در مجموع تیمارهای ترکیبی نسبت به تیمارهای منفرد، موجب کاهش بیشتر زیست توده علف‌های هرز و افزایش زیست توده گوجه فرنگی شدند (Kazerooni Monfared *et al.*, 2005b).

نتایج آزمایشی که در سال ۱۳۸۶ در شهرستان ساوجبلاغ به منظور بررسی امکان کنترل علف‌های هرز در گوجه فرنگی با استفاده از علف‌کش‌ها به صورت پس رویشی و در ۴۰، ۳۰ و ۵۰ روز پس از انتقال نشاء انجام شد، نشان داد که کاربرد علف‌کش سولفوسلوفورون ۵۰ گرم ماده تجاری در هکتار بهترین تیمار برای کنترل علف‌های هرز بود و سپس به ترتیب علف‌کش‌های ریم‌سولفوسلوفورون ۶۰ گرم ماده تجاری در هکتار، سولفوسلوفورون ۲۵ گرم ماده تجاری در هکتار و ریم‌سولفوسلوفورون ۳۰ گرم ماده تجاری در هکتار موجب کاهش خسارت علف‌های هرز شدند (Lashkari *et al.*, 2009).

اهداف این آزمایش عبارت بودند از: ۱) بررسی اثر مصرف علف‌کش‌های خاک کاربرد روی علف‌های هرز و عملکرد گوجه فرنگی و انتخاب علف‌کش مناسب ۲) بررسی اثر پس رویشی متربوزین روی علف‌های هرز و عملکرد گوجه فرنگی.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۹ تیمار در ۳ تکرار در مراکز تحقیقات کشاورزی صفحه آباد دزفول، مشکین آباد کرج و اصفهان اجرا شد. عملیات تهیه زمین شامل شخم با گاو آهن برگداندار، دیسک، تسطیح زمین و شیار بندی در بهار هر سال بود. هر کرت آزمایش شامل چهار ردیف گوجه فرنگی به طول ۵ متر و با فاصله بین ردیف ۲ متر بود. ارقام گوجه فرنگی استفاده شده در مناطق دزفول، اصفهان

^۱ Flat fan nozzle

عملکرد تک بوته گوجه فرنگی شمارش و توزین شدند. داده‌های حاصل از شمارش و توزین علف‌های هرز و عملکرد گوجه فرنگی به کمک نرم افزار MSTATC پس از تبدیل به روش لگاریتم طبیعی ($\ln x + 10$) و حصول اطمینان از متجانس بودن واریانس‌ها طبق آزمون Hartley، تجزیه مرکب شده و برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنه‌ای دانکن با اطمینان ۹۵ درصد استفاده شد.

نتایج

علف‌های هرز. جمعاً ۱۹ گونه علف هرز در مزارع آزمایشی گوجه فرنگی در مناطق دزفول، اصفهان و کرج مشاهده شد (جدول ۱).

چهار کادر ۰/۲۵ متر مربعی به طور تصادفی از وسط هر کرت آزمایش و تعیین وزن تر علف‌های هرز چهار ماه بعد از سمپاشی به تفکیک گونه از سطح یک مترمربع از هر کرت آزمایش بود. به طور کلی علاوه بر کود نیتروژن مصرف شده قبلی کود سرک نیتروژن از مرحله قبل تا بعد از گلدهی گوجه فرنگی در ۳ مرحله و به فواصل ۱۵ روز به میزان ۲۵ کیلوگرم در هکتار از منبع اوره در سطح مزرعه در هر سه منطقه توزیع شد.

بعد از شروع رسیدگی گوجه فرنگی، در صفي آباد دزفول در ماه‌های آبان، آذر و دی، در اصفهان، در ماه‌های شهریور و مهر و در کرج، در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر، میوه‌های گوجه فرنگی از دو ردیف وسط هر کرت برداشت شده و به منظور تعیین عملکرد میوه و همچنین

جدول ۱ - علف‌های هرز غالب مزارع آزمایشی گوجه فرنگی در صفي آباد دزفول، اصفهان و کرج در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶.

Table 1. Dominant weed species of tomato experimental fields at Safi Abad of Dezful, Isfahan and Karaj in 2006 and 2007.

Scientific name	Location [†]			English name	Persian name
	Dezful	Isfahan	Karaj		
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	-	-	+	Prostrate pigweed	تاج خروس گسترده
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	-	+	-	Green pigweed	تاج خروس دورگ
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	-	-	+	Redroot pigweed	تاج خروس
<i>Cardaria draba</i> L. Desv.	-	+	-	Hoary cress	ازمک
<i>Chenopodium album</i> L.	-	-	+	Lambsquarters	سلمک
<i>Cleome viscosa</i> L.	+	-	-	wild mustard	کنجید شیطانی
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	+	+	+	Field bindweed	پیچک صحراوی
<i>Corchorus olitorius</i> L.	+	-	-	Jew's mallow	طحله
<i>Cyperus rotundus</i> L.	+	-	-	Yellow nutsedge	اویارسلام
<i>Datura stramonium</i> L.	-	-	+	Jimson weed	تاتوره
<i>Echinochloa crus - galli</i> L.	-	+	+	Barnyard grass	سوروف
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	-	+	-	Licorice	شیرین بیان
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	+	-	+	Common heliotrope	آفتاب پرست
<i>Hibiscus trionum</i> L.	-	-	+	Venice mallow	قوزک
<i>Malva sylvestris</i> L.	+	+	-	Wild mallow	پنیرک
<i>Physalis diabricata</i> L.	+	-	-	Ground cherry	فانوس چینی
<i>Portulaca oleracea</i> L.	+	-	-	Common purslane	خرقه
<i>Setaria viridis</i> L. P. Beauv.	-	+	+	Green foxtail	ارزن وحشی
<i>Solanum nigrum</i> L.	-	+	+	Black nightshade	تاج ریزی سیاه

[†]- Abbreviations: presence of weed (+); absence of weed (-).

[†]- اختصارات: حضور علف هرز (+)، عدم حضور علف هرز (-).

مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز بیش از سایر علف‌کش‌ها بود، لیکن اختلاف تیمارهای علف‌کش معنی‌دار نشد. هیچ کدام از تیمارهای علف‌کش در کاهش وزن تر کنجد شیطانی و مجموع علف‌های هرز مؤثر نبودند (جدول ۲). در سال ۱۳۸۶، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف‌کش در کاهش وزن تر کنجد شیطانی کاربرد متري بوزين به ميزان ۱ کيلوگرم در هكتار به صورت پس رويشي و ناپروپاميد به ميزان ۲/۵ کيلوگرم در هكتار و در کاهش وزن تر مجموع علف‌های هرز متري بوزين به ميزان ۱ کيلوگرم در هكتار به صورت پس رويشي بودند (جدول‌های ۳ و ۴).

ب - صفات زراعی گوجه فرنگی

عملکرد تک بوته. در سال ۱۳۸۵، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمار در افزایش عملکرد تک بوته گوجه فرنگی شاهد بدون علف هرز بود (جدول ۴). مقایسه عملکرد تک بوته گوجه فرنگی در تیمار شاهد بدون علف هرز با شاهد با علف هرز نشان می‌دهد که علف‌های هرز با تراکم ۲۱۲ بوته در مترمربع و با وزن تر ۲/۶۴ کيلوگرم در مترمربع به ميزان ۹۷ درصد باعث کاهش عملکرد تک بوته گوجه فرنگی شدنند (جدول‌های ۲ و ۴).

صفی آباد دزفول

الف - علف‌های هرز

تراکم علف‌های هرز. در سال ۱۳۸۵، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف‌کش در کاهش تراکم کنجد شیطانی شامل متري بوزين به ميزان ۰/۷۵ کيلوگرم در هكتار به صورت پس رويشي و در کاهش تراکم طحله و مجموع علف‌های هرز متري بوزين به ميزان ۱ کيلوگرم در هكتار به صورت پس رويشي بودند (جدول ۲).

در سال ۱۳۸۶، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمار علف‌کش در کاهش تراکم طحله علف‌کش متري بوزين به ميزان ۱ کيلوگرم در هكتار به صورت پس رويشي بود. تاثیر علف‌کش متري بوزين به ميزان ۱ کيلوگرم در هكتار به صورت پس رويشي نيز در کاهش تراکم کنجد شیطانی بيش از سایر علف‌کش‌ها بود اما از نظر آماری اختلاف تیمارهای علف‌کش معنی‌دار نشد. هم‌چنان در کاهش تراکم پنیرک علف‌کش آکسی فلورفن و ناپروپاميد به ميزان ۴/۵ کيلوگرم در هكتار و در کاهش تراکم مجموع علف‌های هرز علف‌کش متري بوزين به ميزان ۱ کيلوگرم در هكتار به صورت پس رويشي و آکسی فلورفن کارابي بيشتری داشتند (جدول‌های ۳ و ۴).

وزن تر علف‌های هرز. در سال ۱۳۸۵، تاثیر کاربرد علف‌کش متري بوزين به ميزان ۱ و ۰/۷۵ کيلوگرم در هكتار به صورت پس رويشي در کاهش وزن تر طحله در

جدول ۲ - اثر تیمارهای علف کش بر تعداد و وزن تر طحله، کنجد شیطانی و مجموع علف های هرز در منطقه صفوی آباد دزفول در سال ۱۳۸۵.

Table 2. Effect of herbicide treatments on density and fresh weight of *Corchorus olitorius*, *Cleome viscosa* and total weeds in Safi abad of Dezful region, in 2006

Herbicide Treatments	Rate kg or) (lit/ha)	Density (no./m ²)		Total weeds	Fresh weight (kg/m ²)		Total weeds
		<i>Corchorus olitorius</i>	<i>Cleome viscosa</i>		<i>Corchorus olitorius</i>	<i>Cleome viscosa</i>	
Metribuzin PRE	0.75	24 ^{de}	10 ^{bcd}	37 ^{cd}	1.05 ^{ab}	1.86 ^{ab}	2.92 ^a
Metribuzin PRE	1	13 ^{ef}	12 ^{bc}	25 ^d	1.12 ^{ab}	2.38 ^a	3.50 ^a
Metribuzin POST	0.75	48 ^{bcd}	25 ^{ab}	80 ^{abc}	0.88 ^{ab}	1.88 ^{ab}	2.76 ^a
Metribuzin POST	1	38 ^{cde}	16 ^{abc}	60 ^{bcd}	0.86 ^{ab}	1.60 ^{ab}	2.46 ^a
Oxyfluorfen PPI	2	109 ^{abc}	57 ^a	168 ^{ab}	1.70 ^a	1.93 ^{ab}	3.64 ^a
Napropamide PPI	2.5	48 ^{bcd}	18 ^{abc}	73 ^{abc}	1.32 ^a	2.62 ^a	3.94 ^a
Napropamide PPI	4.5	110 ^{ab}	38 ^{ab}	157 ^{ab}	1.33 ^a	2.26 ^a	3.60 ^a
Weedy check	-	172 ^a	30 ^{ab}	212 ^a	1.61 ^a	1.02 ^{ab}	2.64 ^a

† - در هر ستون اعدادی که دارای یک حرف مشترک می باشد تفاوت معنی داری ندارند (دانکن، $\alpha = 0.05$).

† - Means within a column followed by the same letter are not significantly different (Duncan's Multiple Range Test $\alpha = 0.05$).

PRE= Pre-Emergence, POST= Post-Emergence, PPI= Pre-Plant Incorporated

جدول ۳ - اثر تیمارهای علف کش بر تعداد و وزن تر طحله، کنجد شیطانی و پنیرک در منطقه صفوی آباد دزفول در سال ۱۳۸۶.

Table 3. Effect of herbicide treatments on density and fresh weight of *Corchorus olitorius*, *Cleome viscosa* and *Malva sylvestris* in Safi abad of Dezful region, in 2007.

Herbicide Treatments	Rate kg or) (lit/ha)	Density (no./m ²)		<i>Malva sylvestris</i>	Fresh weight (kg/m ²)		<i>Malva sylvestris</i>
		<i>Corchorus olitorius</i>	<i>Cleome viscosa</i>		<i>Corchorus olitorius</i>	<i>Cleome viscosa</i>	
Metribuzin PRE	0.75	24 ^{ab}	5 ^b	11 ^{ab}	0.14 ^a	1.48 ^{ab}	0.36 ^a
Metribuzin PRE	1	7 ^{bed}	1 ^b	12 ^{ab}	0 ^a	0.47 ^{bcd}	0.14 ^a
Metribuzin POST	0.75	13 ^{a-d}	3 ^b	15 ^{ab}	0.36 ^a	0.49 ^{bcd}	0.08 ^a
Metribuzin POST	1	3 ^{cd}	3 ^b	51 ^a	0.11 ^a	0.13 ^d	0.26 ^a
Oxyfluorfen PPI	2	20 ^{ab}	3 ^b	1 ^b	1.32 ^a	1.23 ^{abc}	0.02 ^a
Napropamide PPI	2.5	19	5 ^b	8 ^{ab}	0.53 ^a	0.18 ^d	0.12 ^a
Napropamide PPI	4.5	20 ^{ab}	4 ^b	3 ^b	0 ^a	0.53 ^{bcd}	0.06 ^a
Weedy check	-	28 ^a	19 ^a	9 ^{ab}	0.76 ^a	2.13 ^a	0.13 ^a

† - در هر ستون اعدادی که دارای یک حرف مشترک می باشد تفاوت معنی داری ندارند (دانکن، $\alpha = 0.05$).

† - Means within a column followed by the same letter are not significantly different (Duncan's Multiple Range Test $\alpha = 0.05$).

PRE= Pre-Emergence, POST= Post-Emergence, PPI= Pre-Plant Incorporated

متری بوزین به میزان ۱ کیلو گرم در هکتار به صورت پس رویشی بودند (جدول ۴). مقایسه عملکرد تک بوته گوجه فرنگی در تیمار شاهد بدون علف هرز با شاهد با علف هرز نشان می دهد که علف های هرز با تراکم ۵۶ بوته در

در سال ۱۳۸۶، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثر ترین تیمارها در افزایش عملکرد تک بوته گوجه فرنگی به ترتیب متری بوزین به میزان ۰/۷۵ کیلو گرم در هکتار به صورت پس رویشی، شاهد بدون علف هرز و

در سال ۱۳۸۶، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی به ترتیب شاهد بدون علف هرز، متری بوزین به میزان ۰/۷۵ و ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پس رویشی بودند (جدول ۴). مقایسه عملکرد میوه گوجه فرنگی در تیمار شاهد بدون علف هرز با شاهد با علف هرز نشان می دهد که علف های هرز با تراکم ۵۶ بوته در مترمربع و با وزن تر ۲/۸۹ کیلوگرم در مترمربع به میزان ۹۳ درصد باعث کاهش میوه گوجه فرنگی شدند (جدول ۴).

مترمربع و با وزن تر ۲/۸۹ کیلوگرم در مترمربع به میزان ۸۹ درصد باعث کاهش عملکرد تک بوته گوجه فرنگی شدند (جدول ۴).

عملکرد میوه. در سال ۱۳۸۵، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمار در افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی شاهد بدون علف هرز بود (جدول ۴). مقایسه عملکرد میوه گوجه فرنگی در تیمار شاهد بدون علف هرز با شاهد با علف هرز نشان می دهد که علف های هرز با تراکم ۲۱۲ بوته در مترمربع و با وزن تر ۲/۶۴ کیلوگرم در مترمربع به میزان ۹۸ درصد باعث کاهش عملکرد میوه گوجه فرنگی شدند (جدول های ۲ و ۴).

جدول ۴ - اثر تیمارهای علف کش بر عملکرد تک بوته و عملکرد میوه گوجه فرنگی در سال ۱۳۸۵، تعداد و وزن تر مجموع علف های هرز و عملکرد تک بوته و عملکرد میوه گوجه فرنگی در سال ۱۳۸۶ در منطقه صنی آباد دزفول.

Table 4. Effect of herbicide treatments on tomato yield per plant and tomato fruit yield in 2006, density and fresh weight of total weeds and tomato yield per plant and tomato fruit yield in Safi abad of Dezful region in 2007.

Herbicide Treatments	Rate kg or) (lit/ha	2006			2007		
		Yield per plant (kg)	Tomato fruit yield (t/ha)	Total weed density (no./m ²)	Total fresh weight (kg/m ²)	Yield per plant (kg)	Tomato fruit yield (t/ha)
Metribuzin PRE	0.75	0.046 ^b	1.547 ^b	40 ^{ab}	1.99 ^{abc}	0.087 ^{bcd}	1.139 ^{bcde}
Metribuzin PRE	1	0.125 ^b	3.237 ^b	20 ^{ab}	0.62 ^{de}	0.149 ^{abc}	1.981 ^{bcde}
Metribuzin POST	0.75	0.057 ^b	1.027 ^b	31 ^{ab}	0.94 ^{cde}	0.227 ^a	3.167 ^{ab}
Metribuzin POST	1	0.039 ^b	0.973 ^b	57 ^a	0.50 ^{de}	0.213 ^{ab}	2.380 ^{abc}
Oxyfluorfen PPI	2	0.033 ^b	1.173 ^b	24 ^{ab}	2.58 ^{ab}	0.050 ^{cd}	0.667 ^{cd}
Napropamide PPI	2.5	0.017 ^b	0.259 ^b	32 ^{ab}	0.83 ^{cde}	0.158 ^{abc}	1.870 ^{bcde}
Napropamide PPI	4.5	0.029 ^b	0.837 ^b	27 ^{ab}	0.60 ^{de}	0.208 ^{ab}	2.074 ^{a-d}
Weedy check	-	0.012 ^b	0.187 ^b	56 ^a	2.89 ^a	0.022 ^d	0.278 ^d
Weed free check	-	0.484 ^a	16.219 ^a	-	-	0.216 ^{ab}	4.139 ^a

[†] - در هر ستون عددی که دارای یک حرف مشترک می باشد تفاوت معنی داری ندارند (دانکن، $\alpha = 0.05$).

[‡] - Means within a column followed by the same letter are not significantly different (Duncan's Multiple Range Test $\alpha = 0.05$).

PRE= Pre-Emergence, POST= Post-Emergence, PPI= Pre-Plant Incorporated

اصفهان

کاربرد آکسی فلورفن و متری بوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پس رویشی بودند (جدول های ۵ و ۷). در سال ۱۳۸۶، اثر تیمارهای علف کش بر تراکم ازمک، تاج

الف - علف های هرز
تراکم علف های هرز. در سال ۱۳۸۵، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در کاهش تراکم ازمک، تاج خروس دورگ و مجموع علف های هرز

هکتار به صورت پس رویشی بودند (جدول‌های ۵ و ۷). در سال ۱۳۸۶، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در کاهش وزن تراجم خروس دورگ کاربرد ناپردازید به میزان ۲/۵ کیلوگرم در هکتار بود (جدول ۶). اثر تیمارهای علف کش بر وزن ترازمک، پیچک و مجموع علف‌های هرز معنی‌دار نشد (جدول‌های ۶ و ۸).

خروس دورگ، پیچک و مجموع علف‌های هرز معنی‌دار نشد (جدول‌های ۶ و ۸).

وزن ترا علف‌های هرز. در سال ۱۳۸۵، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در کاهش وزن ترازمک، تراجم خروس دورگ و مجموع علف‌های هرز کاربرد آکسی فلورفن و متربوزین به میزان ۱ کیلوگرم در

جدول ۵ - اثر تیمارهای علف کش بر تعداد و وزن ترازمک، تراجم خروس دورگ در منطقه اصفهان در سال ۱۳۸۵.

Table 5. Effect of herbicide treatments on density and fresh weight of *Cardaria draba* and *Amaranthus hybridus* in Isfahan region, in 2006.

Herbicide Treatments	Density (no./m ²)		Fresh weight (kg/m ²)		
	Rate (kg or lit/ha)	<i>Cardaria draba</i>	<i>Amaranthus hybridus</i>	<i>Cardaria draba</i>	<i>Amaranthus hybridus</i>
Metribuzin PRE	0.75	3 ^a	1 ^{b,c}	0.66 ^a	0.42 ^{b,c}
Metribuzin PRE	1	2 ^a	2 ^b	0.48 ^{ab}	0.52 ^{ab}
Metribuzin POST	0.75	2 ^a	2 ^b	0.47 ^{ab}	0.71 ^{ab}
Metribuzin POST	1	1 ^{b,c}	0.7 ^{cd}	0.22 ^{b,c}	0.22 ^{cd}
Oxyfluorfen PPI	2	0.7 ^c	0.3 ^d	0.15 ^c	0.08 ^d
Napropamide PPI	2.5	2 ^a	2 ^b	0.52 ^a	0.63 ^{ab}
Napropamide PPI	4.5	3 ^a	2 ^b	0.58 ^a	0.65 ^{ab}
Weedy check	-	4 ^a	3 ^a	0.74 ^a	0.78 ^a

[†] - در هر ستون اعدادی که دارای یک حرف مشترک می‌باشد تفاوت معنی‌داری ندارند (دانکن، $\alpha = 0.05$).

[‡] - Means within a column followed by the same letter are not significantly different (Duncan's Multiple Range Test $\alpha = 0.05$).

PRE= Pre-Emergence, POST= Post-Emergence, PPI= Pre-Plant Incorporated

جدول ۶ - اثر تیمارهای علف کش بر تعداد و وزن ترازمک و تراجم خروس دورگ در منطقه اصفهان در سال ۱۳۸۶.

Table 6. Effect of herbicide treatments on density and fresh weight of *Cardaria draba* and *Amaranthus hybridus* in Isfahan region, in 2007.

Herbicide Treatments	Density (no./m ²)		Fresh weight (kg/m ²)		
	Rate (kg or lit/ha)	<i>Cardaria draba</i>	<i>Amaranthus hybridus</i>	<i>Cardaria draba</i>	<i>Amaranthus hybridus</i>
Metribuzin PRE	0.75	2 a	2 a	0.29 a	0.56 ab
Metribuzin PRE	1	2 a	2 a	0.70 a	0.82 a
Metribuzin POST	0.75	2 a	3 a	0.52 a	0.81 a
Metribuzin POST	1	1 a	2 a	0.22 a	0.48 a
Oxyfluorfen PPI	2	1 a	1 a	0.17 a	0.31 ab
Napropamide PPI	2.5	3 a	1 a	0.48 a	0.18 b
Napropamide PPI	4.5	1 a	2 a	0.29 a	0.45 ab
Weedy check	-	3 a	2 a	0.48 a	0.66 ab

[†] - در هر ستون اعدادی که دارای یک حرف مشترک می‌باشد تفاوت معنی‌داری ندارند (دانکن، $\alpha = 0.05$).

[‡] - Means within a column followed by the same letter are not significantly different (Duncan's Multiple Range Test $\alpha = 0.05$).

PRE= Pre-Emergence, POST= Post-Emergence, PPI= Pre-Plant Incorporated

عملکرد میوه گوجه فرنگی به ترتیب شاهد بدون علف هرز، ناپروپامید به میزان ۴/۵ کیلوگرم در هکتار، متربوزین به میزان ۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پس رویشی و ناپروپامید به میزان ۴/۵ کیلوگرم بودند (جدول ۷). مقایسه عملکرد میوه گوجه فرنگی در تیمار شاهد بدون علف هرز با شاهد با علف هرز نشان می‌دهد که علف‌های هرز با تراکم ۲۶ بوته در مترمربع و با وزن تر ۳/۲۷ کیلوگرم در مترمربع به میزان ۵۴ درصد باعث کاهش عملکرد میوه گوجه فرنگی شدند (جدول ۷).

در سال ۱۳۸۶، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی به ترتیب شاهد بدون علف هرز و متربوزین به میزان ۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی بودند (جدول ۸). مقایسه عملکرد میوه گوجه فرنگی در تیمار شاهد بدون علف هرز با شاهد با علف هرز نشان می‌دهد که علف‌های هرز با تراکم ۱۳ بوته در مترمربع و با وزن تر ۲/۱۷ کیلوگرم در مترمربع به میزان ۱۷ درصد باعث کاهش عملکرد میوه گوجه فرنگی شدند (جدول ۸).

جدول ۷- اثر تیمارهای علف کش بر مجموع تعداد و وزن تر علف‌های هرز، عملکرد تک بوته و عملکرد میوه گوجه فرنگی در

منطقه اصفهان در سال ۱۳۸۵.

Table 7. Effect of herbicide treatments on total density and fresh weight of weeds, tomato yield per plant and tomato fruit yield in Isfahan region, in 2006.

Herbicide Treatments	Rate (kg or lit/ha)	Total weed density (no./m ²)	Total weed fresh weight (kg/m ²)	Yield per plant (kg)	Tomato fruit yield (t/ha)
Metribuzin PRE	0.75	16 ^{bc}	2.3 ^c	1.037 ^b	51.433 ^{bc}
Metribuzin PRE	1	14 ^{cd}	2 ^c	0.860 ^{bcd}	41.033 ^d
Metribuzin POST	0.75	16 ^{bc}	2.2 ^{bc}	0.977 ^{bc}	42.867 ^d
Metribuzin POST	1	11 ^{de}	1.25 ^d	1.030 ^b	49.833 ^{bc}
Oxyfluorfen PPI	2	10 ^e	1.25 ^d	1.007 ^b	42.367 ^d
Napropamide PPI	2.5	20 ^{ab}	2.68 ^{abc}	0.947 ^{bc}	45.003 ^{cd}
Napropamide PPI	4.5	21 ^a	2.78 ^{ab}	1.297 ^a	54.033 ^b
Weedy check	-	26 ^a	3.27 ^a	0.693 ^d	33.167 ^e
Weed free check	-	-	-	1.403 ^a	72.067 ^a

[†]- در هر ستون اعدادی که دارای یک حرف مشترک می‌باشند تفاوت معنی‌داری ندارند (دانکن، $\alpha = 0.05$).

[‡] - Means within a column followed by the same letter are not significantly different (Duncan's Multiple Range Test $\alpha = 0.05$).

PRE= Pre-Emergence, POST= Post-Emergence, PPI= Pre-Plant Incorporated

ب - صفات زراعی گوجه فرنگی

عملکرد تک بوته در سال ۱۳۸۵، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در افزایش عملکرد تک بوته گوجه فرنگی شاهد بدون علف هرز و ناپروپامید به میزان ۴/۵ کیلوگرم در هکتار بودند (جدول ۷). مقایسه عملکرد تک بوته گوجه فرنگی در تیمار شاهد بدون علف هرز با شاهد با علف هرز نشان می‌دهد که علف‌های هرز با تراکم ۲۶ بوته در مترمربع و با وزن تر ۳/۲۷ کیلوگرم در مترمربع به میزان ۵۰ درصد باعث کاهش عملکرد تک بوته گوجه فرنگی شدند (جدول ۷).

در سال ۱۳۸۶، هرچند اثر تیمارهای علف کش بر عملکرد تک بوته گوجه فرنگی معنی‌دار نشد (جدول ۸)، اما مقایسه عملکرد تک بوته گوجه فرنگی در تیمار شاهد بدون علف هرز با شاهد با علف هرز نشان می‌دهد که علف‌های هرز با تراکم ۱۳ بوته در مترمربع و با وزن تر ۲/۱۷ کیلوگرم در مترمربع به میزان ۳۸ درصد باعث کاهش عملکرد تک بوته گوجه فرنگی شدند (جدول ۸).

عملکرد میوه. در سال ۱۳۸۵، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در افزایش

جدول ۸ - اثر تیمارهای علف کش بر مجموع تعداد و وزن تر علف های هرز، عملکرد تک بوته و عملکرد میوه گوجه فرنگی در منطقه اصفهان در سال ۱۳۸۶.

Table 8. Effect of herbicide treatments on total density and fresh weight of weeds, tomato yield per plant and tomato fruit yield in Isfahan region, in 2007.

Herbicide Treatments	Rate (kg or lit/ha)	Total weed density (no./m ²)	Total weed fresh weight (kg/m ²)	Yield per plant (kg)	Tomato fruit yield (t/ha)
Metribuzin PRE	0.75	13 ^a	2.78 ^a	1.402 ^a	69.517 ^{ab}
Metribuzin PRE	1	11 ^a	2.81 ^a	1.173 ^a	58.100 ^{bc}
Metribuzin POST	0.75	16 ^a	3.20 ^a	1.042 ^a	51.017 ^c
Metribuzin POST	1	15 ^a	3.02 ^a	1.027 ^a	49.873 ^c
Oxyfluorfen PPI	2	12 ^a	2.86 ^a	1.198 ^a	57.150 ^{bc}
Napropamide PPI	2.5	16 ^a	2.29 ^a	1.493 ^a	56.033 ^{bc}
Napropamide PPI	4.5	13 ^a	2.70 ^a	1.216 ^a	59.217 ^{bc}
Weedy check	-	13 ^a	2.17 ^a	0.994 ^a	64.967 ^{abc}
Weed free check	-	-	-	1.623 ^a	78.300 ^a

[†] - در هر ستون اعدادی که دارای یک حرف مشترک می باشد تفاوت معنی داری ندارند (دانکن، %۵). (α = %۵).

[†] - Means within a column followed by the same letter are not significantly different (Duncan's Multiple Range Test α = 0.05).

PRE= Pre-Emergence, POST= Post-Emergence, PPI= Pre-Plant Incorporated

کرج

الف - علف های هرز

وزن تر علف های هرز. در سال ۱۳۸۵، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در کاهش وزن تر سلمک تیمارهای پیش رویشی متربوزین و ناپروپامید به میزان ۴/۵ کیلوگرم در هکتار، در کاهش وزن تر تاتوره متربوزین به میزان ۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و ناپروپامید به میزان ۴/۵ کیلوگرم در هکتار، در کاهش وزن تر تاج ریزی متربوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی آکسی فلورفن و آکسی فلورفن و مجموع علف های هرز کاربرد آکسی فلورفن بودند (جدول های ۹ و ۱۱).

در سال ۱۳۸۶، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در کاهش تراکم سلمک کاربرد پیش رویشی متربوزین، در کاهش تراکم تاتوره تیمارهای متربوزین به میزان ۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی آکسی فلورفن تاج ریزی آکسی فلورفن و در کاهش تراکم مجموع علف های هرز کاربرد آکسی فلورفن بودند (جدول های ۹ و ۱۱).

در سال ۱۳۸۶، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در کاهش تراکم سلمک کاربرد پیش رویشی متربوزین، در کاهش تراکم تاتوره تیمارهای متربوزین به میزان ۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی، در کاهش تراکم تاج ریزی آکسی فلورفن و در کاهش تراکم مجموع علف های هرز کاربرد آکسی فلورفن بودند (جدول های ۹ و ۱۱).

در سال ۱۳۸۶، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در کاهش تراکم سلمک کاربرد پیش رویشی متربوزین، در کاهش تراکم تاتوره تیمارهای متربوزین به میزان ۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی آکسی فلورفن تاج ریزی آکسی فلورفن و در کاهش تراکم مجموع علف های هرز کاربرد آکسی فلورفن بودند (جدول های ۹ و ۱۱).

پیش رویشی بودند (جدول های ۱۰ و ۱۲).

تراکم علف های هرز. در سال ۱۳۸۵، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در کاهش تراکم سلمک کاربرد متربوزین به میزان ۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی، در کاهش تراکم تاتوره تیمارهای متربوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی آکسی فلورفن، آکسی فلورفن و ناپروپامید به میزان ۴/۵ کیلوگرم در هکتار، در کاهش تراکم تاج ریزی آکسی فلورفن و در کاهش تراکم مجموع علف های هرز کاربرد آکسی فلورفن بودند (جدول های ۹ و ۱۱).

در سال ۱۳۸۶، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در کاهش تراکم سلمک کاربرد پیش رویشی متربوزین، در کاهش تراکم تاتوره تیمارهای متربوزین به میزان ۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی آکسی فلورفن تاج ریزی آکسی فلورفن و در کاهش تراکم مجموع علف های هرز کاربرد آکسی فلورفن بودند (جدول های ۹ و ۱۱).

در سال ۱۳۸۶، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در کاهش تراکم سلمک کاربرد پیش رویشی متربوزین، در کاهش تراکم تاتوره تیمارهای متربوزین به میزان ۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی آکسی فلورفن تاج ریزی آکسی فلورفن و در کاهش تراکم مجموع علف های هرز کاربرد آکسی فلورفن بودند (جدول های ۹ و ۱۱).

پیش رویشی بودند (جدول های ۱۰ و ۱۲).

جدول ۹ - اثر تیمارهای علف کش بر تعداد و وزن تر سلمک، تاتوره و تاج‌ریزی در منطقه کرج در سال ۱۳۸۵.

Table 9. Effect of herbicide treatments on density and fresh weight of *Chenopodium album*, *Datura stramonium* and *Solanum nigrum* in Karaj region, in 2006.

Herbicide Treatments	Rate (kg or lit/ha)	Density (no./m ²)			Fresh weight (kg/m ²)		
		<i>Chenopodium album</i>	<i>Datura stramonium</i>	<i>Solanum nigrum</i>	<i>Chenopodium album</i>	<i>Datura stramonium</i>	<i>Solanum nigrum</i>
Metribuzin PRE	0.75	0.3 ^c	0.7 ^{bc}	5.3 ^{abc}	0.02 ^{bc}	0.13 ^{bc}	0.20 ^{ab}
Metribuzin PRE	1	0.3 ^c	0.7 ^{bc}	4.3 ^{b-e}	0.00 ^c	0.15 ^{bc}	0.13 ^{ab}
Metribuzin POST	0.75	2 ^b	1.3 ^{ab}	8.3 ^{ab}	0.10 ^b	0.27 ^{abc}	0.22 ^{ab}
Metribuzin POST	1	1.3 ^{bc}	1 ^{bc}	5 ^{bcd}	0.04 ^{bc}	0.21 ^{bc}	0.11 ^{ab}
Oxyfluorfen PPI	2	0.7 ^c	0.7	1.3 ^{de}	0.09 ^b	0.15 ^{bc}	0.11 ^{ab}
Napropamide PPI	2.5	1 ^{bc}	2 ^a	6.7 ^{ab}	0.04 ^{bc}	0.32 ^{ab}	0.15 ^{ab}
Napropamide PPI	4.5	0.7 ^c	0.7 ^{bc}	7.7 ^{ab}	0.02 ^{bc}	0.08 ^{bc}	0.23 ^{ab}
Weedy check	-	4.3 ^a	2 ^a	9 ^a	0.18 ^a	0.52 ^a	0.29 ^a

† - در هر ستون عددی که دارای یک حرف مشترک می‌باشد تفاوت معنی‌داری ندارند (دانکن، $\alpha = 0.05$).‡ - Means within a column followed by the same letter are not significantly different (Duncan's Multiple Range Test $\alpha = 0.05$).

PRE= Pre-Emergence, POST= Post-Emergence, PPI= Pre-Plant Incorporated

جدول ۱۰ - اثر تیمارهای علف کش بر تعداد و وزن تر سلمک، تاتوره و تاج‌ریزی در منطقه کرج در سال ۱۳۸۶.

Table 10. Effect of herbicide treatments on density and fresh weight of *Chenopodium album*, *Datura stramonium* and *Solanum nigrum* in Karaj region, in 2007.

Herbicide Treatments	Rate (kg or lit/ha)	Density (no./m ²)			Fresh weight (kg/m ²)		
		<i>Chenopodium album</i>	<i>Datura stramonium</i>	<i>Solanum nigrum</i>	<i>Chenopodium album</i>	<i>Datura stramonium</i>	<i>Solanum nigrum</i>
Metribuzin PRE	0.75	0 ^d	1 ^{de}	5.7 ^{bc}	0.0 ^c	0.03 ^d	0.07 ^a
Metribuzin PRE	1	0 ^d	1.7 ^d	5 ^{bc}	0.0 ^c	0.03 ^d	0.04 ^b
Metribuzin POST	0.75	2.3 ^b	1.7 ^d	10.3 ^a	0.03 ^b	0.05 ^{cd}	0.02 ^c
Metribuzin POST	1	1 ^c	1 ^{de}	6.7 ^b	0.01 ^{bc}	0.05 ^{cd}	0.03 ^{bc}
Oxyfluorfen PPI	2	0.7 ^{cd}	2 ^d	0.3 ^d	0.03 ^b	0.05 ^{cd}	0.01 ^d
Napropamide PPI	2.5	2 ^b	13 ^b	3.7 ^c	0.03 ^b	0.14 ^b	0.01 ^d
Napropamide PPI	4.5	1 ^c	9 ^c	5 ^{bc}	0.01 ^{bc}	0.07 ^c	0.01 ^d
Weedy check	-	7.7 ^a	57 ^a	11 ^a	0.07 ^a	0.25 ^a	0.08 ^a

† - در هر ستون عددی که دارای یک حرف مشترک می‌باشد تفاوت معنی‌داری ندارند (دانکن، $\alpha = 0.05$).‡ - Means within a column followed by the same letter are not significantly different (Duncan's Multiple Range Test $\alpha = 0.05$).

PRE= Pre-Emergence, POST= Post-Emergence, PPI= Pre-Plant Incorporated

مقایسه عملکرد تک بوته گوجه فرنگی در تیمار شاهد بدون علف هرز با شاهد با علف هرز نشان می‌دهد که علف‌های هرز با تراکم ۲۴ بوته در مترمربع و با وزن تر ۱/۴۴ کیلوگرم در مترمربع به میزان ۹۸ درصد باعث

ب - صفات زراعی گوجه فرنگی
عملکرد تک بوته در سال ۱۳۸۵، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمار در افزایش عملکرد تک بوته گوجه فرنگی شاهد بدون علف هرز بود (جدول ۱۱).

متربوزین به صورت پیش رویشی بودند (جدول ۱۲). مقایسه عملکرد تک بوته گوجه فرنگی در تیمار شاهد بدون علف هرز با شاهد با علف هرز نشان می دهد که علف های هرز با تراکم ۲۷۹ بوته در مترمربع و با وزن تر کیلوگرم در مترمربع به میزان ۹۹ درصد باعث کاهش عملکرد تک بوته گوجه فرنگی شدند (جدول های ۱۰ و ۱۲).

کاهش عملکرد تک بوته گوجه فرنگی شدند (جدول های ۹ و ۱۱). در مجموع اثر تیمارهای علف کش بر عملکرد تک بوته گوجه فرنگی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند.

در سال ۱۳۸۶، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در افزایش عملکرد تک بوته گوجه فرنگی شاهد بدون علف هرز، آکسی فلورفن و

جدول ۱۱ - اثر تیمارهای علف کش بر مجموع تعداد و وزن تر علف های هرز، عملکرد میوه گوجه فرنگی در منطقه کرج در سال ۱۳۸۵.

Table 11. Effect of herbicide treatments on total density and fresh weight of weeds, tomato yield per plant and tomato fruit yield in Karaj region, in 2006.

Herbicide Treatments	Rate kg or) (lit/ha	Total weed density (no./m ²)	Total weed fresh weight (kg/m ²)	Yield per plant (kg)	Tomato fruit yield (t/ha)
Metribuzin PRE	0.75	11 cd	0.49 cd	0.059 b	1.927 bc
Metribuzin PRE	1	8 de	0.44 cd	0.115 b	3.201 bc
Metribuzin POST	0.75	19 ab	0.76 bc	0.029 b	0.744 bc
Metribuzin POST	1	16 bc	0.58 ef	0.028 b	0.779 bc
Oxyfluorfen PPI	2	4 ef	0.46 cd	0.139 b	4.170 b
Napropamide PPI	2.5	15 bcd	0.86 b	0.060 b	1.804 bc
Napropamide PPI	4.5	13 bcd	0.57 bc	0.082 b	2.472 bc
Weedy check	-	24 a	1.44 a	0.009 b	0.215 c
Weed free check	-	-	-	0.579 a	22.413 a

† - در هر ستون اعدادی که دارای یک حرف مشترک می باشند تفاوت معنی داری ندارند (دانکن، $\alpha = 0.05$).

‡ - Means within a column followed by the same letter are not significantly different (Duncan's Multiple Range Test $\alpha = 0.05$).

PRE= Pre-Emergence, POST= Post-Emergence, PPI= Pre-Plant Incorporated

در سال ۱۳۸۶، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی به ترتیب شاهد بدون علف هرز، آکسی فلورفن و متربوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی بودند (جدول ۱۲). مقایسه عملکرد میوه گوجه فرنگی در تیمار شاهد بدون علف هرز با شاهد با علف هرز نشان می دهد که علف های هرز با تراکم ۲۷۹ بوته در مترمربع و با وزن تر کیلوگرم در مترمربع به میزان ۹۹ درصد باعث کاهش عملکرد میوه گوجه فرنگی شدند (جدول های ۹ و ۱۲).

عملکرد میوه. در سال ۱۳۸۵، در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز، مؤثرترین تیمارهای علف کش در افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی به ترتیب شاهد بدون علف هرز و آکسی فلورفن بودند (جدول ۱۱). مقایسه عملکرد میوه گوجه فرنگی در تیمار شاهد بدون علف هرز با شاهد با علف هرز نشان می دهد که علف های هرز با تراکم ۲۴ بوته در مترمربع و با وزن تر کیلوگرم در مترمربع به میزان ۹۹ درصد باعث کاهش عملکرد میوه گوجه فرنگی شدند (جدول های ۹ و ۱۱).

جدول ۱۲- اثر تیمارهای علف کش بر مجموع تعداد و وزن تر علف‌های هرز، عملکرد تک بوته و عملکرد میوه گوجه فرنگی در منطقه کرج در سال ۱۳۸۶.

Table 12. Effect of herbicide treatments on total density and fresh weight of weeds, tomato yield per plant and tomato fruit yield in Karaj region, in 2007.

Herbicide Treatments	Rate (kg or lit/ha)	Total weed density (no./m ²)	Total weed fresh weight (kg/m ²)	Yield per plant (kg)	Tomato fruit yield (t/ha)
Metribuzin PRE	0.75	14 ^c	0.34 ^d	0.143 ^{b,c}	4.81 ^{b,c}
Metribuzin PRE	1	12 ^c	0.15 ^e	0.150 ^b	5.59 ^b
Metribuzin POST	0.75	44 ^c	0.35 ^d	0.092 ^d	2.81 ^d
Metribuzin POST	1	21 ^d	0.17 ^e	0.104 ^{cd}	3.52 ^{cd}
Oxyfluorfen PPI	2	13 ^e	0.21 ^e	0.153 ^b	5.77 ^b
Napropamide PPI	2.5	112 ^b	0.79 ^b	0.013 ^e	0.36 ^e
Napropamide PPI	4.5	101 ^b	0.62 ^c	0.018 ^e	0.54 ^e
Weedy check	-	279 ^a	1.20 ^a	0.003 ^e	0.084 ^e
Weed free check	-	-	-	0.402 ^a	17.18 ^a

[†]- در هر ستون عددی که دارای یک حرف مشترک می‌باشد تفاوت معنی‌داری ندارند (دانکن، $\alpha = 0.05$).

[†] - Means within a column followed by the same letter are not significantly different (Duncan's Multiple Range Test $\alpha = 0.05$).

PRE= Pre-Emergence, POST= Post-Emergence, PPI= Pre-Plant Incorporated

بحث

پس رویشی موثرترین تیمارها بودند (جدول‌های ۵، ۶، ۷ و ۸).

در منطقه کرج، در کاهش مجموع تعداد و وزن تر علف‌های هرز تیمارهای کاربرد متربوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و آکسی فلورفن در کنترل مجموع تعداد علف‌های هرز موثرترین بودند. در همین منطقه تیمارهای کاربرد متربوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پس رویشی و ناپروپامید به میزان ۴/۵ کیلوگرم در هکتار و در کاهش مجموع وزن تر علف‌های هرز و در افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی شاهد بدون علف هرز، متربوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و آکسی فلورفن موثرترین تیمارها بودند (جدول‌های ۹، ۱۰ و ۱۱ و ۱۲).

به طور میانگین، در مناطق صفتی آباد دزفول، اصفهان و کرج، رقابت علف‌های هرز با گیاه گوجه فرنگی به میزان ۷۷ درصد باعث کاهش عملکرد میوه گوجه فرنگی شد. توصیه کاربرد علف کش متربوزین برای کنترل علف‌های هرز مزارع گوجه فرنگی به صورت پیش رویشی و پس رویشی و هم‌چنین کاربرد علف کش ناپروپامید به صورت پیش کاشت و مخلوط با خاک برای کنترل علف‌های هرز پهن و باریک برگ یک ساله در زراعت گوجه فرنگی در امریکا

به طور کلی در منطقه صفتی آباد دزفول، تیمارهای کاربرد متربوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و آکسی فلورفن در کنترل مجموع تعداد علف‌های هرز موثرترین بودند. در همین منطقه تیمارهای کاربرد متربوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پس رویشی و ناپروپامید به میزان ۴/۵ کیلوگرم در هکتار و در کاهش مجموع وزن تر علف‌های هرز و در افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی شاهد بدون علف هرز و متربوزین به میزان ۰/۷۵ و ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پس رویشی موثرترین تیمارها بودند (جدول‌های ۲، ۳ و ۴).

در منطقه اصفهان، در کاهش مجموع تعداد و وزن تر علف‌های هرز، تیمارهای کاربرد آکسی فلورفن و متربوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پس رویشی و در افزایش عملکرد میوه گوجه فرنگی شاهد بدون علف هرز، ناپروپامید به میزان ۴/۵ کیلوگرم در هکتار و متربوزین به میزان ۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی و ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت

آزمایشی که در سال‌های ۸۳ - ۱۹۸۲ در امریکا با علف‌کش‌ها به صورت مصرف به تنهایی، ترکیب و یا تقسیط شده روی گوجه فرنگی بذری انجام شد نیز مشخص کرد که کاربرد علف‌کش‌های ناپروپامید به میزان ۱/۱۲ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش کاشت، پیش رویشی، تقسیط شده به صورت پیش رویشی و دو هفته بعد و یا به تنهایی به میزان ۲/۲۴ کیلوگرم در هکتار باعث کنترل علف‌های هرز و تولید محصول اقتصادی گوجه فرنگی شده است و کاربرد تقسیط شده متربوزین نیز به میزان ۰/۴ کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار به صورت پیش رویشی همراه با ستوكسیدیم به میزان ۰/۲۲ و یا ۰/۴۵ کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار و یا فلوآزیفوپ - پی - بوتیل به میزان ۰/۲۸ و یا ۰/۵ کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار باعث گیاه‌سوزی و یا کاهش میزان محصول گوجه فرنگی نشد، مؤید تحقیقات انجام شده در مناطق دزفول، اصفهان و کرج می‌باشد (Glaze, 1985).

نتایج آزمایشاتی که در سال‌های ۸۴ - ۱۹۸۲ در کشور آلبانی با علف‌کش‌های ناپروپامید قبل از کاشت و متربوزین بعد از سبز شدن روی گوجه فرنگی انجام شد، نشان داد که کاربرد علف‌کش‌های ناپروپامید و متربوزین علف‌های هرز پهنه برگ و باریک برگ را کنترل کرده است (Gjata and Prifti, 1986) که مشابه نتایج بدست آمده در اثر کاربرد علف‌کش‌های ناپروپامید و متربوزین در مناطق دزفول، اصفهان و کرج می‌باشد.

نتایج آزمایشی که در سال ۱۹۸۶ در هندوستان روی گوجه فرنگی رقم ۱۰۱ - HS به وسیله هفت علف‌کش پیش رویشی انجام شد، مشخص کرد که متربوزین به میزان ۰/۲۵ کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار بخوبی علف‌های هرز را کنترل کرده و باعث ایجاد گیاه‌سوزی روی گوجه فرنگی نشد، نیز تحقیقات انجام شده در

(Meister, 1994; Ahrens, 1994; zandstra, 2013)

مؤید نتایج حاصل از این آزمایش می‌باشد. در تحقیقی که در نیجریه انجام گردید مصرف علف‌کش متربوزی به میزان ۵/۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار برای کنترل علف‌های هرز گوجه فرنگی به صورت پیش از کاشت مؤثر اعلام گردید (Adigun, 2002) که این موضوع مؤید نتایج حاصل از این آزمایش می‌باشد.

نتایج تحقیقات در امریکا که نشان داده است علف‌کش آکسی فلورفن علف‌های هرز پهنه برگ متعددی را در زراعت گوجه فرنگی کنترل می‌کند نیز مؤید نتایج حاصل از این آزمایش در صفي آباد دزفول، اصفهان و کرج می‌باشد (Bonanno, 1987).

نتایج آزمایش انجام شده در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد که نشان داد تیمارهای وجین دستی و علف‌کش + وجین دستی علف‌های هرز باریک برگ را بهتر از سایر تیمارها کنترل کردند و موجب کاهش بیشتر زیست توده علف‌های هرز و افزایش زیست توده گوجه فرنگی شدند نیز مؤید نتایج حاصل از این آزمایش در صفي آباد دزفول، اصفهان و کرج می‌باشد (Kazerooni Monfared et al., 2005b).

نتایج آزمایشاتی که در امریکا در سال ۱۹۷۴ در ایالت کالیفرنیا انجام شده و طی آن مشخص شده است که کاربرد علف‌کش ناپروپامید به میزان ۱/۵ و ۳ کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار با ارقام مختلف گوجه فرنگی مورد آزمایش سازگار بوده است مؤید تحقیقات انجام شده در مناطق دزفول، اصفهان و کرج می‌باشد (Orr and

.Elmore, 1974).

نتایج آزمایشی که در سال ۱۹۷۷ در کشور فرانسه انجام شد مشخص کرد که کاربرد علف‌کش متربوزین به میزان ۷۰۰ - ۳۵۰ گرم ماده مؤثر در هکتار برای کنترل علف‌های هرز گوجه فرنگی مؤثر بوده و مؤید تحقیقات انجام شده در مناطق دزفول، اصفهان و کرج می‌باشد (Branthome, 1977).

کاربرد هر یک از علف‌کش‌های متربوزین به میزان ۰/۷۵ و ۱ کیلوگرم در هکتار به ترتیب به صورت پیش‌رویشی و پس‌رویشی، آکسی فلورfen به میزان ۲ لیتر در هکتار و یا ناپروپامید به میزان ۴/۵ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش‌رویشی و در کرج، کاربرد هر یک از علف‌کش‌های متربوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش‌رویشی و یا آکسی فلورfen به میزان ۲ لیتر در هکتار به صورت پیش‌رویشی توصیه می‌شود. در صورتی که از علف‌کش استفاده نشود اعمال و جین دستی علف‌های هرز در طول فصل رویشی گوجه فرنگی در هر منطقه نیز توصیه می‌شود.

تشکر و قدردانی

نگارندگان بدين و سيله از كلية همكاران محترمی که با زحمات صادقانه خود اجرای اين آزمایش را طی دو سال در مناطق صفي آباد دزفول، اصفهان و کرج ميسر نموده‌اند صميمانه تشکر و قدردانی می‌نمایند.

مناطق دزفول، اصفهان و کرج را تأييد می‌كند (Khurana and Pandita, 1986).

نتایج آزمایشی که در سال ۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد و نشان داد که بيشترین عملکرد گوجه فرنگی در تیمار کاربرد علف‌کش متربوزین + روتيواتور مشاهده شد و تیمار وجین دستی و ترکیب آن با علف‌کش بهتر از سایر تیمارها علف‌های هرز پهن برگ را کنترل نمود، Kazerooni Monfared *et al.* (2005a) نيز تحقیقات انجام شده در مناطق دزفول، اصفهان و کرج را تأييد می‌كند.

توصیه. طبق این آزمایش برای کنترل علف‌های هرز و افزایش میزان عملکرد میوه گوجه فرنگی کشت مستقیم در صفي آباد دزفول، کاربرد هر یک از علف‌کش‌های متربوزین به میزان ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پیش‌رویشی، آکسی فلورfen به میزان ۲ لیتر در هکتار به صورت پیش‌رویشی و یا متربوزین به میزان ۰/۷۵ و ۱ کیلوگرم در هکتار به صورت پس‌رویشی، در اصفهان،

References:

- Adigun, J. A. 2002.** Chemical weed control in transplanted rain fed tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill) in the Forest-Savanna Transition zone of South Western Nigeria. Document Title: ASSET - Series A: Agriculture & Environment. 2 (2): 141-150.
- Afrah, T. M., Adil, A. El. H., Marmar, A. El S. and Awad, G. O. 2011.** Degradation of oxyfluorfen herbicide by soil microorganisms biodegradation of herbicides. *Biotechnology*. 10(3): 274-279.
- Ahrens, W. H. 1994.** Herbicide Handbook. Weed Science Society of America. Champaign, IL. U. S. A. 352 pp.
- Anonymous. 2008.** Agricultural statistics. First volume, agronomic and orchard crops (crop year 2007-08). Bureau of statistics and technology. Ministry of Agriculture Jihad. [In Persian].
- Anonymous. 2012.** Tomato herbicide treatments table, http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r783_700311.html. [Accessed on 2014-4-11]
- Bonanno, A. R. 1987.** Influence of oxyfluorfen and cinmethylen on weed control, yield and quality of tomatoes grown in plastic culture. *Proceedings of the Southern Weed Science Society*. 40: 121-210.
- Branthome, X. 1977.** Tomato crops. Progress in the use of herbicides. *Defense-des-Vegetaux*. 31(183): 47-50.
- Camper, N. D. 1986.** Research methods in weed science. Southern Weed Science Society of America (SWSSA). 189 pp.
- Gjata, F. and Prifti, M. 1986.** Herbicide tests in field tomato crops. *Buletini-i-Shekencare-Bujqesore*. 25(3): 87-93.
- Glaze, N. C. 1985.** Weed control in direct-seeded tomatoes for transplants. Proceedings of the 38th annual meeting of the Southern

- Weed Science Society. 14-16 January, Houston, Tx, Champaign, p. 119.
- Kazerooni Monfared, A., Koochaki, E., Nassiri Mahalati, M., and Eghbali, Sh. 2006a.** Effect of integrated weed management on broadleaf weed biomass and yield of tomato (*Lycopersicon esculentum* L.). The proceedings of 1st Iranian weed science congress. 25-26 January, Tehran, Iran, p. 126. [In Persian]
- Kazerooni Monfared, A., Koochaki, E., Nassiri Mahalati, M. and Eghbali, Sh. 2006b.** Study of the effect of single and integrated weed management on grass weed and tomato biomass (*Lycopersicon esculentum* L.). The proceedings of 1st Iranian weed science congress. 25-26 January, Tehran, Iran, p. 130. [In Persian]
- Khurana, S. C. and Pandita, M. L. 1986.** Chemical weed control studies in the nursery of cauliflower and tomato. *Haryana Journal of Horticultural Sciences.* 15:1(2): 122-126.
- Lashkari, E., Baghestani Meibodi, M. A., Minbashi Moeani, M. and Mirhadi, S. M. J. 2010.** Survey the possibility chemical and cultural control of tomato weed field with concern on broomrape (*Orobanche aegyptiaca*). The proceedings of 3rd Iranian weed science congress. Volume 2: key papers, weed management and herbicides. 17-18 February, Babolsar, Iran, p. 278. [In Persian with English Abstract]
- Meister, R. T. 1994.** Weed control manual. Meister publishing company.Willoughby, OH. U.S.A. 362 pp.
- Mousavi, M. R. and Rastegar, M. A. 1997.** Pesticides in agriculture. Brahmard Press, Tehran, I. R. Iran. 704 pp. [In Persian].
- Norris, R. F., Elmore, C. L., Rejmanek, M. and Akey, W. C. 2001.** Spatial arrangement, density, and competition between barnyard grass and tomato: 1. crop growth and yield. *Weed Science.* 49: 61-68.
- Orr, J. P. and Elmore, C. L. 1974.** Canning tomato herbicide-varietal interaction trial. *Proceedings of the Western Society of Weed Science.* 27: 48-50.
- Tomlin, C. D. S. 1997.** The pesticide manual. A world compendium .(11th ed.). British Crop Protection Council, UK. 1606 pp.
- Zandstra, B. H. 2013.** Weed Control Guide for Vegetable Crops. MSU Extension Bulletin E-433. Department of Horticulture, Michigan State University. <http://veginformation.msu.edu/bulletins/E433/index.cfm?crop=135>. [Accessed on 2014-8-25].

Evaluation of the Efficacy of Selected Herbicides on Weeds and Yield in Direct Seeded Tomato

Daryosh Ghanbari Birgani¹, Mohammad Reza Karaminejad^{*2}, Reza Tabatabaii Nimavard³, Naser Zarifi Nia¹

1. Agricultural Research Center and Natural Resources of Dezful, Iran. 2. Department of Weed Research, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran. 3. Department of Plant Protection, Agricultural Research Center and Natural Resources of Isfahan, Iran.

Received: Dec. 30, 2013

Accepted: Aug. 11, 2014

Abstract

This experiment was conducted in 2006 and 2007 at Agricultural Research Centers of Safi Abad of Dezful, Isfahan and Tehran (Karaj), I. R. Iran, to evaluate the efficacy of selected herbicides on weeds and yield of direct seeded tomato. The complete randomized block design was used with 9 treatments in three replications. Treatments included: pre-emergence and post-emergence application of metribuzin (Sencor® 70% WP) at 4-leaf stage of tomato at 0.75 and 1 kg/ha, pre-plant incorporated application of oxyfluorfen (Goal® 24% EC) at 2 kg/ha, pre-plant incorporated application of napropamide (Devrinol® 45% FL) at 2.5 and 4.5 kg/ha, weedy and weed free checks. The experimental results at Safi Abad of Dezful for the reduction of total weed density indicated, pre-emergence application of metribuzin at 1 kg/ha and oxyfluorfen were the most effective herbicide treatments. Also weed free check and post-emergence application of metribuzin at 0.75 and 1 kg/ha, were the most effective treatments in increase the yield of tomato fruits. In Isfahan, in reduction of the total weed density, oxyfluorfen and post-emergence application of metribuzin at 1 kg/ha and in tomato yield increase, weed free check, napropamide at 4.5 kg/ha, pre and post-emergence application of metribuzin at 0.75 and 1 kg/ha, respectively, were the most effective herbicide treatments. The results of Karaj showed that pre-emergence application of metribuzin at 1 kg/ha and oxyfluorfen in reduction of total weed density, and for tomato yield increase weed free check, pre-emergence application of metribuzin at 1 kg/ha and oxyfluorfen, were the most effective herbicide treatments.

Key words: Oxyfluorfen, Metribuzin, Napropamide, Chemical Control, Yield.

*Corresponding author: Mohammad Reza Karaminejad, Email: m.karaminejad@gmail.com