

مقاله کوتاه

گزارش زنبور *Pseudococcus comstocki* از ایران

نیرو جعفری^۱، حسین لطفعلی‌زاده^۲، یونس کریم‌پور^۱

۱- گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه ارومیه.

۲- بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز

مسئول مکاتبات: حسین لطفعلی‌زاده، پست الکترونیکی: hlotfalizadeh@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۰۴/۲۱

۲ (۱) ۹۱-۹۴

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۰۱/۲۳

چکیده

به منظور مطالعه‌ی دشمنان طبیعی شپشک آردآلود توت (*Pseudococcus comstocki* (Kuwana) (Hem.: Pseudococcidae) نمونه‌برداری‌هایی در شهرستان تبریز (استان آذربایجان شرقی) انجام گرفت. در این تحقیق یک گونه زنبور پارازیتویید از خانواده Encyrtidae جمع‌آوری و تحت عنوان (*Anagyrus novickyi* (Hoffer) شناسایی گردید. این گونه برای نخستین بار از ایران گزارش می‌شود.

واژه‌های کلیدی: پارازیتویید، شپشک آردآلود، توت، گزارش جدید، آذربایجان شرقی

تاکنون در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است و تحقیقی در زمینه‌ی پارازیتوییدهای آن در ایران به عمل نیامده است. به منظور جمع‌آوری و شناسایی دشمنان طبیعی و پارازیتوییدهای شپشک آردآلود (*P. comstocki*) نمونه‌برداری از بوستان‌های شهر تبریز و اطراف آن طی مسافت‌های دورهای ۷ روزه از پوره‌های سینی آخر این آفت در طول فصل بهار و تابستان سال‌های ۹۱ و ۹۲ انجام پذیرفت. برای این منظور، بعد از شناسایی درختان آلوده به آفت، از تاج درختان و شاخه‌های آلوده به طول تقریبی ۵۰ سانتی‌متر قطع و به آزمایشگاه منتقل شد. از روی این شپشک زنبورهایی پرورش داده شد که متعلق به خانواده‌ی Encyrtidae و جنس *Anagyrus* بودند. این زنبور توسط نگارنده‌ی دوم و با مقایسه با مشخصات مندرج در کلید شناسایی (Springate & Noyes 1990) شناسایی شد. بررسی منابع موجود (Lotfalizadeh, 2010) نشان داد این گونه تاکنون از ایران گزارش نشده است.

گونه‌ی *Anagyrus novickyi* (Hoffer, 1953) (شکل ۱)
نمونه‌های مورد مطالعه

مقدمه

شپشک آردآلود توت (*Pseudococcus comstocki* (Kuwana) (Homoptera: Pseudococcidae) حشره‌ای با دامنه‌ی میزبانی وسیع است که بومی نواحی شرقی آسیا بوده و در این نواحی گسترش زیادی دارد (Meyerdirk & Newell, 1979; Romanchenko & Belskaya, 1981; Ben-Dov *et al.*, 2011). این آفت دارای پارازیتوییدهای *Anagyrus Howard* (Hym.: Encyrtidae) است (Noyes & Hayat, 1994). نتایج بررسی‌های انجام شده در ایتالیا نشان داد که این آفت در مناطق مختلف آن کشور توسط ۴ گونه از زنبورهای *Clausenia* شامل *Chrysoplatycerus* (Howard), *Chrysoplatycerus purpurea* (Ishii) و *Acerophagus maculipennis* (Mercet) *splendens* مورد حمله قرار می‌گیرد (Guerrieri & Pellizzari, 2009). این آفت اولین بار در تهران روی زبان گنجشک دیده شده است. زیست‌شناسی این آفت و دشمنان طبیعی آن


شاخک سفید، بندهای میانی فونیکول قهوه‌ای؛ در بال جلو رگ بال حاشیه‌ای کوتاه‌تر از رگ بال پس حاشیه‌ای.

پراکنش جغرافیایی

این گونه از کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلغارستان، چکسلواکی، اروپا، فنلاند، گرجستان، مولداوی، شمال آفریقا، اسلواکی، اسپانیا و اوکراین گزارش شده است (Noyes, 2014) و برای فون ایران گزارش جدید می‌باشد.

دامنه میزانی

این گونه به عنوان پارازیتویید شپشک *Planococcus citri* و سایر شپشک‌های آردآلود از روی گیاهان تیره‌ی Cupressaceae گزارش شده است (Noyes, 2014).



شکل ۱- گونه‌ی A- جنس ماده از دید پهلوی، B- جنس نر از دید پهلوی.

Fig. 1- *Anagyrus novickyi*: A- female in lateral view, B- male in lateral view.

References

- Ben-Dov, Y., Miller, D.R. & Gibson, G.A.P. 2011.** ScaleNet: A database of the scale insects of the world. [online] URL: <http://www.sel.barc.usda.gov/scalenet/scalenet.htm> (Accessed January 24, 2012).
- Guerrieri, E. & Pellizzari, G. 2009.** Parasitoids of *Pseudococcus comstocki* in Italy, *Clausenia purpurea* and *Chrysoplatycerus splendens*: First records from Europe. Bulletin of Insectology, 62(2):179-182.
- Lotfalizadeh, H. 2010.** Some new data and corrections on Iranian encyrtid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea, Encyrtidae) fauna. Biharean Biologist, 4(2): 173-178.
- Meyerdirk, D.E. & Newell, I.M. 1979.** Importation, colonization and establishment of natural enemies on the Comstock mealybug in California. Journal of Economic Entomology, 72 (1):70-73.
- Noyes, J.S. 2014.** Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. Available online at <http://www.nhm.ac.uk/entomology/chalcidoids/index.html> (accessed 1 May, 2014).
- Noyes, J.S. & Hayat, M. 1994.** Oriental mealybug parasitoids of the Anagyrini (Hymenoptera: Encyrtidae) CAB International, Oxon, UK.
- Romanchenko, A.A. & Bel'skaya, N.M. 1981.** The Comstock mealybug in the Odessa Region. Zashchita Rastenii, 4: 1-41. (in Russian).

ایران، آذربایجان شرقی، تبریز، ۹۲/۵/۵، ۲ ماده؛ ۹۲/۵/۲۵، ۳ ماده؛ ۹۲/۶/۱، ۱ ماده؛ ۹۲/۶/۸، ۲ نر؛ ۹۲/۶/۱۵، ۲ ماده و ۱ نر؛ ۹۲/۶/۲۲، ۱ ماده و ۴ نر؛ ۹۲/۶/۳۰، ۵ ماده و ۲ نر؛ ۹۲/۷/۷، ۱ ماده و ۶ نر؛ ۹۲/۷/۱۴، ۲ ماده و ۲ نر؛ ۹۲/۷/۲۱، ۳ ماده.

ماده (شکل ۱A)- سر به رنگ سیاه اما بهوضوح با رنگ نارنجی در صورت مشخص شده؛ بند اول شاخک گستره و طویل، بند دوم شاخک یک چهارم برابر بند اول فونیکول، قسمت میانی فونیکول دارای رنگ یک‌نواخت، تازک سفید؛ پیش گرده، میان گرده و سپرچه تیره، میان گرده قهوه‌ای؛ رگ بال زیرکناری ۹ برابر طویل تر از رگ بال کناری و رگ بال پس‌کناری است.

نر (شکل ۱B) - شبیه به ماده با این تفاوت که جشه‌ی کوچک‌تر داشته؛ رنگ عمومی بدن تیره‌تر؛ بند اول شاخک پهن نشده و بندهای تازک شاخکی دارای موهای بلند.

خصوصیات افتراقی

این گونه شبیه *Anagyrus schoenherri* (Westwood) است ولی در گونه‌ی اخیر سر به رنگ زرد، انتهای بند دوم

Springate, N.D. & Noyes, J.S. 1990. A review of British species of *Anagyrus* Howard (Hymenoptera: Encyrtidae) with new records and descriptions of other Chalcidoidea. Entomologists Gazette, 41: 213-230.

Short article

Report of *Anagyrus novickyi* (Hym.: Encyrtidae) parasitoid of *Pseudococcus comstocki* from Iran

Nayer Jafari¹, Hossein Lotfalizadeh², Yunes Karimpour¹

1- Department of Plant Protection, University of Urmia, Urmia, Iran.

2- Department of Plant Protection, Agricultural and Natural Resources Research Center of East -Azarbaijan, Tabriz, Iran

Corresponding author: Hossein Lotfalizadeh, e-mail: hlotfalizadeh@gmail.com

Received: April 12, 2014

2 (1) 91-94

Accepted: July 12, 2014

Abstract

In order to identify the natural enemies of Comstock mealybug, *Pseudococcus comstocki* (Kuwana) (Hem.: Pseudococcidae) samplings were made on Mulberry in Tabriz, East-Azarbaijan province. A parasitic wasp of the family Encyrtidae was reared and identified as *Anagyrus novickyi* (Hoffer). This species is recorded here for the first time from Iran.

Keywords: Parasitoid, Mealybug, Mulberry, New record, East-Azarbaijan.
