

مطالعه برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیولوژیکی

* در استان آذربایجان غربی *Wilsonomyces carpophilus*

Study on some biological and morphological characteristics of *Wilsonomyces carpophilus* in West Azerbaijan

** ، یوبرت قوستا و رضا فتاحی^{*} عبدالله احمدپور، محمد جوان نیکخواه

گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه و

گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دریافت: ۱۳۸۷/۹/۱۷ پذیرش: ۱۳۸۸/۳/۲۰

چکیده

به منظور مطالعه ویژگی های مورفولوژیکی و بیولوژیکی جدایه های قارچ عامل بیماری غربالی درختان میوه هسته دار، از اندام های مختلف درختان میوه هسته دار مشکوک به آسودگی در استان آذربایجان غربی طی بهار و تابستان سال ۱۳۸۶ نمونه برداری شد. قطعات بافت های برگ، شاخه و میوه بعد از ضد عفونی سطحی روی محیط های کشت WA (درصد)، MA، PDA و APDA کشت شدند. در مجموع ۶۰ جدایه از هفت گونه مختلف درختان میوه هسته دار به دست آمد. براساس مطالعات تاکسونومیکی، تمامی جدایه ها به عنوان گونه *Wilsonomyces carpophilus* شناسایی گردیدند. جدایه ها روی محیط کشت PDA، اسپورودوکیوم های واجد کنیدیوفور های سمپودیال، کنیدیوم های ۳-۵ × ۱۵-۲۰ × ۷/۵-۶۷/۵ میکرومتر یاخته ای)، هولوبلاستیک، رکسولیتیک (Rhexolytic) و به ابعاد ۱-۹

* بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول به راهنمایی آقایان دکتر محمد جوان نیکخواه و

دکتر یوبرت قوستا ارایه شده به دانشگاه تهران

** مسئول مکاتبه (jnikkhah@ut.ac.irE-mail:

را تولید نمودند. بیشترین میزان رشد رویشی جدایه ها در دمای ۲۱ درجه سانتیگراد و pH ۶ مشاهده گردید و هیچ رشدی در دمای پایین تر از ۵ درجه سانتیگراد و بالاتر از ۳۰ درجه سانتیگراد مشاهده نشد. ضمن اینکه بین جدایه ها از نظر میانگین رشد رویشی و هاگ زایی تفاوت قابل ملاحظه ای وجود داشت. برای تمام جدایه ها، در محیط های کشت MA، PDA و APDA و شرایط تاریکی، کلامیدوسپور ها به وفور تشکیل شدند. کلامیدوسپور ها گرد تا تخم مرغی، با دیواره ضخیم، به رنگ قهوه ای روشن تا تیره و قطر ۱۲-۳۰ میکرومتر، به صورت انتهایی یا میانی، منفرد یا زنجیره ای ۲-۳ عددی و ندرتا درازتر تشکیل شدند. در بررسی نحوه جوانه زنی، نفوذ، آسودگی و گسترش بیماری روی نهال های بذری بادام مشخص شد که نفوذ قارچ از طریق وزنه ها و با تشکیل اپرسوریوم ها انجام می گیرد. سه تا چهار روز بعد از مایه زنی، حلقه ای بی رنگ در اطراف ناحیه آلوده تشکیل گردید و بعد از شش روز، بافت های آلوده دچار بافت مردگی شده و به تدریج از بافت های سالم جدا شدند و بعد از ۱۰ روز ریژش کردند. اسپورو دوکیوم ها تحت شرایط رطوبت نسبی بالا (بیش از ۷۵ درصد) و دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد روی بافت های ریژش یافته یا باقیمانده روی برگ ها و همیشه در سطوح بالای آن ها و به صورت نقاط سیاه رنگ بعد از ۱۶ روز تشکیل شدند. در بررسی نحوه بقای قارچ، طی سه تاریخ نمونه برداری (۱۰ دی، ۲۰ بهمن و ۲۵ اسفند سال ۱۳۸۶) کنیدیوم ها از جوانه های سالم درختان زردآلو، گیلاس، هلو و بادام جدا سازی شدند. درصد جوانه زنی آن ها بین ۱۰۰-۶۲ درصد متغیر بود. تعداد کنیدیوم های جمع آوری شده از درختان زردآلو و بادام در سه تاریخ نمونه برداری متفاوت بود و نمونه برداری های دوم و سوم به ترتیب ۳-۴ و ۱/۵ برابر افزایش در تعداد کنیدیوم را نشان دادند، در حالی که در درختان گیلاس و هلو، کنیدیوم های به دست آمده از جوانه ها تفاوت چندانی در این سه تاریخ نمونه برداری نداشتند. این مطالعات نشان می دهد که کنیدیوم ها در طی فصول خواب در جوانه های سالم درختان بقا یافته و بدین طریق در زمستان گذرانی جمعیت قارچ روی گونه های مختلف هسته دار نقش دارند.

•

واژه های کلیدی: کلامیدوسپور، بقا، بیماری زایی، رکسولیتیک

مقدمه

Wilsonomyces carpophilus (Lév.) Adaskaveg, Ogawa & Butler (= *Stigmina carpophila* (Lév.) M.B. Ellis and *Coryneum beijerinckii* Oud.) عامل غربالی که یکی از مهمترین و خسارت‌زا ترین بیماری های درختان میوه هسته دار در اغلب

مناطق جهان است. این بیماری نه تنها باعث تضعیف درختان و کاهش مقدار و ارزش محصول می شود، بلکه کیفت محصولات را نیز به شدت کاهش می دهد و تنها مرحله غیرجنسی قارچ تولید اسپورودوکیوم می کند، برای آن گزارش شده است (Adaskaveg *et al.* 1990). با وجودی که ولمین (Vuillemin 1888) تشکیل مرحله جنسی قارچ با نام *Ascospora beijerinckii* Vuill. را از بقایای برگی های آلوده گزارش کرده است، اما کارهای بعدی در آلمان، کالیفرنیا و استرالیا تشکیل مرحله جنسی عامل بیماری غربالی را تایید نکرده و تنها مرحله غیرجنسی قارچ را به عنوان تنها منبع اینوکولوم یادآور شده اند (Highborg & Ogawa 1986).

بیماری غربالی برای اولین بار در سال ۱۸۴۳ توسط لویلی (Léveillé) از فرانسه گزارش شد و در مطالعات بعدی اسمی مختلفی به قارچ عامل غربالی داده شده است. الیس (Ellis 1959) با مطالعه قارچ عامل بیماری غربالی و مقایسه آن با جنس *Clasterosporium* و بقیه جنس های دارای هاگ های رنگی و با چندین بند (phaeophragmospores)، آن را به جنس *Stigmina* منتقل کرد. ساتن و پاسکو (Sutton & Pascoe 1989) گونه ها مختلف جنس *Stigmina* را به سه گروه تقسیم کردند که این گروه بندی براساس ویژگی های مورفولوژی کنیدیوم ها، یاخته ها کنیدیزا و بیماری زایی آن ها استوار بود. قارچ عامل بیماری غربالی در گروه دوم قرار گرفته بود که براساس تشکیل اسپورودوکیوم های بالشتکی شکل (pulvinate)، کنیدیوم های قهوه ای روشن، هولوبلاستیک و با دیواره عرضی حقیقی که از کنیدیوفور های آنلیدی ایجاد می شوند و اصولا روی برگ ها، جوانه ها، میوه ها و شاخه های گونه های مختلف درختان میوه هسته دار یافت می شوند، تمایز می شد. نهایتا آداسکاوج و همکاران (Adaskaveg *et al.* 1990) به عنوان یک ترکیب جدید، نام قارچ عامل بیماری غربالی را به نام *W. carpophilus* تغییر دادند و امروزه به این نام خوانده می شود. این محققان نشان دادند که کنیدیوم های *W. carpophilus* در بافت های گیاهی و محیط های کشت از کنیدیوفور های سمپودیال تشکیل شده و جدا شدن آن ها از نوع رکسولیتیک (rhexolytic) می باشد، در حالی که در جنس *Stigmina* تشکیل کنیدیوم ها به صورت هولوبلاستیک و شیزولیتیک (schizolytic) بوده و از کنیدیوفور های آنلیدیک ایجاد می شود و این صفات به عنوان صفات اساسی برای تمایز این دو جنس تاکید شده اند. براساس مطالعات آداسکاوج (1995) مشخص گردید که کنیدیوم های چند یاخته ای *W. carpophilus* قادر دیواره عرضی حقیقی بوده و نفوذ از بافت های گیاهی به صورت مستقیم با کمک اپرسوریوم ها و یا غیرمستقیم از طریق روزنه ها انجام می شود.

به نقل از اشکان و سدی (1971)، این بیماری در ایران برای اولین بار توسط اسفندیاری در سال ۱۹۴۶ از درختان میوه هسته دار از مازندران، گیلان، گرگان و آذربایجان

گزارش شده است. علیرغم گزارش هایی مبنی بر آلودگی گونه های مختلف درختان میوه هسته دار به این قارچ در مناطق مختلف کشور (Ashkan & Asadi 1971, Ershad 1995) مطالعات جامعی در مورد خصوصیات مورفولوژیکی و بیولوژیکی قارچ عامل غربالی وجود ندارد. با توجه به اهمیت بیماری، تحقیق حاضر با هدف بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی جدایه های عامل بیماری، نحوه آلوده سازی میزبان ها و نحوه بقای قارچ روی آن ها صورت گرفته است.

روش بررسی

۱- نمونه برداری و جدا سازی عامل بیماری

طی بهار و تابستان سال ۱۳۸۶، باغ های درختان میوه هسته دار در استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفتند و از برگ ها، میوه ها و شاخه های گونه های مختلف درختان میوه هسته دار (زردآلو، بادام، گوجه، آلو، هلو، شلیل و گیلاس) که نشانه های مشکوک به بیماری را داشتند، نمونه هایی برداشته شد. به منظور جدا سازی عامل بیماری، اندام های مذکور پس از شستشوی سطحی با آب مقطر سترون، با استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم ۱۰ درصد (حاوی ۵٪ درصد کلر فعال) به مدت یک دقیقه ضد عفونی سطحی شدند و سپس با آب مقطر سترون سه بار شستشو گردیدند. پس از رطوبت گیری نمونه ها، قطعاتی به اندازه تقریبی یک سانتی متر مربع از قسمت های آلوده به همراه نواحی سالم به تشک های پتری حاوی محیط های کشت WA (۲ درصد)، MA، PDA یا APDA (محیط غذایی PDA که به آن ۲/۵ میلی لیتر در لیتر اسید لاکتیک ۲۵ درصد اضافه شد) و دمای 20 ± 2 درجه سانتیگراد منتقل شدند. قارچ های رشد کرده به روش تک کنیدیوم (single spore) روى محیط کشت WA (۲ درصد) خالص سازی شدند. جدایه های خالص سازی شده در لوله های آزمایش حاوی محیط کشت PDA و در دمای ۴ درجه سانتیگراد و یا در کاغذ صافی سترون و خشک و دمای ۲۰- درجه سانتیگراد برای مطالعات بعدی نگهداری شدند. در مجموع ۶۰ جدایه از هفت گونه مختلف هسته دار (زردآلو، بادام، هلو، شلیل، آلو، گوجه و گیلاس) جدا سازی گردید. بیشتر جدایه ها از میوه های آلوده و تعدادی کمتر از برگ ها و سرشاخه ها به دست آمدند.

۲- بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و میکروسکوپی جدایه ها

بیست جدایه از میان ۶۰ جدایه از هفت میزبان مختلف درختان میوه هسته دار (جدول ۱) به محیط های کشت MA، PDA، APDA منتقل شدند. تشک های پتری طی یک دوره ۲۱ روزی در انکوباتور با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و تحت شرایط تاریکی و نوری متناسب

(۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی) جهت بررسی خصوصیات مورفولوژیکی جدایه ها نگهداری شدند. صفات مورد مطالعه شامل: سرعت رشد، رنگ پرگنه، مشخصات کنیدیوم،

جدول ۱- محل جمع آوری جدایه های قارچ *Wilsonomyces carpophilus* به دست آمده از گونه های مختلف درختان میوه هسته دار در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۶

Table 1. Localities of *Wilsonomyces carpophilus* isolates obtained from *Prunus* species in West Azerbaijan in 2007

ردیف	نام جدایه Name of Isolate	نام میزبان/اندام گیاهی Name of Host/Plant Organ	محل جمع آوری Location
1	KHJI	گوجه/میوه	Black cherry/Fruit
2	URZI	زردآلو/میوه	Apricot/Fruit
3	MHZ	زردآلو/میوه	Apricot/Fruit
4	SNB	بادام/میوه	Almond/Fruit
5	URH9	هلو/میوه	Peach/Fruit
6	KHG2	گیلاس/برگ	Sweet cherry/leaf
7	URG	گیلاس/برگ	Sweet cherry/leaf
8	KHZ12	زردآلو/میوه	Apricot/Fruit
9	KHG1	گیلاس/برگ	Sweet cherry/leaf
10	KHS	شلیل/میوه	Nectarine/Fruit
11	SLZ1	زردآلو/شاخه	Apricot/Twig
12	MYZ	زردآلو/میوه	Apricot/Fruit
13	MYB	بادام/میوه	Almond/Fruit
14	NAZ	زردآلو/میوه	Apricot/Fruit
15	URA	آلو/میوه	Plum/Fruit
16	URJ	گوجه/میوه	Black cherry/Fruit
17	URH2	هلو/میوه	Peach/Fruit
18	KHB	بادام/میوه	Almond/Fruit
19	URB1	بادام/شاخه	Almond/twig
20	KHJ2	گوجه/میوه	Black cherry/Fruit

کیندیوفور، اسپورودوکیوم و میزان هاگ زایی بود. عکس ها از صفات مذکور با استفاده از میکروسکوپ نوری الیمپوس (Olympus) مدل BX41 تهیه گردیدند.

۳- بررسی اثر دما و اسیدیته (pH) بر میزان رشد رویشی جدایه ها در شرایط آزمایشگاه
به منظور تعیین دما های کمینه، بهینه و بیشینه رشدی، رشد شعاعی شش جدایه KHG1، MHZ، URH9 و SNB (جدول ۱) در محیط کشت PDA و در دما های ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۸ و ۳۲ درجه سانتیگراد مورد مطالعه قرار گرفت. حلقه هایی به قطر ۶ میلی متر از حاشیه پرگنه های در حال رشد فعال (۱۰ روزه) جدایه ها برداشته و به محیط کشت PDA منتقل و در دما های مذکور نگهداری شدند. میزان رشد شعاعی جدایه ها در روز های ۷ و ۱۴ بعد از کشت برای هر یک از دما ها ثبت گردید. علاوه بر آن، میزان رشد شعاعی چهار جدایه URH9، KHJ1، URZ1 و KHG2 (جدول ۱) در pH های ۴-۱۰ و به فاصله نیم از یکدیگر مشابه اثر دما ها ثبت شد. هر جدایه در سه تکرار عمل گردید. pH محیط های کشت PDA با اضافه کردن HCl شش نرمال و یا NaOH دو نرمال و توسط دستگاه pH متر مدل Sartorius PB-11 اندازه گیری و تنظیم شد.

۴- بررسی اثر دما بر درصد جوانه زنی کیندیوم ها
درصد جوانه زنی پنج جدایه URG، KHJ1، SNB، URH9 و KHZ12 (جدول ۱) در دما های ۰-۱، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه سانتیگراد بررسی گردید. برای این منظور از روش شاو و همکاران (Shaw *et al.* 1990) با کمی تغییرات استفاده شد. سوسپانسیون کیندیوم های هر جدایه از سطح محیط کشت PDA ۱۰ روزی قارچ در آب م قطر سترون تهیه شد و غلظت آن ها در 1×10^5 کیندیوم در هر میلی لیتر تنظیم شد. ۱۵۰ میکرولیتر از سوسپانسیون به محیط کشت WA (درصد) منتقل و در دما های فوق الذکر نگهداری شد. بعد از ۲۴ ساعت تشک های پتری زیر میکروسکوپ نوری بررسی شدند و میزان جوانه زنی ۱۰۰ کیندیوم به طور تصادفی ثبت گردید. کیندیوم هایی که دارای لوله تندش معادل یک و نیم برابر عرض کیندیوم و یا بیشتر از آن بودند به عنوان جوانه زده مدنظر قرار گرفتند. محاسبه میزان جوانه زنی کیندیوم ها برای هر جدایه در سه تکرار انجام گرفت.

۵- مطالعه مراحل گسترش بیماری غربالی
در این قسمت از مطالعه از نهال های بذری بادام استفاده گردید. بذر های بادام اهلی (*Prunus dulcis* Mill.) D.A. Webb) در محیط پرلیت مرطوب و دمای ۴ درجه سانتیگراد به مدت دو ماه نگهداری شدند. بعد از سپری شدن دوره خواب بذر ها، بذر های جوانه زده به

گلدان های حاوی خاک، ماسه و کود به نسبت ۱:۱:۲ منتقل و در دمای 20 ± 2 درجه سانتیگراد نگهداری شدند و مراقبت های لازم تا رسیدن آن ها به مرحله ۱۰ برگی به عمل آمد. به منظور عمل مایهزنی نهال های بذری و مطالعه نحوه نفوذ، آلودگی و گسترش بیماری از روش آداسکاوج (Adaskaveg 1995) با کمی تغییرات استفاده گردید. عمل مایهزنی روی نهال های بذری در مرحله ۱۰ برگی (حداقل ۵ برگ با پهنه کامل) و با غلظت هاگ معادل 10×10 کنیدیوم در هر میلی لیتر انجام شد. سوسپانسیون هاگ به صورت یکنواخت توسط آبفشار دستی (sprayer) روی برگ ها پاشیده شد و تا حد امکان سعی گردید که سوسپانسیون از روی برگ ها سرریز نشود. سپس نهال های بذری مایهزنی شده توسط کیسه های پلاستیکی پوشانده شدند و به مدت ۴۸ ساعت در گلخانه در دمای 20 ± 2 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. کیسه های پلاستیکی بعد از ۴۸ ساعت از روی آن ها برداشته شدند و نهال ها در دمای 20 ± 2 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی بیش از ۷۵ درصد نگهداری شدند. مراحل مختلف ایجاد بیماری در فواصل زمانی ۱۲ ساعت پس از مایه زنی تا ۱۰ روز مورد مطالعه قرار گرفت. دیسک های برگی به قطر ۳-۵ میلی متری از بخش های مایهزنی شده برگ ها تهیه شد و توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین بافت های برگی سالم و آلوده در داخل محلول اتانول در اسید استیک (به نسبت ۱:۱ حجمی) به مدت ۲۴ ساعت نگهداری شدند و سپس با محلول های کاتن بلو و یا سافرانین صفر (0) (Safranin) رنگ آمیزی گردیدند. نمونه های رنگ آمیزی شده توسط میکروسکوپ نوری بررسی شدند و نفوذ قارچ و گسترش آلودگی بررسی گردید (Adaskaveg 1995).

۶- بررسی نحوه بقای *W. carpophilus*

در طول تابستان سال ۱۳۸۶ تعدادی از درختان بادام و زردآلو به ترتیب با آلودگی شدید لکه برگی و میوه (بیش از ۷۰ درصد آلودگی)، گیلاس و هلو با آلودگی پایین لکه برگی (کمتر از ۱۰ درصد) در باغ ها شهرستان ارومیه علامت گذاری شدند. در طول زمستان، بافت های آلوده (جوانه ها، شاخه ها، برگ ها و ندرتا میوه های خشک شده متصل به درختان) هر ماه به آزمایشگاه منتقل و برای وجود اندام های عامل بیماری مانند کنیدیوم، ریسه یا اندام های دیگر با استریومیکروسکوپ مدل زایس مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر آن، پس از ضد عفونی سطحی، اندام های جمع آوری شده (مطابق بند ۱)، قطعاتی جدا شدند و به محیط های کشت MA، PDA یا APDA منتقل و در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. جهت بررسی دقیق تر نقش احتمالی کنیدیوم در بقای قارچ از روش های برگ و اگالا (Highberg & Ogawa 1986) با کمی تغییرات استفاده گردید. بدین منظور، ۱۰ شاخه


به صورت تصادفی (ترجیحا از قسمت های پایین تر درختان) از درختان زردآلو، بادام، هلو و گیلاس در تاریخ های ۱۰ دی (ریش کامل برگ ها)، ۲۰ بهمن (تورم جوانه ها) و ۲۵ اسفند (اوایل باز شدن جوانه ها) در سال ۱۳۸۶ جمع آوری شدند. تعداد ۶۰ جوانه سالم از شاخه های جمع آوری شده انتخاب و بعد از جدا سازی لایه های فلس های جوانه ها از یکدیگر، فلس ها به لوله های سانتریفوژ حاوی پنج میلی لیتر آب مقطر سترون منتقل شدند. نمونه ها بعد از سه دقیقه ورتسکس، به مدت پنج دقیقه و با سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ شدند. مایع رویی حاوی سوسپانسیون هاگ ها با استفاده از پی پت پاستور سترون برداشته و به لوله های سانتریفوژ جدید منتقل گردید. مایع مورد نظر دوباره تحت همان شرایط سانتریفوژ گردید. بعد از دور ریختن مایع رویی، رسوب حاصل در نیم میلی لیتر آب مقطر سترون حل شده و به محیط کشت WA (درصد) منتقل و در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد نگهداری شد. بعد از گذشت ۲۴ ساعت تعداد کنیدیوم ها و درصد جوانه زنی آن ها ثبت گردید.

نتیجه

خصوصیات مورفولوژیکی و میکروسکوپی جدایه ها

پرگنه ها در محیط های کشت MA و PDA و تحت شرایط متناوب نوری و تاریکی و دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به رنگ زیتونی تیره بوده (شکل ۱C) و اغلب ریسه های هوایی می باشند. اگر چه در کشت های مسن تر (۲-۳ هفته ای) ریسه های هوایی به میزان کمتر در وسط پرگنه ها و به رنگ سفید تشکیل می شوند. با گذشت زمان، به رنگ خاکستری روشن تا قهوه ای تغییر می یابند. کنیدیوم ها قهوه ای روشن تا تیره بوده و در محیط های کشت فوق به فراوانی تشکیل می شوند. رنگ پرگنه ها در محیط کشت PDA و شرایط تاریکی در جدایه های مورد بررسی متغیر می باشد (شکل های ۱A و ۱B). در اغلب موارد رنگ پرگنه ها در بخش مرکزی زیتونی روشن تا تیره و در حاشیه سفید تا سفید تمایل به کرم دیده می شود (شکل ۱B) و ریسه های هوایی به میزان زیاد و به رنگ خاکستری روشن تا قهوه ای تشکیل می شوند. در مراحل اولیه رشد، رنگ پرگنه ها در پشت تشتک های پتری نخودی کمرنگ تا تیره، که بعد از گذشت یک هفته به رنگ زیتونی یا قهوه ای تیره تغییر می یابند. ریسه ها بنددار، منشعب و کمرنگ تا قهوه ای روشن و به قطر ۷/۵-۵/۲ میکرومتر می باشند. در اوایل تشکیل اسپورودوکیوم ها، ریسه ها دور هم جمع شده و بافت استرومایی را تولید می نمایند (شکل ۱E) که روی آن ها کنیدیوفور ها و کنیدیوم ها تشکیل می شوند (شکل ۱F). اسپورودوکیوم ها به صورت نقاط قهوه ای کمرنگ تا تیره، منفرد یا مجتمع و به ابعاد ۸۲-۳۷ میکرومتر و ندرتا بزرگتر در محیط کشت PDA، دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و شرایط تاریکی به


فراوانی تشکیل می شوند (شکل ۱D). اسپورودوکیوم ها حاوی کنیدیوفور های سمپودیال، کمرنگ تا قهوه ای کمرنگ و به ابعاد $۵-۱۰ \times ۱۲/۵-۵۰$ میکرومتر و ندرتا با طول بیشتر از ۵۰



شکل ۱ - پرگنه جدایه های قارچ *Wilsonomyces carpophilus* روی محیط کشت PDA و تشکیل اسپورودوکیوم: (A) و (B) PDA و شرایط تاریکی، (C) PDA و شرایط نوری متنابض (۱۲ ساعت روشناختی و ۱۲ ساعت تاریکی) (D) اسپورودوکیوم های تشکیل شده روی محیط کشت PDA و شرایط تاریکی، (E) تجمع ریسه ها جهت تشکیل اسپورودوکیوم ها در محیط کشت WA (مقیاس اندازه = ۱۰ میکرومتر)، (F) تشکیل اسپورودوکیوم ها روی محیط کشت WA (مقیاس اندازه = ۱۰۰ میکرومتر).

Fig. 1. Growth pattern of *Wilsonomyces carpophilus* isolates on PDA medium and formation of sporodochia: (A) and (B) PDA and dark conditions, (C) PDA and alternative light conditions, (D) Formation of chlamydospores on PDA and under

dark conditions, (E) Aggregation of hypha on WA (Scale bar = 10 μm),
(F) Formation of sporodochia on WA medium (Scale bar = 100 μm).




شکل ۲ - اسپورودوکیوم، کنیدیوفور و کنیدیوم ها در *Wilsonomyces carpophilus*: (A) اسپورودوکیوم های تشکیل شده در محیط کشت WA (مقیاس اندازه = ۱۰۰ میکرومتر). (B) و (C) کنیدیوفور سمپودیال (مقیاس اندازه = ۱۰ میکرومتر)، (D) زخم های روی کنیدیوفور (مقیاس اندازه = ۱۰ میکرومتر)، (E) نحوه جدا شدن کنیدیوم از کنیدیوفور (مقیاس اندازه = ۱۰ میکرومتر)، (F) کنیدیوم های ۳-۵ یاخته ای (مقیاس اندازه = ۱۰ میکرومتر).

Fig. 2. Sporodochia, conidiophores and conidia in *Wilsonomyces carpophilus*: (A) Sporodochia formed on WA medium (Scale bar= 100 μm), (B) and (C) Sympodial conidiophore (Scale bar = 10 μm), (D) Scars on conidiophores (Scale bar = 10 μm), (E) Separation of conidium from conidiophore (Scale bar = 10 μm), (F) Conidia 3-5 cells (Scale bar = 10 μm).

میکرومتر می باشند (شکل ۲A). کنیدیوفور ها با ۱-۳ خمیدگی زانویی (geniculation) که زخم ها (scars) روی آن ها واضح تا واضح می باشند (شکل های ۲B، ۲C و ۲D). کنیدیوم ها دارای دیواره ضخیم، با سطح صاف و دوکی شکل (fusoid)، به صورت منفرد در بخش انتهایی کنیدیوفور ها تشکیل می شوند. در مواردی کنیدیوم ها به شکل های بیضوی یا گرزی هم دیده می شوند (شکل ۲F). یاخته های انتهایی کنیدیوم ها دارای نوک گرد یا تیز و یاخته های پایینی تخت (truncate) می باشند. کنیدیوم ها ۳-۵ یاخته ای (گاهی ۱-۹ یاخته های) به ابعاد ۱۵-۲۰ × ۷/۵-۶۷/۵ میکرومتر و در پایه ۲/۵-۵ میکرومتر، کمنگ تا قهوه ای کمنگ یا تیره و ندرتا دارای ۱-۲ دیواره مورب (oblique) هستند. تشکیل کنیدیوم ها به صورت هولوبلاستیک و جدا شدن آن ها رکسولیتیک (rhexolytic) است (شکل ۲E). در تمام جدایه های مورد بررسی، کلامیدوسپور ها به وفور در محیط های کشت MA، APDA و تحت شرایط تاریکی تشکیل می شوند (شکل های ۳A، ۳B و ۳C). کلامیدوسپور ها گرد تا تخم مرغی، با دیواره صاف و ضخیم، قهوه ای کمنگ تا تیره، به ابعاد ۱۲-۳۰ میکرومتر و به صورت انتهایی (terminal) یا میانی (intercalary)، منفرد یا در زنجیر های ۲-۳ عددی و ندرتا طویل تر تشکیل می شوند. زنجیر های کلامیدوسپور با طول های زیاد در محیط های کشت قدیمی (۳-۴ هفته ای)، دما های پایین تر از ۱۵ درجه سانتیگراد و pH بالاتر از ۸ به وفور تشکیل می شوند. کلامیدوسپور ها در صورت انتقال به محیط های کشت مذکور، قادر به جوانه زنی هستند.

اثر دما و pH بر میزان رشد رویشی جدایه ها

در مجموع بیشترین میزان رشد رویشی جدایه های مورد مطالعه در دامنه دمایی ۱۵-۲۲ درجه سانتیگراد مشاهده گردید. هر چند که بهینه رشد جدایه ها در دمای ۲۱ درجه سانتیگراد دیده شد. هیچ گونه رشدی در دمای پایین تر از پنج درجه سانتیگراد و بالاتر از ۳۰ درجه سانتیگراد مشاهده نگردید. به علاوه، تفاوت قابل ملاحظه ای در میزان رشد رویشی بین جدایه ها دیده شد. به طور متوسط جدایه ها در محیط کشت PDA و دمای ۲۱ درجه سانتیگراد بعد از ۱۸ روز به انتهای تشکیل های پتری ۸ سانتی متری رسیدند. همچنین بیشترین میزان رشد رویشی جدایه ها (چهار جدایه مورد بررسی) در دامنه pH معادل ۴-۷/۵ و بهینه رشدی آن ها در ۶ pH مشاهده گردید. در pH اسیدی (۴-۵/۵) رنگ پرگنه ها زیتونی تیره و به ندرت دارای ریسه های هوایی و در pH خنثی و نزدیک به آن به رنگ زیتونی کمنگ و با ریسه های هوایی فراوان به رنگ خاکستری دیده شد.



شکل ۳- تشکیل کلامیدوسپور در محیط کشت PDA و شرایط تاریکی: (A) کلامیدوسپور های منفرد، انتهایی و میان ریسه ای (مقیاس اندازه = ۵۰ میکرومتر)، (B) و (C) کلامیدوسپور های زنجیری (مقیاس اندازه = ۱۰ میکرومتر).

Fig. 3. Formation of chlamydospores on PDA in the dark: (A) Single chlamydospores, terminal and intercalary (Scale bar = 50 μm), (B) and (C) Chained chlamydospores (Scale bar = 10 μm).

اثر دما بر میزان درصد جوانه زنی کنیدیوم ها درصد جوانه زنی کنیدیوم ها در پنج جدایه مورد بررسی نفاوت معنی داری نشان داد. بیشترین درصد جوانه زنی کنیدیوم ها (بالاتر از ۹۰ درصد) در دامنه دمایی ۱۵-۳۰ درجه سانتیگراد و بهینه جوانه زنی آن ها در دمای ۲۰-۲۵ درجه سانتیگراد مشاهده شد. در دامنه دمایی ۱۰-۵ درجه سانتیگراد بیش از ۸۰ درصد کنیدیوم ها قادر به جوانه زنی بودند. به علاوه، بیش از ۵۰ درصد کنیدیوم ها در همه جدایه ها در دمای ۱-۰ درجه سانتیگراد جوانه زدن. در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد کمتر از ۱۰ درصد کنیدیوم ها قادر به جوانه زنی بودند.

کنیدیوم ها در دمای ۲۰-۲۵ درجه سانتیگراد بعد از چهار ساعت در محیط کشت WA (۲ درصد) از یک یا هر دو یاخته انتهایی و ندرتا از یاخته های میانی قادر به جوانه زنی بودند.

مراحل گسترش بیماری غربالی روی نهال های بذری بادام


در مدت ۱۲-۲۴ ساعت بعد از مایه زنی، جوانه زنی کنیدیوم ها شروع شد و غالباً از یک یا هر دو یاخته انتهایی و به میزان کمتر از یاخته های میانی انجام گردید (شکل های ۴A و ۴B). لوله های تندشی، دیواره خارجی کنیدیوم را پاره کرده و در مدت ۲۴-۴۸ ساعت طویل گردید (شکل ۴B) و انتهای آن ها متورم شده و اپرسوریوم تولید کردند. اپرسوریوم ها از لوله های تندش کوتاه یا بلند و گاهی منشعب به وجود آمدند (شکل ۴C). نفوذ به طور غیر مستقیم از طریق روزنه ها نیز به میزان کمتری انجام گردید (شکل های ۴D و ۴E).

در مدت ۴۸-۷۲ ساعت، بافت های اطراف منطقه نفوذ به رنگ قهوه ای کمرنگ تغییر یافت و به تدریج بافت ها تجزیه شدند. در مدت ۷۲-۹۶ ساعت (۴-۳ روز بعد از مایه زنی) حلقه ای بی رنگ اطراف بافت های آلوده تشکیل شد (شکل ۲F) که در اثر رنگ آمیزی با کاتن بلو و سافرانین صفر به ترتیب به رنگ آبی کمرنگ تا بنفش و قرمز دیده شد. از روز چهارم بعد از مایه زنی، زخم های ریز و ارغوانی کمرنگ تا قهوه ای مشاهده شدند. زخم ها در مدت ۵-۶ روز به ابعاد ۲-۵ میلی متر رسیدند. از روز ششم به بعد و در دمای ۲۰±۲ درجه سانتیگراد، بافت های آلوده به تدریج از بافت های سالم جدا شدند و بعد از ۱۰ روز ریزش کردند (شکل ۴G). در این حالت برگ ها ظاهری غربال مانند پیدا می کردند (شکل ۴J). در دما های بالاتر میزان ریزش زخم ها بیشتر مشاهده گردید. اسپورودوکیوم ها در رطوبت نسبی بالا (بیش از ۷۵ درصد) و دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد روی بافت های ریزش یافته یا باقیمانده در برگ ها، بعد از ۱۶ روز تشکیل شدند (شکل های ۴H و ۴I). این ساختار های غیرجنسي همیشه در سطح بالایی برگ ها و به صورت نقاط سیاهرنگ روی آن ها دیده شدند. اسپورودوکیوم ها در اوایل مرحله تشکیل، کوتیکول میزان را پاره کرده و به صورت دسته های پراکنده یا مجتمع، در ابعاد ۴۰-۲۲۰ میکرومتر، حاوی کنیدیوفور های سمپودیال و کنیدیوم های ۳-۵ یاخته ای (گاهی ۷-۲ یاخته ای) در سطح رویی برگ ها دیده شدند.

نحوه بقای *W. carpophilus*

طی سه تاریخ نمونه برداری (۱۰ دی، ۲۰ بهمن و ۲۵ اسفند سال ۱۳۸۶)، قارچ مورد نظر از روی سرشاخه ها، برگ ها یا میوه های خشک شده باقیمانده روی درختان یا ریخته شده در پای آن ها در محیط های کشت MA، PDA یا APDA جدا سازی نشد. همچنین در بررسی های انجام شده با استریومیکروسکوپ هیچ اندام قارچی در اندام های مذکور که در نقش داشته باشند (اسپورودوکیوم، کنیدیوم، ریسه یا کلامیدوسپور)، مشاهده نگردید.

با وجود این، کنیدیوم ها با استفاده از سانتریفوژ از جوانه های سالم درختان زردآلو، گیلاس، هلو و بادام جدا سازی شدند. کنیدیوم های به دست آمده ۲-۶ یاخته ای بودند و درصد جوانه زنی



(Fig. 4. Legend in the next page)

(شکل ۴- شرح و ادامه در صفحه بعد)



شکل ۴- نحوه جوانه زنی، نفوذ، آلودگی و گسترش بیماری لکه غربالی روی برگ های نهال های بذری بادام: (A) و (B) نحوه جوانه زنی کنیدیوم و پاره شدن دیواره خارجی آن بعد از ۱۲ ساعت (با بزرگنمایی تقریبی ۴۰۰ برابر)، (C) نفوذ از طریق اپرسوریوم ها بعد از ۲۴ ساعت (با بزرگنمایی تقریبی ۴۰۰ برابر)، (D) و (E) نفوذ از طریق روزنه بعد از ۲۴ ساعت (به ترتیب با بزرگنمایی تقریبی ۴۰۰ و ۱۰۰۰ برابر)، (F) تجزیه بافت اطراف کنیدیوم و تشکیل هاله بی رنگ اطراف بافت آلوده در عرض ۳-۴ روز (با بزرگنمایی تقریبی ۱۰۰ برابر)، (G) جدا شدن بافت آلوده از سالم بعد از شش روز (با بزرگنمایی تقریبی ۱۰۰ برابر)، (H) و (I) تشکیل اسپورودوکیوم ها در سطح رویی برگ ها بعد از ۱۶ روز (به ترتیب با بزرگنمایی تقریبی ۱۰۰ و ۴۰۰ برابر)، (J) نشانه های لکه غربالی روی برگ های بادام بعد از ۱۰ روز.

Fig. 4. Germination, penetration, infection and colonization of shot hole disease on almond seedling leaves: (A) and (B) Germination of conidium and rupture of outer cell wall after 12 hr (400x), C) Penetration through appressoria after 24 hr (400x). (D) and (E) Penetration through stomata after 24 hr (100x and 1000x respectively). (F) Degradation of tissue around conidium and formation of colorless halo around infected tissue within 3-4 days (100x), (G) Abscission of infected tissue from healthy tissue after six days, (H) and (I) Formation of sporodochia on the upper leaf surface after 16 days (100x and 400x, respectively), (J) Symptoms of shot hole disease on almond leaves after ten days.

آن ها بین ۱۰۰-۶۲ درصد محاسبه گردید (جدول ۲). تعداد کنیدیوم های جمع آوری شده از درختان هلو و گیلاس در سه تاریخ نمونه برداری تفاوت قابل ملاحظه ای نشان نداد. در بادام تعداد کنیدیوم ها در ماه های بهمن (۳۵ عدد) و اسفند (۳۷ عدد) نسبت به ماه دی (۲۳ عدد) تقریبا ۱/۵ برابر افزایش نشان داد. همچنین در زردا آلو تعداد کنیدیوم های به دست آمده در ماه های دی (۵۴ عدد) و اسفند (۳۳ عدد) نسبت به ماه بهمن (۱۲ عدد) تقریبا سه تا چهار برابر بیشتر بود (جدول ۲).

بحث

خصوصیات مورفولوژیکی ماکروسکوپی و میکروسکوپی جدایه های *W. carpophilus* مطالعه شده که از گونه های مختلف درختان میوه هسته دار به دست آمده اند با توصیف ارایه شده توسط آداسکاوج و همکاران (۱۹۹۰) مطابقت کامل دارد. تمامی جدایه ها، اسپورودوکیوم ها حاوی کنیدیوفور های سمپودیال، کنیدیوم های منفرد و ۳-۵ یاخته ای (گاهی ۱-۹ یاخته ای) می باشند. از طرفی، براساس مطالعات انجام یافته توسط آداسکاوج (۱۹۹۵) کنیدیوم ها فاقد بند حقیقی و دارای بند کاذب (distoseptate) می باشند. همچنانین کنیدیوم های چند یاخته ای از دو لایه دیواره مجزا شامل دیواره خارجی ضخیم و غنی از الکترون (electron-dense) و دیواره داخلی ضخیم و نیمه شفاف الکترونی (electron-translucent) تشکیل شده اند. بند های کنیدیوم ها نیز حداقل از سه لایه دیواره مجزا که لایه میانی نازک و غنی از الکترون بین دو لایه ضخیم خارجی و داخلی قرار دارد، تشکیل شده است. هر کدام از یاخته های کنیدیوم ها مستقل از دیگری جوانه زده و بنابراین،

جدول ۲- تعداد و درصد جوانه زنی کنیدیوم های به دست آمده از جوانه های سالم درختان زرد آلو، بادام، هلو و گیلاس در طول زمستان سال ۱۳۸۶

Table 2. Number and viability of conidia collected from apricot, almond, peach and sweet cherry buds in winter 2007

میزبان Host	۱۰ دی			۲۰ بهمن			۲۵ اسفند		
	31 Dec.			9 Feb.			10 Mar.		
	تعداد	درصد جوانه زنی (%)	کنیدیوم ها No. of Conidia	تعداد	درصد جوانه زنی (%)	کنیدیوم ها No. of Conidia	تعداد	درصد جوانه زنی (%)	کنیدیوم ها No. of Conidia
زرد آلو (Apricot)	54	93	33	12	94	83	37	82	35
بادام (Almond)	23	62	37	86	86	82	35	82	82
هلو (Peach)	11	100	7	71	71	100	8	71	8
گیلاس Sweet) (cherry)	5	75	4	80	80	75	4	80	80

a: تعداد کنیدیوم های جمع آوری شده از ۶۰ جوانه سالم میزبان

b: درصد کنیدیوم های جوانه زده در محیط کشت آب- آگار بعد از ۲۴ ساعت

b: Percentage of germinated conidia on WA after 24 hr.

از هر کنیدیوم چندین لوله تندش تشکیل می شود (Adaskaveg 1995). اگر چه هیچ گونه گزارشی از تشکیل کلامیدوسپور ها در جدایه های برسی شده توسط آداسکاوج و همکاران (1990) ذکر نشده است. اما تمامی جدایه های مورد بررسی در این تحقیق، قادر به تشکیل کلامیدوسپور ها به صورت زنجیر های ۲-۳ عددی و گاهی بیشتر بودند. به نظر می رسد تشکیل کلامیدوسپور ها در این قارچ نقش مهمی در بقای آن داشته باشند. کول و ناراین (Koul & Narain 1983) گزارش کرده اند که فقط در یکی از جدایه های نام مترادف عامل بیماری غربالی (*Stigmina carpophila*) کلامیدوسپور ها به وفور در محیط کشت PDA و به صورت میانی یا انتهایی تشکیل می شوند.

بهینه رشد جدایه ها در دمای ۲۱ درجه سانتیگراد و pH ۶ مشاهده گردید. همچنین تفاوت قابل ملاحظه ای بین میزان رشد رویشی جدایه ها در دما ها و pH های مورد مطالعه دیده شد. براساس مطالعات انجام یافته توسط اسمیت و اسمیت (Smith & Smith 1942) بیشترین میزان رشد رویشی جدایه ها در دمای ۱۹ درجه سانتیگراد مشاهده شد و براساس گزارش ولیمیاز و هلتون (Williams & Helton 1971) رشد سریع جدایه ها موقعی که از بتا-مالتوز و ال-آسپاراژین به ترتیب به عنوان منابع کربن و نیتروژن و در pH ۵/۴-۵/۸ استفاده گردد، حاصل می شود. براساس مطالعات آداسکاوج و همکاران (Adaskaveg et al. 1990)، بیشترین میزان رشد رویشی جدایه ها در دامنه دمایی ۱۵-۲۲ درجه سانتیگراد رخ داد و هیچ رشدی در دمای پایین تر از ۵ درجه سانتیگراد و بالاتر از ۳۰ درجه سانتیگراد مشاهده نشد. در این تحقیق، کنیدیوم ها در دما های پایین تر از ۰ درجه سانتیگراد قادر به جوانه زنی بودند. براساس مطالعات صورت گرفته توسط شاو و همکاران (1990)، بیش از ۴۰ درصد کنیدیوم ها در محیط کشت PDA و دمای ۰-۱ درجه سانتیگراد جوانه زدند و بین درصد جوانه زنی چهار جدایه مورد بررسی اختلاف معنی داری دیده نشد. بر این اساس کنیدیوم ها در دما های پایین تر از قدرت جوانه زنی بالایی برخوردار بوده و می توانند نقش مهمی در آلوگی گیاهان میزبان و بقای قارچ در شرایط نامساعد جوی داشته باشند. در این مطالعه، مشخص گردید که نفوذ قارچ به طور مستقیم از طریق اپرسوریوم ها و یا غیرمستقیم از طریق روزنه ها انجام می گیرد. براساس مطالعات انجام یافته توسط آداسکاوج و همکاران (1995)، اطراف لوله های تندش و اپرسوریوم ها مواد موسیلاژی (mucilaginous materials) تشکیل می شود که احتمالاً در چسبیدن آن ها به سطوح گیاهی نقش دارند. همچنین در زیر اپرسوریوم ها سوراخی (pore) مشاهده می گردد که احتمالاً در اثر ترشح آنزیم های تجزیه کننده دیواره یاخته های اپیدرمی و کوتیکولی ایجاد شده است و از این طریق، میخ رخنه (peg penetration) وارد بافت های داخلی میزبان می شود. همان طور که در

این تحقیق مشاهده شد، اسپورودوکیوم ها همیشه در سطح بالایی برگ ها تشکیل می شوند که صفت مذکور می تواند در افزایش پخش کنیدیوم ها توسط باران به قسمت های پایین تر اندام های گیاهی (شاخه ها، برگ ها، جوانه ها و میوه ها) حائز اهمیت باشد.

چنانکه قبل ذکر شد، کنیدیوم ها از جوانه های سالم درختان زردآلو، بادام، هلو و گیلاس طی سه تاریخ نمونه برداری (۱۰ دی، ۲۰ بهمن و ۲۵ اسفند سال ۱۳۸۶) جمع آوری شدند و درصد جوانه زنی آن ها بین ۶۲-۱۰۰ درصد ثبت گردید که حاکی از قدرت جوانه زنی بالای کنیدیوم ها تحت شرایط دمای پایین می باشد. این مشاهدات نشان می دهد که کنیدیوم ها در طی فصول خواب در جوانه های سالم درختان بقا یافته و بدین طریق به زمستان گذرانی جمعیت قارچ روی گونه های مختلف هسته دار کمک می نمایند. افزایش تعداد کنیدیوم ها در جوانه ها می تواند براساس شرایط آب و هوایی و شرایط بیماری موجود در باغ ها قابل توجیه باشد. مطالعات هایبرگ و اوگاوا (۱۹۸۶) نشان می دهد که میزان کل بارندگی در طول نمونه برداری چهار برابر افزایش داشت. به طوری که، طی دوره های نمونه برداری، در مواردی که بارندگی کم بوده تعداد کنیدیوم ها نیز کم بودند، در حالی که بعد از بارندگی تعداد کنیدیوم ها حدود ۱۵-۲۰ برابر افزایش نشان دادند. همچنین تعداد کنیدیوم های جمع آوری شده از درختان بادام با آلودگی شدید (۱۰۰ درصد آلودگی) نسبت به درختانی با آلودگی پایین (کمتر از ۱۱ درصد) تفاوت قابل ملاحظه ای نشان دادند که حالت اخیر می تواند به علت بالاتر بودن سطوح شدت بیماری اولیه در درختان با آلودگی شدید باشد. در این تحقیق هم تعداد کنیدیوم های جمع آوری شده از درختان هلو و گیلاس با آلودگی پایین به مراتب کمتر از درختان بادام و زردآلو با آلودگی شدید بود. در تعدادی از منابع به نقش ریسه ها در بقای قارچ در جوانه ها و سرشاخه های آلوده در زردآلو، بادام و هلو اشاره شده است (Ashkan & Asadi 1971, Highberg & Ogawa 1986). اگرچه کلامیدوسپور ها در تمامی جدایه های مورد بررسی در این مطالعه در محیط های کشت به وفور تشکیل شدند و قادر به جوانه زنی در محیط های کشت می باشند، با این حال هیچ گونه شواهدی از نقش آن ها در بقای قارچ در جوانه ها و سرشاخه ها به دست نیامد و تشکیل و نقش کلامیدوسپور ها در بقایای بیولوژی قارچ نیازمند مطالعه بیشتر است.

به نظر می رسد که درک صحیح از نحوه نفوذ، آلودگی، گسترش بیماری و نحوه بقای عامل بیماری لکه غربالی درختان میوه هسته دار می تواند در اتخاذ تصمیمات مناسب جهت کاهش بیماری و کنترل آن مفید واقع شود.

سپاسگزاری

نگارندگان از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران به خاطر فراهم کردن اعتبارات مالی این تحقیق کمال تشکر را دارند. همچنین از زحمات خانم دکتر مینا راستگو به خاطر کمک در جمع آوری نمونه های گیاهی و از همکاری های صمیمانه آقایان مهندس کیوان غضنفری، مهندس کامیار حسنزاده و هوشنگ قلیزاده قدردانی به عمل می آید.

منابع

جهت ملاحظه منابع به متن انگلیسی مراجعه شود.

نشانی نگارندگان: عبدالله احمدپور، دکتر محمد جوان نیکخواه و دکتر محمد رضا فتاحی مقدم، گروه های گیاه پزشکی و علوم باگبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران و دکتر یوبرت قوستا، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.

STUDY ON SOME BIOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF *WILSONOMYCES CARPOPHILUS* IN WEST AZERBAIJAN

A. AHMADPOUR, M. JAVAN- NIKKHAH^{*}, Y. GHOSTA and R. FATAHI

Department of Plant Protection,

University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran;

Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, and

Department of Horticultural Science,

University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran

Received: 08.12.2008

Accepted: 10.06.2009

Shot hole disease of stone fruit trees, caused by *Wilsonomyces carpophilus* (Lév.) Adaskaveg, Ogawa & Butler (= *Stigmina carpophila* (Lév.) M.B. Ellis and *Coryneum beijerinckii* Oud.) is a serious disease of *Prunus* species in West Azerbaijan province. The pathogen was obtained from infected leaves, fruits and twigs of *Prunus* orchards during spring and summer of 2007. Samples were cultured on PDA, MEA, WA (2%) and APDA media after surface sterilization. Sixty isolates were recovered from *Prunus* orchards and studied. Based on morphological and physiological characters and growth optimal temperature, all isolates were identified as *Wilsonomyces carpophilus*. Isolates produced sporodochia bearing sympodial conidiophores and conidia with 3-5 cells (occasionally 1-9 cells), holoblastic, rhexolytic and 20-67.5 × 7.5-15 µm. Optimal growth was observed in 21° C and pH 6 and no growth was occurred below 5° C or above 30° C. The isolates exhibited

* Corresponding author (E-mail: jnikkhah@ut.ac.ir)

significant differences in sporulation and vegetative growth rate. Chlamydospores were frequently formed in PDA, APDA and MA media in all of the isolates. Chlamydospores are thick walled, spherical, pale brown to black and 12-30 µm in diameter and were formed both terminally as well as intercalary, single or 2-3 chains and rarely longer. The fungus penetrated almond leaf indirectly through stomata or directly through appressoria. Within 3-4 days from infection, colorless halo were formed around infected area and lesions gradually abscised after six days. Sporodochia were always produced on upper leaf surfaces. In study of the fungus survival in three dates of sampling (31 Dec., 9 Feb. and 10 March), conidia were taken from healthy dormant peach, sweet cherry, almond and apricot buds. Viability of conidia ranged within 62-100 % in three dates of sampling. While, number of conidia in almond and apricot were showed 1.5- and 3-4 fold increase, respectively. These observations indicate that conidia survive in dormant buds, thereby contributing to the overwintering population of the fungus on the different *Prunus* species.

Key words: Chlamydospore, Survival, Pathogenicity, Rhexolytic

Figures and tables are given in the Persian text.

References

- ADASKAVEG, J.E. 1995. Conidial morphology, host colonization and development of shot hole of almond caused by *Wilsonomyces carpophilus*. Can. J. Bot. 73: 432-444.
- ADASKAVEG, J.E., OGAWA, J.M. and BUTLER, E.E. 1990. Morphology and ontogeny of conidia in *Wilsonomyces carpophilus*, gen. nov. and comb. nov., causal pathogen of shot hole disease of *Prunus* species. Mycotaxon 37: 275-290.
- ASHKAN, M. and ASADI, P. 1971. Shot hole disease of fruit trees. Iran. J. Plant Pathol. 7: 39-63.
- ELLIS, M.B. 1959. *Clasterosporium* and some allied dematiaceae phragmosporea. II. Mycol. Pap. 72: 1-75.

- ERSHAD, D. 1995. Fungi of Iran. 2nd ed. Agricultural Research, Education & Extension Organization, Publication No. 10, Tehran, 868 pp.
- GROVE, G.G. 2002. Influence of temperature and wetness period on infection of cherry and peach foliage by *Wilsonomyces carpophilus*. Can. J. Plant Pathol. 24: 40-45.
- HIGHBERG, L.M. and OGAWA, J.M. 1986. Survival of shot hole inoculum in association with dormant almond buds. Plant Dis. 70: 828-831.
- KOUL, A.K. and NARAIN, U. 1983. Existence of chlamydospores in the culture of *Stigmina carpophila*. Indian Phytopathol. 36: 769-770.
- SHAW, D.A., ADASKAVEG, J.E. and OGAWA, J.M. 1990. Influence of wetness period and temperature on infection and development of shot hole disease of almond caused by *Wilsonomyces carpophilus*. Phytopathology 80: 749-756.
- SMITH, C.O. and SMITH, D.J. 1942. Host range and growth temperature relations of *Coryneum beijerinckii*. Phytopathology 32: 221-225.
- SUTTON, B.C. and PASCOE, I.G. 1989. Reassessment of *Peltosoma*, *Stigmina* and *Batcheleromyces* and description of *Hyphothyrium* gen. nov. Mycol. Res. 92: 210-229.
- VUILLEMIN, P. 1888. L' *Ascospora beijerinckii* et la maladie des cerisiers. J. Bot. 2: 255-259.
- WILLIAMS, R.E. and HELTON, A.W. 1971. An optimum environment for the culturing of *Coryneum carpophilum*. Phytopathology 61: 829-830.

Addresses of the authors: A. AHMADPOUR, Dr. M. JAVAN-NIKKHAH and Dr. R. FATAHI, Department of Plant Protection, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran and Dr. Y. GHOSTA, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.