

مطالعه برخی گونه‌های قارچ‌های فیالیددار قارچزی از سواحل جنوبی دریای خزر

Some phialidic fungicolous fungi from the Southern Caspian coasts

رسول زارع^{*} و محمد رضا آصف

بخش تحقیقات رستنی‌ها، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

پذیرش: ۱۳۸۷/۳/۶

دریافت: ۱۳۸۶/۱۰/۲۶

چکیده

این پژوهش طی سالهای ۱۳۸۲-۸۴ به منظور جمع‌آوری و شناسایی قارچ‌های فیالیددار قارچزی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان انجام شد و در مجموع ۵۷ جدایه خالص شده از مناطق مورد بررسی به دست آمد. این قارچ‌ها در هفت جنس شامل *Acremonium*, *Trichoderma*, *Simpllicillium*, *Lecanicillium*, *Sepedonium*, *Fusarium*, *Cladobotryum*, *Simplicillium*, *Sepedonium* و *C. mycophilum*, *Sepedonium microspermum*, *Simpllicillium lanosoniveum*, *C. mycophilum*, *Sepedonium microspermum*, *Simpllicillium lanosoniveum*, *Lecanicillium wallacei* برای ایران جدید هستند. چند جدایه متعلق به جنس‌های آکرمونیوم، فوزاریوم و سپدونیوم هم بودند که با روش‌های در دسترس و منابع موجود قبل شناسایی نبودند. بیشترین جدایه‌های به دست آمده متعلق به جنس تریکو درما بودند.

واژه‌های کلیدی: Aphyllophoricolous, Agaricicolous, Boleticolous, *Hypomyces*, Clavicipitaceae

* مسئول مکاتبه (E-mail: simplicillium@yahoo.com)

مقدمه

شناخت قارچ‌های قارچزی به قرن‌ها پیش بر می‌گردد (Ainsworth 1976). اصطلاح قارچ‌های قارچزی (*fungicolous fungi*) برای گونه‌هایی به کار می‌رود که پیوسته با دیگر قارچ‌ها در ارتباط بوده و این اصطلاح، قارچ‌هایی را که روی گلستانگ‌ها رشد می‌کنند (*lichenicolous*) (Gams *et al.* 2004, Hawksworth *et al.* 1995) نیز شامل می‌شود (Jeffries 1995, Barnett 1963, Gilman & Tiffany 1952) و بارنت (Barnett 1964) و بسیاری دیگر گیلمان و تیفانی (Gilman & Tiffany 1952) از محققان این اصطلاح را در مورد مجموعه قارچ‌های مرتبط با دیگر قارچ‌ها به کار برده‌اند. گمس و همکاران (2004) در یک بررسی جامع در رابطه با قارچ‌های قارچزی، به انواع رابطه این قارچ‌ها با میزبان، تعداد و دامنه میزبانی و جنس‌های مختلف قارچزی پرداخته‌اند. فرم‌های جنسی اغلب گونه‌های قارچزی که روی اندام‌های بارده قارچ‌هایی نظری آگاریک‌ها، آقیلوفورها و دیسکومیستها رشد می‌نمایند به تیره Hypocreaceae تعلق دارند (Pöldmaa 2000, Rossman *et al.* 1999).

اولین مطالعات جامع تاکسونومیکی قارچ‌های قارچزی متعلق به تیره Hypocreaceae توسط آرنولد (Arnold 1969, 1970, 1971) انجام گرفت. آرنولد گونه‌های قارچزی این تیره را در جنس‌های *Hypomyces* و *Peckiella*, *Arachnocrea*, *Apiocrea* و ساموئلز (Rogerson & Samuels 1985, 1989, 1993, 1994) دامنه وسیعتری به جنس *Hypomyces* داده و دو جنس *Peckiella* و *Apiocrea* را به عنوان متراծ برای *Hypomyces* معرفی کردند. دو جنس قارچزی کم اهمیت‌تر *Sphaerostilbella* و *Protocrea* نیز در تیره Hypocreaceae قرار داده شده‌اند (Pöldmaa 2000). هر چند جنس مهم *Hypocrea* کمتر به عنوان یک جنس قارچزی مطرح است، اما در مواردی به عنوان نزدیکترین جنس روی میزبان‌های قارچی یافت شده است.

شكل‌های غیرجنسی متعلق به جنس *Hypomyces* در جنس‌های مختلفی از هیفوومیست‌ها طبقه‌بندی شده‌اند (Gams & Hoozemans 1970, de Hoog 1978, Rogerson & Samuels 1993, 1994) اما در این میان جنس *Cladobotryum* به عنوان مهم‌ترین آسامورف گونه‌های قارچزی جنس *Hypomyces* مطرح است (Pöldmaa 2000, Rogerson & Samuels 1993).

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط سامر و همکاران (Sahr *et al.* 1999), راجرسون و ساموئلز (1994, 1993, 1985, 1989) و پولدم (2000)، گونه‌های متعلق به جنس *Hypomyces* که روی میزبان‌های قارچی رشد می‌کنند در چهار گروه مورد بررسی قرار گرفته و معروف شده‌اند، شامل: گونه‌هایی که روی دیسکومیست‌ها رشد می‌کنند، گونه‌هایی که روی

گونه‌های جنس *Boletus* رشد می‌نمایند (boleticolous species)، گونه‌هایی که روی اعضای راسته Agaricales رشد می‌کنند (agaricicolous species) و گونه‌هایی که روی اعضای راسته Aphyllophorales رشد می‌کنند (aphyllophoricolous species). گونه‌های مختلف جنس *Hypomyces* در موارد مختلف و روی میزبان‌هایی از تمامی گروه‌های قارچی فوق شامل دیسکومیستها (Leotiales, Pezizales) (از جمله *Russulales*، *Leotiales*, *Pezizales*)، آگاریکها آفیلوفورها رشد می‌نمایند.

آصف و محمدی گل‌تپه (Asef & Mohammadi Goltapeh 2002) چهار گونه از جنس *C. varium*, *C. polypori*, *C. verticillatum*, *C. dendroides* *Cladobotryum* شامل کردند، اما در هیچیک از نمونه‌های بررسی شده توسط آن‌ها، فرم جنسی مشاهده نشد. عموماً فرم‌های غیرجنسی گونه‌های قارچی دارای دامنه میزبانی و پراکنش وسیعی می‌باشند، اما پیدایش و مشاهده تلثومorf این گونه‌ها به ندرت، با محدودیت بسیار و تخصص میزبانی و اکولوژیکی بالا همراه می‌باشد. اخیراً آصف و زارع (Asef & Zare 2006) سه گونه از جنس *Hypomyces* به عنوان فرم‌های جنسی قارچ‌های قارچی و یک گونه از جنس *Cladobotryum* را از ایران گزارش نموده‌اند. آنامورف‌های گونه‌های قارچی از میزبان‌های *H. rosellus* و *H. aurantius* به ترتیب با نام‌های *C. varium* و *C. dendroides* پیش از این به عنوان قارچی از میزبان‌های قارچی گزارش شده بودند (آصف و محمدی گل‌تپه ۲۰۰۲) اما فرم جنسی آنها مشاهده نشده بود. همچنین ترکیب آنامورف/تلثومورف *H. polyporinus/C. clavisporum* برای نخستین بار در ایران توسط آصف و زارع (۲۰۰۶) گزارش شده است. زارع و خباز جلفایی (Zare & Khabbaz-Jolfaei 2005) در یک بررسی از واحدهای پرورش قارچ خوارکی در استان تهران گونه‌های *T. virens*, *Trichoderma harzianum*, *Verticillium fungicola* و *Trichothecium roseum*, *Acremonium crotocinigenum*, *C. dendroides*, *T. atroviride* را گزارش نمودند. از دیگر قارچ‌های مهم مرتبط با دیگر قارچ‌ها می‌توان از گونه‌های جنس *Trichoderma* نام برد. گونه *T. harzianum* از فراوان ترین گونه‌های تریکودرما است که از قارچ‌های مختلف جدا شده است. همه قارچ‌های متعلق به جنس‌های فوق دارای کنیدیوفورهای شبه ورتیسیلیوم هستند. جامع‌ترین تحقیق در زمینه گونه‌های ورتیسیلیوم قارچی توسط گمس و ون زاین (Gams & Van Zaayen 1982) انجام شده است و سه واریته *V. fungicola* var. *flavidum*, *Verticillium fungicola* var. *fungicola* و *V. fungicola* var. *aleophilum* بر اساس دمای بهینه و بیشینه رشد از یکدیگر شناسایی شده‌اند. همچنین گونه‌های دیگری از جمله *V. rexianum*, *V. leptobactrum*, *V. biguttatum*, *V. leptobactrum*, *Nectriopsis* و آنامورف‌های *Sphaerostilbella* توسط گمس و ون زاین (۱۹۸۲) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اخیراً این سه واریته از *Verticillium fungicola* مورد بررسی دقیق‌تر مولکولی و

مورفولوژیکی قرار گرفته و این گونه بر اساس دمای بهینه و بیشینه رشد و انشعابات کنیدیوفور و نیز روابط فیلوزنیکی با دو گونه و یک واریته در جنس *Lecanicillium* ترکیب شده است (Zare & Gams 2008). هدف از انجام این پژوهش شناسایی قارچ‌های ورتیسیلیوم مانند قارچ‌زی در شمال ایران بود.

روش بررسی

نمونه‌برداری

در این بررسی از سواحل جنوبی دریای خزر شامل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان بازدید به عمل آمد و نمونه‌های (قارچ‌های) مشکوک به آلودگی‌های قارچی جمع‌آوری شدند. قبل از انتقال به آزمایشگاه، جهت جلوگیری از پوسیدگی اندام‌ها، قارچ‌ها خشک شدند. در آزمایشگاه کلیه نمونه‌ها مورد بررسی ماکروسکوپی (مشاهده تغییر رنگ و رشد کپک‌ها روی سطح اندام‌های بارده) و میکروسکوپی (توسط بینوکول) قرار گرفتند. در صورت مشاهده کپک از آن اسلاید میکروسکوپی تهیه شد و مورد مطالعه میکروسکوپی بیشتر جهت شناسایی گونه‌ها قرار گرفت.

محیط‌های کشت

جهت خالص سازی قارچ‌های جمع‌آوری شده از محیط کشت سیب زمینی- دکستروز- آگار (PDA) و عصاره مالت- آگار (MEA) حاوی ۱۰۰ پی پی ام از هر یک از آنتی‌بیوتیک‌های پنی‌سیلین و استرپتومایسین (به منظور ممانعت از رشد باکتری‌ها) استفاده شد. با استفاده از بینوکول از قسمت‌های کپک زده توسط سوزن شیشه‌ای (glass needle) روی محیط کشت فوق به روش خط‌کشی (streaking) کشت شد. قارچ‌های به دست آمده تا زمان شناسایی روی محیط کشت MEA در دمای چهار درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. جهت شناسایی از محیط‌های کشت PDA، PDA، PCA (Gams *et al.* 2007)، SNA (Nirenberg 1976) و CMA (Gams *et al.* 1998) استفاده شد. عکسبرداری با استفاده از میکروسکوپ المپوس (BH2) و دوربین دیجیتال المپوس (C-4000) انجام شد. در مورد کنیدیوم‌ها حداقل از ۳۰ عدد و در مورد فیالیدها حداقل از ۲۰ عدد اندازه‌گیری شد.

نتیجه و بحث

در مجموع، تعداد ۵۷ جدایه قارچ فیالیددار از لکه‌ها و پوشش کپکی موجود روی ساقه، کلاهک، سوراخ‌ها و تیغه‌های قارچ‌های مختلف مورد بررسی به دست آمد. مشخصات این

قارچ‌ها از قبیل اسامی گونه‌ها، شماره کلکسیون، محل و تاریخ جمع‌آوری در جدول ۱ ارایه شده است. در میان قارچ‌های فهرست شده در جدول ۱، گونه‌های *Acremonium cf. recifei*, *C. purpureum*, *Cladobotryum mycophilum*, *Sepedonium microspermum* و *Lecanicillium wallacei* و *Simplicillium lanosoniveum*, می‌شوند (گونه‌های جدید برای فلور قارچ‌های ایران در جدول ۱ به صورت پرنگ نوشته شده‌اند). با بازبینی جنس ورتیسیلیوم توسط زارع و گمس (۲۰۰۴ و ۲۰۰۱)، بخشی از گونه‌های قارچزی آن به جنس *Lecanicillium* منتقل شدند. بخش عمده دیگر هنوز در این جنس قرار دارد، اگرچه تحقیقات اخیر بر اساس تلفیق داده‌های مولکولی و مورفولوژیکی نشان می‌دهد که این گونه‌ها که در بخش *Albo-erecta* از این جنس قرار دارند با گونه‌های بیماریزای گیاهی (*Verticillium* s. str.) ارتباط تاکسونومیکی دوری داشته و متعلق به یک جنس نمی‌باشند (زارع و گمس، ۲۰۰۸ و اطلاعات منتشر نشده).

گونه *V. fungicola* (= *Lecanicillium fungicola*) که عمده‌ترین گونه این بخش است قبلاً توسط زارع و خباز جلفاًی (۲۰۰۵) از قارچ پرورشی *Agaricus bisporus* از استان تهران گزارش شده است. این گونه در این تحقیق روی قارچ‌های خودرو مشاهده نشد. گونه *L. wallacei* اخیراً بر اساس یافته‌های مولکولی از جنس *Simplicillium* به جنس *Lecanicillium* منتقل شده است (زارع و گمس ۲۰۰۸). گونه‌های شبه ورتیسیلیوم به دست آمده در این تحقیق (جدول ۱) به شرح زیر تشریح و گزارش می‌شوند:

***Acremonium* Link, Magazin Ges. naturf. Freunde, Berlin 3: 15, 1809**

پنج جدایه متعلق به جنس آکرمونیوم در این تحقیق پیدا شد که یکی از آن‌ها *Acremonium cf. recifei* شناسایی گردید و چهار جدایه دیگر از این جنس (جدول ۱) که دارای کنیدیوم‌های خمیده مشابه آنچه که در *Acremonium curvulum* وجود دارد بودند، اما به دلیل این که سایر خصوصیات آن‌ها از قبیل پرگنه، کنیدیوفور و آرایش کنیدیوم‌ها متفاوت بود، با استفاده از منابع موجود (گمس ۱۹۷۱) در سطح گونه قابل شناسایی نبودند. به دلیل سادگی مورفولوژیکی بسیار زیاد و نبود معیارهای قابل اعتماد کافی، برای شناسایی همه آکرمونیوم‌های به دست آمده در سطح گونه اطلاعات مولکولی لازم است. اگرچه علیرغم تحقیقات گسترده‌هه هنوز هیچ سیستم مولکولی قابل قبول برای شناسایی گونه‌های آکرمونیوم معرفی نگردیده است (ریچارد سامربل، مکاتبات خصوصی ۲۰۰۷).

جدول ۱- فهرست قارچهای به دست آمده از سواحل جنوبی دریای خزر

Table 1. List of isolates obtained from the southern Caspian coasts

Fungus	Collection number	Host	Place	Collection date
<i>Acremonium cf. recifei</i>	T8-2-1 = IRAN 977C = CBS	<i>Pseudotrametes gibbosa</i>	Tonekabon-Liresar	30.9.2005
<i>Acremonium</i> sp.	MZ32	white mould on rust? underside of <i>Ulmus</i> sp. leaf	Tonekabon-Khorramabad	4.10.2004
<i>Acremonium</i> sp.	MZ14	<i>Daldinia</i> sp.	Jannat Roudbar rd.	5.10.2004
<i>Acremonium</i> sp.	MZ8	<i>Xylaria longipes</i>	Jannat Roudbar rd.	5.10.2004
<i>Acremonium</i> sp.	Gorgan3	<i>Tranzschelia discolor</i>	Gorgan-Nasrabad	17.10.2004
<i>Cladobotryum dendroides</i>	G4b1	unidentified agaric	Langerude-Khorma	13.5.2004
<i>Cladobotryum purpureum</i>	15b	<i>Pleurotus ostreatus</i> (yellow mould) on cap of agaric	Tonekabon-Liresar	12.11.2003
<i>Cladobotryum mycophilum</i>	T2	<i>Schizophyllum commune</i>	Tonekabon-Liresar	29.9.2005
<i>Cladobotryum mycophilum</i>	T4	<i>Schizophyllum commune</i> (white mould)	Tonekabon-Liresar	30.9.2005
<i>Cladobotryum mycophilum</i>	T6	white mould on <i>Trametes</i> sp.	Tonekabon-Liresar	30.9.2005
<i>Cladobotryum mycophilum</i>	T7	<i>Trametes versicolor</i>	Gorgan-Naharkhoran	3.5.2004
<i>Cladobotryum mycophilum</i>	Gor1b	<i>Trametes</i> sp.	Gorgan-Naharkhoran	3.5.2004
<i>Cladobotryum mycophilum</i>	Gor15	<i>Schizophyllum commune</i>	Tonekabon-Liresar	30.9.2005
<i>Cladobotryum mycophilum</i>	T16			

Table 1. (contd.)

Fungus	Collection number	Host	Place	Collection date
<i>Cladobotryum varicillatum</i>	A9	<i>Lactarius piperatus</i>	Navrud (Asalem-Khalkhal rd.)	12.8.2004
<i>Fusarium oxysporum</i>	A2	<i>Leccinum</i> sp.	Navrud (Asalem-Khalkhal rd.)	12.8.2004
<i>Fusarium proliferatum</i>	T8-2-3	<i>Pseudotrametes gibbosa</i>	Tonekabon-Liresar	30.9.2005
<i>Fusarium</i> sp.	MZ15	<i>Hypoxyylon</i> sp.	Jannat Roudbar rd.	5.10.2004
<i>Hypomyces polyporinus</i>	Gor3-1	<i>Trametes versicolor</i>	Kordkoy-Forest Park	3.5.2004
<i>Hypomyces polyporinus</i>	Gor6-1	<i>Trametes versicolor</i>	Gorgan-Alngdarreh	3.5.2004
<i>Lecanicillium muscarium</i>	MZ27	<i>Transchelia discolor</i>	Tonekabon-Khorramabad (Letak)	4.10.2004
<i>Lecanicillium wallacei</i>	T8-2-4=IRAN 979C = CBS 120056	<i>Pseudotrametes gibbosa</i>	Tonekabon-2000 Forest	29.9.2005
<i>Sepedonium microsporum</i>	T1 = IRAN 1021C = CBS 120057	<i>Boletus</i> sp.	Tonekabon-2000 Forest	29.9.2005
<i>Sepedonium</i> sp.	8b	<i>Boletus</i> sp.	Navrud (Asalem-Khalkhal rd.)	12.8.2004
<i>Sepedonium</i> sp.	8b-1	<i>Boletus</i> sp.	Navrud (Asalem-Khalkhal rd.)	12.8.2004
<i>Sepedonium</i> sp.	A10	<i>Leccinum</i> sp.	Navrud (Asalem-Khalkhal rd.)	12.8.2004
<i>Sepedonium</i> sp.	A12	<i>Leccinum</i> sp.	Navrud (Asalem-Khalkhal rd.)	12.8.2004
<i>Simplicillium lanosumiveum</i>	T-9-2=IRAN 978C = CBS 120055	<i>Trametes versicolor</i>	Tonekabon-2000 Forest	29.9.2005

Table 1. (contd.)

Fungus	Collection number	Host	Place	Collection date
<i>Trichoderma atroviride</i>	Gor12	<i>Trametes versicolor</i>	Gorgan-Alangdarreh	3.5.2004
<i>Trichoderma atroviride</i>	Gor3	<i>Trametes versicolor</i>	Kordkoy-Forest Park	3.5.2004
<i>Trichoderma atroviride</i>	Gor4	<i>Daldinia concentrica</i>	Kordkoy-Forest Park	3.6.2004
<i>Trichoderma atroviride</i>	Gor9	<i>Pleurotus</i> sp.	Gorgan-Alangdarreh	3.5.2004
<i>Trichoderma atroviride</i>	Gor10	unidentified agaric	Gorgan-Alangdarreh	3.5.2004
<i>Trichoderma atroviride</i>	Gor-3-2	<i>Stereum</i> sp.	Kordkoy-Forest Park	3.5.2004
<i>Trichoderma atroviride</i>	T10	<i>Daldinia concentrica</i> (while mold)	Tonekabon-Liresar	30.9.2005
<i>Trichoderma atroviride</i>	T11	<i>Daldinia concentrica</i>	Tonekabon-Liresar	30.9.2005
<i>Trichoderma atroviride</i>	T9	<i>Trametes</i> sp.	Tonekabon-Liresar	30.9.2005
<i>Trichoderma atroviride</i>	17	<i>Trametes versicolor</i>	Tonekabon-Liresar	12.7.2004
<i>Trichoderma atroviride</i>	Gor14	<i>Trametes versicolor</i>	Gorgan-Normal	31.5.2004
<i>Trichoderma atroviride</i>	RZ2	<i>Hypoxyylon</i> sp.	Mazandaran-Zirab (Forest park)	4.9.2004
<i>Trichoderma atroviride</i>	Gor1	<i>Trametes versicolor</i>	Gorgan-Naharkhoran	3.5.2004
<i>Trichoderma atroviride</i>	G4a	rotten fungus	Gilan-Langerude (Khorma)	13.11.2004
<i>Trichoderma atroviride</i>	RZ3	<i>Xylaria longipes</i>	Mazandaran-Zirab (Forest park)	4.9.2004
<i>Trichoderma atroviride</i>	RZ6	<i>Xylaria longipes</i>	Mazandaran-Zirab (Forest park)	4.9.2004

Table 1. (contd.)

Fungus	Collection number	Host	Place	Collection date
<i>Trichoderma citrinoviride</i>	Gor2	<i>Auricularia</i> sp.	Kordkoy-Forest Park	3.5.2004
<i>Trichoderma harzianum</i>	Gor16	<i>Xylaria longipes</i>	Kordkoy-Forest Park	3.5.2004
<i>Trichoderma harzianum</i>	G20	<i>Sarcosypha coccinea</i>	Siahkal-Deilaman	3.5.2004
<i>Trichoderma harzianum</i>	Gor18	<i>Trametes versicolor</i>	Gorgan-Nomal	3.5.2004
<i>Trichoderma harzianum</i>	15a2	<i>Pleurotus ostreatus</i>	Tonekabon-Liresar	12.7.2004
<i>Trichoderma harzianum</i>	G4b	unidentified agaric	Gilan-Langerude (Khorma)	3.5.2004
<i>Trichoderma harzianum</i>	23	<i>Trametes versicolor</i>	Gorgan-Ghorogh	31.5.2004
<i>Trichoderma harzianum</i>	10a	<i>Trametes versicolor</i>	Tonekabon-Liresar	12.7.2004
<i>Trichoderma harzianum</i>	15al	<i>Xylaria longipes</i>	Mazandaran-Zirab (Forest park)	4.9.2004
<i>Trichoderma harzianum</i>	16b	<i>Xylaria longipes</i>	Mazandaran-Zirab (Forest park)	4.9.2004
<i>Trichoderma harzianum</i>	MZ13	<i>Hypoxylon</i> sp.	Jannat Roudbar rd.	5.10.2004
<i>Trichoderma koningii</i>	Gor17	unidentified polypore	Kordkoy-Forest Park	3.5.2004
<i>Trichoderma koningii</i>	RZ4	<i>Hypoxylon</i> sp.	Mazandaran-Zirab (Forest park)	4.9.2004

اصلی که به صورت بُر رنگ نشاند برای ایران گزارش جدید می‌باشد. IRAN...C = مجموعة قارچ‌های زنده موجود به مرکز قارچ‌شناسی در شهر اوتخت کشور هند.

CBS = مجموعة قارچ‌های زنده موجود به مرکز قارچ‌شناسی در شهر اوتخت کشور هند.

Names printed in bold are new records for Iran. IRAN...C = Fungal Culture Collection of Herbarium, Ministry of Agriculture, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran.

CBS = Centralbureau voor Schimmelmelicultures, Utrecht, the Netherlands.


***Acremonium cf. recifei* (Leão & Lôbo) W. Gams, *Cephalosporium-artige Schimmelpilze* (Stuttgart): 133, 1971**

پرگنه کند رشد بود و قطر آن روی محیط کشت PDA در دمای ۲۴ درجه سانتی گراد پس از ۱۰ روز به ۳۰ میلی متر رسید. رنگ پرگنه از سطوح رویی و زیرین زرد و ارتفاع آن کم بود (میسلیوم هوایی ناچیز بود). فیالیدها با ابعاد $1/5-1/7 \times 1/5-1/6$ میکرومتر، دارای یقه (کلارت) مشخص (شکل ۱)، کنیدیومها با اندازه $2/4-3/5 \times 6/5-7/5$ میکرومتر، خمیده تا هلالی شکل با دو انتهای گرد، به صورت زنجیری و با سرهای کنیدیومی مشخص، تک یاخته‌ای و رنگ پذیر (در کاتن بلو + لاکتیک اسید) بودند (شکل ۱).

اندازه کنیدیومها نسبت به آنچه در مورد *A. recifei* ذکر شده است، $1/3-2 \times 1/3-2$ میکرومتر، بزرگتر و عریض‌تر بود. گونه دیگری که کنیدیوم‌های کوتاه‌تر خمیده است *A. curvulum* W. Gams می‌باشد، اما این گونه با داشتن کنیدیوم‌های کوتاه‌تر $1-2 \times 1/4-2/1$ میکرومتر و فقدان کلامیدوسپور از این گونه متمایز است. برای این گونه کلامیدوسپورهای کروی تا تخم مرغی با اندازه $3-5$ میکرومتر گزارش شده است (گمس ۱۹۷۱)، اما جدایه ایرانی فاقد کلامیدوسپور بود. این گونه *A. curvulum* از گونه‌هایی هستند که هنوز مشکلات تاکسونومیکی داشته و طبقه‌بندی درست آن‌ها مستلزم بررسی تعداد زیادی جدایه با تلفیق روش‌های مورفولوژیکی و فیلوجنی مولکولی چند زنی می‌باشد. یک جدایه از این گونه از قارچ *Pseudotrametes gibbosa* (Pers.) Bondartsev & Singer از تنکابن (لیره سر) به دست آمد. پس از مشاهده تفاوت‌های فوق‌الذکر، این جدایه جهت مشورت به مرکز قارچ‌شناسی هلند (CBS) ارسال شد و از متخصصین این جنس (ریچارد سامربل و والتر گمس، مکاتبات خصوصی) نظرخواهی شد. نتیجتاً نزدیکترین گونه به آن *A. recifei* تشخیص داده شد. این جدایه (T8-2-1) در مجموعه قارچ‌های زنده ایران با شماره IRAN 977C و در مجموعه قارچ‌های هلند با شماره CBS 120051 نگهداری می‌شود.

***Cladobotryum* Nees, Syst. Pilze (Würzburg): 56, 1816**

پنج گونه از این جنس به دست آمد که شامل *Cladobotryum dendroides* و *Hypomyces polyporinus* (*C. clavisporum*), *C. verticillatum*, *C. purpureum* *C. verticillatum* و *C. dendroides* (*C. mycophilum*) (جدول ۱) بودند. از این میان گونه‌های *Hypomyces polyporinus* گونه (Anamorph: *C. clavisporum*) قبل از ایران گزارش شده‌اند (آصف و محمدی گل تپه ۲۰۰۲). گونه هم اخیراً از استان گلستان (کردکوی و افراخته) گزارش شده است (آصف و زارع ۲۰۰۶). در اینجا فقط به شرح دو گونه جدید برای ایران پرداخته می‌شود.



شکل ۱ - a-f: فیالیدها، f, j, k: کنیدیومها در سرهای دروغین و در زنجیر، i و j: کلارت‌های مشخص در انتهای فیالیدها، l-n: کنیدیومهای خمیده تکیاختهای. i و L در کاتن بلو-لاکتیک اسید و بقیه در آب تهیه شده‌اند.

Fig. 1. *Acremonium* cf. *recifei*: a-f. Phialides f, j, k. Conidia in heads and chain h, i, j. Distinct collaretts, l-n. Curved 1-celled conidia. i and L are mounted in cotton blue-lactic acid and the rest in water.

***Cladobotryum purpureum* (Morgan-Jones) Helfer, Lib. Bot. 1: 92, 1991**

پرگنه کرکی تا محملی، نسبتاً متراکم، قرمز آلبالویی تا بنفش، روی PDA سریع الرشد به طوری که پس از ۲۴ ساعت در دمای ۲۴ درجه سانتی گراد قطر آن به دو سانتی متر می‌رسد. ابتدا سفید تا کرم رنگ و تا زرد کاهی و سپس قرمز تا بنفش رنگ می‌شود. میسلیوم ابتدا سفید و سپس صورتی مایل به گلی رنگ می‌شود. سطح زیرین پرگنه قهوه‌ای تیره، فیالیدها در اشعابات فراهم (verticillate) و در دسته‌های ۲-۸ تایی، انعطاف ناپذیر و باریک شونده به سمت انتهایها (aculate) با طول ۲۰-۲۸ و ضخامت ۳/۵-۴ میکرومتر در قاعده که به سمت انتهای ۱-۱/۲ میکرومتر باریک می‌شوند. کنیدیومها انتروبلاستیک، تخم مرغی شکل، بی‌رنگ، با سطح صاف، دو یاخته‌ای، در قاعده تا حدی برآمده (papillate)، یاخته تحتانی مقداری بزرگتر، اندازه کنیدیومها ۱۵/۵-۱۸ × ۶-۷ میکرومتر (شکل ۲).

یک جدایه از این گونه از کپک زرد روی *Pleurotus ostreatus* جدا شد (جدول ۱) و در مجموعه قارچ‌های زنده ایران با شماره C 784 IRAN نگهداری می‌شود. این اولین گزارش از وجود این گونه در ایران است. این گونه قبل از *Lenzites betulina*, *Marasmius* spp. و *Stereum* sp. در آمریکای شمالی گزارش شده است (Gray & Morgan-Jones 1980). این گونه نخستین بار در جنس *Sibirina* توصیف شد (Gray & Morgan-Jones 1980)، اما بعداً بر اساس شباهت‌های مورفولوژیکی به جنس *Cladobotryum* منتقل شد (Helfer 1991).

***Cladobotryum mycophilum* (Oudem.) W. Gams & Hooz., Persoonia 6(1): 102, 1970**

پرگنه با رشد هوایی زیاد و پنبه‌ای، بی‌رنگ تا صورتی کمرنگ بوده؛ میسلیوم به صورت سطحی روی سطح هیمنیوم اندام بارده قارچ میزبان بوده و کنیدیوفورها اغلب منفرد، منشعب، راست تا مقداری انعطاف پذیر، بی‌رنگ و در انتهای تشکیل یک دسته انتهایی از یاخته‌های کنیدیومزا (فیالید) می‌دهند. فیالیدها در دسته‌های ۲-۵ تایی به صورت فراهم یا به صورت جانبی روی کنیدیوفور تشکیل می‌شوند. فیالیدها کمابیش استوانه‌ای اما در انتهای کمی باریکترند. انتهای فیالیدها کند (غیر تیز) است. اندازه آن‌ها ۴/۸-۶ × ۲۳-۲۸ میکرومتر است. کنیدیومها به صورت هولوبلاستیک تشکیل شده و به صورت یک برآمدگی در انتهای فیالید تشکیل می‌شوند. کنیدیومها بی‌رنگ، با سطح صاف و عموماً دارای ۱-۳ بند، معمولاً نامتقارن و بی‌رنگ و در پایه به صورت ساقه نازکی بریده شده است (narrowly truncate). اندازه آن‌ها ۱۰ × ۷/۵-۱۷-۲۵ میکرومتر و شکل آن‌ها از گرزی تا بیضوی متغیر است (شکل ۳). تعداد هفت جدایه از این گونه از میزبان‌های مختلف و از مناطق مختلف مورد بررسی (استان‌های گلستان و مازندران) جمع‌آوری شد (جدول ۱). گزارش این گونه برای میکوفلور ایران جدید

است. این گونه از میزبان‌های متعدد متعلق به راسته‌های *Agaricales* و *Aphylophorales* از اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن گزارش شده است.

***Fusarium* Link, Magazin Ges. naturf. Freunde, Berlin 3: 10, 1809**

سه جدایه از این جنس در طی این بررسی از *Leccinum* sp., *Hypoxyton* sp. و *Pseudotrametes gibbosa* از ناورود (جاده اسلام به خلخال)، تنکابن و جنت رودبار به دست آمد (جدول ۱). این گونه‌ها شامل *F. oxysporum*, *F. proliferatum* و *F. oxysporum* بودند. اگرچه این گونه‌ها تاکنون از این قارچ‌ها در ایران جدا یا گزارش نشده‌اند، اما از میزبان‌های گیاهی مختلف قبل از ایران گزارش شده‌اند (Ershad 1995). گونه *Fusarium* sp. شبیه *F. oxysporum* بود، اما فاقد کلامیدوسپور، لذا فعلاً در هیچ گونه‌ای طبقه‌بندی نشده است. شناسایی این گونه‌ها با استفاده از Gerlach & Nirenberg (1982) انجام شد.

***Lecanicillium* W. Gams & Zare, Nova Hedwigia 72(3-4): 332, 2001**

دو جدایه متعلق به این جنس از ایران به دست آمد. این جنس در سال ۲۰۰۱ از جنس *Verticillium* تقسیک شد (ز/رع و گمس ۲۰۰۱). یکی از جدایه‌های به دست آمده *Pleurotus L. muscarium* (Petch) Zare & W. Gams شناسایی شد که قبل از ایران از *L. wallacei* ostreatus گزارش شده بود (ز/رع و آصف ۲۰۰۴). گونه دیگر *L. wallacei* می‌باشد که اخیراً از جنس *Simplicillium* به این جنس منتقل شده است.

***Lecanicillium wallacei* (H.C. Evans) H.C. Evans & Zare, in Zare & Gams, Mycol. Res., 112: 816, 2008**

پرگنه سفید با سطح زیرین کرم تا کرم قهوه‌ای، رشد آن پس از ۱۰ روز روی PDA در دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد به ۳۰ میلی‌متر رسید. فیالیدها منفرد یا در دسته‌های ۳-۴ تایی به صورت فراهم تشکیل می‌شوند. فیالیدها نازک، باریک شونده به سمت انتهای آندازه ۱/۶ × ۲۳-۳۸ میکرومتر هستند. کنیدیوم‌ها در انتهای فیالیدها به صورت سرهای کنیدیومی به شکل بیضوی تا نیمه‌کروی تشکیل می‌شوند. دارای دو نوع کنیدیوم است. ماکروکنیدیوم‌ها تک‌یاخته‌ای، دوکی شکل با دو انتهای تیز و اندازه ۱-۱/۳ × ۹-۱۱(۱۲) و میکروکنیدیوم‌ها نیز تک‌یاخته‌ای، بیضوی تا دوکی کوتاه و با اندازه ۱/۱ × ۰/۹-۱/۱ میکرومتر هستند. کریستال‌های هشت وجهی در داخل آگار تشکیل شدند (شکل ۴). این گونه بر اساس داشتن کنیدیوفور فراهم و اطلاعات مولکولی [توالی‌های منطقه ITS از rDNA (ز/رع و گمس ۲۰۰۸)] از جنس *Simplicillium* خارج و در *Lecanicillium* ترکیب شد. این گونه قبل فقط از شفیره یک پروانه جدا شده بود (ز/رع و گمس ۲۰۰۱ و ۲۰۰۴).

یک جدایه از این گونه از قارچ *Pseudotrametes gibbosa* به دست آمد (جدول ۱). این جدایه در مجموعه قارچ‌های زنده ایران (IRAN 979 C) و در مجموعه قارچ‌های زنده هلند (T8-2-4) نگهداری می‌شود. گزارش این گونه برای ایران جدید است. (CBS 120056)




شکل ۲ - ۲: a-d: کنیدیوفورها و انشعابات فراهم، e-g: کنیدیوم‌ها.
Fig. 2. *Cladobotryum purpureum*: a-d. Conidiophores and verticillately branched phialides, e-g. Conidia.



شکل -۳ : a-d: کنیدیوفورها و فیالیدها در آرایش فراهم، e-g. کنیدیوم‌ها.

Fig. 3. *Cladobotryum mycophilum*: a-d. Conidiophores and phialides in verticillate arrangement, e-g. Conidia.



شکل -۴ Lecanicillium wallacei: a-g. کنیدیوفورها، فیالیدها و سرهای کنیدیومی،
h. میکرو- و ماکروکنیدیومها، i. کریستال هشت وجهی.


Fig. 4. *Lecanicillium wallacei*: a-g. Conidiophores, phialides and conidial heads,
h. Micro- and macro-conidia, i. Octahedral crystal.

***Simpicillium* W. Gams & Zare, *Nova Hedwigia* 73(1-2): 38, 2001**

یک جدایه متعلق به این جنس از مناطق بررسی شده بدست آمد (جدول ۱). گونه‌های این جنس اغلب پاتوژن دیگر قارچ‌ها یا پاتوژن حشرات هستند. گونه به دست آمده است که گونه تیپ این جنس بوده و در اینجا مختصراً شرح داده شده است. *S. lanosoniveum*

***Simpicillium lanosoniveum* (J.F.H. Beyma) Zare & W. Gams, *Nova Hedwigia* 73(1-2): 39, 2001**

برگنه سفید مایل به کرم با سطح زیرین زرد کمنگ، با رشد متوسط ۲۵ میلی‌متر روی PDA پس از ۱۰ روز در دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد بوده، فیالیدها ساده و منفرد و یا اینکه دو فیالید نزدیک به هم روی کنیدیوفور ایجاد شدند. اندازه فیالیدها $18-20 \times 1-1/2$ میکرومتر بوده و کنیدیوم‌ها نیمه کروی، بیضوی تا استوانه‌ای کوتاه و نسبتاً کوچک با اندازه $2-2/8 \times 2/5-3/5$ میکرومتر هستند. کنیدیوم‌ها در سرهای کوچک کنیدیومی در انتهای فیالیدها تشکیل شدند. کریستال‌های هشت وجهی در داخل آگار تشکیل شدند (شکل ۵). ممکن است دو فیالید به صورت مقابل دیده شوند اما با بزرگنمایی بیشتر مشخص می‌گردد که کاملاً در برابر هم نیستند. دمای بهینه برای رشد این گونه (۲۱-۲۷ درجه سانتی‌گراد و حداقل دمای رشد ۳۰ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است (Zare & Gams 2001). گزارش این گونه برای ایران جدید است. دامنه میزانی این گونه بسیار وسیع است و شامل قارچ‌ها و حشرات است. این گونه قبل از زنگ قهوه (*Hemileia vastatrix*), شفیره پروانه و *Penthocrates styx* و شپشک نرم سبز قهوه (*Coccus viridis*) گزارش شده است (Zare & Gams 2001). این اولین گزارش این گونه از *Trametes versicolor* و اولین گونه‌ای از این جنس است که از ایران گزارش می‌شود. یک جدایه از این گونه (T 9-2) در مجموعه قارچ‌های زنده ایران (IRAN 978 C) و در مجموعه قارچ‌های زنده هلند (CBS 120055) نگهداری می‌شود.



شکل -۵ a-c: کنیدیوفورها و سرهای کنیدیومی،
d و e. کنیدیومهای نیمه کروی تا بیضوی، f. کریستال هشت وجهی.

Fig. 5. *Simplicillium lanosoniveum*: a-c. Conidiophores and conidial heads,
d, e. Subglobose to ellipsoidal conidia f. Octahedral crystal.

Sepedonium Link, Magazin Ges. naturf. Freunde, Berlin 3: 18, 1809

پنج نمونه متعلق به این جنس از مناطق مورد بررسی (جدول ۱) به دست آمد. آرایش فیالیدها روی کنیدیوفور در بیشتر گونه‌های این جنس به صورت فراهم می‌باشد، اگرچه مرحله فیالیدیک ممکن است فقط در ابتدای مراحل رشد قارچ دیده شده و پس از آن فقط آلوروکنیدیوم‌ها در محیط دیده شوند.

***Sepedonium microspermum* Besl, in Besl, Hagn, Jobst & Lange, Z. Mykol.
64(1): 46, 1998**

پرگنه سریع‌الرشد بود و قطر آن روی محیط کشت PDA در دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد پس از پنج روز به هشت سانتی‌متر رسید. رنگ پرگنه از سطوح رویی و زیرین در ابتدای رشد سفید و پس از مدت کوتاهی به زرد طلایی تغییر یافت. کنیدیوفورها بی‌رنگ، بند بند هستند. فیالیدها نازک، فاقد یقه مشخص (شکل ۶) و به صورت منفرد یا در دسته‌های ۳-۲-۱ تایی به صورت فراهم روی کنیدیوفور قرار دارند. فیالیدها $4 \times 3-4 \times 60-40$ میکرومتر که در انتهای $1/5-2$ میکرومتر باریک می‌شود. فیالوکنیدیوم‌ها (phialoconidia) تخم مرغی تا دوکی شکل در سرهای کنیدیومی تشکیل شده و تک یا خته‌ای با اندازه $17/5 \times 5/5-9/5 \times 16/3-17/5$ میکرومتر می‌باشد. آلوروکنیدیوم‌ها (aleuroconidia) روی ساقه جانبی کوتاهی تشکیل شده، زرد کروی با برجستگی‌های زاویه دار و با اندازه $16/3-17/5$ میکرومتر می‌باشد (شکل ۶).


رنگ زرد طلایی پرگنه به دلیل تعداد زیاد آلوروکنیدیوم‌ها می‌باشد. این آلوروکنیدیوم‌ها که نوعی اندام استراحتی محسوب می‌شوند روی اندام‌های میزان که قارچ‌های راسته Boletales هستند تشکیل شده و به صورت پوشش زرد طلایی دیده می‌شوند. این قارچ‌ها عموماً به عنوان قارچ‌های بولتزی (boleticolous) شناخته می‌شوند. جامعترین کار تاکسونومیکی روی این جنس توسط Sahr *et al.* (1999) انجام شده است که ویژگی‌های مورفولوژیکی، آناتومیکی و مولکولی (توالی ITS) را تلفیق کرده و کلیدی برای هشت گونه از جنس *Sepedonium* ارایه کرده‌اند. گونه‌های مختلف *Sepedonium* تاکنون از گونه‌های زیادی از جنس‌های مختلف شامل *Boletus*, *Xerocomus*, *Chalciporus*, *Gyrodont*, *Gyroporus*, *Tylopilus*, *Gomphidius*, *Paxillus*, *Suillus*, *Porphyrellus*, *Leccinum*, *Chamonixia*, *Xanthoconium* و *Astroboletus*, *Pulveroboletus*, *Fistulinella*, *Phylloporus* جدا شده‌اند (Sahr *et al.* 1999). این اولین گزارش از جنس *Sepedonium* در ایران است.

چهار نمونه دیگر (جدول ۱) از ناورود (جاده اسلام به خلخال) از جنس‌های *Boletus* و *Leccinum* جدا شدند. اگرچه این جدایه‌ها در سطح جنس شناسایی شدند، اما به دلیل عدم رشد پرگنه از اینوکولوم آلوروکنیدیومی، گونه آن‌ها قابل تشخیص نبود. حتی با وارد کردن تنش در دمای پایین (داخل فریزر) و کشت روی محیط‌های کشت مختلف و محیط‌های اسیدی آلوروکنیدیوم‌ها تحریک به جوانه زنی نشدن. شکل و اندازه آلوروکنیدیوم‌ها در این نمونه‌ها به گونه *Sepedonium laevigatum* Sahr & Ammer شباهت دارد (شکل ۷)، اما برای تشخیص قطعی گونه دانستن مورفولوژی مرحله کنیدیومی لازم است.



شکل -۶ a و b. کنیدیوفورها و سرهای کنیدیومی،
c. کنیدیوم‌ها، g-i. آلوروکنیدیوم‌ها.

Fig. 6. *Sepedonium microspermum*: a, b. Conidiophores and conidial heads,
c-f. Conidia, g-i. Aleuroconidia.



شکل -۷: آلوروکنیدیوم‌های چند نمونه که جوانه نزد و تولید فیالوکنیدیوم نکردند.

Fig. 7. *Sepedonium* sp.: Aleuroconidia of some specimens that did not germinate to produce phialoconidia.

Trichoderma Pers., Neues Mag. Bot. 1: 92, 1794

بیشترین جدایه‌های (۲۹ جدایه) به دست آمده متعلق به این جنس بودند (جدول ۱). گونه‌های *T. atroviride* (با ۱۶ جدایه) و *T. harzianum* (با ۱۰ جدایه) از فراوانترین گونه‌ها بودند. سه جدایه دیگر به دست آمد که یک جدایه متعلق به *T. citrinoviride* و دو جدایه دیگر *T. koningii* شناسایی شدند.

گونه *T. atroviride* که یکی از گونه‌های فراوان و مهم از نظر کنترل بیولوژیکی محسوب می‌شود، قبلاً توسط ظفری و همکاران (Zafari et al. 2004) از ایران گزارش شده است. این گونه متعلق به بخش *Trichoderma* از این جنس است که دارای کنیدیوم‌های نیمه‌کروی تا کروی سبز رنگ و کلامیدوسپور فراوان است. تفاوت قابل توجه این گونه با داشتن فیالیدهای قلاب مانند و کنیدیوم‌های بزرگ‌تر آن است. اندازه کنیدیوم‌ها

در این گونه $2/2-3/4 \times 2/6-4/2$ میکرومتر و در *T. harzianum* کوچکتر، $1/5-2/5 \times 2-3$ میکرومتر است. این دو گونه به همراه گونه *T. aggressivum* که فقط بر اساس اختلاف حداکثر دمای رشد از *T. harzianum* قابل تشخیص است، مفصلاتوسط (Samuels et al. 2002) تشریح و مقایسه شده‌اند. گونه *T. citrinoviride* قبل از ایران گزارش و توسط ظفری و همکاران (Zafari et al. 2002) تشریح شده است. در این گونه کنیدیوفورها از تیپ *Longibrachiatum* و کنیدیومها مستطیلی تا بیضوی نسبتاً یکنواخت به رنگ سبز و با دیواره صاف هستند. اندازه آن‌ها به طور متوسط $2/3-3/7 \times 1/5-2$ میکرومتر است.

سپاسگزاری

نگارندگان از همکاری صمیمانه تکنیسین‌های بخش تحقیقات رستنی‌ها خانم زهره قنبری و آقای اصغر صادقی مصور به خاطر تهیه محیط‌های کشت قدردانی می‌نماید. همچنین همکاری‌های آقای پروفسور والتر گمس از مرکز قارچ‌شناسی هلند (CBS, Utrecht, Netherlands) در ارسال برخی منابع علمی و مشاوره در تشخیص گونه *Trichoderma koningii* در خور تقدیر است.

منابع

جهت ملاحظه منابع به متن انگلیسی مراجعه شود.

نشانی نگارندگان: دکتر رسول زارع و محمدرضا آصف، بخش تحقیقات رستنی‌ها، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، صندوق پستی ۱۴۵۴، تهران ۱۹۳۹۵.

SOME PHIALIDIC FUNGICOLOUS FUNGI FROM THE SOUTHERN CASPIAN COASTS

R. ZARE* and **M.R. ASEF**

Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection

Received: 15.01.2008

Accepted: 26.05.2008

During 2003-05 Iranian provinces in the Southern Caspian coast (Gilan, Mazandaran and Golestan Provinces, N. Iran) were investigated in order to collect and identify fungicolous species on various fungal hosts. Fifty-seven isolates were obtained and these were classified into seven genera, *Acremonium*, *Cladobotryum*, *Fusarium*, *Sepedonium*, *Hypomyces*, *Lecanicillium*, *Simplicillium* and *Trichoderma*. Among 13 species obtained, *Acremonium* cf. *recifei*, *Cladobotryum purpureum*, *C. mycophilum*, *Sepedonium microspermum*, *Simplicillium lanosoniveum*, *Lecanicillium wallacei* are new records for Iran. A few isolates belonging to *Acremonium*, *Fusarium* and *Sepedonium* (Table 1) could not be identified to species level with the available methods and literature. *Trichoderma* was the most frequently isolated genus.

Key words: *Hypomyces*, Boleticolous, Agaricicolous, Aphyllophoricolous, Clavicipitaceae

* Corresponding author (E-mail: simplicillium@yahoo.com)

To observe the figures and table, refer to the Persian text.

References

- AINSWORTH, G.C. 1976. Introduction to the History of Mycology. Cambridge University Press., Cambridge, England.
- ARNOLD, G. 1969. Über zwei neue imperfekten gatungen, *Eurasina*. gen. nov., und *Pseudohansfordia* gen. nov. Z. Pilzk. 35: 305-310.
- ARNOLD, G. 1970. Über *Hypomyces porotheliiformis* und seine nebebfrechtfotrm. Westfäl. Pilzbriefe 8: 11-13.
- ARNOLD, G. 1971. Über einige neue taxa und kombinationen der Sphaeriales. Z. Pilzk. 37: 187-198.
- ASEF, M.R. and MOHAMMADI GOLTAPEH, E. 2002. Identification of fungicolous fungi of Iran I. *Cladobotryum* species. Rostaniha 3: 5-8 (Persian 11-22).
- ASEF, M.R. and ZARE, R. 2006. Identification of fungicolous fungi of Iran. II. Teleomorphs belonging to the genus *Hypomyces*. Rostaniha 7: 35-42 (Persian 33-35).
- BARNETT, H.L. 1963. The nature of mycoparasitism by fungi. Ann. Rev. Microbiol. 17: 1-14.
- BARNETT, H.L. 1964. Mycoparasitism. Mycologia 56: 1-19.
- DE HOOG, G.S. 1978. Notes on some fungicolous *Hypomyces* and their relatives. Persoonia 10: 33-81.
- ERSHAD, D. 1995. Fungi of Iran, 2nd ed. Ministry of Agriculture, Agricultural Research, Education & Extension Organization. Tehran, Iran.
- GAMS, W. 1971. *Cephalosporium*-artige Schimmelpilze (Hyphomycete). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
- GAMS, W. and HOOZEMANS, A.C.M. 1970. *Cladobotryum*-konidien formen von *Hypomyces*-Arten. Persoonia 6: 95-110.

- GAMS, W. and VAN ZAAYEN, A. 1982. Contribution to the taxonomy and pathogenicity of fungicolous *Verticillium* species. I. Taxonomy. Neth. J. Pl. Path. 88: 57-78.
- GAMS, W., DIEDERICH, P. and PÖLDMAA, K. 2004. Fungicolous fungi. Chapter 17 In: Müller, G., Bills, G.F. & Foster, M.S. (eds). Measuring and monitoring biological diversity: Standard Methods for Fungi. Academic Press, New York.
- GAMS, W., CROUS, P.W. and VERKLEY, G.J.M. (eds) 2007. CBS Course of Mycology. 5th ed. Utrecht: Centraalbureau voor Schimmelcultures.
- GERLACH, W. and NIRENBERG, H. 1982. The Genus *Fusarium*, A Pictorial Atlas. Biol. Bundes. Land- und Forstwirt., Berlin.
- GILMAN, J.C. and TIFFANY, L.H. 1952. Fungicolous fungi from Iowa. Proc. Iowa Acad. Sci. 59: 99-110.
- GRAY, D.J. and MORGAN-JONES, G. 1980. Notes of Hyphomycetes. XXXIV. Some mycoparasitic species. Mycotaxon 10: 375-404.
- HAWKSWORTH, D.L., KIRK, P.M., SUTTON, B.C. and PEGLER, D.N. 1995. Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi, 8th ed. CAB International, Wallingford.
- HELPFER, W. 1991. Pilze auf Pilzfruchtkörpern. Untersuchungen zur Ökologie, Systematik und Chemie. Lib. Bot. 1: 1-157.
- JEFFRIES, P. 1995. Biology and ecology of mycoparasitism. Can. J. Bot. 73 (Suppl. 1): S1284-S1290.
- NIRENBERG, H. 1976. Untersuchungen Über die morphologische und biologische Differenzierung in der *Fusarium*-Sektion *Liseola*. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem 169: 1-117.
- PÖLDMAA, K. 2000. Generic delimitation of the fungicolous Hypocreaceae. Stud. Mycol. 45: 83-94.
- PÖLDMAA, K. and SAMUELS, G.J. 1999. Aphylophoricolous species of *Hypomyces* with KOH-negative perithecia. Mycologia 91: 177-199.

-
- ROGERSON, C.T. and SAMUELS, G.J. 1985. Species of *Hypomyces* and *Nectria* occurring on Discomycetes. *Mycologia* 77: 763-783.
- ROGERSON, C.T. and SAMUELS, G.J. 1989. Boleticolous species of *Hypomyces*. *Mycologia* 81: 413-432.
- ROGERSON, C.T. and SAMUELS, G.J. 1993. Polyporicolous species of *Hypomyces*. *Mycologia* 85: 231-272.
- ROGERSON, C.T. and SAMUELS, G.J. 1994. Agaricicolous species of *Hypomyces*. *Mycologia* 86: 839-866.
- ROSSMAN, A.Y., SAMUELS, G.J., ROGERSON, C.T. and LOWEN, R. 1999. Genera of Bionectriaceae, Hypocreaceae and Nectriaceae (Hypocreales, Ascomycetes). *Stud. Mycol.* 42: 1-248.
- SAHR, T., AMMER, H., BESL, H. and FISCHER, M. 1999. Infrageneric classification of the boleticolous genus *Sepedonium*: species delimitation and phylogenetic relationships. *Mycologia* 91: 935-943.
- SAMUELS, G.J., DODD, S.L., GAMS, W., CASTLEBURY, L.A. and PETRINI, O. 2002. *Trichoderma* species associated with the green mold epidemic of commercially grown *Agaricus bisporus*. *Mycologia* 94: 146-170.
- ZAFARI, D., ERSHAD, D., ZARE, R. and ALIZADEH, A. 2002. A contribution to the identification of *Trichoderma* species in Iran. *Iran. J. Pl. Path.* 38: 9-13 (Persian 21-45)
- ZAFARI, D., ZARE, R., ERSHAD, D. and ALIZADEH, A. 2004. Three new species of *Trichoderma* for the mycoflora of Iran. *Rostaniha* 5: 63-65 (Persian 159-169).
- ZARE, R. and ASEF, M.R. 2004. First report of *Lecanicillium muscarium* from Iran. *Rostaniha* 5: 49-50.
- ZARE, R. and GAMS, W. 2001. A revision of *Verticillium* section *Prostrata*. IV. The genus *Lecanicillium* and the new genus *Simplicillium*. *Nova Hedwigia* 73: 1-50.
- ZARE, R. and GAMS, W. 2004. A monograph of *Verticillium* section *Prostrata*. *Rostaniha*, Suppl. 3, 188 pp.

- ZARE, R. and GAMS, W. 2008. A revision of the *Verticillium fungicola* species complex and its affinity with the genus *Lecanicillium*. Mycol. Res. 112: 811-824.
- ZARE, R. and KHABBAZ-JOLFAEI, H. 2005. Fungi isolated from *Agaricus bisporus* in Tehran Province with special reference to *Verticillium fungicola*. Rostaniha 6: 5-8 (Persian 17-30).

Address of the authors: Dr R. ZARE and M.R. ASEF, Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection, P.O. Box 1454, Tehran 19395, Iran.