

بررسی جنبه‌های فراساختاری خفتگی در بذر یولاف وحشی

A study on ultrastructural aspects of seed dormancy in wild oats

حمیرا سلیمی*، مه لقا قربانی، بهروز شاهسون بهبودی و نوح شهرآین
موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی،
دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه تهران

دریافت 1381/3/13 پذیرش 1382/3/12

چکیده

تفاوت‌های ساختاری و فراساختاری بذور خفته و غیر خفته یولاف وحشی (*Avena ludoviciana*) توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی (TEM) بررسی گردید. پس از جذب آب، رشد شعاعی سلول‌های روپوششی (epithelial) (په در بذور غیر خفته مشاهده گردید. در بذور خفته، سلول‌های مذکور رشد نیافته و به صورت متراکم و فشرده وجود داشتند. هضم دانه‌های چربی و آلورون درون سلول و در نتیجه رقیق شدن سیتوپلاسم، توسعه شبکه آندوپلاسمی، افزایش تعداد پلی زومها و تجمع آنها، افزایش تعداد میتوکندری، مشاهده حضور یک واکوئول بزرگ در سلول، تغییرات فراساختاری موجود در سلول‌های بذور غیر خفته بود که در بذور خفته مشاهده نگردید. در بذور خفته واکوئول‌های کوچک و متعدد، تعداد زیادی دانه‌های چربی و آلورون وجود داشت.

واژه‌های کلیدی: یولاف وحشی، بذر، خفتگی، ساختار، فراساختار

* مسئول مکاتبه

مقدمه

یولاف وحشی یکی از علفهای هرز مهم غلات به ویژه گندم است که بذر آن خفتگی عمیقی دارد. شناخت جنبه‌های سلولی و ملکولی خفتگی در یافتن روش‌های موثر در شکستن خفتگی و کاهش تراکم بانک بذر در خاک‌های زراعی مفید می‌باشد. شناخت مکانیسم‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در زمینه انتقال بذر از حالت خفته به غیر خفته هنوز کامل نشده است. نیلور (Naylor 1966) وجود هورمون جیبرلین را در بذور غیر خفته *Avena fatua* نشان داد. بیولی و بلک (Bewley & Black 1978) نقش هورمون جیبرلین را در سنتز آنزیم α -amylase در سلول‌های آلورون بذر گیاهان تیره گندمیان برای هضم نشاسته نشان دادند. بیلین و فولی (Bailin & Foley 1994) وجود پروتئین‌های جدیدی را در بذر غیر خفته *Avena fatua* نشان دادند. فینچر (Fincher 1989) هورمون جیبرلین را در بیان زن آنزیم α -امیلاز موثر دانست. نگبی (Negbi 1984) ساختمان و عمل لپه را در گیاهان تیره گندمیان بررسی نمود و نگبی و سارجنت (Sargent 1986) لپه موجود در بذر یولاف را بررسی کردند و آنرا ساختاری مهم در جذب ذخایر سلول‌های اندوخته‌ای و تجهیز آنها به رویان معرفی نمودند. راؤ و راجو (Rao & Raju 1985) رشد ساعی سلول‌های روپوششی لپه را پس از جذب آب در بذر غیر خفته *A. fatua* نشان دادند. در این پژوهش تفاوت‌های فرا ساختاری بین بذور خفته و غیر خفته یولاف وحشی بررسی گردید.

روش بررسی

با کشت بذور تازه برداشت شده و بذوری که یک سال در آزمایشگاه موجود بود (یولاف وحشی) و مشاهده و مقایسه جوانه زنی آنها، بذور تازه به عنوان بذور خفته و بذوری که به مدت یک سال در محیط طبیعی آزمایشگاه نگهداری شده بود به عنوان بذور غیر خفته استفاده گردیدند (Salimi & Ghorbanli 2001, Salimi et al. 1998). سبوسه (glumel) از بذر جدا گردید و بذور پس از 24 ساعت قرار گرفتن در آب به دو نیمه تقسیم شد که نیمه دارای رویان، لپه و بخشی از اندوخته جهت مطالعات میکروسکوپی انتخاب شد. از هر یک از بذور خفته و غیر خفته 50 نمونه انتخاب و از هر یک سه الی چهار قطعه جدا گردید. نمونه‌ها نسبت به وضعیت رویان با برش‌های طولی و عرضی به قطعات 4-3 میلی‌متری تقسیم شدند. از هر یک از قطعات نیز هشت الی ده برش تهیه شد. جهت تهیه برش‌های میکروتومی و مشاهده آنها با میکروسکوپ نوری، قطعات در فیکساتور فرمالین: اسید استیک: اتانول 96 درجه (FAA, 2:2:16) به مدت 24 ساعت در دمای آزمایشگاه (22 درجه سانتی‌گراد) قرار گرفتند. پس از شستشو در آب، آبگیری با درجات مختلف اتانول، واضح سازی با مخلوط اتانول و تولوئن

و سپس تولوئن خالص انجام گردید. قالب‌گیری درون آون با دمای 58-62 درجه سانتی‌گراد با استفاده از پارافین انجام شد. پس از برش گیری با میکروتوم (برش‌ها به ضخامت 8 میکرومتر) حذف پارافین با تولوئن و سپس با اتانول انجام گرفت و برش‌ها آبدهی شدند. رنگ آمیزی با مخلوط رنگ‌های هماتوکسیلین و قرمز کنگو و نیزرنگ‌های سافرانین و فست گرین انجام گردید(Behbody 1984). جهت تهیه برش‌های اولترا میکروتومی و مشاهده آنها با میکروسکوپ نوری به صورت برش‌های نیمه نازک(semi thin) و مشاهده برش‌های نازک با میکروسکوپ الکترونی، قطعات در گلوتارآلدهید 2٪ و بافر فسفات به مدت 6 ساعت با دمای 0-4 درجه سانتی‌گراد و سپس برای 3 ساعت درون اسید اسミک با دمای 4 درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. پس از آبگیری با اتانول و اکسید پروپیلن نمونه‌ها در اپوکسی رزین(812epon) قالب گیری شدند. برش گیری با اولترامیکروتوم انجام گردید و نمونه‌ها روی پولک مسی قرار گرفتند. ضخامت قطعات برای مشاهده با میکروسکوپ الکترونی 60-80 نانومتر و با میکروسکوپ نوری 1-2 میکرومتر بود. از استات اورانیوم و سیترات سرب جهت رنگ‌آمیزی برش‌های نازک(Behbody 1984) و تولودین بلو یک درصد جهت رنگ‌آمیزی برش‌های نیمه نازک استفاده شد (Dykstra 1993).


نتیجه

الف - مشاهده سلول‌های رو پوششی لپه در برش‌های اولترا میکروتومی نیمه نازک با میکروسکوپ نوری


شكل‌های 1 و 2 به ترتیب مربوط به برش عرضی از بذور خفته و غیرخفته است که از برش‌های نیمه نازک به دست آمد. سلول‌های روپوششی لپه در بذر خفته (شکل 1) ریز و فشرده بود و تراکم بیشتری از مواد ذخیره‌ای در آنها و در سلول‌های اندوخته‌ای مشاهده گردید، در صورتی که سلول‌های روپوششی در بذر غیر خفته رشد شعاعی داشت و طویل‌تر بود. همچنین ذخایر در سلول‌های اندوخته‌ای نیز در جریان هضم شدن قرار داشتند (شکل 2).

ب - مشاهده سلول‌های روپوششی لپه و سلول‌های اندوخته(endosperm) در برش‌های اولترامیکروتومی با میکروسکوپ الکترونی




در بذور خفته، سلول‌های روپوششی لپه دارای مقادیر زیادی چربی، دانه‌های آلورون (دانه‌های در بردارنده پروتئین)، گلوبوپیید و پیش پلاست بودند (شکل‌های 3، 4 و 5). در صورتی که در بذور غیر خفته ذخایر فوق کاهش یافته و شبکه آندوبلاسمی وسیع، میتوکندری فراوان و تجمع پلی زومها مشاهده گردید (شکل‌های 6 و 7). در سلول‌های اندوخته‌ای بذور خفته تعدادی واکوئول ریز وجود داشت (شکل 10)، اما در بذور غیر خفته تنها یک واکوئل بزرگ مشاهده گردید (شکل 8 و 9).



شکل 1- مشاهده برش های نیمه نازک با میکروسکوپ نوری: برش عرضی از لپه بذر خفته (Ep) سلول های اندوخته، (En) سلول های روپوششی.
Fig. 1. Light microscopy, Semi section: Radial section of scutellum in dormant seed. (x191). Endosperm (En), Epithelial cell (Ep).





شکل 2- مشاهده برش های نیمه نازک با میکروسکوپ نوری: برش عرضی از لپه بذر غیر خفته (Ep) سلول های اندوخته، (En) سلول های روپوششی.
Fig. 2. Light microscopy, Semi section: Radial section of scutellum in nondormant seed.(x383). Endosperm (En), Epithelial cell (Ep).




شکل ۳، ۴ و ۵ - مشاهده با میکروسکوپ الکترونی ترانسمیشن: سلول‌های روپوششی لپه در بذر خفته. شکل‌های ۳، ۴ و ۵ به ترتیب $\times 55420$ ، $\times 7335$ و $\times 11573$ دیواره (W)، فضای بین سلولی، (L) چربی، (V) واکوئل، (Al) دانه آleurون، (Gl) گلوبویید.

Figs. 3, 4 & 5. Transmission electron microscopy: Epithelial cells of the scutellum in dormant seed ($\times 55420$, $\times 7335$ & $\times 11573$). Cell wall (W), Mea (Me), Lipid (L), Vacuole (V), Aleurone grain (Al), Gluboid (Gl).




شکل 6 و 7 - مشاهده با میکروسکوپ الکترونی ترانسمیشن: سلول های روبوششی لبه در بذر غیرخفت. شکل های 6 و 7 به ترتیب $\times 9291$ و $\times 24450$. پیش پلاست، (Er) شبکه آندوپلاسمی، (M) میتوکندری، (Pol) پلیزوم.

Figs. 6 & 7. Transmission electron microscopy: Epithelial cells of the scutellum in dormant seed ($\times 9291$ & $\times 24450$). Proplast (Pp), Endoplasmic reticulum (Er), Mitochondria (M), Polysome (Pol).




8



9

شکل 8 و 9- مشاهده با میکروسکوپ الکترونی ترانسمیشن: سلول‌های اندوخته‌ای در بذر غیرخفته. شکل‌های 8 و 9 به ترتیب $\times 8930$ و $\times 11573$. (V) واکوئل، (En) سلول‌های اندوخته‌ای.

Figs. 8 & 9. Transmission electron microscopy: Endospermal cells in nondormant seed. (x 8930 & x 11573). Vacuole (V), Endospermal cells (En).



شکل 10- مشاهده با میکروسکوپ الکترونی ترانسمیشن: سلول‌های اندوخته‌ای در بذر خفته (24450 ×).

Fig. 10. Transmission electron microscopy: Endospermal cells in dormant seed (x 24450).

بحث

مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که پس از جذب آب، تغییرات ساختاری و فراساختاری در بذور غیرخفته به وجود آمد. این تغییرات در بذور خفته مشاهده نشد، به طوری که رشد شعاعی سلول‌های روپوششی لپه تنها در بذور غیر خفته مشاهده گردید. پدیده فوق با مشاهدات رائو و راجو (Rao & Raju 1985) موافق بود. آنها رشد شعاعی سلول‌های روپوششی لپه را پس از جذب آب در بذور غیر خفته *A. fatua* مشاهده کردند و دلیل آن را توسعه سطح سلول جهت جذب بیشتر مواد هضم شده برای انتقال به رویان ذکر نمودند. پدیده فوق در روند جوانه زنی بذور ذرت (*Zea mays*) نیز توسط زامسکی (Zamski 1973) مشاهده گردید. هضم چربی، دانه‌های آلورون و تشکیل یک واکوئل بزرگ در سیتوپلاسمی رقیق در نتیجه فعال شدن آنزیم‌های درون سلول بذور غیر خفته پس از جذب آب بود. افزایش تعداد میتوکندری‌ها در سلول‌های مذکور مبین افزایش تنفس سلولی و فعالیت سلول‌ها در بذور غیر خفته بود که در تجزیه ذخایر و تولید انرژی نقش داشت. افزایش و تجمع پلی زومها و توسعه شبکه آندوپلاسمی صاف و دانه دار نیز در جهت انتقال مواد و نیز سنتز پروتئین‌ها و آنزیم‌ها در بذور غیر خفته مشاهده گردید. در بذور خفته چنین تغییراتی مشاهده نشد و عدم حضور یا عدم افزایش تعداد اندامک‌های فوق الذکرموجب غیر فعال ماندن سلول‌ها و استمرار خفتگی در آنها شد. در نتیجه،

باقی ماندن ذخایر و عدم تجهیز و انتقال آنها به رویان در ابقاء خفتگی موثر بود. با توجه به مشاهدات فوق پدیده خفتگی در بذر یولاف وحشی به سطوح درون سلولی بستگی داشت که تغییرات در این سطوح در حذف خفتگی و جوانه زنی بذور مؤثر است. سلیمی و همکاران (Salimi *et al.* 1998) حضور دو باند پلی پپتیدی در بذور خفته و ناپدید شدن آنها و ظهور 8 باند پلی پپتیدی جدید را در بذور غیر خفته یولاف وحشی نشان دادند که موافق با تغییرات درون سلولی مشاهده شده بود. مشاهدات فوق احتمال دخالت ژن‌ها را در پدیده خفتگی نشان داد.

سیاست‌گذاری

از خانم مهندس شهرلا امینی کارشناس شرکت داروپخش جهت همکاری در تهیه برش‌ها تشکر و قدردانی می‌گردد.

منابع

جهت ملاحظه منابع به صفحات 2-3 متن انگلیسی مراجعه شود.

نشانی نگارنده‌گان: حمیرا سلیمی و دکتر نوح شهرآیین، موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، صندوق پستی 1454، تهران 19395؛ دکترمه لقا قربانی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه تربیت معلم و دکتر بهروز شاهسون بهبودی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران.

A STUDY ON ULTRASTRUCTURAL ASPECTS OF SEED DORMANCY IN WILD OATS

H. SALIMI*, M. GHORBANLI, B. SH. BEHBODY and N. SHAHRAEEN

Plant Pests & Diseases Res. Inst.; Department of Biology,
Tarbiat Moalem University and Tehran University

Received 03.06.2002

Accepted 02.05.2003

The structural differences between dormant and nondormant seeds of wild oats (*Avena ludoviciana* Durieu) were studied by light and transmission electron microscopy. Radial elongation of scutellum epithelial cells were observed in nondormant seeds after imbibition, compared with dormant seeds in which cells were completely compressed. Ultrastructural differences for example, dilution of cytoplasm, digestion of lipid and aleurone grains, enlarged endoplasmic reticulum, increase and assembly of polysomes and mitochondria, presence of a big vacuole were observed in nondormant seeds. Electron microscopy did not reveal such changes in dormant seeds. Nevertheless a lot of spherosomes, aleurone grains and some small vacuole were observed in the cytoplasm.

Key words: *Avena ludoviciana*, seed, dormancy, structure, ultrastructure

* Corresponding author

To look at the figures, please refer to the Farsi text (pages: 1-9).

References

- BAILIN, L. and FOLEY, M. E. 1994. Differential polypeptide patterns in imbibed dormant and after-ripened *Avena fatua* embryos. Journal of Experimental Botany 45: 275- 279.
- BEHBODY, SH. B. 1984. Guide book of cytological laboratory, Department of Biology, Tehran University.
- BEWLEY, J. D. and BLACK, M. 1978. Physiology and Biochemistry of seeds in relation to germination. I. Development, Germination and Growth. Springer-verlag, Berlin.
- DYKSTRA, M. J. 1993. A manual of applied technic for biological electron microscopy. Plenum Press.
- FINCHER, G. B. 1989. Molecular and cellular biology associated with endosperm mobilization germination cereal grains. Annual review of plant physiology and plant molecular biology 40: 305-346.
- NAYLOR, J. M. 1966. Dormancy studies in seed of *Avena fatua* 5. On the response of aleurone cells to gibberelic acid. Can. J. Bot. 44 : 19-22.
- NEGBI, M. 1984. The structure and the function of the scutellum in the Gramineae. Bot. J. Linn. Soc. 88: 205-222.
- NEGBI, M. and SARGENT, J. A. 1986. The scutellum of *Avena*: a structure to maximize exploitation of endosperm reserves. Bot. J. Linn. Soc. 93: 247-258.
- RAO, D. V. and RAJU. M.V. 1985. Radial elongation of the epidermal cell of scutellum during caryopsis germination of wild oats (*Avena fatua*). Can. J. Bot. 63: 1789-1793.
- SALIMI, H., GHORBANLI, M. and BEHBODY, SH. B. 1998. Phisiologycal basis of seed dormancy in wild oats (*Avena ludoviciana*). 6th EWRS Mediteranean Symposium, Montpellier, France: 231.
- SALIMI, H. and GHORBANLI, M. 2001. A study on seed germination of *Avena ludoviciana* and the effective factors in seed dormancy breaking. Rostaniha 2: 41-55.

ZAMSKI, E. 1973. Light and electron microscope observations on scutellum epithelial cells during germination of *Zea mays* seeds. Israel Journal of Botany 22: 211-230.

Addresses of the authors: H. SALIMI and Dr. N. SHAHRAEEN, Plant Pests & Diseases Research Institute, P. O. Box 1454, Tehran 19395, Iran; Dr. M. GHORBANLI, Department of Biology, Tarbiat Moalem University and Dr. B. SH. BEHBODY, Department of Biology, Tehran University, Tehran, Iran.