

## مقاله‌ی کوتاه علمی

### گزارش جدید مگس *Cheilosia cumanica* (Dip.: Syrphidae) از ایران

بابک قرالی<sup>۱\*</sup> و آنمه ووجیک<sup>۲</sup>

۱- بخش تحقیقات گیاه‌پژوهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، بلوار شهید بهشتی، پلاک ۱۱۸، قزوین، ۲- بخش بیولوژی و اکولوژی دانشکده علوم، صربستان.

\*مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: bgharaei@mail.com

### *Cheilosia cumanica* (Dip.: Syrphidae), a new record of flower flies from Iran

B. Gharali<sup>1&\*</sup> and A. Vujic<sup>2</sup>

1. Department of Plant Protection, Ghazvin Research Center for Agriculture and Natural Resources, Shahid Beheshti Boulevard, No. 118, Ghazvin, Iran, 2. Department of Biology and Ecology, Faculty of Science, Trg Dositeja Obradovicea 2, 21000 Novi Sad, Serbia and Montenegro.

\*Corresponding author, E-mail: bgharaei@mail.com

#### Abstract

*Cheilosia (Convocheila) cumanica* Szilady is recorded for the first time from Iran. This species is similar to *C. laticornis* Rondani morphologically; however, is distinguished from this close species in male by hairy eyes (bare in *C. laticornis*) and in female by longer third antennal segment that is three times longer than the second segment (less than 2.5 times in *C. laticornis*). This finding increase the number of *Cheilosia* species known from Iran to seven.

جنس *Cheilosia* Meigen با داشتن حدود ۴۸۰ گونه در منطقه‌ی پاله‌آرکتیک یکی از بزرگترین جنس‌های مگس‌های خانواده Syrphidae می‌باشد. این جنس در زیرخانواده Cheilosioini و قبیله‌ی Eristalinae با داشتن گونه‌ی (gena) مشخص و رشدیافته، بر جستگی میانی صورت و همچنین رنگ کاملاً سیاه شکم در اکثر گونه‌ها، از سایر گونه‌های این قبیله جدا می‌شود (Peck, 1988; Barkalov, 2002). لارو بسیاری از گونه‌ها گیاه‌خوار بوده و تعداد اندکی گندخوار، قارچ‌خوار و یا شیره‌خوارند، و از گیاهان مخروطی تغذیه می‌کنند. بر خلاف مطالعات فونستیک متعدد و دقیق صورت‌گرفته در نقاطی همچون اروپا و کشور روسیه تنها شش گونه از این جنس از ایران گزارش شده است (Bradescu, 1991; Barkalov, 2002). یکی از گونه‌ها که با نام *Cheilosia latifacies* Loew (Gilasian, 2005; Dousti & Hayat, 2006) ایران گزارش شده (Dousti & Hayat, 2006)، همانم (synonym) گونه‌ی (*C. laticornis* Rondani) می‌باشد (Claussen & Thompson, 1996).

بررسی نمونه‌های جمع‌آوری شده از منطقه‌ی فشم تهران نشان داد که نمونه‌ها به یک گونه‌ی ظاهرًا کمیاب به نام *Cheilosia cumanica* Szilady تعلق دارند. با توجه به اطلاعات پراکنده و گاهًا متناقض موجود در منابع مختلف، ذکر تاریخچه‌ی این گونه که از طریق مکاتبه با متخصص این جنس، دکتر Anatolii Barkalov، به دست آمده، مفید خواهد بود.

گونه‌ی *C. cumanica* برای اولین بار از رومانی گزارش گردید. Brădescu (1986) طی مقاله‌ای به توصیف مجدد این گونه پرداخته و به دلیل از بین رفت نمونه‌های تیپ در آتش‌سوزی، نئوتیپ نر را از بین شش نمونه‌ی جمع‌آوری شده از روی گیاهان چتریان انتخاب نمود. بعدها Brădescu (1991) این گونه را با گونه‌ی *C. verae* Stackelberg که در منطقه‌ی قفقاز پراکنش دارد، با مقایسه‌ی شکل زنیتالیای نر در مقاله‌ی Stackelberg (1960) هنام تلقی نمود. اما متأسفانه هنامی مذکور در مقاله‌ی Barkalov (1994) مورد توجه قرار نگرفت و *C. verae* کلید شناسائی گونه‌های این جنس در منطقه‌ی روسیه، آورده شد. این محقق علاوه بر ترسیم دستگاه تناسلی نر و پروفیل صورت و ساختک این گونه، دستگاه تناسلی نر و شکل بند سوم ساختک گونه‌ی *C. latifacies* را نیز به عنوان گونه‌ی نزدیک و شبیه به آن ترسیم نمود. همچنین، Barkalov (2002) به بررسی زیرجنس‌های جنس *Cheilosia* پرداخت و ۸ زیرجنس جدید را توصیف و طبقه‌بندی جدیدی برای این جنس ارایه نمود. یکی از زیرجنس‌های توصیف شده، *Convocheila* می‌باشد که بر اساس گونه‌ی تیپ، *C. cumanica*، توصیف گردید اما شکل‌های ارایه شده برای این زیرجنس و گونه‌ی *C. cumanica*، دقیقاً شکل‌هایی بود که در مقاله‌ی قبلی او (Barkalov, 1994) برای *C. latifacies* ارایه شده بود. دکتر Barkalov (مکاتبات شخصی) علت این امر را نامشخص بودن وضعیت دو گونه در زمان نگارش مقاله عنوان نموده و بیان می‌دارد که هر دو ترسیم متعلق به گونه‌ی *C. cumanica* می‌باشد. لذا، با توجه به مطالب ذکر شده، موارد زیر می‌بایست در نظر گرفته شود:

- گونه‌های *C. verae* و گونه‌ی *C. cumanica* هنام بوده و گونه‌ی اخیر معتبر می‌باشد. این دو گونه در کاتالوگ خانواده‌ی Syrphidae به عنوان دو گونه‌ی مجزا ذکر شده‌اند (Peck, 1988).
- ترسیم‌های ارائه شده در دو مقاله‌ی Barkalov (1994، شکل‌های ۳۳-۳۷ برای *C. latifacies* و ۲۰۰۲، شکل‌های ۵۳-۵۵ برای *C. cumanica*) یکسان بوده و به گونه‌ی *C. cumanica* تعلق دارند.

- همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد، گونه‌ی *C. latifacies* هم‌نام گونه‌ی *C. laticornis* بوده و نام اخیر معتبر می‌باشد.

- با توجه به هنامی گونه‌ها و جمع آوری نمونه‌های جدید از ایران، دامنه‌ی پراکنش *C. cumanica* وسیع بوده و شامل منطقه‌ی بالکان، رومانی، ایران و ناحیه‌ی قفقاز می‌باشد. گونه‌های *C. laticornis* و *C. cumanica* متعلق به گروه *laticornis* هستند. از آنجایی که هر دو گونه از ایران گزارش شده‌اند و بسیار شبیه به یکدیگر می‌باشند، لذا کلید زیر برای شناسایی آن‌ها پیشنهاد می‌گردد:

- ۱- نمونه‌ی نر.....
- ۲- نمونه‌ی ماده.....
- ۳- *C. laticornis* .....
- ۴- چشم‌ها لخت، بدون مو.....
- ۵- چشم‌ها مودار، برجستگی میانی صورت بدون مو و اطراف شاخک مودار.....
- ۶- سومین بند شاخک طویل (۳ برابر بلندتر از بند دوم).....
- ۷- سومین بند شاخک کوتاه (کمتر از ۲/۵ برابر طول بند دوم).....

گونه‌ی *C. cumanica*، گونه‌ی تیپ زیرجنس *Convocheila* (دارای شش گونه) می‌باشد که مشخصات آن به شرح زیر است:

چشم‌ها مودار و یا لخت، موهای موجود در حاشیه‌ی بالایی چشم‌ها بلند؛ حفره‌های شاخک کاملاً از یکدیگر مجزا؛ پیشانی پهن و محدب؛ بال شفاف؛ بدن باریک؛ اسکلریت فوقانی ادآگوس طویل، لب‌های جلویی بزرگ و کاملاً از یکدیگر مجزا شده، لب‌های عقبی کوچک، لب‌های جلویی *hypandrium* با یک صفحه‌ی مشخص در زائده‌ی چپ، زائده‌ی راست به سمت بالا خمیده شده، surstylus طویل و باریک (Barkalov, 2002).

نمونه‌های مطالعه شده: ۲ نر و ۹ ماده (۲ ماده و ۱ نر در کلکسیون حشره‌شناسی نویساد)، فشم منطقه‌ی لالون)، ۳۵ درجه و ۳۴ دقیقه‌ی شمالی، ۵۱ درجه و ۵۸ دقیقه‌ی شرقی، ارتفاع: ۱۵۰۰ متر، تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۲۴، جمع آوری با تور از گیاهان تیره‌ی چتریان.

از دکتر علیرضا منفرد به خاطر همراهی در نمونه‌برداری، Menno Remer از موزه لیدن به خاطر ارسال مقاله‌ی Bradescu برای نگارنده‌ی اول و همچنین از دکتر Barkalov (موزه‌ی نووسیبریسک) به خاطر اطلاعات مفیدی که در اختیار گذاشتند بسیار سپاس‌گزاریم.

#### منابع

- Barkalov, A. V.** (1994) Hoverflies of the genus *Cheilosia* Meigen (Diptera: Syrphidae). *Entomological Review* 73(5), 28-58.
- Barkalov, A. V.** (2002) Subgeneric classification of the genus *Cheilosia* Meigen (Diptera: Syrphidae). *Entomological Review* 82(5), 518-531.
- Brădescu, V.** (1986) *Merodon ambiguous* sp. n. and a redescription of *Cheilosia cumanica* Szilady, 1938 (Diptera: Syrphidae). *Review Roumain de Biologie Animals* 31(2), 103-108.
- Brădescu, V.** (1991) Les Syrphides de Roumanie (Diptera, Syrphidae), Clés de détermination et répartition. *Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"* 31, 7-83.
- Claussen, C. & Thompson, F. C.** (1996) Zur Identität und Synonymie der von Camillo Rondani beschriebenen *Cheilosia*-Arten (Diptera, Syrphidae). *Studia dipterologica* 3, 275-281.
- Dousti, A. F. & Hayat R.** (2006) A catalogue of the Syrphidae (Insecta: Diptera) of Iran. *Journal of Entomological Research Society* 8(3), 5-38.
- Gilasian, E.** (2005) New records of one genus and six species of Syrphidae (Diptera) from Iran. *Journal of Entomological Society of Iran* 25(1), 75-76.
- Peck, L.V.** (1988) Family Syrphidae. pp. 11-230 in Soos, A. & Papp, L. (Eds) *Catalogue of Palaearctic Diptera; Syrphidae-Conopidae*. Vol. 8, 363 pp. Akademia Kiado, Budapest.
- Stackelberg, A. A.** (1960) New hoverflies (Diptera: Syrphidae) from the Caucasus. *Entomologicheskoe Obozrenie* 39, 227-232.