

مقاله کوتاه علمی

گزارش زنبور (Barichneumon derogator (Hym.: Ichneumonidae: Ichneumoninae) از ایران

غلامحسین حسن‌شاهی^{او*}، حبیب عباسی‌پور^۱، ریچو جاسیلا^۱ و فاطمه جهان^۱

۱- گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ۲- موزه جانورشناسی، بخش تنوع زیستی و علوم محیطی، دانشگاه تورکو، فنلاند.

*مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: hasanshahi.entomo@yahoo.com

First report of Barichneumon derogator (Hym.: Ichneumonidae: Ichneumoninae) from Iran

G. Hasanshahi^{۱&*}, H. Abbasipour^۱, R. Jussila^۲ and F. Jahan^۱

1. Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran, Iran, 2. Zoological Museum, Section of Biodiversity and Environmental Sciences, FIN-20014, University of Turku, Finland.

*Corresponding author, E-mail: hasanshahi.entomo@yahoo.com

Abstract

We studied the pest and parasitoid fauna of cauliflower fields in southern Tehran in 2011. In the course of our research the Ichneumonid wasp *Barichneumon derogator* (Wesmael) of the subfamily Ichneumoninae was collected and identified. This parasitoid attacks the larval stages of lepidopteran pests. The species *B. derogator* is newly recorded from Iran.

الکلی قرار داده شدند. شناسایی نهایی پارازیتیوئیدها توسط نگارنده سوم انجام شد. در بین نمونه‌ها گونه Barichneumon derogator (Wesmael) برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. گونه فوق تاکنون از کشورهای اسپانیا، هلند، انگلستان، آلمان و دانمارک گزارش شده است (Tereshkin, 2004, 2005). در بین ۱۴ گونه از جنس *B. derogator* *Barichneumon Thomson* کمترین فراوانی و توزیع را دارا می‌باشد (Tereshkin, 2005). از میزان‌های این پارازیتیوئید می‌توان به بال‌پولکداران Noctuidae (دو گونه)، خانواده Geometridae (یک گونه) و خانواده Pieridae (یک گونه) اشاره کرد (Herting, 1976; Rasnitsyn, 1981).

برخی از ویژگی‌های شکل‌شناسی زنبور *B. derogator* به شرح زیر است: اندازه متوسط تا بزرگ، بال‌ها تا ۲۰ میلی‌متر، بدن اغلب رنگارنگ، زیرپیشانی معمولاً پهن و صاف، آرواره بالا باریک و بلند و دارای دندانه کم، در بال جلو معمولاً لوزی‌شکل و یا پنج‌وجهی، بال عقب دارای رگ M+Cu، برجستگی‌های پروپودئوم کامل، پروپلورا بدون برجستگی، و تخمریز

به‌منظور شناسایی پارازیتیوئیدهای لاروی و شفیرگی آفات موجود در مناطق کلم‌کاری جنوب تهران، نمونه‌برداری از مزارع کلم گل در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت. نمونه‌برداری به دو صورت انجام شد: در روش اول تمام لاروها و شفیرهای آفات مختلف، از جمله شب‌پره پشت الماسی، سفیده کوچک کلم و شته مویی کلم، و دیگر آفات کلم، از جمله لاروهایی از خانواده Geometridae و Noctuidae به آزمایشگاه انتقال و در شرایط آزمایشگاهی نگهداری شدند. لاروها در ظروف پلاستیکی به ابعاد $15 \times 5 \times 5$ سانتی‌متر که در آن برای تهویه مناسب با توری ارگانزا پوشیده شده بود، قرار گرفتند و در شرایط دمایی 22 ± 2 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 65 ± 2 درصد و ۱۴ ساعت روشنایی تا زمان خروج حشرات کامل پارازیتیوئیدهای احتمالی نگهداری شدند. این نمونه‌ها به صورت روزانه برای جمع‌آوری پارازیتیوئیدها بررسی و زنبورهای خارج شده در الكل 75 درصد نگهداری شدند. در روش دیگر با استفاده از روش تورزنی به صورت زیگزاگی در مزرعه حرکت کرده و با هر چند قدم، یکبار اقدام به تورزنی نمودیم. نمونه‌های جمع‌آوری شده درون شیشه

بال پولکداران را پارازیته می کند و درنهایت از شفیره آن خارج می شود.

ماده معمولاً کوتاه و یا مخفی می باشد. این زبور از پارازیتیویدهای koinobiont می باشد و لارو

منابع

- Herting, B.** (1976) *A catalogue of parasites and predators of terrestrial arthropods*. Vol. 7, Part 2, 221 pp. Commonwealth Institute of Biological Control.
- Tereshkin, A. M.** (2004) Ichneumon flies of the genus *Barichneumon* (Hymenoptera: Ichneumonidae) of east Europe forest zone. 1. Taxonomy description of *Barichneumon scopanator* sp. n. and *B. scopulatus* sp. *Euroasian Entomological Journal* 3(2), 139-151.
- Tereshkin, A. M.** (2005) Ichneumon flies of the genus *Barichneumon* Wesmael, 1845 (Hymenoptera: Ichneumonidae) of forest zone. 2. Ecology of species. *Euroasian Entomological Journal* 4(1), 63-66.
- Rasnitsyn, A. P.** (1981) Gravenhorst's and Berthoumieu's types of Ichneumoninae Stenopneusticae preserved in Wrocław and Cracow, Poland (Hymenoptera, Ichneumonidae). *Polskie Pismo Entomologiczne* 51(1), 101-145.