

دو فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران  
جلد ۹ شماره ۲، صفحه ۱۲۴-۱۳۶، (۱۳۹۰)

## بررسی فلور منطقه کرسنک استان چهارمحال و بختیاری از نظر ارزش حفاظتی

حمزه علی شیرمردی<sup>۱\*</sup>، محمد فیاض<sup>۲</sup>، مهدی فرخپور<sup>۳</sup> و ولی الله مظفریان<sup>۴</sup>

\*- نویسنده مسئول، کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، پست الکترونیک: hshirmardi@yahoo.com

- مریم پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

- دانشیار بازنشسته، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

- دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۱۲/۱۱

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۰۳/۱۳

### چکیده

مطالعه حاضر به منظور شناخت فلور و معرفی منطقه به عنوان یکی از کلیدی‌ترین مناطق از نظر اولویت حفاظتی و تعیین گونه‌های در معرض خطر انقراض و فرم‌های رویشی انجام شد. نمونه‌های گیاهی براساس روش مرسوم مطالعات تاکسونومیک منطقه‌ای جمع‌آوری و با استفاده از منابع موجود شناسایی و خانواده، جنس و گونه هر یک از آنها تعیین گردید. شکل زیستی هریک از عناصر گیاهی با استفاده از روش رانکیر مشخص شد. براساس نتایج بدست آمده، تعداد ۲۷۶ گونه گیاهی متعلق به ۴۳ تیره و ۱۹۱ جنس در منطقه وجود دارد که به صورت شکل‌های زیستی ۶۹ گونه تروفیت (۲۵ درصد)، ۴۰ گونه کریپتوفت (۱۴/۴۹ درصد)، ۱۹ گونه کامفت (۶/۸۸ درصد)، ۷ گونه فانروفت (۲/۵۴ درصد) و ۱۴۱ گونه همی‌کریپتوفت (۵۱/۰۹ درصد) دیده می‌شوند. علاوه بر این گونه‌های گیاهی تهدیدشده براساس معیارهای IUCN، کتاب Read Data Book of Iran، نحوه بهره‌برداری و ارزیابی مستقیم آنها در طول ۶ سال بررسی و ۴ رسته گونه‌های بحرانی، در معرض انقراض، آسیب‌پذیر و با خطر کمتر در منطقه مورد مطالعه تعیین گردید. براین اساس، ۵۳ گونه تهدیدشده در این منطقه شناسایی شد که همه آنها متعلق به منطقه ایران- تورانی بود. از ۵۳ گونه فوق، دو گونه در طبقه بحرانی، دو گونه در معرض خطر، ۸ گونه در طبقه آسیب‌پذیر و ۴۱ گونه در طبقه با خطر کمتر قرار داشت.

واژه‌های کلیدی: فلور، شکل‌های زیستی، پراکنش جغرافیایی، گیاهان در حال انقراض، کرسنک

### مقدمه

به همین دلیل سازمانی به عنوان سازمان بین‌المللی حفاظت از طبیعت IUCN<sup>۱</sup> تشکیل شده که هدف آن شناسایی و معرفی گونه‌های گیاهی و جانوری نادر و مفید در کلیه مناطق دنیا و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از انهدام آنهاست (کریمیان، ۱۳۸۴).

بررسی، شناسایی، حفظ و نگهداری گونه‌های گیاهی، به ویژه گونه‌های مفید و نادر در دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پایه و اساس توسعه پایدار و هر گونه بهره‌برداری اصولی و منطقی از طبیعت و منابع طبیعی، حفظ و حراست گونه‌های گیاهی و گنجینه‌ی ثانی است.

مواد و روشها

منطقه کرسنک با ۵۷۶ هکتار، ناحیه‌ای نیمه‌کوهستانی و مرتفع در استان چهارمحال و بختیاری و در فاصله ۶۷ کیلومتری شمال‌غربی شهرکرد و همچنین ۶۰ کیلومتری شرق کوهرنگ فراردارد. موقعیت جغرافیایی آن بین ۳۲ درجه و ۳۰ دقیقه و ۲۹ ثانیه تا ۳۲ درجه و ۳۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه عرض شمالی و ۵۰ درجه و ۲۷ دقیقه و ۴۴ ثانیه تا ۵۰ درجه و ۲۹ ثانیه و ۹ ثانیه طول شرقی واقع شده‌است. حداکثر ارتفاع منطقه از سطح دریا ۳۱۰۰ متر و حداقل ارتفاع آن ۲۲۵۰ متر بوده و متوسط شیب منطقه حدود ۲۰-۳۰ درصد و جهت آن شمالی می‌باشد. متوسط بارندگی منطقه در طول ۵ سال بررسی ۴۵۰ میلی‌متر بوده‌است.

برای بررسی فلور منطقه، در راستای اجرای دو طرح بزرگ ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی کشور در استان چهارمحال و بختیاری از سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ طرح تولید علوفه قابل برداشت مراتع در ۵ منطقه رویشی کشور با ۴ زیرطرح، در طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ مسافت‌هایی در فصول رویش (اردیبهشت تا مهر)، نمونه‌های گیاهی براساس روش مرسوم مطالعات تاکسونومی منطقه‌ای جمع‌آوری گردید. همزمان با جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی، یاداشت‌های مربوط به وضعیت بوم‌شناسخی و شکل زیستی هر یک از گونه‌های گیاهی به صورت مستقیم بر روی زمین انجام شد. پس از هر نوبت جمع‌آوری، نمونه‌ها با استفاده از وسایل لازم پرس و خشک شدن و برای نگهداری در هر باریوم آماده شدند. نمونه‌های هر باریومی آماده شده بر اساس روش‌های مرسوم تاکسونومی گیاهی و بکارگیری منابع لازم (مطفریان، ۱۳۷۷؛ میین، ۱۳۷۳-۱۳۵۴؛ اسدی ۱۳۷۴-

به طور کلی شناسایی و معرفی رستنی‌های یک منطقه به عنوان بستر تحقیقات زیست‌محیطی اهمیت ویژه‌ای دارد که از آن جمله می‌توان به امکان دسترسی آسان و سریع به گونه‌گیاهی خاص در محل و زمان معین (Stace, 1989)، تعیین توانمندی و قابلیت‌های رویشی منطقه، امکان افزایش تعداد گونه‌های منطقه از نظر تراکم، شناسایی گونه‌های مقاوم و در حال انقراض و کمک به حفظ گونه‌های گیاهی، شناسایی گیاهان دارویی و استفاده اصولی از آنها و کمک به تعیین پوشش گیاهی اشاره کرد (Davis, 1978; Ferrari *et al.*, 1993) اشاره کرد (Davis, 1978; Ferrari *et al.*, 1993). فلور ایران از دیرباز مورد توجه محققان خارجی و داخلی بوده است و نمونه‌های گیاهی زیادی جمع‌آوری و شناسایی شده است (قهرمان، ۱۳۸۲-۱۳۵۷؛ مظفریان، ۱۳۷۷؛ مبین، ۱۳۷۳-۱۳۵۴؛ اسدی، ۱۳۷۴-۱۳۶۷؛ Rechinger, 1948-60؛ Parsa, 1963-1993؛ Leonard, 1981-1987؛ Zohary, 1974؛ Davis, 1965-1988). این مطالعات در شرایطی مهمتر جلوه می‌نمایند که اهمیت حفظ و جلوگیری از انقراض گونه‌های گیاهی در آنها دوچندان گردد و مناطقی که دارای چنین خصوصیاتی هستند باید در اولویت مطالعه از نظر بررسی فلور و عوامل تعیین‌کننده نوع پوشش و انقراض گونه‌ای قرار گیرند. براین اساس، این پژوهش برای اولین بار در این منطقه صورت گرفته و از اهداف عمده آن تعیین قابلیت‌های گیاهی منطقه در بُعد فلورستیک و در کنار آن تعیین گونه‌های در معرض خطر براساس معیارهای سازمان بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) که حفظ آنها در شرایط موجود جزء مهمترین اهداف سازمان‌های مرتبط با منابع طبیعی است، می‌باشد.

۰.۲٪ از گونه‌ها (۷ گونه) را گونه‌های فانروفیت تشکیل می‌دهند.

از ۲۷۶ گونه گیاهی موجود در منطقه، ۵۳ گونه در خطر تهدید قراردارند. نکته حائز اهمیت این که کلیه گونه‌های در حال انقراض متعلق به منطقه ایرانی- تورانی *Allium hirtifolium* هستند. از ۵۳ گونه فوق، گونه‌های *Allium Ampeloperasum* L. Boiss و *Salvia hydrangea* DC. ex Benth. و *Ziziphora Prangos acaulis* DC. *Typha latifolia* L. *Eremostachys laevigata cilinopodioides* Lam. *Hieracium cheirifolium* Boiss. Bunge. *Anchusa strigosa Aethionema grandiflorum* R. Br. و *Aristolochia bottae* Jaub. & Spach. L. آسیب‌پذیر<sup>۴</sup> و ۴۱ گونه دیگر در طبقه با خطر کمتر<sup>۵</sup> قراردارند. از میان ۲۷۶ گونه ذکر شده برای منطقه کرسنک، تعداد ۲۱ گونه آن (۷۶/۴۵ درصد) از عناصر ایرانی- تورانی هستند و به دلیل تقابل و نفوذ عناصر نواحی رویشی عمدۀ مجاور، عناصر مشترک ایرانی- تورانی- اروپا سیبریایی به تعداد ۳۵ گونه (۱۲/۶۸ درصد) و عناصر مشترک ایرانی- صحارا سندیایی با ۴ گونه (۱/۴۵ درصد)، عناصر ایرانی تورانی- مدیترانه‌ای با ۱۰ گونه (۳/۶۲ درصد) و عناصر جهان وطنی با ۷ گونه (۰.۲٪ درصد) در منطقه وجود دارند.

Parsa, 1948-60؛ ۱۳۶۵-۱۳۷۴؛ معصومی، ۱۹۶۳-۱۹۹۳ (Rechinger, 1963-1993) شناسایی شد و خانواده، جنس و گونه هر یک از آنها تعیین گردید. نمونه‌های جمع‌آوری شده در این بررسی در هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری نگهداری می‌شود. در این تحقیق برای بررسی طبقات حفاظتی گونه‌های گیاهی منطقه از معیارهای سازمان IUCN Red Data Book of Iran (Anonymous, 1981) (Jalili & Jamzad, 1999)، نحوه بهره‌برداری از گونه‌های گیاهی منطقه و ارزیابی مستقیم تراکم آنها در طول ۱۰ سال بررسی، استفاده شد. گونه‌های گیاهی از لحاظ طبقات حفاظتی به گونه‌های بحرانی، در خطر انقراض، آسیب‌پذیر و دارای وضعیت با خطر کمتر تقسیم‌بندی شدند. به‌منظور تعیین شکل‌های زیستی گیاهان منطقه از روش رانکیر استفاده شد.

## نتایج

براساس بررسی‌های انجام شده، تعداد ۲۷۶ گونه گیاهی متعلق به ۴۳ تیره و ۱۹۱ جنس در منطقه مورد مطالعه وجود دارد. از نظر شکل‌های حیاتی یا فرم رویشی، ۶۶ گونه گیاهی گراس و فورب یکساله (۱۱ گونه گراس و ۵۵ گونه فورب یکساله)، ۱۸۲ گونه گراس و فورب چندساله (۲۲ گونه گراس و ۱۶۰ گونه فورب چندساله)، ۱۹ گونه گیاه بوته‌ای، ۷ گونه گیاهی درخت و درختچه (که تماماً به صورت دست‌کاشت هستند) در منطقه پراکنش دارند (جدول ۲). از نظر فرم‌های رویشی رانکیر ۰.۲۵٪ از گونه‌ها (۶۹ گونه) تروفیت، ۰.۱۴٪ از گونه‌ها (۴۰ گونه) کریپتووفیت، ۰.۷٪ از گونه‌ها (۱۹ گونه) کامفیت، ۰.۵۱٪ از گونه‌ها (۱۴۱ گونه) همی‌کریپتووفیت و

1- Critically Endangered (CE)

2- Endangered (EN)

3- Vulnerable (VU)

4- Lower Risk (LR)

جدول ۱- تعداد جنس، گونه های در خطر تهدید در خانواده های عمدہ یافت شده در منطقه کرسنک

نام خانواده	تعداد جنس	تعداد گونه	در خطر تهدید	نام خانواده	تعداد جنس	تعداد گونه	در خطر تهدید
Boraginaceae	۵	۷	۱	Solanaceae	۱	۱	۱
Caryophyllaceae	۷	۱۰	۱	Rubiaceae	۴	۶	-
Chenopodiaceae	۴	۴	-	Linaceae	۱	۱	۱
Compositae	۲۹	۴۰	۱۰	Umbelliferae	۱۲	۱۶	۳
Cruciferae	۱۶	۱۹	۳	Aristolochiaceae	۱	۱	۱
Euphorbiaceae	۲	۶	-	Plumbaginaceae	۱	۱	۱
Papilionaceae	۱۲	۳۰	۱۲	Polygonaceae	۲	۴	۱
Gramineae	۲۴	۳۰	-	Scrophulariaceae	۳	۳	-۱
Labiatae	۱۳	۳۲	۹	Rosaceae	۴	۴	-
Liliaceae	۸	۱۳	۴	Iridaceae	۲	۲	-
Ranunculaceae	۹	۱۰	۲	Papaveraceae	۴	۶	-
Thymelaeae	۱	۱	۱	Santalaceae	۱	۱	۱

نتایج نشان داد که تعداد ۲۷۶ گونه گیاهی از ۴۳

خانواده و ۱۹۱ جنس در سطح منطقه وجود دارد که با توجه به وسعت کم منطقه (۶۰۰ هکتار)، نشان از غنای گونه ای بالای آن می باشد. از این تعداد بیش از ۱۰۰ گونه آن به نوعی دارویی و ۵۳ گونه آن در لیست گیاهان در خطر انقراض است که نشان دهنده قابلیت بالای منطقه در امر تولید گیاهان دارویی و همچنین اولویت حفاظتی منطقه است. همان طور که در جدول های ۱ و ۲ مشاهده می گردد، خانواده های Compositae با ۲۹ جنس و ۴۰ گونه، Gramineae با ۲۴ جنس و ۳۰ گونه، Labiatae با ۱۳ جنس و ۳۲ گونه، Papilionaceae با ۱۲ جنس و ۳۰ گونه، Cruciferae با ۱۶ جنس و ۱۹ گونه و Liliaceae با

## بحث

گونه های مختلف گیاهی از لحاظ عادت های رشد، نحوه تولید مدل، نوع کاربردی که دارند و واکنش به چرا باهم متفاوت هستند. بنابراین در گام نخست باید گونه های گیاهی یک منطقه را شناسایی کرد، زیرا با توجه به گونه های مختلف در ترکیب گیاهی باید عملیات مدیریتی متفاوتی به کار گرفته شود تا ضمن حفظ وضع موجود و ارتقا آن در آینده، از انقراض گونه های با ارزش جلوگیری شود. در عین حال، لازم است با خصوصیات و شکل زیستی گونه های گیاهی موجود در یک منطقه آشنا بود تا به بهترین وجه راهکارهای اصلاح و احیای گونه های با ارزش و کنترل گونه های مهاجم و سمی به کار گرفته شود.

این منطقه را تشکیل داده است (Zohary, 1974; Fielder, 1992). وجود گونه های غیر خوش خوارک مانند انواع *Cirsium bracteosum* *Euphorbia Noaea mucronata* (Forsk.) Aschers. Et DC. Schweinf. و گونه های یکساله بی ارزش در پوشش گیاهی و وجود میکرو تراس ها در منطقه، نشان دهنده بهره برداری زیاد و تخریب اکوسیستم منطقه در سالیان اخیر بوده است. البته علاوه بر بهره برداری زیاد در سالیان اخیر، وقوع خشکسالی و آتش سوزی های مکرر در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، شخم و تبدیل اراضی و آفات و امراض باعث کم شدن تراکم گونه های خوش خوارک و جایگزینی آنها توسط گونه های غیر خوش خوارک شده است. به طوری که امیری نیا و شاکری در سال ۱۳۸۱ در ارزیابی و توصیف پوشش گیاهی مراتع میان بند در دامغان نیز به این موضوع اشاره داشته اند.

براساس کتاب Red Data Book of Iran (Jalili & Jamzad, 1999)، ۴۲ گونه تهدید شده در منطقه مشخص شد ولی براساس معیارهای سازمان IUCN و ارزیابی مسقیم گونه های گیاهی موجود در منطقه و نحوه بهره برداری از آنها ۵۳ گونه تهدید شده در منطقه شناسایی شده است. در کتاب Red Data Book of Iran گونه های *Phlomis persica* *Erodium cicutarium* (L.) L Her. *Linum album* Kotschy ex Boiss. *Astragalus verus* *Astragalus susianus* Boiss. *Echinophora* *Astragalus effuses* Bunge. Olivier. *Cousinia* *Cirsium bracteosum* DC. *platyloba* DC. *Cousinia calcitrapa* Boiss. *cylindracea* Boiss. *Thesium kotschyanum* *Centaurea aucheri* DC. *Hyoscyamus kotschyanus* Pojark. و Boiss. جزء

۸ جنس و ۱۳ گونه از خانواده های گیاهی بزرگ منطقه به شمار می روند. از نظر فرم های رویشی رانکیر ۲۵٪ از گونه ها (۶۹ گونه) تروفیت، ۱۴٪/۴۹ از گونه ها (۴۰ گونه) کریپتو فیت، ۶٪/۸۸ از گونه ها (۱۹ گونه) کامفیت، ۵۱٪/۰۹ از گونه ها (۱۴۱ گونه) همی کریپتو فیت و ۲٪/۵۴ از گونه ها (۷ گونه) را گونه های فانروفیت تشکیل داده اند. بیشتر شکل های زیستی این منطقه به ترتیب مربوط به همی کریپتو فیت، تروفیت، ژئوفیت، کامفیت، هیدروفیت و فانروفیت بوده است. فراوانی همی کریپتو فیت ها (۵۱ درصد از گونه های منطقه) و حضور کامفیت ها و فراوانی گونه های خاردار جنس *Astragalus* با طیف زیستی اقلیم سرد معتدل و سرد سیر بودن منطقه تطبیق می نماید (Zohary, 1974). ۲۵ درصد از گیاهان منطقه متعلق به شکل زیستی تروفیت ها یا گیاهان یکساله می باشد که دوره زندگی خود را در فاصله زمانی شرایط مرطوب حاکم بر منطقه (اواسط اسفند تا اوایل خرداد) می گذرانند؛ بنابراین در فصول خشک منطقه فقط بقایای این گیاهان در لابه لای پوشش گیاهی منطقه دیده شده است. در این منطقه، بیشتر گونه های پایا را شکل های بوته ای خاردار و بالشتک مانند *Astragalus* می دهد که به جنس های *Acanthophyllum* و *Onobrychis* *Acantholimon* تعلق دارند و همراه با گندمیان چندساله مانند *Poa bulbosa* L. *Bromus tomentellus* Boiss. و *Melica persica* Kunth *Hordeum bulbosum* L. انواع *Agropyron* sp. دیده می شوند که نشان دهنده شرایط معتدل و مرتفع سرد در منطقه است که با مجموعه عوامل دیگری نظیر نوع بستر و خاک و شرایط بهره برداری از طبیعت توسط انسان در مجموع ترکیب فلوریستیک خاص

بر اساس کتاب Red Data Book of Iran گونه *Thypha latifolia* در هیچ یک از طبقات گونه‌های تهدیدشده قرار نگرفته است. ولی با بررسی رویشگاه این گونه، مشخص شده است که گونه فوق گیاهیست آب‌دوست و در جاهای مردابی و استخرهای آب رویش دارد. از آنجا که در منطقه مورد مطالعه چندین استخر آب برای مصارف کشاورزی ایجاد شده است، این گونه نیز در آنها رویش دارد. ولی به دلیل اشغال سطح استخرها و مصرف زیاد آب، توسط کشاورزهای منطقه از سطح استخرهای آب ریشه‌کن و سوخته شده، به همین دلیل این گونه نیز جزء گونه‌های تهدیدشده منظور شده است. از ۵۳ گونه تهدیدشده در منطقه، ۷۷/۳۶ درصد جزء گونه‌های با خطر کمتر (LR)، ۳/۷۷ درصد جزء گونه‌های بحرانی (CE)، ۱۵/۰۹ درصد جزء گونه‌های آسیب‌پذیر (VU) و ۳/۷۷ درصد جزء گونه‌های در معرض خطر (EN) می‌باشد. بیشترین تعداد گونه‌های تهدیدشده در منطقه متعلق به خانواده‌های Papilionaceae، Umbelliferae، Liliaceae، Labiateae، Compositae، جغرافیایی، رقابت بین گونه‌ای، شرایط سخت زیست محیطی، چگونگی استقرار و تکثیر طبیعی، چگونگی بهره‌برداری گیاهان توسط انسان، دام و حیات وحش و سرانجام آفات و بیماری، برای تشخیص گونه‌های نادر و عوامل دخیل در کاهش جمعیت آنها مؤثر می‌باشد (Grime, 1985; Ferrari *et al.*, 1993; Jalili & Jamzad, 1999).

به علت استفاده عشایر و روستاییان از گیاهان دارویی Allium ampeloperasum گونه‌های *Thymus daenensis* و گونه‌های مختلف منطقه، *A. hirtifolium*

گونه‌های با خطر کمتر هستند، ولی بر اساس بررسی‌های انجام شده در منطقه و ارزیابی مستقیم آنها در طول ۱۰ سال (طرح‌های انجام شده در منطقه ازجمله طرح ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی استان و طرح تعیین علوفه قابل برداشت مراتع کشور که در مجموع ۱۰ سال، فاکتورهای گیاهی درصد تاج پوشش، تراکم و تولید گونه‌های گیاهی منطقه کرسنک)، گونه‌های گیاهی نامبرده شده در منطقه فراوان بودند و هر ساله نیز بر تراکم آنها افزوده شده است و نحوه بهره‌برداری از آنها نیز در حدی نیست که در سال‌های آینده به آنها آسیب جدی وارد سازد. عکس، در کتاب Red Data Book of Iran گونه‌های DC. ex Benth. *Centaurea Behen* Linn. Bunge. *Salvia sclarea* L. *Salvia hydrangea* Alopecurus Ovcz. *Eremostachys laevigata* *apiatus* در هیچ‌کدام از گروه‌های تهدیدشده گیاهی قرار ندارند، ولی با بررسی‌های انجام شده در منطقه و نحوه بهره‌برداری از آنها (بر اساس داده‌های حاصل از انجام طرح ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ و انجام طرح تعیین علوفه قابل برداشت مراتع از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ هر ساله از تراکم آنها در پوشش گیاهی منطقه کاسته شده است)، گونه‌های گیاهی فوق در طبقات در خطر انقراض و آسیب‌پذیر تقسیم‌بندی شده‌اند. گونه‌های *Allium hirtifolium* Boiss. در کتاب Red Data Book of Iran *ampeloperasum* طبقه گونه‌های در خطر انقراض قرار دارند ولی بر اساس معیارهای IUCN و نحوه بهره‌برداری از آنها در سالیان اخیر جزء گونه‌های بحرانی منطقه تقسیم‌بندی شده‌اند تا در اولویت حفاظت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند.

کشور قرار دهد، چنانکه امروزه در بیشتر مجلات معتبر علمی دنیا به این موضوع پرداخته‌اند (Hebbar *et al.*, 2004; Ghorbani, 2005; Chellaiah *et al.*, 2006).

وجود گونه‌های علفی بالارزش مانند *Astragalus effusus* Bunge, *Astragalus brachystachys angustiflorus* و *Agropyron tomentellus* Boiss. DC. و دیگر گیاهان *Trigonella elliptica* Boiss. *x repens* L. خوشخوارک موجود در ترکیب پوشش‌گیاهی منطقه، نوید این را می‌دهد که با رعایت زمان ورود و خروج دام و طرفیت چرایی، این منطقه می‌تواند به یک ایستگاه بذرگیری (بخصوص بذر گونه‌های علوفه‌ای خوشخوارک) اختصاص داده شود تا برای احیای مرتع تخریب شده مناطق مشابه با این منطقه، از بذرها این گیاهان استفاده شود.

### منابع مورد استفاده

- اسدی، م.، ۱۳۶۷-۷۴. فلور ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مرتع کشور، جلد‌های ۱-۱۳.
- امیری‌نیا، ل. و شاکری، ا. ۱۳۸۱. آنالیز، ارزیابی و توصیف پوشش‌گیاهی مرتع میانبند در دامغان. پژوهه کارشناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ۸۷ صفحه.
- قهرمان، ا.، ۱۳۸۲-۵۷. فلور رنگی ایران. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مرتع کشور، جلد‌های ۱-۲۰.
- کریمیان، ع.، ۱۳۸۴. گیاهان دارویی، معطر، مرتعی و نادر مناطق حفاظت شده کالمند بهادران و کوه بافق استان یزد. مجله محیط‌شناسی، ۳۷: ۱۰ صفحه.
- مبین، ص.، ۱۳۵۴-۷۳. گیاهان ایران (فلور گیاهان آوندی). انتشارات دانشگاه تهران، جلد‌های ۱-۴، ۳۴۲ صفحه.
- مظفریان، و.، ۱۳۷۷. فرهنگ نام‌های گیاهان ایران. انتشارات فرهنگ معاصر تهران، ۶۷۱ صفحه.

جنس‌های *Ziziphora*, *Nepeta*, *Stachys* در معرض نابودی قرار دارند و اگر مورد حفاظت و حمایت جدی قرار نگیرند، در مدت زمانی نه‌چندان دور شاهد انقراض آنها خواهیم بود. در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ گونه‌های *A. hirtifolium* و *A. ampeloperasum* در قسمت‌های بالادست منطقه به فراوانی یافت می‌شدند. ولی در چندسال اخیر به دلیل بهره‌برداری بیش از حد، تراکم آنها به زیر ۵۰۰ پایه در هکتار رسیده است و هر ساله نیز وضعیت آنها وخیم‌تر از قبل خواهد شد. مهمترین روش‌های جلوگیری از انقراض آنها، حفاظت، قرق، جلوگیری از ورود دام تا زمان رسیدن بذرها گیاهان، بذرگیری، کشت بذرها مربوطه در باغ‌های گیاه‌شناسی و تکثیر مجدد گیاهان یادشده، بررسی مراحل فولوزی و سازگاری آنها در طرح‌های تحقیقاتی می‌باشد. با توجه به آنکه بیشتر گونه‌های تهدید شده از نظر شکل زیستی به صورت همی‌کریپتوفتیت می‌باشند، چنانچه در منطقه، بخش‌هایی به صورت قرق در نظر گرفته شود، می‌توان تا حدودی از انقراض گونه‌های مورد نظر جلوگیری به عمل آورد.

در این تحقیق مشخص شد که گیاهان متعلق به تیره‌های Compositae, Labiateae, Apiaceae و Polygonaceae بیشتر به صورت سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرند که بیشترین استفاده دارویی گونه‌ها مربوط به تیره‌های نعناعیان، شببو و سوسن بوده است. نوع استفاده از گیاهان بیشتر به صورت جوشانده و یا استفاده به عنوان طعم‌دهنده و یا استفاده در ترشیجات محلی است. براین اساس، اگر به نمونه‌های دارویی منطقه و کشت آنها توجه بیشتری گردد، استفاده از اطلاعات مردم بومی می‌تواند یافته‌های گرانبهایی در اختیار مؤسسات پژوهشی و دارویی

- Ghorbani, A., 2005. Studies on pharmaceutical ethnobotany in the region of Turkmen Sahra, north of Iran (Part 1): General results. *Journal of Ethnopharmacology*, 102: 58-68.
- Grime, J. P., 1985. The C-S-R model of primary plant strategies-origins, implications and tests. In: Gottlieb, L.D. and Jain, S. (Eds.). *Evolutionary Plant Biology*. London: Chapman and Hall, pp: 93-371.
- Hebbar, S.S., Harsha, V.H., Shripathi, V. and Hegde, G.R., 2004. Ethnomedicine of Dharwad district in Karnataka, India-plants used in oral health care. *Journal of Ethnopharmacology*, 94: 261-266.
- Jalili, A. and jamzad, Z., 1999. Red data book of Iran. Research Institut of Forests and Rangelands Pub., Tehran, Iran, 748 p.
- Leonard, J., 1981-1987. Contributoin a l'etude de la flore et de la vegetation des deserts d'Iran, Fascicules 1-7. *Bulletin of the Jardin Botanique National de Belgique*, Meise, 205-217.
- Parsa, A., 1948-60. Flore of Iran. Ministere de I Education, Tehran, 8 vol.
- Rechinger, K.H., 1963-93. *Flora Iranica*. Akademische Druck-U Verlagsanstlt, Graz, Austria, Vol. 1-172.
- Stace, A., 1989. *Plant Taxonomy and Biosystematics*. LTd Publication, Second Ed., 387 p.
- Zohary, M., 1974. *Geobotanical Foundations of the Middle East*. Gustav Fischer Verlag Stuttgart, Vol. 1-2: 739 p.
- معصومی، ع.ا.، ۱۳۷۴-۱۳۶۵. گونهای ایران. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، جلد ۱-۳.
- Anonymous, 1981. How to use the IUCN Red Data Book Categories. Threatened Plants Committee Secretariat. IUCN, Kew, 826 p.
- Chellaiah, M., Ayyanar, M., Raja, N. and Ignacimuthu, S., 2006. Medicinal plants used by traditional healers in Kancheepuram District of Tamil Nadu India. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 2: 43-57.
- Davis, D.Sc., 1978. *Flora of Turkey and the East Aegean Islands*. University of Edinburgh, 6: 384 p.
- Davis, P. H., 1965-1988. *Flora of Turkey*. Edinburgh University Press, Edinburgh, Vol. 1-10.
- Ferrari, C., Bona, F. and Alessandrini, A., 1993. Rare Plants of the Emilia-Romagna Region (Northern Italia): A Data Bank and computer mapped atlas for conservation Purpose. *Biological Conservation*, 64: 11-188.
- Fielder, P. L. and Ahouse, J. J., 1992. Hierarchies of Cause: toward an understanding of rarity in vascular plant species. In: Fielder, P. L., and Jain, S. K. (Eds.) *Conservation Biology, The theory and practice of Nature Conservation, Preservation and Management*. Champman and Hall, New York, 474p.

جدول ۲- لیست فلوریستیک منطقه کرسنک براساس خانواده گیاهی، جنس و گونه گیاهی (بر اساس حروف الفبا)

نام علمی	شكل زیستی	وضعیت حفاظتی	نام علمی	شكل زیستی	وضعیت حفاظتی
<b>Amaranthaceae</b>	-	-	<i>Silene conoidea</i> L.	Th	-
<i>Amaranthus albus</i> L .	Th	-	<i>Silene spergulifolia</i> (Willd.) M. B.	Ch	-
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Th	-	<i>Vaccaria pyramidata</i> Medicus.	Th	-
<b>Amaryllidaceae</b>	-	-	<b>Chenopodiaceae</b>	-	-
<i>Ixiolirion tataricum</i> (Pall.) Herb.	Ge	-	<i>Ceratocarpus arenarius</i>	Th	-
<b>Aristolochiaceae</b>	-	-	<i>Chenopodium album</i> L.	Th	-
<i>Aristolochia Bottae</i> Jaub. & Spach	He	VU	<i>Noaea mucronat</i> (Forsk.) Aschers et Sch.	Ch	-
<b>Boraginaceae</b>	-	-	<i>Salsola kali</i> L.	Th	-
<i>Anchusa italicica</i> Retz.	He	-	<b>Compositae</b>	-	-
<i>Anchusa strigosa</i> Labill.	He	VU	<i>Achillea millefolium</i> L. Subsp. <i>millefolium</i>	He	LR
<i>Arnebia euchroma</i> (Royle) I.M.Johnst.	He	-	<i>Achillea wilhelmsii</i> C.Koch	He	-
<i>Lithospermum arvense</i> L.	Th	-	<i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.	He	-
<i>Onosma bulbosum</i> DC.	He	-	<i>Anthemis odontostephana</i> Boiss.	Th	-
<i>Onosma microcarpum</i> DC.	He	-	<i>Artemisia Aucheri</i> Boiss.	Ch	-
<i>Rindera lanata</i>	He	-	<i>Carthamus oxyacantha</i> M.B.	Th	-
<b>Capparidaceae</b>	-	-	<i>CentaureaAucheri</i> (DC.) Wagenitz.subsp. <i>Aucheri</i>	He	LR
<i>Cleome iberica</i> DC.	Th	-	<i>Centaurea Behen</i> L.	He	-
<b>Caryophyllaceae</b>	-	-	<i>Centaurea depressa</i> M.B.	Th	-
<i>Acanthophyllum microcephalum</i> Boiss.	Ch	-	<i>Centaurea Gaubae</i> (Bornm.)Wagenitz	Ch	LR
<i>Arenaria insignis</i> Litw.	Ch	LR	<i>Centaurea iberica</i> Trev.ex Spreng.	He	-
<i>Cerastium dichotomum</i> L.	Th	-	<i>Centaurea persica</i> Boiss.	He	LR
<i>Cerastium inflatum</i> Link ex Desf.	Th	-	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	He	-
<i>Dianthus orientalis</i> Adams subsp. <i>orientalis</i> .	He	-	<i>Centaurea virgata</i> Lam.	He	-
<i>Gypsophila bicolor</i> (Freyn & Sint.) Grossh..	He	-	<i>Chardinia orientalis</i>	Th	-
<i>Silene caesarea</i> Boiss & Bal.	He	-	<i>Cichorium intybus</i> L.	He	-
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Th	-	<b>Convolvulaceae</b>	-	-
<i>Cirsium bracteosum</i> DC.	He	LR	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Th	-
<i>Cousinia calcitrapa</i> Boiss.	He	LR	<i>Convolvulus commutatus</i> Boiss.	He	-
<i>Cousinia cylindracea</i> Boiss.	He	LR	<b>Cruciferae</b>	-	-
<i>Crepis sancta</i> (L.) Babcock	Th	-	<i>Aethionema elongatum</i> Boiss.	He	-
<i>Echinops leiocarpus</i> Bornm.	He	-	<i>Aethionema grandiflorum</i> Boiss. & Hohen.	He	VU
<i>Garhadiolus angulosus</i> Jaub. & Spach	Th	-	<i>Alyssum linifolium</i> Steph. ex Willd.	Th	-

## ادامه جدول ۲

نام علمی	شكل زیستی	وضیعت حفاظتی	نام علمی	شكل زیستی	وضیعت حفاظتی
<i>Gundelia Tournefortii</i> L.	He	-	<i>Alyssum marginatum</i> Steud. ex Boiss.	Th	-
<i>Helichrysum oligocephalum</i> DC.	He	LR	<i>Arabidopsis Thaliana</i> (L.) Heynh.	Th	-
<i>Hertia angustifolia</i> (DC.) O.Kuntze.	Ch	LR	<i>Barbarea plantaginea</i> DC.	Th	-
<i>Hieracium cheirifolium</i> Boiss. & hausskn.	He	VU	<i>Capsella Bursa-pastoris</i> (L.)	Th	-
<i>Lactuca serriolai</i> L.	He	-	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Th	-
<i>Lasiopogon muscoides</i> (desf.)DC.	Th	-	<i>Clypeola aspera</i> (Grauer) Turrill	Th	-
<i>Onopordon leptolepis</i> DC.	He	-	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Andrz	Th	-
<i>Picnomon Acarna</i> (L.)Cass.	Th	-	<i>Descurainia Sophia</i> (L.) Schur	Th	-
<i>Scariola orientalis</i> (Boiss.)Sojak.	Ch	-	<i>Fibigia macrocarpa</i>	He	-
<i>Scorzonera seidlitzii</i> Boiss.	He	-	<i>Fibigia umbellata</i>	He	-
<i>Serratula latifolia</i> Boiss.	He	-	<i>Isatis tinctoria</i> L.	He	-
<i>Tanacetum polyccephalum</i> Schultz Bip.	He	-	<i>Lepidium persicum</i> Boiss	He	-
<i>Taraxacum montanum</i> (C.A.Mey.) DC.	He	-	<i>Matthiola ovatifolia</i> (Boiss.) Boiss	He	LR
<i>Taraxacum syriacum</i> Boiss.	He	-	<i>Micrantha multicaulis</i> (Boiss.) Dvorak	He	LR
<i>Tragopogon longirostris</i> Bisch	He	-	<i>Nasturtium officinale</i> (L.) R.Br	Hydro	-
<i>Tripleurospermum disiciforme</i> (C.A.Mey)	He	-	<i>RobeschiaSchimperi</i> (Boiss.) O.E.Schutz	Th	-
<i>Xeranthemum annum</i> L.	Th	-	<b>Cypraceae</b>	-	-
<i>Carex stenophylloides</i> (V.Krecz.) Egor.	He	-	<i>Alopecurus apodus</i> Ovcz.	He	-
<i>Holoschoenus vulgaris</i>	He	-	<i>Arrhenatherum kotschy</i> Boiss.	Ge	-
<b>Dipsacaceae</b>	-	-	<i>Boissiera squarrosa</i>	Th	-
<i>Cephalaria dichaetophora</i> Boiss.	He	-	<i>Bothrichloa ischaemum</i> (L.) Keng.	He	-
<i>Pterocephalus Canus</i> Coult.ex DC.	He	-	<i>Bromus danthoniae</i> Trin.	Th	-
<b>Elaeagnaceae</b>	-	-	<i>Bromus tectorum</i> L.	Th	-
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L	Ph	-	<i>Bromus tomentellus</i> Boiss.	He	-
<b>Euphorbiaceae</b>	-	-	<i>Catabrosa aquatic</i> (L.) Beauv.	Hydro	-
<i>Andrachne telephiooides</i> L.	He	-	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pres.	Ge	-
<i>Euphorbia azerbadjhanica</i> Bordz.	Th	-	<i>Dactylis glomerata</i> L.	He	-
<i>Euphorbia Boissieriana</i> (Worn.) Prokh.	He	-	<i>Eremopoa persica</i> (Trin.) Roshev.	Th	-
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	He	-	<i>Heteranthelium piliferum</i>	Th	-
<i>Euphorbia heteradenia</i> Jaub&Sp	He	-	<i>Hordeum bulbosum</i> L.	Ge	-
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Th	-	<i>Hordeum glaucum</i> Steud.	Th	-
<b>Fumariaceae</b>	-	-	<i>Hordeum violaceum</i> Boiss.et Huet.	Ge	-
<i>Fumaria asepala</i> Boiss.	Th	-	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Th	-

## ادامه جدول ۲

نام علمی	شكل زیستی	وضیعت حفظاظتی	نام علمی	شكل زیستی	وضیعت حفظاظتی
<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Th	-	<i>Melica persica</i> Kunth.	He	-
<b>Geraniaceae</b>	-	-	<i>Oryzopsis holciformis</i> (M.B) Hack.	Ge	-
<i>Biebersternia multifida</i> DC.,Prodr.	Ge	-	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C. E. Hubb.	Th	-
<i>Erodium cicutarium</i> (L.)	He	LR	<i>Pharagmitis australis</i> (Cav) Rtin.	Ge	-
<i>Geranium tuberosum</i> L.	Ge	-	<i>Poa bulbosa</i> L.	Ge	-
<b>Gramineae(Poaceae)</b>	-	-	<i>Psathyrostachys fragilis</i> (Boiss.) Nevskei	Ge	-
<i>Aegilops cylindrica</i> Host	Th	-	<i>Puccinella bulbosa</i>	Ge	-
<i>Agropyrum intermedium</i> (Host) P. Beauv.	He	-	<i>Setaria viridis</i>	Th	-
<i>Agropyrum repens</i> (L.) P. Beauv.	He	-	<i>Sorghum halepense</i> L.	Ge	-
<i>Stipa hohenackeriana</i> Trin.& Pupr.	He	-	<i>Salvia hydrangea</i> DC. Ex Benth.,	He	EN
<i>Taeniatherum crinitum</i> (Schreb.)	Th	-	<i>Salvia multicaulis</i> Vahl, Enum.	He	-
<b>Iridaceae</b>	-	-	<i>Salvia palaestina</i> Benth.	He	-
<i>Gladiolus segetum</i> Boiss.	Ge	-	<i>Salvia sclarea</i> L.	He	EN
<i>Iris songarica</i> Schrenk.	Ge	-	<i>Salvia syriaca</i> L.	He	-
<b>Juglandaceae</b>	-	-	<i>Salvia virgata</i> Jacq.,Hort.	He	-
<i>Juglans regia</i>	Ph	-	<i>Stachys inflata</i> Benth.	He	-
<b>Juncaceae</b>	-	-	<i>Stachys lavandulifolia</i> Vahl, Symb.	He	-
<i>Juncus inflexus</i> L.	Ge	-	<i>Stachys pilifera</i> Benth.	He	LR
<b>Labiatae</b>	-	-	<i>Stachys setifera</i> C. A. Mey.	He	-
<i>Ajuga chamaecistus</i> Ging. <i>Subsp.chamaecistus</i>	Ch	LR	<i>Stachys spectabilis</i> Choisy.	He	-
<i>Eremostachys laevigata</i> Bunge.	He	VU	<i>Teucrium orientale</i> L. <i>subsp.orientale</i>	He	-
<i>Eremostachys macrophylla</i> Montbr.	He	-	<i>Teucrium polium</i> L.	He	-
<i>Lallementia iberica</i> (Stev.)	Th	-	<i>Thymus daenensis</i> Cllak <i>subsp.daenensis</i>	Ch	LR
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Th	-	<i>Ziziphora cilinopodiooides</i> Lam.	He	VU
<i>Marrubium astracanicum</i> Jacq.	He	-	<i>Ziziphora Tenuir</i> L.	Th	-
<i>Marrubium cuneatum</i> Russell	He	-	<b>Liliaceae</b>	-	-
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Hudson,	He	-	<i>Allium Ampeloprasum</i> L. <i>subsp.iranicum</i> Wendelbo	Ge	CEN
<i>Nepeta heliotropifolia</i> Lam.	He	-	<i>Allium atroviolaceum</i> Boiss.	Ge	-
<i>Nepeta fissa</i> C. A. May.	He	-	<i>Allium hirtifolium</i> Boiss.	Ge	CEN
<i>Nepeta persica</i> Boiss,Diagn.	He	-	<i>Allium scabriascapum</i> Boiss. & Ky.	Ge	-
<i>Nepeta pungens</i> (Bunge.) Benth.,	Th	-	<i>Bellevalia glauca</i> (Lindl.) Kunth.	Ge	-
<i>Nepeta Straussii</i> Hausskn.&Bornm.	Th	LR	<i>Colchicum speciosum</i> Steven.	Ge	-

ادامه جدول ۲

نام علمی	شكل زیستی	وضعیت حفاظتی	نام علمی	شكل زیستی	وضعیت حفاظتی
<i>Phlomis olivieri</i> Benth.	He	-	<i>Colchicum</i> <i>Wendelbo</i> K.Persson	Ge	LR
<i>Phlomis persica</i> Boiss.	He	LR	<i>Fritillaria</i> <i>imperialis</i> L.	Ge	-
<i>Salvia ceratophylla</i> L.	He	-	<i>Fritillaria</i> <i>persica</i> L.	Ge	-
<i>Eremurus spectabilis</i> M.B.Subsp. <i>spectabilis</i>	Ge	LR	<i>Astragalus campylanthus</i> Boiss.	Ch	LR
<i>Gagea gageoides</i> (Zuoc.)Vved.	Ge	-	<i>Astragalus caragana</i>	He	-
<i>Muscari neglectum</i> Guss.	Ge	-	<i>Astragalus cephalanthus</i> DC.	Ch	LR
<i>Tulipa stylosa</i> Stapf.	Ge	-	<i>Astragalus curvirostris</i>	He	-
<b>Linaceae</b>	-	-	<i>Astragalus effusus</i> Bunge	He	LR
<i>Linum album</i> Ky.ex Boiss.	He	LR	<i>Astragalus microphysa</i> Boiss	Ch	LR
<b>Malvaceae</b>	-	-	<i>Astragalus murinus</i> Boiss.	Ch	LR
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Th	-	<i>Astragalus piptocephalus</i> Boiss.& Hausskn. ex Boiss	Ch	LR
<b>Onagraceae</b>	-	-	<i>Astragalus rhodosemius</i>	Ch	-
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	He	-	<i>Astragalus susianus</i> Boiss.	Ch	LR
<b>Orobanchaceae</b>	-	-	<i>Astragalus verus</i> Olivier.	Ch	LR
<i>Orobanche schwingenschuui</i> Gill.	Parasite	-	<i>Cicer spiroceras</i> Jaub.& Spach.	He	LR
<b>Papaveraceae</b>	-	-	<i>Coronilla varia</i> L.	He	-
<i>Glaucium oxylobolum</i> Boiss.& Buhse	He	-	<i>Lotus corniculatus</i> L.	He	-
<i>Hypecoum pendulum</i> L.	Th	-	<i>Medicago sativa</i> L.	He	-
<i>Papaver Argemone</i> L.	Th	-	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Desr.	He	-
<i>Papaver dubium</i> L.	Th	-	<i>Onobrychis cornuta</i> (L.) Desv. subsp. <i>cornuta</i>	Ch	-
<i>Papaver fugax</i> Poir.	He	-	<i>Onobrychis Gaubae</i> Bornm	He	LR
<i>Roemeria refracta</i> DC.	Th	-	<i>Ononis spinosa</i> L.	He	-
<b>Papilionaceae</b>	-	-	<i>Sophora alopecuroides</i> L.	He	-
<i>Astragalus adscendens</i>	Ch	-	<i>Trifolium pratense</i> L.	He	-
<i>Astragalus angustiflorus</i>	He	-	<i>Trifolium repens</i> L.	He	-
<i>Astragalus ardehalicus</i>	Ch	-	<i>Trigonella elliptica</i> Boiss.	He	LR
<i>Astragalus babakhanloui</i> Maassoumi& Podl.	He	LR	<i>Vicia Ervilia</i> (L.) Willd.	Th	-
<i>Astragalus brachystachys</i>	He	-	<i>Vicia narbonensis</i> L	He	-
<b>Plantaginaceae</b>	-	-	<b>Rosaceae</b>	-	-
<i>Plantago lanceolata</i> L.	He		<i>Amygdalus communis</i> L.	Ph	-
<b>Plumbaginaceae</b>	-	-	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	Ph	-
<i>Acantholimon festucaceum</i> (Jaub. & Spach) Boiss.	Ch	LR	<i>Potentilla reptans</i> L.	He	-
<b>Podophyllaceae</b>	-	-	<i>Sanguisorba minar</i> Scop.	He	-
<i>Leontice armeniaca</i> Boivn.	Ge	-	<b>Rubiaceae</b>	-	-

ادامه جدول ۲

نام علمی	شكل زیستی	وضیعت حفظاظتی	نام علمی	شكل زیستی	وضیعت حفظاظتی
<i>Leontice leontopetalum</i> L. <i>Subsp.leontopetalum.</i>	Ge	-	<i>Asperula molluginoides</i> (M.B.) Reichb.	He	-
<b>Polygonaceae</b>	-	-	<i>Asperula orientalis</i> Boiss. et. Hohen.	Th	-
<i>Polygonum aridum</i> Boiss.& Hausskn.	He	LR	<i>Callipeltis cucularis</i> Stev.	Th	-
<i>Polygonum aviculare</i> L.	He	-	<i>Crucianella gilanica</i> Tin.	He	-
<i>Rumex crispus</i> L.	He	-	<i>Galium aparina</i> L.	Th	-
<i>Rumex ponticus</i> E. H. L. Krouse.	He	-	<i>Galium verum</i> L.	He	-
<b>Ranunculaceae</b>	-	-	<b>Salicaceae</b>	-	-
<i>Adonis aestivalis</i> L.	Th	-	<i>Populus alba</i> L.	Ph	-
<i>Anemone biflora</i> DC.	Ge	-	<i>Salix alba</i> L.	Ph	-
<i>Batrachium trichophyllum</i> Bosch.	Hydro	-	<b>Santalaceae</b>	-	-
<i>Ceratocephalus falcate</i> (L.) Pers.	Th	-	<i>Thesium kotschyanum</i> Boiss.	He	LR
<i>Consolida orientalis</i> (Gay) Schrod.	Th	-	<b>Scrophulariaceae</b>	-	-
<i>Delphinium tuberosum</i> Auch. ex Boiss.	Ge	LR	<i>Scrophularia nervosa</i> Bth. & Boiss.	He	-
<i>Ficaria kochii</i> (Ledeb.) Iranshahr & Rech. F.	Ge	-	<i>Verbascum macrocarpum</i> Boiss.	He	-
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Ge	-	<i>Veronica orientalis</i> MILL.	He	-
<i>Ranunculus kotschy</i> Boiss.	Ge	LR	<b>Solanaceae</b>	-	-
<i>Thalictrum isopyroides</i> C.A.Mey.	He	-	<i>Hyoscyamus kotschyanus</i> Pojark.	He	LR
<b>Resedaceae</b>	-	-	<b>Typhaceae</b>	-	-
<i>Reseda lutea</i> L.	He	-	<i>Typha latifolia</i> L.	Hydro	VU
<b>Umbelliferae</b>	-	-	<i>Malabaila dasyantha</i> (C.Koq) Grossh.	He	LR
<i>Bunium caroides</i> (Boiss.) Hausskn.Bornm.	Ge	-	<i>Prangos acaulis</i> (DC.) Bornm.	He	VU
<i>Bunium cylindricum</i> (Boiss. & Hohen).	Ge	-	<i>Prangos ferulacea</i> (L.) Lindl.	He	-
<i>Bunium paucifolium</i> DC.	Ge	-	<i>Prangos Uloptera</i> DC.	He	-
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	He	-	<i>Scaligeria nodosa</i> (Boiss) Boiss.	He	-
<i>Chaerophyllum macropodium</i> Boiss.	He	-	<i>Scandix iberica</i> M.B.	Th	-
<i>Conium maculatum</i> L.	He		<i>Turgenia latifolia</i> (L.).	Th	-
<i>Echinophora platyloba</i> DC.	He	LR	<b>Vitaceae</b>	-	-
<i>Eryngium Billardieri</i> F. Delaroche.	He	-	<i>Vitis vinifera</i> L.	Ph	-
<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	He	-			

شكل زیستی: Ph: فانروفیت، Ch: کامفیت، He: همی کریپتووفیت Ge: ژئوفیت، Th: تروفیت Hydro: آبری  
 طبقات حفاظتی: EN: در خطر انقراض، VU: آسیب پذیر، LR: کمتر در خطر، CEN: بحرانی