

بررسی اثر موضعی اسانس آویشن (*Thymus vulgaris L.*) بر التیام زخم جلدی نوع برشی عفونی شده با *Candida albicans* در موش آزمایشگاهی سفید بزرگ (مطالعه هیستوپاتولوژیکی)

آرین رحمانپور^{۱*}، مهران نصیری^۲ و محمد رضا فرهیور^۳

۱- نویسنده مسئول، کارشناس ارشد میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

پست الکترونیک: rahmanpour_arvin@yahoo.com

۲- استادیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ایران

۳- استادیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ایران

تاریخ پذیرش: مهر ۱۳۹۴

تاریخ اصلاح نهایی: شهریور ۱۳۹۴

تاریخ دریافت: اردیبهشت ۱۳۹۴

چکیده

عفونت‌های زخم ناشی از *Candida albicans* در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. عدم دسترسی آسان، گران بودن داروها، عوارض جانبی ناشی از آنها و بهویژه توسعه مقاومت دارویی، سبب شد تا استفاده از مواد بیولوژیک به عنوان راه حل‌های جایگزین مطرح گردد. یکی از این مواد بیولوژیک که از دیرباز خواص ضدیکروبی آن به اثبات رسیده است، گیاه آویشن (*Thymus vulgaris L.*) می‌باشد. مطالعه اخیر بهمنظور بررسی اثر موضعی اسانس آویشن بر التیام زخم جلدی نوع برشی عفونی شده با *Candida albicans* در موش آزمایشگاهی سفید بزرگ انجام شد. در این مطالعه که بر روی ۳۶ موش آزمایشگاهی سفید بزرگ نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 210 ± 10 گرم انجام شد، پس از بیهوشی عمومی و ایجاد یک زخم مربع شکل با ابعاد $1/5$ در $1/5$ سانتی‌متر در محل بین دو کتف، به‌وسیله $1/0$ میلی‌لیتر از سوسپانسیون مخمر *Candida albicans* (لافاصله به محل زخم) تزریق شد. سپس موش‌های آزمایشگاهی سفید بزرگ آزمایش در سه گروه ۱۲ تایی (شاهد، پماد 3% و پماد $1/5\%$) به‌طور تصادفی توزیع و هر گروه خود به ۴ زیر‌گروه ۳ تایی (گروه‌های نمونه‌برداری در روزهای مختلف) تقسیم گردید. در طول اجرای طرح، در پایان روزهای $4, 8, 12, 16$ و 20 از زخم‌های گروه‌های مختلف، بهمنظور بررسی‌های هیستوپاتولوژیک و شمارش مخمر، به‌وسیله پانچ مخصوص بیوپسی، نمونه گرفته شد. براساس نتایج بدست‌آمده از این مطالعه، اختلاف معنی‌داری از نظر تأثیر پماد 3% و $1/5\%$ در کاهش تعداد مخمر *Candida albicans* دیده نشد، ولی این اختلاف در مقایسه با گروه شاهد به‌طور محسوسی معنی‌دار بود ($P < 0.001$). همچنین مطالعات هیستوپاتولوژیک نشان داد که از نظر کاهش عروق خونی، کاهش حضور سلول‌های چند هسته‌ای، افزایش سلول‌های فیبروبلاست و افزایش تعداد ماکروفازها، هر دو پماد در مقایسه با گروه شاهد نسبت به هر دو گروه بهتر عمل کردند. در مجموع، با توجه به اینکه پماد 3% در بیشتر موارد با پماد $1/5\%$ عملکرد مشابه داشته و در سایر موارد نسبت به هر دو گروه بهتر عمل کرده است، پماد 3% می‌تواند انتخاب بهتری برای استعمال موضعی در روند التیام و کاهش عفونت *Candida albicans* در محل زخم در نظر گرفته شود.

واژه‌های کلیدی: اسانس آویشن، *Candida albicans*، التیام زخم، موش آزمایشگاهی سفید بزرگ.

Candida albicans اسانس آویشن بر عفونت‌های جلدی در شرایط آزمایش بر روی نمونه موجود زنده به شکل آسیب‌شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. عدم دسترسی آسان و گران بودن داروها، اثرات جانبی و بهویژه توسعه مقاومت دارویی منجر به استفاده از مواد بیولوژیکی به عنوان راه حل‌های جایگزین شده است. در تحقیقات اخیر نشان داده شده است که گیاهان و ترکیب‌هایی که از گیاهان مشتق شده‌اند می‌توانند راه حل‌های مناسبی برای درمان بیماری‌های عفونی مقاوم، جلوگیری از اثرات جانبی و بهویژه توسعه مقاومت دارویی باشند (Raja et al., 2011). از این‌رو، این مطالعه با هدف بررسی اثرات درمانی گیاه آویشن بر درمان رخمهای عفونی انجام شده است.

مواد و روش‌ها

آماده‌سازی اسانس گیاه

برگ‌های تازه گیاه آویشن در خردامه سال ۱۳۹۲ از باغ گیاهان دارویی شهرداری ارومیه جمع‌آوری و شستشو شده و پس از تأیید دانشکده علوم گیاهی و کشاورزی دانشگاه ارومیه، در سایه و در دمای اتاق ۲۳–۲۲ درجه سانتی‌گراد خشکانیده و خرد شد؛ سپس به منظور تهیه اسانس گیاه به مقدار مورد نیاز، در هر بار اسانس‌گیری در حدود ۱۰۰ گرم از پودر گیاه آویشن در بال نیم لیتری دستگاه کلونجر ریخته شد و مقدار سه تا شش برابر وزن گیاه به آن آب اضافه گردید. اسانس موجود در گیاه با استفاده از دستگاه کلونجر به مدت ۵ ساعت استخراج شد. اسانس بدست آمده پس از آبگیری با سولفات‌سدیم انیدرید، درون شیشه رنگی کوچک جمع‌آوری گردید و تا روز ساخت پماد در یخچال نگهداری شد (Tyagi & Malik, 2011).

تهیه پماد پایه

به منظور آماده‌سازی پمادهای درمانی ۱/۵٪ و ۳٪، به ترتیب ۱/۵ و ۳ CC از اسانس خالص تهیه شده از برگ گیاه آویشن در یک قوطی به ۱۰۰ گرم پماد پایه واژلین (۷۰٪) و اوسرین (۳۰٪) اضافه شد (Farahpour & Habibi, 2012).

مقدمه

یکی از عارضه‌هایی که بیشتر کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند، عفونت زخم‌های پوستی می‌باشد. برآوردهای کنونی نشان می‌دهد که نزدیک به ۶ میلیون نفر از زخم‌های مزمن در سراسر جهان رنج می‌برند (Kumar et al., 2006). طب سنتی ایران تاریخی بیش از ۳۰۰۰ سال دارد و قبل از طب مدون در بین مردم مرسوم بوده و با عقاید و باور مردم عجین شده است (Naseri, 2004). شرایط بهداشتی ضعیف در برخی از کشورهای جهان سوم، علت اصلی این مشکل است. یکی از عفونت‌های شایم در زخمهای آلدگی آنها با *Candida albicans* می‌باشد (Isibor et al., 2008). این قارچ در پوست و سطوح مخاطی دهان، واژن و دستگاه گوارش تکثیر می‌گردد و با توجه به ماهیت نقص میزان تحت تأثیر، قادر است انواع عفونت‌ها را ایجاد کند. انتشار بیماری‌های انسانی ناشی از این ارگانیسم که به‌طور پیوسته در سال‌های اخیر افزایش یافته است، منجر به استفاده وسیعی از داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی و آنتی‌بیوتیک‌های طیف گسترده شده است (Murray et al., 2008; Sullivan et al., 2008). عفونت‌های ناشی از *Candida albicans* همچنین یک مشکل جدی برای بیماران دچار سوختگی، بیماران مبتلا به تنوپلاسم‌های مختلف و افراد مبتلا به نقص ایمنی می‌باشد (Agarwal et al., 2010). آزول و مشتقان آن فلوكونازول به‌دلیل ویژگی مهارکنندگی فعالیت قارچی در کاهش میزان عفونت‌های کاندیدیاز، در هر دو شکل موضعی یا دهانی برای درمان استفاده می‌شوند (Agarwal et al., 2010). یکی از گیاهانی که برخی خواص دارویی آن به اثبات رسیده است، اسانس گیاه آویشن (*Thymus vulgaris*) می‌باشد که یکی از شناخته شده‌ترین گیاهان دارویی از تیره نعناء است که به‌دلیل دارا بودن مقادیر فراوانی از تیمول (Thymol)، کارواکرول (Carvacrol)، ترکیب‌های فنول و ترپن‌وئیدی (Phenol/Terpenoid) خاصیت شدید ضدبacterیالی و ضدقارچی دارد (Zargari, 1995; Conforti, 2008). از این‌رو، در این مطالعات اثرات ضدقارچی (et al., 2008).

روش بیهوشی و ایجاد زخم

القاء بیهوشی با ترکیب زایلازین هیدروکلرايد ۲٪ (۵۰ mg/kg) و کتامین هیدروکلرايد ۱۰٪ (۵۰ mg/kg) تهیه شده از شرکت آلمانی Bayer، به صورت داخل صفاقی انجام شد (Farahpour & Habibi, 2012). موش‌های آزمایشگاهی به صورت شکمی بر روی میز جراحی قرار داده شدند، سپس سطح پشتی موش‌ها از ناحیه کتف تا ایلئوم آماده سازی و اسکراب شده و یک زخم مرتع شکل با ابعاد ۱/۵ در ۱/۵ سانتی‌متر در محل بین دو کتف ایجاد شد. با ایجاد زخم به روش برشی، لایه‌های اپiderم و درم به طور کامل برداشته شدند (شکل‌های ۱ و ۲). بلافارسله پس از ایجاد زخم، محل زخم هر یک از موش‌های گروه درمان و شاهد توسط ۱۰/۰ ml از سوسپانسیون حاوی حدوداً 10^6 CFU/ml آزمایشگاهی Sullivan et al., 2004 آزاد شد. سپس موش‌های مورد آزمایش در سه گروه ۱۲ تایی (شاهد، پماد ۳٪ و پماد ۱/۵٪) به طور تصادفی توزیم و هر گروه خود به ۴ زیرگروه ۳ تایی (گروه‌های نمونه برداری در روزهای ۴، ۸، ۱۲، ۱۶ و ۲۰) تقسیم شدند. بعد از سپری شدن ۲۴ ساعت (به منظور کلونیزاسیون مخمر) درمان موضعی آغاز گردید (Farahpour & Habibi, 2012).

تهیه مقاطع هیستوپاتولوژیک در روزهای ۴، ۸، ۱۲، ۱۶ و ۲۰ پس از جراحی از زخم‌های گروه‌های شاهد و درمان، نمونه بافتی برداشته شد. بدین ترتیب که ۵ حیوان به طور تصادفی از هر گروه انتخاب شد و پس از ایجاد بیهوشی به روش ذکر شده و انجام عمل اسکراب معمول جراحی، تحت شرایط آسپتیک توسط پانچ بیوپسی، نمونه‌ای به قطر ۷mm از تمام بافت التیامی گرفته شد. نمونه بافتی گرفته شده به منظور پایدار کردن در فرمالین بافر ۱۰٪ قرار داده شده و به آزمایشگاه

حیوانات مورد آزمایش

۳۶ سر موش آزمایشگاهی سفید بزرگ نر نژاد ویستار با محدوده وزنی 210 ± 10 گرم و محدوده سنی ۱۲ تا ۱۴ هفته از محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه تهیه شدند. حیوانات به مدت ۱۰ روز در قفس‌های جداگانه در محل آزمایش به منظور تطابق به شرایط محیطی جدید نگهداری شدند. قفس‌های نگهداری حیوانات از نظر شرایط دمایی (22 ± 3 درجه سانتی‌گراد)، رطوبت (60 ± 5 ٪) و نوردهی (۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی) در شرایط استاندارد بودند. در طول تحقیق حیوانات به شکل دستی، توسط غذای مخصوص حیوانات آزمایشگاهی تغذیه گردیدند و به آب و غذا دسترسی آزاد داشتند. پروتکل این مطالعه مورد تأیید کمیته نظارت بر حقوق حیوانات آزمایشگاهی مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه قرار گرفت.

نحوه تیمار زخم‌ها

پس از ایجاد زخم، ۳۶ سر موش مورد مطالعه به طور تصادفی به سه گروه ۱۲ تایی تقسیم شدند. گروه اول (گروه شاهد) توسط پماد پایه (ترکیب ۷۰ گرم واژلین و ۳۰ گرم اوسرین) و گروه‌های دوم و سوم به ترتیب توسط پمادهای ۱٪ و ۳٪ انسانس آویشن تیمار شدند. در حدود ۱ گرم پماد به طور موضعی، به شکل روزانه یکبار در روز (تا روز بیستم) بر روی محل زخم تا زمان بھبودی کامل قرار داده شد (Farahpour & Habibi, 2012).

آماده‌سازی سوسپانسیون مخمر

در ابتدا، سویه استاندارد *Candida albicans* (PTCC 5022) روی محیط کشت ساپورود دکستروز آگار همراه با کلرامفینیکل به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد کشت داده شد. سپس با استفاده از کلونی‌های ظاهر شده، استاندارد نیم مک فارلند تهیه گردید (Brown, 2009; Beldon, 2010).



شکل ۱- اندازه‌گیری محل زخم توسط خط کش در روز نخست جراحی (قبل از برش)



شکل ۲- اندازه‌گیری محل زخم توسط خط کش در روز نخست جراحی (بعد از برش)

پاتولوژی برای انجام سایر مراحل آماده‌سازی و تهیه مقطع منتقل گردید. پس از تشییت و قالب‌گیری نمونه‌های بافتی در پارافین، توسط میکروتوم مقاطعی به ضخامت ۵ میکرون تهیه و به روش هماتوکسیلین-ائوزین (برای شمارش سلوالی) Sasidharan *et al.*, (رنگ آمیزی شد) ۲۰۱۰). در این بررسی پارامترهای آسیب‌شناختی نشان‌دهنده پیشرفت ترمیم از جمله نوزایش عروقی، سلوالهای التهابی، میزان تشکیل لایه شاخی و ضخامت آن، مهاجرت فیبروبلاستی، حجم توده کلاژن و میزان بلوغ کلاژن براساس جدول ۱ پارامترهای آسیب‌شناختی نشان‌دهنده پیشرفت ترمیم زخم براساس امتیازدهی گزارش گردید (Ozay *et al.*, ۲۰۱۰).

جدول ۱- پارامترهای آسیب‌شناختی نشان‌دهنده پیشرفت ترمیم زخم و نحوه رتبه‌بندی آنها

درجه‌بندی	سلول‌های التهابی	نوزایش عروقی	فیبروبلاست	کلاژن	تشکیل بافت پوششی
۰	عدم حضور	عدم حضور	عدم حضور	عدم حضور	ضخیم شدن لبه‌های برش
۱	خفیف	خفیف	خفیف	خفیف	مهاجرت سلوالهای (باft جوانه‌ای) متر از ۵۰٪
۲	خفیف (باft جوانه‌ای و خط دمارکاسیون)	خفیف	(اطراف باft)	(اطراف باft)	مهاجرت سلوالهای (باft جوانه‌ای) بیشتر از ۵۰٪
۳	متوسط (باft جوانه‌ای و خط دمارکاسیون)	متوسط	متوسط	متوسط	بل زدن ناحیه برش (باft جوانه‌ای)
۴	خط دمارکاسیون)	برجسته	برجسته	برجسته	شاخی شدن (باft جوانه‌ای)

نتایج

پس از بررسی نتایج حاصل از پمادهای درمانی حاوی اسانس گیاه آویشن در مقایسه با یکدیگر و گروه شاهد، مشخص شد که میزان پرخونی و تعداد سلوالهای التهابی در روز چهارم، در گروه درمانی با پماد ۳٪، کاهش چشمگیری در مقایسه با گروه شاهد وجود دارد ($P < 0.05$) (جدول ۲).

آزمون آماری ارزیابی آسیب‌شناختی بافت پوست در حال ترمیم به صورت کیفی انجام شد. داده‌ها به صورت میانگین \pm انحراف استاندارد(ها) ارائه شده است. برای مطالعات آماری متغیرهای ترتیبی از نرم‌افزار spss ورژن ۱۸ استفاده شد و P-value کمتر از ۰/۰۵ معنی‌دار در نظر گرفته شد.

در گروه درمانی $1/5\%$ با سرعت کنتر و در گروه شاهد بسیار کنتر می‌باشد. به طوری که شروع نوزایش بافت پوششی از روز دوازدهم بوده و با روند متوسطی تا روز شانزدهم ادامه می‌باید و در روز بیستم بعد از القاء عفونت پل بافت پوششی کامل می‌گردد (شکل ۴). حداقل تراکم کلاژنی، اپیتلیزاسیون و بلوغ دسته‌های کلاژنی در گروه شاهد در روز بیستم بوده که تا حدی با میزان آن در روز شانزدهم گروه درمانی 3% برابر می‌کند ($P<0.05$).

بحث


در پژوهش اخیر مشخص شد که کاربرد موضعی اسانس آویشن، به طور معنی داری ($P<0.05$) موجب افزایش نوزایش عروقی، موجب افزایش سنتز کلاژن، همچنین افزایش دسته‌های کلاژنی از یکسو و از سوی دیگر کامل شدن پل بافت پوششی در روزهای شانزدهم و بیستم بعد از القاء عفونت در زخم‌های درمان یافته، شده است. نتایج آسیب‌شناختی این مطالعه برای بافت و اثبات اثر اسانس گیاه آویشن که دارای خواص بیولوژیک مفید بی‌شماری است، به شکل آزمایشگاهی و بالینی، در مدل موش آزمایشگاهی سفید بزرگ انجام شد که این پژوهش نشان داد که استفاده موضعی از اسانس آویشن در شرایط آزمایش بر روی نمونه موجود زنده، موجب توقف *Candida albicans* عفونت‌زاوی زخم پوستی آلوده شده به مخمر ضدقارچی اسانس آویشن، به دلیل دارا بودن مقادیر تیمول، کارواکرول، ترکیب‌های فنول و ترینوئیدی در محیط آزمایشگاه انجام شده است و بر همین اساس نشان داده شده است که این ترکیب‌ها مهمترین اجزای مؤثر در فعالیت ضدقارچی و ضدمیکروبی گیاه آویشن می‌باشند (Conforti *et al.*, 2008; Zargari, 1995) همچنین فرایند ترمیمی زخم پدیده‌ای پیچیده و سازمان یافته است که پس از آسیب پوست و بافت‌های نرم انجام می‌شود و گاهی برای ماه‌ها و سال‌ها ادامه می‌باید.

همچنین تعداد سلول‌های ایمنی تک هسته‌ای بیشتری در بافت در حال ترمیم دیده می‌شود. در کلیه گروه‌ها، از روز هشتم به بعد، به شکل قابل ملاحظه‌ای از تعداد سلول‌های ایمنی کاسته شده است. کاهش روند یادشده با سرعت کنتری نسبت به آویشن $1/5\%$ همراه است؛ اما در گروه شاهد، روند کاهش پرخونی با سرعت بسیار کنتری نسبت به گروه‌های درمانی، بهویژه گروه آویشن 3% ادامه یافته است (شکل ۳). در بررسی آسیب‌شناختی از لحاظ تشکیل عروق خونی جدید، در تمامی گروه‌ها، تا روز هشتم تشکیل عروق خونی نو، افزایش داشته و از آن به بعد روند کاهشی پیدا کرده است. با این تفاوت که در گروه درمانی با پماد 3% تعداد معنی‌دار بیشتر عروق خونی نو در مقایسه با گروه درمانی با پماد $1/5\%$ و گروه شاهد تشکیل شده است ($P<0.05$). همچنین در بررسی از لحاظ مهاجرت سلول‌های فیبروبلاست به محل زخم، در هر دو گروه درمانی، تعداد بالاتری از سلول‌های فیبروبلاست در روز هشتم به چشم می‌خورد. این افزایش در روز شانزدهم بعد از ایجاد عفونت به بیشترین میزان خود رسیده و بعد روند کاهشی پیدا می‌کند، در حالی که بیشترین میزان فیبروبلاست در گروه شاهد، در روز شانزدهم، کمتر از میزان دیده شده در روز دوازدهم گروه درمانی 3% بود. همچنین از لحاظ سنتز کلاژن و تراکم کلاژنی، در نمونه‌های حاصل از پماد 3% سنتز کلاژن از همان روز چهارم شروع و سیر صعودی دارد؛ در مقایسه، بهترتب در گروه‌های درمانی $1/5\%$ و شاهد تراکم کلاژنی آهسته‌تر آغاز شده و با روند متوسطی ادامه می‌باید؛ به شکلی که حداقل میزان سنتز و تراکم کلاژن در گروه‌های یادشده در روز بیستم بوده که تا حدی با میزان آن در روز شانزدهم گروه درمانی 3% برابر می‌کند ($P<0.05$) از نظر تشکیل بافت پوششی، در گروه درمانی 3% از روز هشتم به بعد، میزان قابل توجهی شروع ساخت و حرکت بافت پوششی بر روی زخم دیده می‌شود که با روند صعودی ادامه یافته و در روز شانزده پل بافت پوششی کامل شده و لایه شاخی هم به وجود می‌آید؛ در حالی که این روند

جدول ۲- نتایج حاصل از میانگین \pm انحراف استاندارد برآوردهای بررسی آسیب‌شناختی گروه‌های مختلف


گروه‌های مورد آزمایش	نوع سلول التهابی	پرخونی	میزان سلول‌های التهابی	تراکم کلاژنی	بافت پوششی	نوژایش	بلوغ دسته‌های کلاژن
آویشن ۵٪ روز چهارم	لنفوسيت-نوتروفيل	+++	+++	++++	-	-	-
آویشن ۳٪ روز چهارم	لنفوسيت-نوتروفيل	++ a	++ a	++++	++	-	-
شاهد روز چهارم	لنفوسيت-نوتروفيل	+++	+++	++++	+	-	-
آویشن ۱/۵٪ روز هشتم	لنفوسيت	+ b	+++	++++	+	-	-
آویشن ۳٪ روز هشتم	لنفوسيت	++ a	+++	+++	++	-	-
شاهد روز هشتم	لنفوسيت	+++	+++	++++	+	-	-
آویشن ۱/۵٪ روز دوازدهم	لنفوسيت	-	+++	++	+++	-	-
آویشن ۳٪ روز دوازدهم	لنفوسيت	+	+++	++	++	-	-
شاهد روز دوازدهم	لنفوسيت	-	+++	++	++	-	-
آویشن ۱/۵٪ روز شانزدهم	لنفوسيت	-	+++	+++ ab	+++ a	-	-
آویشن ۳٪ روز شانزدهم	لنفوسيت	-	+++	+++ ab	+++ b	-	-
شاهد روز شانزدهم	لنفوسيت	-	+++	+	+	-	-
آویشن ۱/۵٪ روز بیستم	لنفوسيت	-	+++	-	++++ b	++++	-
آویشن ۳٪ روز بیستم	لنفوسيت	-	+++	-	++++ ab	+++ a	-
شاهد روز بیستم	لنفوسيت	-	+++	-	+++	+++	+

a, b: حروف غیریکسان نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار در مقایسه با گروه شاهد است ($P < 0.05$).
ab: حروف غیریکسان نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار در مقایسه با گروه آویشن.



شکل ۳- نمای ریزبینی از مقطع عرضی پوست موش در روز هشتم

گروه شاهد (A)، گروه درمانی با پماد ۱/۵٪ اسانس آویشن (B)، گروه درمانی با پماد ۳٪ اسانس آویشن (C) تعداد سلول‌های ایمنی در گروه C و B نسبت به گروه A کاهش یافته و در گروه شاهد، روند کاهش پرخونی با سرعت بسیار کنترلی نسبت به گروه‌های درمانی انجام شده است و همچنین اسکار (Sc) و بافت پوششی نوزایشی (Ep) در گروه درمانی با پماد ۳٪ اسانس آویشن تشکیل شده است (رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، بزرگنمایی $\times 40$).



شکل ۴- نمای ریزبینی از مقطع عرضی پوست موش در روز شانزدهم

گروه شاهد (D)، گروه درمانی با پماد ۱/۵٪ اسانس آویشن (E)، گروه درمانی با پماد ۳٪ اسانس آویشن (F). در گروه درمانی با پماد ۳٪ پل بافت پوششی (Ep) کامل و لایه شاخی (Co) هم تشکیل شده است؛ در حالی که این روند در گروه درمانی با پماد ۱/۵٪ با سرعت کنترلی و در گروه شاهد بسیار کنترلی می‌باشد. سلولهای التهابی فیبروبلاست در گروه درمانی با پماد ۳٪ اسانس آویشن نسبت به دو گروه دیگر کاهش یافته است. تراکم باندهای کلاژنی در دو گروه درمانی با اسانس آویشن نسبت به گروه شاهد افزایش یافته است (رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، بزرگنمایی $\times 40$).

مرحله از میزان حضور سلول‌های ایمنی در محل زخم کاسته شده و بر تعداد سلول‌های فیبروبلاست افزوده می‌گردد (Eming *et al.*, 2007). در پژوهش اخیر مشخص شد که کاربرد موضعی اسانس آویشن، به طور معنی‌داری ($P < 0.05$) موجب افزایش مهاجرت فیبروبلاست‌ها و شروع نوزایش بافت پوششی در روزهای هشتم و دوازدهم بعد از القاء عفونت در زخم‌های درمان شده، بهویژه در دوز بالاتر شده است (جدول ۲). مرحله سوم روند التیامی، مرحله بلوغ است که از روز چهاردهم بعد از وقوع زخم آغاز می‌گردد (Eming *et al.*, 2007). طی این مرحله افزایش سنتر کلاژن و سازماندهی دسته‌های کلاژنی، تکامل بافت گرانوله به بافت اسکار و حذف سلول‌های دیگر توسط فرایند آپوپتوز اتفاق خواهد افتاد (Lerman *et al.*, 2003). در پژوهش اخیر مشخص شد که کاربرد موضعی اسانس آویشن، به طور معنی‌داری ($P < 0.05$) موجب افزایش سنتر کلاژن و همچنین افزایش دسته‌های کلاژنی از یکسو و از سوی دیگر کامل شدن پل بافت پوششی در روزهای شانزدهم و بیستم بعد از القاء عفونت در زخم‌های درمان شده، بهویژه در دوز بالاتر شده است (جدول ۲). یافته‌های اخیر، با گزارش‌های دیگر محققان مطابقت دارد (Pieroni *et al.*, 2005). نتایج این مطالعه نشان داد با توجه به یافته‌های آسیب‌شناختی از پژوهش اخیر، پماد حاوی اسانس آویشن موجب کاهش عفونت‌زایی ناشی از مخمر *Candida albicans* و تسریع روند بهبود زخم پوستی عفونی شده و همچنین موجب بروز اثرات مثبت آن در روند التیام زخم‌های تمام ضخامت عفونی با کاهش زمان مرحله التهابی و میزان عفونت بافتی و همچنین افزایش نوزایش عروقی، مهاجرت فیبروبلاستی و نوزایش بافت پوششی می‌باشد که در مجموع استفاده موضعی از پماد ۳٪ انسانس آویشن از لحاظ تأثیرگذاری بر میزان کاهش دوره درمان و روند بهبود زخم نسبت به پماد درمانی $1/5$ ٪ به شکل مطلوب‌تر، و در مقایسه با گروه کنترل بسیار چشمگیر‌تر عمل کرده است. بنابراین با نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان کاربرد درمانی اسانس آویشن را در درمان زخم‌های عفونی مثبت ارزیابی کرد. در این مطالعه بهدلیل محدودیت در

در طی روند ترمیم، فرایندهای مشخص و هماهنگی از قبیل بازسازی، مهاجرت و تکثیر سلول‌های پارانشیمی و سلول‌های بافت همبند و ساخت دوباره بافت همبند و رگ‌زایی انجام می‌شود. با توجه به اینکه مراحل متعددی در ترمیم زخم شامل: انعقاد، التهاب، گرانولاسیون، فیبروبلازی، کلاژنیزیس، انقباض زخم و اپیتلیزاسیون وجود دارد (Young & Dyson, 1990). براساس مطالعات فارماکولوژیکی، فعالیت تسریع‌کنندگی بسیاری از گیاهان دارویی حاوی مواد و ترکیب‌های طبیعی از جمله تانن‌ها، ترپن‌وئیدها و فلاونوئیدها که توانایی ایجاد افزایش سرعت بهبود زخم ناشی از حادث Cushnie و برخی بیماری‌ها را دارند به اثبات رسیده است (Cushnie & Lamb, 2011). فرایند بهبود زخم، در انواع مختلف زخم پیچیده بوده و با توجه به همپوشانی فیزیولوژیکی، به سه مرحله التهاب، تکثیر بافت همبند و بازسازی تقسیم می‌گردد. وقوع دقیق تمام این مراحل در زمان مناسب، باعث می‌شود فرایند بازسازی و بهبود زخم به صورت عادی امکان‌پذیر شود. حال افزایش سرعت هر یک از این مراحل یادشده ترمیم، موجب تسریع کلی زمان بهبودی زخم می‌شود (Beldon, 2010). از سوی دیگر، در اوایل مرحله اول روند التیامی، و با کاهش میزان عوامل عفونتزا و آماس زخم، نوزایش عروقی برای تشکیل بافت‌های جوان آغاز می‌گردد (Lerman *et al.*, 2003; Eming *et al.*, 2007). در پژوهش اخیر مشخص شد که به طور معنی‌داری ($P < 0.05$) از شدت آماس و حضور سلول‌های ایمنی چند هسته‌ای (نوتروفیلها) در زخم‌های عفونی درمان شده توسط پماد حاوی اسانس آویشن، بهویژه در دوز بالاتر، کاسته شده است. مرحله دوم روند التیامی، مرحله پرولیفراسیون سلول‌های بافت همبندی می‌باشد که از روز سوم بعد از وقوع زخم آغاز می‌گردد (Eming *et al.*, 2007). زمان این مرحله، نوزایش عروقی، رسوب کلاژن، رشد دوباره بافت پوششی و تشکیل بافت گرانوله، متشکل از سلول‌های اندوتیال، ماکروفاژها، فیبروبلاست‌ها و اجزای ماتریکس خارج سلولی موقع جدید شروع به پوشش دادن و پر کردن سطح زخم برای بازگرداندن یکپارچگی بافت پوست اتفاق می‌افتد. همچنین طی این

2008. Incidence of aerobic bacteria and *Candida albicans* in post-operative wound infections. African Journal of Microbiology Research, 2: 288-291.
- Kumar, V.P., Chauhan, N.S., Harish, P. and Rajani, M., 2006. Search for antibacterial and antifungal agents from selected Indian medicinal plants. Journal of Ethnopharmacology, 107(2): 182-188.
 - Lerman, O.Z., Galiano, R.D., Armour, M., Levine, J.P. and Gurtner, G.C., 2003. Cellular dysfunction in the diabetic fibroblast: impairment in migration, vascular endothelial growth factor production, and response to hypoxia. American Journal of Pathology, 162(1): 303-312.
 - Murray, C.K., Loo, F.L., Hospenthal, D.R., Cancio, L.C., Jones, J.A. and Kim, S.H., 2008. Incidence of systemic fungal infection and related mortality following severe burns. Burns, 34(8): 1108-1112.
 - Naseri, M., 2004. Development of traditional medicin and WHO Guideline. Journal of Daneshvar Pezeshki, 11(52): 53-68.
 - Ozay, Y., Ozyurt, S., Guzel, S., Cimbiz, A., Olgun, E.G. and Cayci, M.K., 2010. Effects of *Equisetum arvense* ointment on dermal wound healing in rats. Wounds, 22(10): 261-267.
 - Pieroni, A., Muenz, H., Akbulut, M., Bašer, K.H.C. and Durmuşkahya, C., 2005. Traditional phytotherapy and trans-cultural pharmacy among Turkish migrants living in Cologne, Germany. Journal of Ethnopharmacology, 102(1): 69-88.
 - Raja, R.D.A., Jeeva, S., Prakash, J.W., Antonisamy, J.M. and Irudayaraj, V., 2011. Antibacterial activity of selected ethnomedicinal plants from South India. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 4(5): 375-378.
 - Sullivan, D.J., Moran, G.P., Pinjon, E., Al-Mosaid, A., Stokes, C. and Vaughan, C., 2004. Comparison of the epidemiology, drug resistance mechanisms, and virulence of *Candida dubliniensis* and *Candida albicans*. FEMS Yeast Research, 4(4-5): 369-376.
 - Sasidharan, S., Nilawaty, R., Xavier, R., Latha, L.Y. and Amala, R., 2010. Wound healing potential of *Elaeis guineensis* Jacq leaves in an infected albino rat model. Molecules, 15(5): 3186-3199.
 - Tyagi, A.K. and Malik, A., 2011. Antimicrobial potential and chemical composition of *Mentha piperita* oil in liquid and vapour phase against food spoiling microorganisms. Food Control, 22(11): 1707-1714.
 - Young, S.R. and Dyson, M., 1990. Effect of therapeutic ultrasound on healing of full thickness excised skin lesions. Ultrasonic, 28: 175-180.
 - Zargari, A., 1995. Medicinal Plant (Vol. 1). Tehran Univercity, Tehran, 976p.

رنگ‌آمیزی اختصاصی بافت، بررسی بافت‌شناسی فقط با استفاده از رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین اوزین انجام شده، و پیشنهاد می‌شود که در مطالعات آینده رنگ‌آمیزی‌های اختصاصی شامل رنگ‌آمیزی ماسون تری کروم برای بررسی رسوب کلازن و رنگ‌آمیزی ایمونوپیراکسید از جهت بررسی عروق نیز انجام شود تا بتوان بررسی بافت‌شناسی کامل تری انجام داد. همچنین یکی از روش‌های بررسی زخم، علاوه بر اندازه‌گیری قطر زخم، بررسی قدرت کششی سطحی زخم توسط دستگاه تانسیومتر می‌باشد که در این مطالعه، به دلیل عدم دسترسی به این دستگاه این اقدام انجام نشد.

سپاسگزاری

بدینوسیله نویسندهان مقاله مراتب قدردانی و تشکر خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه که در اجرای این تحقیق ما را همراهی کردند، ابراز می‌دارند.

منابع مورد استفاده

- Agarwal, V., Lal, P. and Pruthi, V., 2010. Effect of plant oils on *Candida albicans*. Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 43(5): 447-451.
- Beldon, P., 2010. Basic science of wound healing. Surgery (Oxford), 28(9): 409-412.
- Brown, A.E., 2009. Benson's Microbiological Applications: Laboratory Manual in General Microbiology, Short Version: McGraw Hill, 480p.
- Conforti, F., Sosa, S., Marrelli, M., Menichini, F., Statti, G.A. and Uzunov, D., 2008. In vivo anti-inflammatory and in vitro antioxidant activities of Mediterranean dietary plants. Journal of Ethnopharmacology, 116(1): 144-151.
- Cushnie, T.P.T. and Lamb, A.J., 2011. Recent advances in understanding the antibacterial properties of flavonoids. International Journal of Antimicrobial Agents, 38(2): 99-107.
- Eming, S.A., Werner, S., Bugnon, P., Wickenhauser, C., Siewe, L. and Utermöhlen, O., 2007. Accelerated wound closure in mice deficient for interleukin-10. American Journal of Pathology, 170(1): 188-202.
- Farahpour, M. and Habibi, M., 2012. Evaluation of the wound healing activity of an ethanolic extract of *Ceylon cinnamon* in mice. Veterinárí medicína, 57(1): 53-57.
- Isibor, J.O., Oseni, A., Eyaufe, A. and Ahmadu, T.,

The local effects of *Thymus vulgaris* L. essential oil on healing the cutaneous incisional wounds in the case of rats infected with *Candida albicans* (a histopathological study)

A. Rahmanpour^{1*}, M. Nasiri² and M.R. Farahpour³

1*- Corresponding author, Msc of Microbiology, Liver & Digestive Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran, E-mail: rahmanpour_arvin@yahoo.com

2- Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Urmia, Iran

3- Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Urmia, Iran

April: May 2015

Revised: September 2015

Accepted: September 2015

Abstract

Wound infections caused by *Candida albicans*, have substantially grown in recent years. The lack of easy access, medicine costliness, side effects, and development of the pharmaceutical resistance resulted in using biological materials as an alternative. *Thymus vulgaris* L. is one of the antimicrobial properties of biological materials, whose effectiveness has been proved from a long time ago. This study analyzed the local effects of *Thymus* essential oil on healing the cutaneous incisional wounds in the case of rats infected with *Candida albicans*. In this experiment, carried out on 36 Wistar male rats with an average weight of 210 ± 10 g, after general anesthesia and making a 1.5×1.5 cm square wound between the shoulder area, 0.5 ml. of the yeast suspension containing 1.5×10^6 CFU/ml *Candida albicans* was applied to the wound(s). Then, in three groups of 12 (to control with 3 percent and 1.5 percent local ointments), the rats were randomly distributed into 4 subgroups of 3 animals (each group was sampled on different days). During the experiment, in order to assess the histopathology and yeast count, at the end of 4th, 8th, 12th, 16th, and 20th days, samples were taken by a special biopsy punch. According to the result drawn from this experiment, and regarding the effects of 3 percent and 1.5 percent ointments, there was not a conspicuous dissimilarity in reducing the *Candida albicans* yeast count, but in comparison with the control group, this dissimilarity was noticeably meaningful ($P<0.001$). Moreover, according to the histopathological studies, both ointments showed significantly remarkable results in terms of reduced blood vessels and mononuclear cells, increased fibroblast cells, and increased number of macrophages in comparison with the control group. Overall, since the 3 percent ointment had achievements similar to the 1.5 percent one, and mostly well-achieved as compared with the other (two) groups, it (the 3 percent ointment) would be the final choice to local usage in the process of healing and reducing of *Candida albicans* infections.

Keywords: *Thymus* essential oil, *Candida albicans*, wound healing, rats.