

گزارش جدید خانواده‌ی (Acari: Oribatida) از ایران

نعمی عظیمی^۱، پریسا لطف‌الهی^{۲*}، داود شیردل^۳ و علیرضا خلیل‌آریا^۴

۱-دانشجوی دکتری، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ایران

۲- نویسنده‌ی مسئول مکاتبات، استادیار، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده‌ی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی.

پست الکترونیکی: prslotfollahy@yahoo.com

۳- استادیار، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

۴- استادیار، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

تاریخ دریافت: ۹۴/۱۱/۲۰ تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۶/۳۰

چکیده

طی مطالعه‌ی فونستیک کنه‌های اریباتید (Acari: Oribatida) خاک پای درختان ممرز، *Carpinus betulus* L. (Betulaceae) روسنای گرمناب در جنگل‌های ارسباران، شمال شرق استان آذربایجان شرقی، ایران، در اواسط مرداد ۱۳۹۲، گونه‌ی *Pantelozetes paolii* (Oudemans, 1913) از خانواده‌ی Oribellidae Kunst, 1971 جمع‌آوری و شناسایی گردید که این اولین گزارش از کنه‌های این خانواده برای فون کنه‌های ایران می‌باشد. در این گونه پرودورسوم دارای کوستولای باریک، بلند، نایپوسته و کمی همگرا است که موهای لاملایی در انتهای خطوط کوستولایی واقع شده‌اند. سنسیلوس شانه‌وش یک طرفه با پنج تا شش انشعاب نسبتاً بلند و پاها تک‌ناخنی می‌باشند. به علاوه در این مطالعه، کلیدی برای شناسایی تمامی گونه‌های توصیف شده از زیرجنس *Pantelozetes* P. (P.) *unitjumenienesis* Ermilov, Salavatulin & Tolstikov, 2015 در دنیا شامل (Pantelozetes) Grandjean, 1953 P. (P.) *tianchanicus* P. (P.) *berlesei* Fujikawa, 1979 *bayartogtokhi* Ermilov, Salavatulin & Tolstikov, 2015 P. (P.) *serratus* Wang & Cui, 1996 و P. (P.) *paolii* (Oudemans, 1913) Rakhimbajeva, 1995 ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی: آذربایجان شرقی، گزارش جدید، فون، ایران.

مقدمه

کنه‌های اریباتید خانواده‌ی Oribellidae Kunst, 1971 از بالکوهورت Desmonomatides، کوهورت اریباتیدهای عالی (Brachypylina) و بالاخانواده‌ی (Oribelloidea)، دارای شش جنس و ۳۹ گونه می‌باشند (Subias, 2016). این کنه‌ها از

خاک، خاک برگ و خزه در نواحی هولارکتیک و شرق یافت شده و رژیم قارچ‌خواری دارند (Smith *et al.*, 2011). بدنبال آن‌ها در سطح پشتی محدب و به میزان کمی اسکلروتینی شده، کلیسیرها کشیده و به سمت انتهای باریک شده، پرودورسوم قادر نیست، تنها دارای خطوط لاملایی موازی یا کمی هم‌گرا، دارا

نمونه‌های جمع‌آوری شده در این مطالعه به صورت اسلامید میکروسکوپی در کلکسیون آزمایشگاه کنه‌شناسی گروه گیاه‌پزشکی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز نگه‌داری می‌شوند.

نتایج

طی مطالعه‌ی فونستیک کنه‌های اریباتید جنگل‌های ارسباران در فصل زراعی سال ۱۳۹۲، خانواده‌ی Oribellidae با یک گونه‌ی شناسایی شده با نام *Pantelozetes paolii* (Oudemans, 1913) جمع‌آوری و برای اولین بار به فون ایران معرفی شد. طول بدن ۴۳۹ و عرض آن ۲۲۸ میکرومتر؛ به رنگ زرد روشن؛ خرطوم مثلثی و در انتهای به صورت برآمده؛ حاشیه‌های پهلوی خرطوم دارای پنج دندانه در هر طرف، موهای خرطومی (ro) بلندتر از موهای لاملاسی (le)، موهای لاملاسی صاف و بلندتر از فاصله‌ی بین آن‌ها، موهای بین لاملاسی (in) مویی شکل با تعدادی مویچه‌های ریز، ضخیم‌تر و کوتاه‌تر از موهای لاملاسی؛ موهای برون حفره‌ای (ex) نخی‌شکل و مویچه‌دار، پرودورسوم دارای کوستولای باریک، بلند، ناپیوسته و کمی هم‌گرا که موهای لاملاسی در انتهای خطوط کوستولایی واقع شده‌اند، سنسیلوس (ss) شانه‌وش یک طرفه با پنج تا شش انشعاب نسبتاً بلند، شیار دورسوسجوگال مستقیم، نوتوگاستر تخم مرغی‌شکل و دارای ۱۰ جفت موی صاف؛ صفحه‌های جنسی و مخرجي (g)، بزرگ و نزدیک هم، دارای شش جفت موی جنسی (an) یک جفت کنار جنسی (ag)، دو جفت موی مخرجي (ad)، منفذ *iad* در حاشیه‌ی کناری جلویی صفحه‌ی مخرجي واقع شده، فرمول موهای اپیمری (1a-4c) ۱، ۳، ۳؛ موهای اپیمری در اندازه‌ی متوسط و صاف، آپودم چهارم با یک خط کیتینی مشخص، پاها تک ناخن.

مناطق انتشار: هولارکتیک و جاوه (Subias, 2016). مشخصات جمع‌آوری: تعداد ۱۱ نمونه از بقایای گیاهی پای درختان مرز با نام علمی *Carpinus betulus L.* (Betulaceae) جنگل‌های ارسباران، روزتای

فاقد توتوریم، نوتوگاستر دارای ۱۰ جفت مو، اپیمرهای سوم و چهارم مجزا از یکدیگر و مشخص، دارای چهار جفت مو روی صفحه‌ی شکمی، صفحه‌های جنسی با شش جفت مو و صفحه‌ی مخرجي دارای دو جفت مو می‌باشد (Kunst, 1971).

از بین جنس‌های این خانواده، جنس *Xenillus paolii* 1953 با گونه‌ی تیپ *Pantelozetes Subias, 1913* برای اولین بار پایه‌گذاری شد (Grandjean, 1913). از این جنس، زیرجنس *Pantelozetes* (Pantelozetes) با صفات زیر از دو زیر جنس دیگر آن قابل تشخیص می‌باشد:

روستروم دندانه‌دار، پرودرسوم با کوستولای کمی هم‌گرا و کوتاه‌تر از نصف طول پرودرسوم؛ شیار دورسوسجوگال مستقیم؛ نوتوگاستر با ۱۰ جفت مو؛ دارای دو جفت موی مخرجي، سه جفت کنار مخرجي، شش جفت جنسی و یک جفت کنار جنسی؛ دارای برآمدگی پیش‌رانی‌سینه‌ای سوم؛ فرمول موهای اپیمری ۳، ۳، ۱، ۳ (Fujikawa, 1979) تک ناخن‌های سه‌ناخن‌های ناهم‌شکل.


در این مطالعه، طی جمع‌آوری و شناسایی کنه‌های خاک‌زی زیراسته‌ی نهان استیگمایان (Oribatida) جنگل‌های ارسباران در استان آذربایجان شرقی، با شناسایی گونه (Oudemans, 1913) *Pantelozetes paolii* خانواده‌ی Oribellidae برای اولین بار به فون کنه‌های ایران معرفی می‌شود.

مواد و روش‌ها

به منظور بررسی فون کنه‌های اریباتید خاک‌زی منطقه‌ی آینالو در جنگل‌های ارسباران در مرداد ماه سال ۱۳۹۲، از بقایای گیاهی پوسیده و خاک پای درختان جنگلی در نقاط مختلف این منطقه نمونه‌برداری به عمل آمد. کنه‌های موجود در نمونه‌ها با استفاده از قیف برزل جداسازی، در محلول اودمن نگه‌داری، با محلول نسبیت شفاف‌سازی و با کمک آمیخته‌ی هویر اسلامید میکروسکوپی دائمی از آن‌ها تهیه گردید (Krantz & Walter, 2009). نمونه‌ها با استفاده از کلیدهای معتبر و موجود مورد شناسایی قرار گرفت که در این مقاله بخش کوچکی از این مطالعه آورده می‌شود.

۱۵۲۰ متر از سطح دریا) در ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ جمع آوری گردید.

گرمناب منطقه‌ی آینالو (طول جغرافیایی ۴۶ درجه و ۴۷ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۸ درجه و ۵۸ دقیقه و ارتفاع



شکل ۱- نمای سطح پشتی (سمت چپ) و سطح شکمی (سمت راست) در *Pantelozetes paolii*

تا کنون شش گونه از زیرجنس *Pantelozetes* (*Pantelozetes*) توصیف شده که کلید شناسایی زیر برای تشخیص آنها پیشنهاد می‌شود:

- ۱- پاهای سهناخنه‌ی ناهم‌شکل
- ۲- پاهای تک‌ناخنه
- ۳- بدن با تزئینات حفره حفره (foveolate) و خطی (Lineolate)، کوستولا کاملاً مشخص و رشدیافته

Pantelozetes (P.) unitjumenienensis Ermilov, Salavatulin & Tolstikov, 2015

- بدن بدون تزئینات حفره حفره و خطی، کوستولا ضعیف

Pantelozetes (P.) bayartogtokhi Ermilov, Salavatulin & Tolstikov, 2015

Pantelozetes (P.) berlesei Fujikawa, 1979

- کوستولا ممتد و پیوسته

- ۴- کوستولا نایپوسته و فقط در طرفین وجود دارد

۴- کوستولا کوتاه، طوری که انتهای آن به محل اتصال موهای لاملایی نمی‌رسد

Pantelozetes (P.) tianchanicus Rakhimbajeva, 1995

۵ کوستولا بلند

Pantelozetes (P.) paolii (Oudemans, 1913) .

Pantelozetes (P.) serratus Wang & Cui, 1996.

۵- موهای لاملایی در انتهای کوستولاها قرار گرفته اند

- موهای لاملایی در بین کوستولاها واقع شده اند

منابع

- Smith, I.M., Lindquist, E.E. & Behan-Pelletier, V.M. (2011) Mites (Acari) of the Montane Cordillera Ecozone. pp. 193-268; in Scudder, G.G.E. & Smith, I.M. (Eds) Assessment of species diversity in the Montane Cordillera Ecozone. Available from: <http://www.royalbcmuseum.bc.ca/assets/Montane-Cordillera-Ecozone.pdf> (accessed February 2016).
- Subias, L.S., 2016. Listado sistemático, sinonímico y biogeográfico de los acaros oribátidos (Acariformes, Oribatida) del mundo (exento fosiles). Available http://escalera.bio.ucm.es/usuarios/bba/cont/docs/RO_1.pdf (Accessed in February 2016). First version published in *Graellsia* (2004), 60 (special issue): 593 p.
- Wang, H. and Cui, Y., 1996. Acari: Oribatida. In: Huang, F.S. (Ed.), Insects of the Karakorum-Kunlun Mountains. Science Press, Beijing, 321–328.
- Ermilov, S. G., Salavatulin, V. M and Tolstikov, A. V., 2015. A new species of *Pantelozetes* (Acari, Oribatida, Thyrisomidae) from environs of lake Baikal (Russia). *Systematic & Applied Acarology*, 20 (1): 51–60.
- Fujikawa, T., 1979. Revision of the family Banksinomidae (Acari, Oribatei). *Acarologia*, 20 (3): 433–467.
- Krantz, G.W. and Walter, D.E., 2009. A manual of acarology. Texas Technology University Press, 807 pp.
- Kunst, M., 1971. Key to the fauna of Czechoslovakia – Supercohort Oribatei. *Ceskoslovenska Akademie Ved*, 531-580.
- Oudemans, A.C., 1913. *Acarologische Aanteekeningen*. XLVII. *Entomologische Berichte*, 3: 372–376.
- Rakhimbajeva, A.K., 1995. New species, *Pantelozetes tianchanicus* sp.n. Rakhimbajeva (Oribatei,