

کلید شناسائی نیم سخت بالپوشان ایران (۱۴)

خانواده NAUCORIDAE FALLEN 1814

نگارش:

محمد صفوی<sup>۱</sup>

حشرات این خانواده دارای اندازه‌های متوسطه بدنی پهن و تخت و بیضی شکل و پوست صاف می‌باشد، سر عرضی کوتاه و به طرف جلو خم شده، حاشیه خارجی چشمها خسیدگی منظمی را با سر تشکیل می‌دهند بطوریکه حاشیه چشمها در امتداد حاشیه سر می‌باشد. خرطوم کوتاه سه بندی شاخص در زیر سر مخفی واژ سرکوتاه تر می‌باشد سر بدون چشم‌ساده، Membrane بالپوشاهای بدون رگ و حشره قادر لوله تنفسی است، پاهای بلوشی‌شکاری و دارای ران بسیار پهن ساق پای جلویی کوتاه و خمیده و کاملاً "دربرابر" حاشیه جلویی ران قرار می‌گیرد پنجه‌های آن دارای یک بند می‌باشد درحالیکه پنجه‌های پای میانی و عقبی دارای دو بند است پاهای میانی و عقبی پاروئی شکل و ساق پای میانی و عقبی خاردار می‌باشد.

بیولوژی - حشرات کامل زمستان را در بین بقایای گیاهان آبزی می‌گذرانند تخم گذاری در بهار شروع می‌شود و حشره تخمها خود را در بین بافت‌های نرم گیاهان آبزی می‌گذارد.

با وجود یکمیای این حشره مانند سایر سن‌های آبزی برای شنا تغییر شکل نداده است ولی حشره روی شکم با سرعت نسبتاً خوبی شنا می‌کند و در بین علف‌های آبزی جو پیارها که دارای آبهای نسبتاً راک است مجتمع می‌شوند هنگام تنفس انتهای قسمت پشتی بدن را به سطح آب می‌رسانند.

اغلب گونه‌ها دارای چند شکلی بال (Polymorphisme alaire)

۱ - دکتر محمد صفوی، انجمن حشره‌شناسان ایران، تهران، صندوق پستی ۱۴۵۴ کد پستی ۱۹۳۹۵.

می‌باشد و با وجود پکه بالهای حشرات اغلب کامل است ولی به خاطر اینکه ماهیچه‌های پرواز کم و بیش از بین رفته اند تاکنون پرواز آنها دیده نشده و بنظر می‌رسد که مهاجرت حشرات در شب بوسیله راه رفتان انجام می‌گیرد. هنگامیکه این حشرات را شکار کنیم محتوای *Ampoule rectale* خود را مانند فواره خالی می‌کنند. حشرات دارای اعضاء تولید صدا می‌باشند و از خود صدا در می‌آورند.

**عضسو tympanale** در حشرات وجود دارد. لاروها و حشرات کامل دارای غدد بوئی بوده دارای پنج سن لاروی می‌باشند. تغذیه لاروها از حشرات و یا حلزون‌های آبرزی می‌باشد و گاهی اوقات از شیره کیاهی آلکهای سبز تغذیه می‌کنند که در این صورت روده آنها دارای بقایای کلروفیل می‌باشد.

#### زیرخانواده' NAUCORINAE Stål 1876

\* لب بالادراس گرد، گاره جلوئی پیش‌گرده در وسط راست، حاشیه داخلی چشمها به طرف جلو مت مرکز است، *Guia* نسبتاً بلند و دارای *Carina*، زیرسینه میانی و عقبی (*Meso, Metasternum*) بدون *Carina* و یا به زحمت دارای کارن می‌باشد، حشره نر بدون تقارن و کاملاً "رشد یافته است. از جنس *N. cimicoides* Geoffray 1762 از پندرانزی در تاریخ 1965. 9.5. جمع آوری شده است.

Naucoris cimicoides L. - طول حشره در حدود ۱۲-۱۵ میلیمتر می‌باشد، گاره پیش‌گرده کمی برآمده و سپرچه درخشان، رنگ زمینه آن زرد رنگ است که در حشرات زنده کمی آبی رنگ بمنظر می‌رسد، در روی سرت نقاط قهوه‌ای رنگی وجود دارد که بعضی از آنها دو خط طولی موازی میانی را تشکیل می‌دهند و هر کدام در روی پشت سر ضخیم تر می‌شوند.

در طرفین پیش‌گرده دولکه قهوه‌ای که توسط یک نوار میانی تقریباً " بشکل x از یکدیگر جدا می‌شوند و نگ سپرچه زرد نخودی بالپوش‌ها قهوه‌ای زیتونی غیر شفاف و دارای نقاط بسیار ریز است. *Membrane* از انتهای شکم تجاوز می‌کند و بطور غیر مشخص از *Corium* جدا شده است.

Journal of Entomological Society of Iran  
March 1990, Vol. 10 (1,2)

CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES HEMIPTERES,  
HETEROPTERES DE L'IRAN(XIV)  
\*  
Par : M.SAFAVI

Les Punaises de la famille NAUCORIDAE sont représentées  
Par une seule espèce *Naucoris cimicoides* L., en Iran.

L'auteur décrit la biologie sommaire de cette espèce  
qui s'est trouvée à Bandar Anzali a 9.5.1965.

REFERENCES

POISSON, R., 1957- Faune de France , Heteroptères  
aquatiques, 262 pages, avec 185 figures, Paris, Librairie  
de la Faculté des Sciences

---

\*- Dr. M.safavi, Entomological Society of Iran , P.O.Box  
1454, Tehran19395,Iran.