

”نهال و بذر“
جلد ۱۶، شماره ۴، اسفند ۱۳۷۹

بررسی روش‌های مختلف ارزیابی مقاومت به گسترش
در سنبله‌های گندم*

Study of Different Assessment Methods of Resistance to
Fusarium graminearum Spread in Wheat Spikes

محمد عابدینی اصفهانی، عباس سعیدی، قاسم کریم‌زاده و عزیزالله علیزاده

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

تاریخ دریافت: ۱۳۷۹/۲/۸

چکیده

عابدینی اصفهانی، م.، سعیدی، ع.، کریم‌زاده، ق. و علیزاده، ع. ۱۳۷۹. بررسی روش‌های مختلف ارزیابی مقاومت به گسترش *Fusarium graminearum* در سنبله‌های گندم. *نهال و بذر*: ۱۶: ۴۸۱-۴۹۴.

برای بررسی روش‌های مختلف ارزیابی مقاومت به گسترش فوزاریوم سنبله، واکنش ۲۸ ژنوتیپ گندم بهاره (*Triticum aestivum* L.) به دو جدایه *F. graminearum* در شرایط گلخانه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت. روش مایه‌زنی، نقطه‌ای و زمان آن اوایل گل دهی بود. داده‌ها برای مقاومت به گسترش فوزاریوم در داخل سنبله به سه روش نرخ نهایی آلودگی اندازه‌گیری شده در ۲۸ روز بعد از مایه‌زنی بر اساس مقیاس ۵-۰، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (Area Under Disease Progress Curve= AUDPC) بر اساس ارزیابی نرخ آلودگی ۲۱، ۱۴، ۷ و ۲۸ روز بعد از مایه‌زنی و درصد آلودگی محور سنبله (درصد محورهای سنبله آلوده شده به گل سنبله‌های مایه‌زنی شده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تنوع بین ژنوتیپ‌ها برای هر سه روش ارزیابی، معنی‌دار شد. داده‌های حاصله از سه روش ارزیابی، همبستگی مثبت و معنی‌داری نشان داد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که هر سه روش ارزیابی لزوماً یک فرآیند اساسی گسترش بیماری را در سنبله اندازه‌گیری می‌کند. از مشابهت نتایج حاصله از ارزیابی بر اساس تعداد سنبلچه‌های آلوده (دو روش اول ارزیابی) و محور سنبله (روش سوم) می‌توان نتیجه گرفت که محور سنبله به عنوان مهم‌ترین سد دفاعی گیاه در مقابل گسترش فوزاریوم سنبله می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: گندم (*Triticum aestivum* L.), فوزاریوم سنبله (*Fusarium graminearum*), مقاومت، روش‌های ارزیابی.

* این مقاله بر اساس نتایج به دست آمده از اجرای طرح تحقیقاتی شماره ۷۸۱۸۷-۱۲-۱۰۰ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تنظیم گردیده و قسمتی از بایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول که به گروه اصلاح باتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ارائه شده است.

بیمارگر و هر کدام از فاکتورهای مقاومت میزان قویاً تحت تأثیر شرایط محیطی و مرحله رشدی میزان قرار می‌گیرند و این عوامل تجزیه و تحلیل مقاومت را با پیچیدگی بیشتری مواجه ساخته است (Mesterhazy, 1995; Miedaner, 1997).

اجزاء مکانیسم‌های فعال مقاومت عبارتند از:
 ۱) مقاومت به آلووده شده اولیه (Schroeder and Christensen, 1963)
 ۲) مقاومت به گسترش قارچ در بافت‌های میزان (Schroeder and Christensen, 1963)
 ۳) مقاومت به مایکوتکسین‌ها (1985; Snijders and Perkowski, 1990)
 ۴) تحمل (Miller et al., 1995)
 ۵) مقاومت به آلووده شده دانه (Mesterhazy, 1995). دو جزء اول یعنی مقاومت به آلووده شدن اولیه یا ممانعت از نفوذ قارچ و مقاومت به گسترش قارچ بعد از نفوذ در درون سنبله، بیشتر به مرحله رشدی میزان بستگی دارند، و گزارش شده که از نظر ژنتیکی با هم ارتباطی ندارند (Procunier et al., 1998). مهپاشی مایه قارچ بر روی سنبله و ارزیابی تعداد سنبلاچه‌های آلووده، امکان ارزیابی این دو جزء مقاومت را به صورت توأم فراهم می‌آورد، ولی در مایه‌زنی یکی از گلچه‌های سنبله یا مایه‌زنی نقطه‌ای، فقط جزء دوم ارزیابی می‌شود. در بعضی آزمایش‌ها، بین داده‌های حاصله از دو نوع مایه‌زنی، همبستگی معنی‌داری وجود نداشته که این نشان دهنده بیان‌های مختلف ژنتیکی در پاسخ به این دو روش مایه‌زنی می‌باشد (Buerstmayr et al., 1999; Schroeder and Christensen, 1963).

مقدمه

بیماری فوزاریومی سنبله یا اسکب (Fusarium head blight or scab) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های گندم و سایر غلات دانه‌ریز، در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب است که گونه‌های متعددی از فوزاریوم (*Fusarium spp.*) از زمان ظهور سنبله تا رسیدگی، سنبله‌ها را آلووده کرده و باعث کاهش کمی و کیفی محصول می‌شود (1997; Johnes and Mirocha, 1999). (Chen et al., 1997; Miedaner, 1997). استفاده از قارچ‌کش‌ها و عملیات زراعی فقط میزان خسارت را کاهش می‌دهد و نمی‌تواند از تمامی آسیب‌های کمی و کیفی جلوگیری کند (Parson, 1994; Bowden and Leslie, 1997). استفاده از ارقام مقاوم همراه با عملیات مدیریت زراعی مناسب، بهترین و مؤثرترین روش کنترل بیماری شناسایی شده است (Parry et al., 1995; McMullen et al., 1997). پیشرفت در اصلاح ارقام مقاوم به اسکب در گندم کند بوده است. از دلایل آن می‌توان نبود مقاومت کامل، پیچیدگی روابط بیمارگر- میزان- محیط، ناشناخته بودن اساس ژنتیکی مقاومت و نبود روشی ارزان، سریع و مطمئن را برای ارزیابی آن نام برد (Miedaner, 1997; Walsh et al., 1998).

مکانیسم‌های مقاومت به بیماری فوزاریوم سنبله پیچیده بود و تا به حال به طور کامل شناخته نشده‌اند. عواملی وجود دارد که حساسیت را کاهش می‌دهند، از آن جمله عوامل فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی هستند که بیان‌کننده واکنش‌های دفاعی فعل و غیرفعال به وسیله میزان می‌باشند.

استفاده، بخشی از لاین‌ها انتخابی بخش تحقیقات غلات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج بود. بذر هر کدام از ژنوتیپ‌ها توسط محلول هیپوکلریت سدیم ۲٪ / ۵٪ برابر رقیق شده واکس تجاری (%) به مدت ۵ دقیقه ضدغونی و بعد سه بار (هر بار یک دقیقه) با آب مقطр استریل شسته شدند. برای جوانهزنی، بذرهای ضدغونی شده در داخل ظروف پتری حاوی کاغذ صافی، به مدت سه روز در ۲۵°C در انکورباتور قرار داده شد. شرایط نوری برای جوانهزنی ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی بود. تعداد ۴-۵ بذر جوانه زده در گلدان‌های پلاستیکی به قطر و ارتفاع ۱۵cm کشت شد. خاک گلدان‌ها از مخلوط خاک ماسه: خاک برگ: کود دامی پوسیده به نسبت ۲:۱:۱:۱ تهیه شد. از هر ژنوتیپ ۶ گلدان [۳ گلدان (تکرار) برای هر جدایه] کاشته و گلدان‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، در روی سکوهای گلخانه قرار داده شدند. کشت گیاهان در ۲۰ بهمن ۱۳۷۷ در گلخانه فوزاریوم بخش تحقیقات غلات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. دمای گلخانه در مدت رشد گیاهان روی ۲۰°C تنظیم شده بود و شرایط نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی بود. نور گلخانه به صورت طبیعی و تکمیلی تأمین می‌شد و تأثیراتی بر رشد نداشت. تأثیراتی بر رشد نوری تقریباً برابر با ۱۶ هزار لوکس بود. مرحله داشت شامل آبیاری، کوددهی و سمپاشی به طور منظم و معمول انجام شد. کود مصرف شده، اوره بود که به میزان یک گرم به هر گلدان داده شد. این میزان کود در سه مرحله به فاصله

نظر مقاومت به آلدگی اولیه، در بین ژنوتیپ‌های گندم کمتر گزارش شده و به علت تأثیر پذیری زیاد آن از شرایط محیطی، ماهیت آن به خوبی شناخته نشده است (Bai *et al.*, 1999)، ولی اختلاف ژنوتیپ‌ها از نظر گسترش بیمارگر در درون سنبله، در همه آزمایش‌ها مشاهده شده و به عنوان جزء پایدار مقاومت معرفی شده است که کمتر از جزء اول تحت تأثیر شرایط محیطی قرار می‌گیرد (Buerstmayr *et al.*, 1999).

ملاک‌ها یا روش‌های ارزیابی در مایهزنی نقطه‌ای که تا به حال مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از: ارزیابی ظاهری بر اساس تعداد سنبله‌های آلدود شده (Bai *et al.*, 1999; 1996; Bai and Shaner, 1996), سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) بر اساس چند بار ارزیابی ظاهری (Bai and Shaner, 1996) و ارزیابی تعداد دانه‌های آلدود شده بعد از برداشت (Singh *et al.*, 1995) بوده است. در این تحقیق جهت ارزیابی علاوه بر دو روش اول، روش جدیدی با عنوان درصد آلدگی محور سنبله استفاده شد که از نسبت محورهای سنبله آلدود شده به کل سنبله‌های مایهزنی شده در یک تکرار حاصل می‌شد. و هدف بررسی کارآیی این روش نسبت به دو روش دیگر بود.

مواد و روش‌ها

در این آزمایش عکس العمل ۲۸ ژنوتیپ شامل ۶ رقم تجاری و ۲۲ لاین پیشرفته گندم بهاره (جدول ۱)، در مقابل دو جدایه از قارچ *F. graminearum* ارزیابی شد. لاین‌های مورد

جدول ۱ - ارقام و شجره لاین‌های گندم بهاره (*T. aestivum* L.) مورد استفاده در
ارزیابی مقاومت به فوزاریوم سنبله

Table 1. Cultivars and line pedigrees of spring wheat (*T. aestivum* L.) used
for evaluation of resistance to Fusarium head blight

No	Cultivar/pedigree
1	Tajan
2	Falat
3	Shiroodi
4	Wangshuibai
5	Ghods
6	Pastour
7	Chirya.5//Nanjing 82149/Lira/3/Kite/Glen
8	Sha4/Chill
9	Vpm/Mo535.11.4.8//pen/3/Wea V1/4/Wea V2
10	Kauz CM 67456-4y-1m
11	Kauz//Altra 84/Aos CM 111633-6m
12	Kauz//cinh 77.308//Bau CM 108805-Otopm
13	Milan/Sha4
14	Tan"S"/Pew"S"/Sara CM
15	Kauz*2MNV//Kauz-CRG958-10Y-010m..
16	FURY.KEN-SLM//ALDAN/4/PAT10/ALD//PAT 72300/3Pvn
17	Attila (CM85836-4v-0m-0y-8m-0y-0pz)
18	Jup/Bjy"s"/Ures
19	Tan//BUC/Pvn
20	F6.74/BUN//SIS/3/LIRA
21	Gov/AZ//MUS/3/KEA
22	LFN/1158.57//PRL/3/HAHN
23	OPATA/RAYON//KAUZ
24	THB/KEA/S KAUZ
25	SHA3/SERI//SHA4/LIRA
26	PVN//STAR/LUCO-M
27	Sha3/Seri//G.C.W1/Seri
28	BOW/SERI

خرده‌های کلش از سوسپانسیون، آن را از پارچه ململ استریل عبور داده و به این ترتیب محلول زلال و قهوه‌ای رنگی حاصل شد. شمارش اسپورها توسط لام شمارش (Haemocytometer) انجام شد.

مایهزنی سنبله‌ها در اوایل مرحله گل‌دهی، زمانی که بساک‌ها از وسط سنبله شروع به بیرون آمدند می‌کردند [مرحله ۶۰ زادوکس و همکاران (Zadoks *et al.*, 1974)] انجام شد. با استفاده از میکروپیپت (Micropipett) (با ۱۰۰ - ۰ دلت، ۱۰۵ از مایه قارچ در یکی از گلچه‌های وسطی هر سنبله تزریق شد. غلظت مورد استفاده اینوکلوم برای هر دو جدایه 2×10^4 اسپور در هر میلی‌لیتر بود. سنبله‌های مایهزنی شده توسط آبپاش دستی مرطوب و در داخل کیسه پلاستیکی با رطوبت قرار داده شدند. سه روز بعد سنبله‌ها را از کیسه درآورده و گلدان‌های مربوطه در اتافک‌های پلاستیکی با رطوبت نسبی ۷۵ - ۷۰٪ قرار داده شدند. همزمان نبودن گل‌دهی ژنتیک‌های مختلف منجر به مایهزنی آن‌ها در تاریخ‌های متفاوت گردید. به همین دلیل تاریخ مایهزنی سنبله‌ها در روی آن‌ها با استفاده از برچسب کاغذی درج گردید تا بر اساس آن‌ها یادداشت برداری‌ها انجام شود. علائم ظاهری بیماری از نقاط قهوه‌ای تیره یا آبسوخته در روی گلوم‌ها تا زرد شدن سنبله‌ها متغیر بود.

اولین یادداشت برداری از سنبله‌ها ۷ روز بعد از مایهزنی انجام و یادداشت برادری‌های بعدی به فاصله یک هفته و سه‌بار دیگر از هر سنبله انجام شد. در یادداشت برداری میزان گسترش قارچ در

۱۵ روز از هم به گلدان‌ها اضافه شد. مهم‌ترین آفت گلخانه، شته بود که به محض رؤیت آن، سمپاشی با متاسیستوکس-ار (Metasystox-R) با غلظت $1/5$ در هزار به وسیله سمپاش دستی انجام می‌شد. همچنین در صورت مشاهده سفیدک پودری از قارچکش میلگو (Milgoe) با ماده مؤثره Ethirimol (با غلظت $5/0$ در هزار استفاده می‌شد. اثر قارچکش میلگو بر روی فوزاریوم گزارش نشده است (ترابی، م. ۱۳۷۷، مذاکرات شخصی).

جهت تهیه مایه قارچ، دو جدایه تک اسپور شده، به شماره‌های ۱۶۲ و ۱۷۱ قارچ *F. graminearum* از واحد پاتولوژی بخش تحقیقات غلات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تهیه گردید. جدایه ۱۶۲ از رستم کلا مازندران و جدایه ۱۷۱ از کمال آباد گرگان جمع آوری شده بودند. برای تهیه مایه قارچ از روش زیر استفاده شد (مسرا آبادی، ۱۳۷۵؛ Wegner, 1992؛ مقدار ۵ گرم کلش خرد شده گندم را در ارلن‌های 250 ml ریخته و به آن 125 ml آب مقطر اضافه گردید. مجموعه حاصله ۲ بار به فاصله ۲۴ ساعت در 21°C و فشار یک اتمسفر به مدت 30 دقیقه اتوکلاو شد و پس از خنک شدن، یک تکه به قطر 1 cm^2 از محیط کشت همراه با میسلیوم‌های روی آن برداشته و به ارلن‌ها اضافه شد. ارلن‌ها بر روی شبکر چرخشی (Rotary shaker) در 25°C و 120 دور در دقیقه قرار گرفتند. ۴ روز بعد سوسپانسیونی با غلظت تقریبی 10^6 اسپور (ماکروکنیدی) در هر میلی‌لیتر تولید شد. برای جدا کردن میسلیوم و

نتایج

نتیجه تجزیه واریانس برای سه روش ارزیابی گسترش بیماری یعنی نرخ نهایی آلودگی (میانگین امتیاز مربوط به یک گلدان در یادداشت برداری چهارم)، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری یا AUDPC و آلودگی محور سنبله (درصد سنبله هایی که محور سنبله در آنها آلوده شد) برای ژنتیپ های مختلف در شرایط هر دو جدایه (جدول ۲)، بیانگر این بود که در هر دو جدایه بلوک ها معنی دار هستند. معنی دار شدن بلوک ها نشان دهنده اختلاف بین بلوک ها از نظر گسترش آلودگی می باشد. این اختلاف از شرایط رطوبتی و دمایی زیر محفظه های پلاستیکی هر کدام از بلوک ها ناشی شده است و اثر این عوامل را در گسترش شدت بیماری نشان می دهد در مورد جدایه ۱۶۲ میانگین مربعات نرخ نهایی آلودگی در سطح ۱٪ معنی دار شد در صورتی که در مورد دو روش دیگر ارزیابی، میانگین مربعات مربوط به ژنتیپ ها معنی دار نبود. هر سه روش ارزیابی در مورد جدایه ۱۷۱ در سطح ۱٪ معنی دار شد. یعنی با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت که بین ژنتیپ ها از نظر مقاومت به گسترش فوزاریوم در درون سنبله در هر سه روش ارزیابی اختلاف وجود دارد.

از مقایسه ژنتیپ ها با آزمون دانکن (جدول های ۳ و ۴) استنباط می شود که ژنتیپ ها واکنش متفاوت داشته و در شرایط هر دو جدایه ژنتیپ های حساس واکنش مشابه فلات (ژنتیپ شماره ۲) داشته و ژنتیپ های مقاوم برای هر دو جدایه مقاومت شان کمتر از Wangshuibai

درون سنبله از مقیاس ۵ - ۰ ارائه شده توسط Wan et al., (1997) استفاده شد.

میانگین نرخ آلودگی سنبله های مربوط به گلدان در هر چهار بار یادداشت برداری محاسبه شد. میانگین حاصله از یادداشت برداری چهارم به عنوان نرخ نهایی آلودگی در نظر گرفته و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از میانگین های به دست آمده از ۴ بار یادداشت برداری، برای هر تکرار (گلدان) مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری یا AUDPC (Area Under Disease Progress Curve) نیز محاسبه گردید. برای محاسبه AUDPC از فرمول زیر استفاده (Buerstmayr et al., 1999):

$$\text{AUDPC} = \sum_{i=1}^n \{(Y_i + Y_{i-1})/2\}(X_i - X_{i-1})$$

که در آن: Y_i = امتیاز اکتسابی در یادداشت برداری i ام، X_i = روز یادداشت برداری i ام بعد از مایه زنی و n = تعداد یادداشت برداری می باشد. در مورد آلودگی محور سنبله (تعداد سنبله هایی که در آنها محور سنبله آلوده شده تقسیم بر تعداد سنبله های مایه زنی شده ضربدر ۱۰۰) چون داده ها به صورت درصد بودند از تبدیل arcsin استفاده شده (Steel and Torrie, 1980) حاصل از دو روش دیگر از توزیع نرمال تبعیت می کردند مستقیماً در تجزیه های آماری از آنها استفاده شد. تجزیه های آماری شامل تجزیه واریانس، مقایسه میانگین ها و محاسبه همبستگی بین سه روش ارزیابی (نرخ نهایی آلودگی AUDPC و آلودگی محور سنبله) با استفاده از نرم افزار MSTATC انجام شد.

جدول ۲ - میانگین مربعات سه روش ارزیابی گسترش بیماری فوزاریوم سنبله گندم در ارزیابی *F. graminearum* مقاومت ۲۸ ژنوتیپ گندم با دو جدایه

Table 2. Means of squares of three assessment methods of resistance to Fusarium head blight spread in spikes of 28 wheat genotypes with two isolates of *F. graminearum*

S.O.V.	منابع تغیرات	df	درجه آزادی		Final disease rating		AUDPC		آلدگی محور	
			I ₁₆₂	I ₁₇₁	I ₁₆₂	I ₁₇₁	I ₁₆₂	I ₁₇₁	سنبله	پیشرفت بیماری
Block	بلوک	2	1.33**	3.95**	275.29*	1388.12**	1428.04**	227.93*		
Genotype	ژنوتیپ	27	0.39**	1.98**	130.09 ^{ns}	813.44**	282.50 ^{ns}	515.76**		
Error	خطا	53	0.18	0.41	80.55	172.33	218.06	1225.91		

I₁₆₂ and I₁₇₁ = Isolate 161 and isolate 171 respectively.

* Significant at 5% level.

* معنی دار در سطح اختصار ۵٪

** Significant at 1% level.

** معنی دار در سطح ۱٪

ns Not significant.

ns غیرمعنی دار.

بحث

در مورد مقاومت به فوزاریوم سنبله بیش از ۱۰۰ سال است که به وجود تنوع ژنتیکی در بین ژنوتیپ‌های مختلف گندم پی برده شده است و تحقیقات متعدد بعدی وجود این تنوع را به اثبات رسانده‌اند. در این تحقیق تنوع ژنتیکی بالایی از نظر مقاومت به گسترش فوزاریوم در داخل سنبله در بین ژنوتیپ‌های مختلف مشاهده شد. مشخص شد که رقم شناخته شده فلات به عنوان حساس‌ترین و رقم Wangshuibai به عنوان مقاوم‌ترین ژنوتیپ در برابر هر دو جدایه می‌باشد. مقاومت رقم Wangshuibai در این تحقیق با گزارش‌های قبلی محققین در توافق کامل می‌باشد. محدوده نرخ نهایی آلدگی آن بر اساس مقیاس ۵-۰ در تحقیق حاضر ۱/۴۶-۱/۴۲ بود که در بیشتر موارد

(ژنوتیپ شماره ۴) بوده است. میزان آلدگی در شرایط جدایه ۱۶۲ پایین بود و ژنوتیپ‌های حساس نیز میزان آلدگی پایینی را نشان دادند، لذا شرایط برای بروز همه‌گیری مساعد نبوده است. در مورد جدایه ۱۷۱ شرایط محیطی در محل آزمایش مساعد بود و در دو ژنوتیپ (شماره ۲۰ و ۱۷) ۱۰۰٪ آلدگی مشاهده شد.

ضرایب همبستگی بین سه روش ارزیابی (جدول ۵) برای هر دو جدایه در سطح اختصار ۱/۰ معنی دار بود، لذا رابطه نزدیکی بین این سه روش ارزیابی وجود داشته و هر سه روش می‌توانند به یک میزان اختلافات بین ژنوتیپ‌ها را از نظر مقاومت به فوزاریوم سنبله بیان کنند.

جدول ۳- مقایسه میانگین‌ها (\pm SE) در سه روش ارزیابی مقاومت به گسترش بیماری فوزاریوم
سنبله در ۲۸ ژنوتیپ گندم با جدایه ۱۶۲

Table 3. Means (\pm SE) of three assessment methods of resistance to Fusarium

head blight spread in spikes of 28 wheat genotypes with

isolate 162 of *F. graminearum*

شماره ژنوتیپ	نرخ نهایی آلودگی پیشرفت بیماری	سطح زیر منحنی در صد محورهای سنبله آلودگی	Genotype No.	Final disease rating	AUDPC	Rachis infection(%)
2*	2.83 \pm 0.23 a	51.24 \pm 9.00 a		2.83 \pm 0.23 a	51.24 \pm 9.00 a	66.67 \pm 7.39 a
23	2.63 \pm 0.06 ab	49.24 \pm 4.77 ab		2.63 \pm 0.06 ab	49.24 \pm 4.77 ab	66.67 \pm 5.00 ab
19	2.48 \pm 0.10 abc	49.76 \pm 1.63 ab		2.48 \pm 0.10 abc	49.76 \pm 1.63 ab	41.67 \pm 5.00 abc
17	2.42 \pm 0.06 abc	46.49 \pm 1.71 abc		2.42 \pm 0.06 abc	46.49 \pm 1.71 abc	41.67 \pm 5.00 abc
24	2.35 \pm 0.18 abcd	43.41 \pm 1.53 abcd		2.35 \pm 0.18 abcd	43.41 \pm 1.53 abcd	33.33 \pm 9.42 bc
14	2.27 \pm 0.13 abcde	43.27 \pm 4.61 abcd		2.27 \pm 0.13 abcde	43.27 \pm 4.61 abcd	22.22 \pm 6.18 abc
22	2.18 \pm 0.18 abcdef	43.57 \pm 6.90 abcd		2.18 \pm 0.18 abcdef	43.57 \pm 6.90 abcd	33.33 \pm 10.20 bc
18	2.18 \pm 0.22 abcdef	38.91 \pm 4.16 abcd		2.18 \pm 0.22 abcdef	38.91 \pm 4.16 abcd	25.00 \pm 8.83 abc
20	2.18 \pm 0.23 abcdef	46.38 \pm 6.31 abc		2.18 \pm 0.23 abcdef	46.38 \pm 6.31 abc	33.33 \pm 13.38 abc
11	2.17 \pm 0.35 abcdef	36.80 \pm 3.70 abcd		2.17 \pm 0.35 abcdef	36.80 \pm 3.70 abcd	25.00 \pm 13.81 abc
3	2.13 \pm 0.34 bcdefg	38.62 \pm 3.58 abcd		2.13 \pm 0.34 bcdefg	38.62 \pm 3.58 abcd	33.33 \pm 13.38 abc
27	2.12 \pm 0.30 bcdefg	39.26 \pm 6.39 abcd		2.12 \pm 0.30 bcdefg	39.26 \pm 6.39 abcd	41.67 \pm 10.01 abc
10	2.10 \pm 0.08 bcdefg	32.44 \pm 2.17 bcd		2.10 \pm 0.08 bcdefg	32.44 \pm 2.17 bcd	16.67 \pm 5.20 c
28	2.10 \pm 0.24 bcdefg	39.55 \pm 8.01 abcd		2.10 \pm 0.24 bcdefg	39.55 \pm 8.01 abcd	41.67 \pm 5.00 abc
13	2.07 \pm 0.45 bcdefg	38.37 \pm 6.53 abcd		2.07 \pm 0.45 bcdefg	38.37 \pm 6.53 abcd	33.33 \pm 13.38 abc
1	2.03 \pm 0.32 bcdefg	35.70 \pm 7.70 abcd		2.03 \pm 0.32 bcdefg	35.70 \pm 7.70 abcd	16.67 \pm 9.83 c
15	2.02 \pm 0.38 bcdefg	40.80 \pm 6.88 abcd		2.02 \pm 0.38 bcdefg	40.80 \pm 6.88 abcd	22.22 \pm 6.95 bc
5	2.00 \pm 0.14 bcdefg	37.34 \pm 2.78 abcd		2.00 \pm 0.14 bcdefg	37.34 \pm 2.78 abcd	8.33 \pm 5.20 c
16	1.97 \pm 0.31 bcdefg	32.76 \pm 5.30 bcd		1.97 \pm 0.31 bcdefg	32.76 \pm 5.30 bcd	30.56 \pm 11.47 abc
9	1.97 \pm 0.23 bcdefg	43.16 \pm 2.60 abcd		1.97 \pm 0.23 bcdefg	43.16 \pm 2.60 abcd	16.67 \pm 5.20 c
26	1.85 \pm 0.31 cdefgh	37.63 \pm 7.94 abcd		1.85 \pm 0.31 cdefgh	37.63 \pm 7.94 abcd	16.67 \pm 9.33 bc
25	1.83 \pm 0.51 cdefgh	35.75 \pm 5.98 abcd		1.83 \pm 0.51 cdefgh	35.75 \pm 5.98 abcd	25.00 \pm 14.43 abc
8	1.69 \pm 0.38 defgh	34.51 \pm 5.43 abcd		1.69 \pm 0.38 defgh	34.51 \pm 5.43 abcd	11.11 \pm 6.59 c
7	1.67 \pm 0.19 defgh	30.89 \pm 2.63 cd		1.67 \pm 0.19 defgh	30.89 \pm 2.63 cd	19.44 \pm 5.51 bc
12	1.61 \pm 0.14 efgh	29.34 \pm 3.20 cd		1.61 \pm 0.14 efgh	29.34 \pm 3.20 cd	0.00 \pm 0.00 c
21	1.50 \pm 0.29 fgh	29.56 \pm 8.88 cd		1.50 \pm 0.29 fgh	29.56 \pm 8.88 cd	25.00 \pm 8.16 bc
4	1.47 \pm 0.07 gh	28.17 \pm 3.19 d		1.47 \pm 0.07 gh	28.17 \pm 3.19 d	8.33 \pm 4.85 c
6	1.16 \pm 0.17 h	28.58 \pm 4.08 d		1.16 \pm 0.17 h	28.58 \pm 4.08 d	25.00 \pm 8.83 bc

* For name or pedigree of genotypes see Table 1.

میانگین‌هایی که با حروف مشابه در هر ستون مشخص شده‌اند، با یکدیگر اختلاف معنی‌دار ندارند ($P > 0.05$).Means followed by similar letters in each column are not significantly different ($P < 0.05$).

فوزاریوم سنبله از روش مایه‌زنی نقطه‌ای استفاده شد. این روش امکان جدا کردن اجزاء مختلف مقاومت را از هم فراهم می‌آورد. همانطوری که اشاره شد مقاومت به گسترش فوزاریوم درون سنبله به عنوان تیپ عمدۀ مقاومت معرفی شده است و مایه‌زنی یک سنبله‌چه در یک سنبله اختلاف در وقوع بیماری در ژنوتیپ‌های مختلف را محدود کرده و سیستم پیچیده بیماری را جهت بررسی تسهیل می‌کند (Bai *et al.*, 1999). بررسی همبستگی بین میانگین‌های حاصله از سه روش برای هر ژنوتیپ، نشان داد که همبستگی بالا و معنی‌دار بین این روش‌ها وجود دارد (جدول ۵). در ژنوتیپ‌های مقاوم درصد آلدگی محور سنبله پایین بود و این با ناخ نهایی آلدگی آن‌ها در توافق بود. برای مثال رقم مقاوم Wangshuibai که ناخ نهایی آلدگی ۱/۴۲ در برابر جدایه ۱۷۱ داشته، فقط در ۳۳/۸٪ از سنبله‌ها، نفوذ بیمارگر از سنبله‌چه مایه‌زنی شده به محور سنبله اتفاق افتاد در صورتی که در رقم حساس فلات با میانگین ناخ نهایی آلدگی ۴/۶۷، ۱۰۰٪ محورهای سنبله آلدگی را نشان دادند. از همبستگی بالا و مشابهت نتایج حاصله از آن‌ها می‌توان نتیجه گرفت که سه روش ارزیابی مقاومت لزوماً یک فرآیند اساسی گسترش بیماری را در درون سنبله اندازه‌گیری می‌کنند و ساده‌ترین روش برای اخذ اطلاعات، کافی خواهد بود. ناخ نهایی آلدگی بر اساس شمارش تک‌تک سنبله‌چه‌های آلدده به دست می‌آید. سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری نه تنها ناخ نهایی آلدگی را نشان میدهد بلکه سرعت پیشرفت بیماری، در مراحل اولیه آلدگی را نیز

آلودگی محدود به سنبله‌چه مایه‌زنی شده می‌بود. با استفاده از همین مقیاس، آلدگی آن در مرحله خمیری سخت ۱/۵۷ گزارش شده است (Wangshuibai, 1997). رقم Wang *et al.*, 1982 آزمایش‌های مختلف ارزیابی مقاومت، به عنوان مقاوم‌ترین ژنوتیپ گزارش شده است (Wang and Miller, 1988; Liu, 1985; Wang *et al.*, 1997; Lin *et al.*, 1992; عوامل محیطی در شروع و توسعه آلدگی اسکب گندم مهم‌ترین نقش تعیین کننده را دارند (Bai and Shanner, 1994) همچنین پاری و همکاران (Parry *et al.*, 1995) نتیجه گرفته‌اند که علاوه بر مقاومت میزان برخی از عوامل دیگر نیز در گسترش فوزاریوم سنبله تأثیر دارند از جمله این عوامل می‌توان به نوع و مقدار مایه قارچ، مرحله رشدی گیاه، دما و رطوبت محیط اشاره کرد. لذا این منابع تا حد ممکن بایستی در آزمایش‌های ارزیابی و بهزادی تحت کنترل قرار گیرند. معنی‌دار شدن بلوک‌ها در این تحقیق اثر دما و رطوبت را در آزمایش‌های گلخانه‌ای نشان می‌دهد چون هر کدام از بلوک‌ها بعد از مایه‌زنی در زیر یک محفظه پلاستیکی قرار گرفته‌اند لذا شرایط محیطی (رطوبت و دما) در زیر آن‌ها متفاوت بوده و این عامل باعث اختلاف معنی‌دار بین بلوک‌ها از نظر گسترش فوزاریوم گردیده است. در صورتی که در آزمایش دیگری که در شرایط گلخانه‌ای مشابه، همه بلوک‌ها در زیر یک محفظه بزرگ قرار گرفته بودند اختلاف بین بلوک‌ها معنی‌دار نشده بود (عبدی‌نی اصفهانی، ۱۳۷۸).

در این تحقیق جهت ارزیابی مقاومت به

جدول ۴- مقایسه میانگین ها (\pm SE) در سه روش ارزیابی مقاومت به گسترش بیماری فوزاریوم
سبله در ارزیابی ۲۸ ژنوتیپ گندم با جدایه ۱۷۱

Table 4. Means (\pm SE) of three assesment methods of resistance to Fusarium head blight spread in spikes of 28 wheat genotypes with isolate 171 of *F. graminearum*

Genotype No.	Final disease rating	isolate 171 of <i>F. graminearum</i>	
		AUDPC	Rachis infection(%)
20*	5.00 \pm 0.00 a	109.60 \pm 0.93 a	91.67 \pm 5.16 ab
17	5.00 \pm 0.00 a	92.87 \pm 4.11 abc	4.06 \pm 93.33 ab
2	4.67 \pm 0.17 ab	90.42 \pm 5.59 abcde	100.00 \pm 0.02 a
28	4.58 \pm 0.22 ab	93.16 \pm 3.31 ab	91.67 \pm 6.95 abc
24	4.57 \pm 0.28 ab	91.89 \pm 4.30 abcd	91.67 \pm 5.16 ab
3	4.50 \pm 0.14 abc	67.08 \pm 10.21 defgh	75.00 \pm 15.16 abc
23	4.20 \pm 0.59 abcd	82.83 \pm 1032 bcdef	91.67 \pm 5.16 ab
15	4.18 \pm 0.32 abcd	76.13 \pm 9.50 bcdefg	91.67 \pm 5.16 ab
5	4.17 \pm 0.71 abcd	77.70 \pm 14.07 bcdefg	83.33 \pm 10.16 abc
19	4.15 \pm 0.35 abcd	65.63 \pm 3.47 efgh	83.33 \pm 5.16 abc
22	4.13 \pm 0.23 abcd	81.25 \pm 3.72 bcdef	88.89 \pm 6.18 abc
11	4.10 \pm 0.15 abcd	81.43 \pm 1.93 bcdef	83.33 \pm 5.16 abc
6	3.93 \pm 0.31 abcde	78.40 \pm 7.33 bcdefg	83.33 \pm 5.16 abc
16	3.88 \pm 0.61 abcdef	70.06 \pm 14.77 bcdefgh	58.33 \pm 13.38 abc
7	3.85 \pm 0.42 abcdef	67.93 \pm 4.75 bcdefgh	80.56 \pm 6.22 abc
13	3.73 \pm 0.38 abcdef	66.3 \pm 8.91 defgh	83.33 \pm 10.16 abc
14	3.61 \pm 0.32 bcdef	64.55 \pm 5.33 efgh	83.33 \pm 13.27 ab
9	3.49 \pm 0.25 bcdef	66.70 \pm 6.22 defgh	58.33 \pm 7.53 abc
21	3.29 \pm 0.27 cdef	67.41 \pm 9.16 cdefgh	61.11 \pm 11.400 abc
18	3.28 \pm 0.43 cdef	60.38 \pm 10.21 fgh	66.67 \pm 13.35 abc
27	3.26 \pm 0.56 cdef	63.43 \pm 11.19 fgh	53.33 \pm 8.88 abcd
10	3.16 \pm 0.38 def	61.48 \pm 6.90 fgh	75.00 \pm 8.80 abc
25	3.10 \pm 1.07 def	65.22 \pm 20.66 efgh	41.67 \pm 8.32 cd
1	2.98 \pm 0.52 def	61.08 \pm 7.98 fgh	66.67 \pm 5.00 abc
8	2.80 \pm 0.43 ef	58.22 \pm 9.75 hi	50.00 \pm 8.66 bcd
26	2.67 \pm 0.30 ef	46.78 \pm 4.59 hi	41.67 \pm 5.00 cd
12	2.64 \pm 0.58 f	52.23 \pm 9.00 gh	38.89 \pm 12.15 cd
4	1.42 \pm 0.17 g	27.13 \pm 1.01 i	8.33 \pm 5.20 d

* For name or pedigree of genotypes see Table 1.

میانگین هایی که با حروف مشابه در هر ستون مشخص شده اند با یکدیگر اختلاف معنی دار ندارند ($P < 0.05$).

Means followed by similar letters in each column are not significantly different ($P < 0.05$).

جدول ۵- ضرایب همبستگی بین سه روش ارزیابی مقاومت به گسترش فوزاریوم سنبله
گندم در ۲۸ ژنوتیپ گندم با دو جدایه *F. graminearum*

Table 5. Correlation coefficients of three assessment methods of resistance to Fusarium head blight spread in spikes of 28 wheat genotypes with two isolates of *F. graminearum*

Assessment method	روش ارزیابی	Isolate	جدایه	نرخ نهایی	سطح زیر منحنی
			آلدگی	آلدگی	پیشرفت بیماری
AUDPC	سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری	162		0.89**	
		171		0.92**	
Rachis infection	آلدگی محور سنبله	162		0.73**	0.72**
		171		0.90**	0.84**

** Significant at 1% level.

* معنی دار در سطح احتمال ۱٪

زرد شدن آن‌ها می‌باشد. زرد شدن پیش از موعد ممکن است عوامل دیگری نیز داشته باشد و با آلدگی به وجود آمده از منبع دیگری غیر از سنبلاچه مایه‌زنی باشد. همچنین بعد از مرحله شیری، کل سنبلاچه‌ها (سالم و آلدده) به تدریج زرد می‌شوند که در آن موقع، تشخیص سنبلاچه‌های آلدده از سالم غیر ممکن می‌نماید (Parry *et al.*, 1995; Miedaner, 1997). در صورتی که در روش استفاده از محور سنبله برای ارزیابی، مشکل محدودیت زمانی وجود نداشته و حتی بعد از رسیدگی کامل سنبله ارزیابی ممکن می‌باشد. لذا استفاده از آن در روش مایه‌زنی نقطه‌ای می‌تواند کار ارزیابی را تسهیل بخشد.

گزارش شده که مقاومت به گسترش فوزاریوم در داخل سنبله خودش شامل دو جزء می‌باشد: یکی نفوذ بیمارگر به محور سنبله و دوّمی گسترش آن به سنبلاچه‌های مجاور بعد از نفوذ در محور

نشان می‌دهد. در این مطالعه بین این دو روش ضریب همبستگی بالا (۰/۹۲-۰/۸۹) وجود داشت که این در توافق با گزارش بای و همکاران (Bai *et al.*, 1999) (در این مورد بود که همبستگی بین آن دورا ۰/۹۶-۰/۹۲ اعلام کرده‌اند. بنابراین هر دو روش برای تمایز ژنوتیپ‌ها از همیگر مناسب هستند ولی ارزیابی AUDPC، با توجه به این که نیاز به چند مرحله یادداشت برداری دارد فوق العاده گران تمامی می‌شود و شاید در جوامع بزرگ گیاهی امکان پذیر نباشد. روش آلدگی محور سنبله، همانطوری که گفته شد تعداد محورهای سنبلاچه آلدده شده را نسبت به گل سنبلاچه‌های مایه‌زنی شده نشان می‌دهد. این روش مزایای مختلفی را نسبت به ارزیابی بر اساس کل سنبلاچه‌های آلدده دارد که آسان بودن ارزیابی و کاهش اشتباه در ارزیابی را می‌توان از آن جمله شمرد. معمولاً اساس تشخیص سنبلاچه‌های آلدده

دفاعی گیاه بعد از نفوذ بیمارگر در یک سبلچه می باشد و در صورت شکسته شدن این سد دفاعی سبلچه های مجاور به راحتی آلووده خواهند شد. این نتیجه گیری را هم تجزیه همبستگی و هم تجزیه ژنتیکی به روش دیالل (عابدینی اصفهانی، ۱۳۷۸) به خوبی تأیید می کرد.

سنبله (Yu, 1982; Bai and Shaner, 1996) همچنین بر اساس نظر یو (Yu, 1982) ممکن است ژن های متفاوتی این دو جزء را کنترل کنند ولی اطلاعات مستدلی در این مورد گزارش نشده است. تحقیق حاضر نشان داد که این دو عامل با هم ارتباط داشته و محور سنبله به عنوان اولین سد

References

منابع مورد استفاده

- عابدینی اصفهانی، م. ۱۳۷۸. بررسی ژنتیک مقاومت به فوزاریوم سنبله در ارقام گندم هگزابلوئید. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
- مهرآبادی، م. ۱۳۷۵. بررسی مقاومت نسبی ارقام و لاین های مختلف گندم به بیماری فوزاریومی خوش گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
- Bai, G.H., Kolb, L., Shaner, G., and Domier, L.L. 1999. Amplified fragment length polymorphism markers linked to a major quantitative trait locus controlling scab resistance in wheat. *Phytopathology* 89: 343-348.
- Bai, G., and Shaner, G. 1994. Scab of wheat: Prospects for control. *Plant Disease* 78: 760-766.
- Bai, G.H., and Shaner, G. 1996. Variation in *Fusarium graminearum* and cultivar resistance to wheat scab. *Plant Disease* 80: 975-979.
- Bowden, R.L., and Leslie, J.F. 1997. Diversity and sexuality in *Gibberella zeae*. pp. 35-39. In: Dublin H.J., Gilbert, I., Reeves, J., and McNab, A. (eds.). *Fusarium Head Scab: General Status and Future Prospects*. CIMMYT. Mexico. D.F.
- Johnes, R.K., and Mirocha, C.J., 1999. Quality parameters in small grains from Minnesota affected by Fusarium head blight. *Plant Disease* 83: 506-511.
- Lin, Y., Yang, Z., and Wu, Z. 1992. Genetic analysis of resistance to scab (*Gibberella zeae*) in wheat varieties from different regions. *Acta Agricultural of Shanghai* 8: 31-36.
- Liu, Z.Z. 1985. Recent advances in research on wheat scab in China. pp. 174-181. In: Saunders, D.A. (ed.). *Wheat for More Tropical Environments*, CIMMYT, Mexico, D.F.
- McMullen, M., Jones, R., and Gallenberg, D. 1997. Scab of wheat and barley: A reemerging

- disease of devastating impact. *Plant Disease* 81: 134-148.
- Mesterhazy, A. 1995.** Types and components of resistance to Fusarium head blight of wheat. *Plant Breeding* 114: 377-386.
- Miedaner, T. 1997.** Breeding wheat and rye for resistance to Fusarium diseases-review article. *Plant Breeding* 116: 201-220.
- Miller, J.D., Young, J.C., and Sampon, D.R. 1985.** Deoxynivalenol and Fusarium head blight resistant in spring cereals. *Phytopathology* 113: 359-367.
- Millus, E.A., and Parson, C.E. 1994.** Evaluation of foliar fungicides for controlling Fusarium head blight of wheat. *Plant Disease* 78: 697-799.
- Parry, D.W., Jenkinson, P., and Mcleon, L. 1995.** Fusarium ear blight (scab) in small grain cereals-a review. *Plant Pathology* 44: 207-238.
- Procunier, J.D., Gilbert, J., Aung, T., Gray, M., and Prashar, S. 1998.** Microsatellite identification of specific D chromosomes for Fusarium head blight resistance in hexaploid wheat. pp. 143-144. In: Slinkard, A.E. (ed.). Proceedings of the 9th International wheat Genetics Symposium, Vol. 3, University of Saskatchewan, Canada.
- Schroeder, H.W., and Christensen, J.J. 1963.** Factors affecting resistance of wheat to scab caused by *Gibberella zeae*. *Phytopathology* 53: 831-838.
- Singh, R.P., Ma, H., and Rajaram, S. 1995.** Genetic analysis of resistance to scab in spring wheat cultivar Frontana. *Plant Disease* 79: 238-240.
- Snijders, C.H.A., and Perkowski, J. 1990.** Effect of head blight caused by *Fusarium culmorum* on toxin content and weight of wheat kernels. *Phytopathology* 80: 66-70.
- Steel, R.G.D., and Torrie, J.H. 1980.** Principals and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. 2nd edn. New York: McGraw-Hill Publ. USA.
- Walsh, E.J., Fanning, M.J., and Bannon, E. 1998.** An evaluation of screening techniques to assess Fusarium head blight resistance in spring wheat (*Triticum aestivum* L.). *Cereal Research Communications* 26: 59-66.
- Wan, Y.F., Yen, C., and Yang, J.L. 1997.** Sources of resistance to head scab in *Triticum* *Euphytica* 94: 31-36.
- Wang, Y.Z., and Miller, J.D. 1988.** Screening techniques and sources of resistance to Fusarium head blight. pp. 125-140. In: Klatt, A. (ed.). *Wheat Production Constraints in*

Topical Environments. CIMMYT, Mexico. D.F.

Wang, Y.Z., Yang, X.N., and Xiao, Q.P. 1982. The improvement of identification technique of scab (*Gibberella zaeae* Petch) resistance of wheat and the development of resistant sources. *Scientia Agricultural Sinica* 5: 67-77.

Wegner, M. 1992. Optimierung von saatgutpillierungen mit mikrobiellen antagonisten zur biologischen Bekampfung von *Fusarium culmorum* (W.G.SM) Sacc. in weizen. Diplomarbeit Universitaet Goettingen. Germany.

Yu, Y.J. 1982. Monosomic analysis for scab resistance and yield components in the wheat cultivar Soo-Moo-3. *Cereal Research Communications* 10: 185-190.

Zadoks, J.C., Chang, T.T., and Konzak, C.F. 1974. A decimal code for the growth stage of cereals. *Weed Research* 14: 415-421.

آدرس نگارندها

محمد عابدینی استهانی - بخش تحقیقات اصلاح و نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی ایرانشهر، ایرانشهر.
علیاس سعیدی - بخش تحقیقات غلات، مؤسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر، صندوق پستی ۴۱۱۹، کرج ۳۱۵۸۵.
قاسم کریمزاده - گروه اصلاح بیانات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
عزیزالله علیراده - گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران.