

ارزیابی عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیک ارقام وارداتی شبدر بررسیم

Evaluation of Forage Yield and Morphological Characteristics of Imported Berseem Clover Cultivars

محمد زمانیان

استادیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
کشاورزی، کرج، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۲/۱۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۷/۲۳

چکیده

زمانیان، م. ۱۳۹۵. ارزیابی عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیک ارقام وارداتی شبدر بررسیم. مجله بهنژادی نهال و بذر ۱-۳۲:۳۲-۱۰. 10.22092/spij.2017.111285.1

بررسی و مقایسه پتانسیل عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیک ارقام وارداتی با ارقام رایج شبدر بررسیم می‌تواند به تنوع در بین ارقام شبدر بررسیم و افزایش تولید علوفه در کشور کمک کند. این پژوهش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سیزده رقم و چهار تکرار در کرج اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس مركب دو ساله نشان داد که اثر سال و رقم در مورد عملکرد علوفه تر، علوفه خشک و صفات مورفولوژیک در سطح احتمال ۱٪ معنی‌دار بود که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین ارقام و متفاوت بودن اثر سال بر تولید علوفه و صفات مورفولوژیک ارقام شبدر بررسیم است. مقایسه میانگین صفات نشان داد توده پلی‌کراس کرج با ۲۵/۲۰ و ۶۵/۱۶ و رقم ایزوله مصری با ۸۴/۴۶ و ۷۰/۱۰ تن در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد علوفه تر و خشک را تولید کردند. اثر رقم و سال بر صفات مورفولوژیک از جمله ارتفاع بوته معنی‌دار بود ولی همبستگی مثبت و معنی‌داری بین این صفات و عملکرد علوفه مشاهده نشد. ارقام وارداتی وینر، الیت ۲ و لاین سلکسیون و از تودهای داخلی تولیدی دزفول، پلی‌کراس کرج و ساکرومونت مازندران با تولید ۶۹-۶۸ تن علوفه تر و ۵/۱۶ تن در هکتار علوفه خشک برتقی ارقام بودند و نسبت به شاهد (رقم تولیدی کرج) از نظر تولید علوفه تر و علوفه خشک به ترتیب ۷٪ و ۱۰٪ برتقی نشان دادند و برای کشت و تولید علوفه در شرایط کرج قابل توصیه هستند.

واژه‌های کلیدی: شبدر، علوفه خشک، صفات زراعی، تجزیه مركب.

“مجله بهنژادی نهال و بذر” جلد ۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۵

تلفن: ۰۲۶۳۶۷۰۲۰۵۲

نویسنده مسئول: m_zamaniyan@yahoo.com

مقدمه

طوری که رقم وینر با ۹۱/۹۸ تن علوفه تر و ۱۷/۰۲ تن علوفه خشک در هکتار بیشترین عملکرد علوفه را نسبت به شاهد داشت (زمانیان، گزارش منتشر نشده). جو بورتون (Joe Burton) یکی از ارقام اصلاح شده شبد برسیم است که توسط دانشگاه کالیفرنیا از ژرمپلاسم رقم مولتی کات به دست آمد، این رقم پائیزه، به عنوان تولید علوفه خشک، تر، تازه و کود سبز مورد استفاده قرار گرفته و به بیماری‌های ویروسی متحمل و ارتفاعی حدود ۴۵-۵۵ سانتی‌متر دارد (Williams *et al.*, 1996). ویلیام (Smith, 1970) و اسمیت (William, 2002) مهم‌ترین عوامل مؤثر بر پتانسیل تولید علوفه گیاهان علوفه‌ای لگوم را بافت خاک، pH، بارندگی، درجه حرارت و رقم معرفی و گزارش کردند با کاهش درجه حرارت (کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد)، تعداد ساقه که یکی از مؤلفه‌های مهم در عملکرد علوفه است در گونه‌های مختلف شبد برسیم بستگی به شرایط و همکاران (Ross *et al.*, 2001) اعلام کردند که عملکرد علوفه شبد برسیم بستگی به شرایط آب و هوایی و منطقه دارد، به طوری که در ایتالیا ۳-۵ تن ماده خشک در هکتار (Martinello, 1999)، در امریکای شمالی (Westcott *et al.*, 1995) و ۵/۸ تن هکتار (Shrestha *et al.*, 1998) و در کانادا ۵/۵ تن در هکتار ماده خشک بعد از ۶۱ روز از رشد بهاره

شبدربرسیم بسانام علمی *Trifolium alexandrinum L.* یکی از گیاهان علوفه‌ای مهم خانواده لگومینوز است که به علت دارا بودن خصوصیات مناسب مورفو‌فیزیولوژیکی از جمله ارتفاع بوته، سطح برگ و تعداد ساقه در واحد سطح، در سیستم‌های زراعی ایران جایگاه بسیار خوبی دارد و سطح زیر کشت آن بیش از ۵۰ هزار هکتار در کشور است (Zamanian, 2003). عملکرد محصول شبد برسیم بستگی به شرایط آب و هوای تاریخ کاشت، عملیات زراعی، ارتفاع بوته و رقم دارد (Taylor, 1985). در منطقه کرج با سه بار چین‌برداری ۶۲/۹۹ تن، ۱۰/۴۳ تن، در سنتنج ۳۳/۲۸ تن و ۶/۸۹ تن، در همدان ۳۲/۳۳ تن و ۶/۱۵ تن، در بروجرد ۵۴/۱۴ تن و ۹/۹۴ تن، در کرمانشاه ۴۹/۶۶ تن و ۸/۵۲ تن، در اراک ۳۳/۴۱ تن و ۷/۳۰ تن، در شهر کرد ۲۶/۹۷ تن و ۸/۶۰ تن، در مازندران ۵۰-۷۰ تن و در خوزستان تا ۱۰۰ تن در هکتار به ترتیب علوفه تر و خشک تولید می‌کند (Zamanian, 2003 Zamanian *et al.*, 2002) یک بررسی مشاهده‌ای که در سال ۱۳۸۵ در کرج انجام شد، ارقام شبد برسیم به نام‌های اکیناتوم، وینر والکس مطالعه و گزارش داده شد که بین ارقام از نظر مدت زمان لازم تا برداشت، رسیدگی، خصوصیات مورفو‌لوجیکی، یکنواختی سطح سبز و عملکرد علوفه در چین‌ها و مجموع چین‌ها تفاوت‌هایی وجود داشت به

می‌شوند. از بین ارقام مورد مطالعه رقم سعیدی بیشترین عملکرد را نسبت به ارقام تابور، جوبورtern و سیرو داشت. پوتنم و همکاران (Putnam *et al.*, 2000) با مقایسه عملکرد کمی و کیفی علوفه ارقام شبدربرسیم در کالیفرنیا گزارش دادند که عملکرد علوفه ارقام شبدربرسیم تابع مناطق کشت بود و به طور میانگین عملکرد در رقم دیویس ۶/۵-۷/۵ تن در ایکر و درالستر و بالای ۹ تن در ایکر بود. هدف از اجرای این پژوهه بررسی توانایی تولید علوفه ارقام خارجی و توده‌ها و ارقام رایج داخلی شبدربرسیم جهت افزایش تولید علوفه در کشور بود.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در مزرعه پژوهشی ۴۰۰ هکتاری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با موقعیت طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۶ دقیقه شرقی و عرض جغرافیائی ۳۵ درجه و ۵۹ دقیقه شمالی و ارتفاع ۱۳۲۱ متری از سطح دریا در کرج در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سیزده رقم به نام‌های اکیناتون، الکس، وینر، الیت ۲، رقم ۸۵۷۰۵، تولیدی کرج (شاهد)، مولتی کات، ساکرومونت کرج، ایزوله مصری، لاین سلکسیون، تولیدی کرج، ساکرومونت مازندران و پلی کراس کرج و چهار تکرار اجرا شد. برای اجرای این طرح قطعه زمینی به مساحت حدود ۸۰۰ مترمربع در شهریور شخم زده و به همراه

(Brink and Fairbrother, 1992) به دست آمد. رووس و همکاران (Ross *et al.*, 2005) با مقایسه عملکرد علوفه شبدربرسیم در کشت خالص و مخلوط گزارش دادند که عملکرد علوفه تحت تأثیر تاریخ چینبرداری علوفه و تراکم بذر قرار داشت و در کشت خالص میانگین عملکرد علوفه شبدربرسیم در چین اول کمتر از بقیه چین‌ها بود ولی سرعت رشد مجدد بیشتر از بقیه چین‌ها است و در مجموع عملکرد آن در کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص بود و به طور کلی عملکرد علوفه و سرعت رشد مجدد شبدرب نسبت به تاریخ چینبرداری علوفه عکس العمل خطی داشت. مارتا و کوتروباس (Martha and Koutroubas, 2004) بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد علوفه شبدربرسیم گزارش کردند که در شرایط تنش عملکرد زیست توده یک سوم عملکرد زیست توده در شرایط نرمال است، آن‌ها علت کاهش عملکرد را زودگل دهی، افزایش تنفس و کاهش سطح برگ شبدر در شرایط تنش اعلام کردند. ردویسچ و همکاران (Rethwisch *et al.*, 2002) از مقایسه عملکرد علوفه ارقام شبدرب از سطح برسیم گزارش دادند که تاریخ کاشت و درجه حرارت روی رشد، تداوم عملکرد و استقرار بوته اثرهای متفاوتی دارند و تاریخ کاشت‌های زودهنگام باعث افزایش عملکرد علوفه می‌شود. همچنین ارقام شبدرب رسیم از نظر تعداد چینبرداری علوفه به سه گروه یک چین، دو چین و چند چین تقسیم

۱۰-۲۵ درصد گل دهی از دو خط وسط با حذف نیم متر حاشیه از ابتدا و انتهای خطوط، علوفه از سطح ۴ متر مربع برداشت و بلا فاصله توزین و عملکرد علوفه تر بر حسب کیلو گرم در کرت و سپس تن در هکتار به دست آمد. از علوفه تر، یک نمونه یک کیلو گرمی به طور تصادفی انتخاب و در آون با دمای ۷۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت خشک و سپس با استفاده از تناسب عملکرد ماده خشک در هکتار محاسبه شد. روی کلیه داده‌ها توسط نرم افزار آماری MSTAT-C تجزیه واریانس ساده و مرکب به منظور بررسی اثر متقابل بین سال‌ها و ارقام بر اساس عملکرد علوفه در مجموع سه چین در سال اول و چهار چین در سال دوم انجام و مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن در سطح ۵٪ انجام شد.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس مرکب (جدول ۱) نشان داد که اثر سال و رقم بر عملکرد علوفه تر و خشک در سطح احتمال ۱٪ معنی‌دار شد. این امر میانگر وجود تنوع ژنتیکی بین ارقام و متفاوت بودن اثر سال بر تولید علوفه تر و خشک ارقام شبدربرسیم بود. این در حالی است که اثر متقابل سال \times رقم برای این صفات غیر معنی‌دار بود به عبارت دیگر روند برتری ارقام در سال‌ها یکسان بود. مقایسه میانگین‌ها (جدول ۲) نشان داد که در سال ۱۳۸۶ توده پلی کراس کرج با ۶۲/۵۶ تن در هکتار علوفه تر بیشترین و رقم

شخم براساس آزمون خاک مقدار ۱۰۰ کیلو گرم کود فسفر (P_2O_5) و ۳۰ کیلو گرم در هکتار نیترون (N_2) پخش و زیر خاک شد. تعداد واحدهای آزمایشی در هر بلوک سیزده عدد، فاصله بین تکرارها یک متر و هر تیمار شامل چهار خط پنج متری با فاصله ۵۰ سانتی متر بود. عملیات کاشت هر سال در ۲۰ شهریور توسط نیروی کارگری صورت انجام شد. تراکم کاشت بر مبنای ۲۵ کیلو گرم بذر در هکتار، آبیاری به صورت جوی پشته و بر اساس عرف منطقه هفته‌ای یک بار و وجين علف‌های هرز و سله‌شکنی توسط نیروی کارگری انجام شد. در طول آزمایش صفاتی از قبیل ارتفاع بوته (در هر پلات به طور تصادفی ده بوته انتخاب و ارتفاع آن‌ها از سطح زمین تا سطح کانوپی اندازه گیری و میانگین آن‌ها معيار قرار گرفت)، نسبت برگ به ساقه (در هر پلات به طور تصادفی ۳۰۰ گرم علوفه انتخاب و پس از جدا کردن برگ‌ها از ساقه‌ها و خشک کردن آن‌ها در آون و تقسیم وزن برگ به ساقه محاسبه شد)، سرعت رشد مجدد (هفت روز بعد از برداشت در هر پلات به طور تصادفی ده نقطه انتخاب و ارتفاع آن‌ها از سطح زمین تا سطح کانوپی اندازه گیری و میانگین ارتفاع در واحد روز معيار سرعت رشد مجدد قرار گرفت)، تعداد ساقه در واحد سطح (در هر پلات تعداد ساقه‌های موجود در یک مترمربع اندازه شمارش شد) و عملکرد علوفه اندازه گیری شد. برای تعیین عملکرد علوفه در مرحله

جدول ۱- تجزیه واریانس مرکب عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیک ارقام شبدر بر سیم

Table 1. Combined analysis of variance of forage yield and morphological characteristics of Berseem clover cultivars

S.O.V.	منابع تغییرات	df.	میانگین مربعات					
			درجه آزادی	عملکرد علوفه تر	عملکرد علوفه خشک	ارتفاع بوته	تعداد ساقه در واحد سطح	سرعت رشد مجدد
Year (Y)	سال	1	12066.92**	712.37**	4249.33**	116841.33**	2447.31**	2253.85**
Error	خطا	6	135.10	7.19	30.85	1271.98	80.06	60.17
Cultivars (C)	ارقام	12	414.91**	26.52**	36.88**	5243.26 ns	59.51*	21.79 ns
Y × C	سال × ارقام	12	51.64 ns	2.31 ns	17.50 ns	4261.24**	18.91**	25.03*
Error	خطا	72	51.88	2.45	10.10	1353.69	3.89	10.40
CV. (%)	درصد ضریب تغییرات		11.10	10.28	5.52	9.35	6.89	7.21

* and ** : Significant at 5% and 1% levels of probability respectively.

ns: Not significant.

* و **: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد.

ns: غیر معنی دار.

جدول ۲- مقایسه میانگین عملکرد علوفه ارقام شبدر بررسیم
Table 2. Mean comparison of forage yield of Berseem clover cultivars

Cultivars	ارقام	Fresh yield (tha^{-1})			عملکرد علوفه خشک (tha^{-1})			عملکرد علوفه خشک (tha^{-1})			وزن خشک تک ساقه		
		۱۳۸۶	۱۳۸۷	مرکب	۱۳۸۶	۱۳۸۷	مرکب	۱۳۸۶	۱۳۸۷	مرکب	۱۳۸۶	۱۳۸۷	مرکب
		2007	2008	Combined	2007	2008	Combined	2007	2008	Combined	2007	2008	Combined
Akinatoum	اکیناتون	41.56c	63.13bc	52.34b	9.34d	14.91bc	12.13c	--	2.76cd	--	--	--	--
Alex	آلکس	53.31ab	80.44a	66.88a	12.18c	18.61a	15.39ab	--	2.82cd	--	--	--	--
Winer	وینر	60.63ab	76.67a	68.66a	14.47ab	17.92a	16.19ab	--	2.98abc	--	--	--	--
II Elitt	ایلت ۲	56.75ab	82.13a	69.44a	14.36ab	18.68a	16.52ab	--	3.01abc	--	--	--	--
Cult.85705	رقم ۸۵۷۰۵	54.06ab	79.63a	66.84a	12.45abc	18.74a	15.59ab	--	2.93abcd	--	--	--	--
Tolidi-e-Karaj	تولید کرج	51.75ab	77.38a	64.56a	12.55abc	17.91a	15.23ab	--	3.16a	--	--	--	--
Multicut	مولتی کات	57.75ab	79.81a	68.78a	13.31abc	18.26a	15.78ab	--	2.77cd	--	--	--	--
Sacromonte Karaj	ساکرومونت کرج	53.50ab	71.44abc	62.47a	12.36bc	17.10ab	14.73b	--	2.95abcd	--	--	--	--
Isoleh Mesri	ایزوله مصری	33.56c	60.13c	46.84b	7.42e	13.98c	10.70c	--	2.80cd	--	--	--	--
Selected line	لاین سلکسیون	61.50a	78.00a	69.75a	13.34abc	19.66a	16.50ab	--	2.86bcd	--	--	--	--
Tolidi-e- Dezfoul	تولیدی دزفول	54.81ab	81.88a	68.34a	14.49a	18.28a	16.39ab	--	2.93abcd	--	--	--	--
Sacromonte Mazandaran	ساکرومونت مازندران	61.63a	74.88ab	68.25a	13.35abc	19.45a	16.40ab	--	3.08ab	--	--	--	--
Polycross Karaj	پلی کراس کرج	62.56a	77.94a	70.25a	14.56a	18.75a	16.65a	--	2.80cd	--	--	--	--
Mean	میانگین	54.11	75.65	64.87	12.62	17.86	15.24	--	2.91	--	--	--	--

میانگین های با حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی دار ندارند.

Means with similar letters in each column are not significantly different at 5% level of probability.

به خود اختصاص دادند. این نتایج نشان داد که عملکرد علوفه متاثر از وزن خشک ساقه است و ارقام دارای عملکرد علوفه بیشتر از وزن خشک ساقه بالاتری برخوردارند هر چند همبستگی (جدول ۳) بین این صفات معنی دار نشد (Volence *et al.*, 1987). با توجه به نتایج می توان در منطقه کرج از ارقام خارجی وینر، الیت ۲، لاین سلکسیون در کنار ارقام داخلی تولیدی ذرفول، ساکرومونت تولیدی مازندران، تولیدی ذرفول و پلی کراس کرج جهت تولید علوفه استفاده کرد.

نتایج این تحقیق نشان داد عامل سال و رقم بر بروز پتانسیل تولید علوفه ارقام شبدربرسیم بر اساس شرایط آب و هوا و رقم دارد (Taylor, 1985؛ Zamanian, 2003؛ Smith, 1970؛ William, 2002) و اسمیت (Smith, 1970) با بررسی عوامل مؤثر بر پتانسیل تولید علوفه گیاهان علوفه ای لگوم گزارش دادند رقم یکی از مؤلفه های موثر در عملکرد علوفه است. در این پژوهش تفاوت بین ارقام و توده های شبدربا علت اختلاف عملکرد علوفه شد که با نتایج بالا مشابهت دارد. رووس و همکاران (Ross *et al.*, 2001) اعلام کردند که عملکرد علوفه شبدربرسیم بستگی به شرایط آب و هوایی و منطقه دارد، به طوری که در ایتالیا ۵-۳ تن ماده خشک در هکتار (Martiniello, 1999)، در امریکای شمالی (Westcott *et al.*, 1995) و در ۸/۵ تن هکتار

ایزوله مصری با ۳۳/۵۶ تن در هکتار کمترین عملکرد علوفه تر را تولید کردند. در سال ۱۳۸۷ رقم الیت ۲ با ۸۲/۱۳ تن و رقم ایزوله مصری با ۱۳/۶۰ تن در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد علوفه تر را دارا بودند. مقایسه میانگین دو ساله (جدول ۲) نشان داد که توده پلی کراس با ۷۰/۲۵ تن در هکتار بیشترین و رقم ایزوله مصری با ۴۶/۸۴ تن در هکتار کمترین عملکرد علوفه تر را تولید کردند. یکی از علل کاهش عملکرد رقم ایزوله مصری زود رسی این رقم است (Martha and Koutroubas, 2004). مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک (جدول ۲) نشان داد که در سال ۱۳۸۶ توده پلی کراس کرج با ۱۴/۵۶ تن در هکتار، تولیدی ذرفول با ۱۴/۴۹ تن، الیت ۲ با ۱۴/۳۶ تن و وینر با ۱۴/۴۷ تن در هکتار و در سال ۱۳۸۷ ارقام لاین سلکسیون با ۱۹/۶۶ تن و ساکرومونت مازندران با ۱۹/۴۵ تن و در مجموع دو سال توده پلی کراس کرج با ۱۶/۶۵ تن، الیت ۲ با ۱۶/۵۲ تن، لاین سلکسیون با ۱۶/۵۰ تن و ساکرومونت مازندران با ۱۶/۴۰ تن، تولیدی ذرفول با ۱۶/۳۹ تن و وینر با ۱۶/۱۹ تن در هکتار علوفه خشک برترین ارقام بودند. مقایسه میانگین ها (جدول ۲) نشان داد که بین ارقام شبدربرسیم از نظر وزن خشک تک ساقه در سطح احتمال ۱٪ تفاوت معنی دار وجود داشت و رقم تولیدی کرج با ۳/۱۶ گرم، رقم الیت ۲ با ۱/۳۰ گرم و رقم ساکرومونت تولیدی مازندران با ۰/۳۰۸ گرم بیشترین وزن خشک تک ساقه را

جدول ۳- ضرایب همبستگی بین صفات مورفولوژیک با عملکرد علوفه تر و خشک ارقام شبدر بررسیم
Table 3. Correlation of coefficients between morphological characteristics and fresh and dry matter yield of Berseem clover cultivars

	عملکرد علوفه تر Fresh yield	عملکرد علوفه خشک DMY	وزن خشک ساقه SDW	ارتفاع بوته PH	تعداد ساقه در واحد سطح S/m ²	سرعت رشد مجدد در سطح RGR
Dry matter yield (DMY)	0.993**					
Shoot dry weight (SDW)	0.328 ^{ns}	0.389 ^{ns}				
Plant height (PH)	0.233 ^{ns}	0.308 ^{ns}	0.401 ^{ns}			
Shoots/m ² (S/m ²)	0.158 ^{ns}	0.116 ^{ns}	0.070 ^{ns}	-0.457 ^{ns}		
Regrowth rate (RGR)	0.224 ^{ns}	0.207 ^{ns}	-0.318 ^{ns}	0.218 ^{ns}	-0.321 ^{ns}	
Leaf Stem (L/S)	-0.167 ^{ns}	-0.097 ^{ns}	0.157 ^{ns}	0.303 ^{ns}	-0.207 ^{ns}	-0.605*

* و **: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵ و ۱ درصد.

* and ** : Significant at 5% and 1% levels of probability respectively
ns: Not significant.

ns: غیر معنی دار.

بود، بنابراین صفات مورفولوژیک مثل صفات کمی علوفه تحت تأثیر سال و رقم بود. مقایسه میانگین ها (جدول ۴) نشان داد که از نظر ارتفاع بوته در سال ۱۳۸۶ رقم تولیدی دزفول با ۶۸/۰۳ سانتی متر در سال ۱۳۸۷ رقم ساکرومونت تولیدی مازندران با ۵۷/۸۱ سانتی متر و در دو سال رقم ساکرومونت تولیدی مازندران با ۶۰/۸۰ سانتی متر و از نظر تعداد ساقه در مترمربع در سال ۱۳۸۶ رقم ۱۳۸۶ رقم ۸۵۷۰۵ با ۵۲۸/۳ ساقه، در سال ۱۳۸۷ رقم ایزو له مصری با ۳۹۸/۹ ساقه و در مجموع دو سال رقم ۸۵۷۰۵ با ۴۵۶/۱۲ ساقه و از نظر سرعت رشد مجدد در سال ۱۳۸۶ رقم تولیدی دزفول با ۲۸/۱۰ سانتی متر و در سال ۱۳۸۷ رقم اکیناتون با ۳۷/۵۵ سانتی متر و در مجموع دو سال رقم اکیناتون با ۳۲/۵۵ سانتی متر و از نظر نسبت برگ به ساقه در سال ۱۳۸۶ رقم ایزو له مصری با نسبت ۵۴/۷۵ و در سال ۱۳۸۷ رقم ساکرومونت تولیدی مازندران با نسبت ۴۳/۰۸ و در مجموع دو سال

کانادا ۵/۵ تن در هکتار ماده خشک بعد از ۶۱ روز از رشد به ساره (Brink and Fairbrother, 1992) آمد. رویسچ و همکاران (Rethwisch *et al.*, 2002) اعلام کردند رشد و پایداری تولید علوفه ارقام شبدر بررسیم تابع محیط رشد است. در این پژوهش با توجه به معنی دار شدن اثر سال، تفاوت بین سالها باعث اختلاف بین پتانسیل تولید علوفه و تعداد چینبرداری در ارقام شبدر بررسیم شد و این عوامل باعث تفاوت عملکرد علوفه بین ارقام شبدر بررسیم بود که این نتایج موید نظرات محققین بالا است.

نتایج تجزیه واریانس مركب (جدول ۱) نشان داد اثر سال برای همه صفات مورفولوژیک، رقم ارتفاع بوته و سرعت رشد مجدد و اثر متقابل سال × رقم برای تعداد ساقه در واحد سطح، سرعت رشد مجدد و نسبت برگ به ساقه در سطح احتمال ۱٪ و ۵٪ معنی دار

جدول ۴- مقایسه میانگین صفات مورفولوژیکی ارقام شبدر بر سیم

Table 4. Mean comparison of morphological characteristics of Berseem clover cultivars

Cultivars	ارقام	ارتفاع بوته			تعداد ساقه در واحد سطح			سرعت رشد مجدد			نسبت برگ به ساقه		
		Plant height (cm)			Shoot/m ²			Regrowth rate (cm/day)			L/S		
		۱۳۸۶ 2007	۱۳۸۷ 2008	مرکب دو ساله Combined	۱۳۸۶ 2007	۱۳۸۷ 2008	مرکب دو ساله Combined	۱۳۸۶ 2007	۱۳۸۷ 2008	مرکب دو ساله Combined	۱۳۸۶ 2007	۱۳۸۷ 2008	مرکب دو ساله Combined
Akinatoum	اکیناتون	62.04ab	50.77bcd	56.4bcd	376.4c	345.9ab	361.1a	27.55ab	37.55a	32.55a	47.75bcd	40.67a	44.21a
Alex	آلکس	62.20ab	49.12d	55.66cd	416.1bc	327.2b	376.1a	25.83abc	35.83abc	30.83abc	45.00d	39.16a	42.08a
Winer	وینر	62.92ab	51.50bcd	57.22abcd	488.3ab	351.7 ab	420.0a	25.35bcd	31.58bcd	28.46a-e	47.50bcd	41.75a	44.62a
II Elitt	۲البت	65.01a	55.88a	60.44a	443.6bc	364.4 ab	404.0a	24.27cd	32.85bcd	28.56a-e	50.25a-d	40.67a	45.46a
Cult.85705	۸۵۷۰۵ رقم	56.99b	50.13cd	53.56d	528.3a	384.1 a	456.2a	18.88e	33.92bc	26.40cde	46.50cd	40.83a	43.66a
Tolidi-e-Karaj	تولید کرج	64.93a	54.21ab	59.57ab	413.0bc	361.0ab	387.0a	23.23cd	33.28bc	28.25a-e	47.50bcd	38.17a	42.83a
Multicut	مولتی کات	63.41a	50.74bcd	57.08a-d	458.3abc	360.3ab	409.3a	24.95bcd	35.18abc	30.06a-d	46.25cd	41.08a	43.67a
Sacromonte Karaj	ساکرومونت کرج	61.90ab	49.38d	55.64cd	420.0bc	356.4ab	388.2a	17.30e	29.67de	23.49e	51.25abc	42.50a	46.87a
Isoleh Mesri	ایزوله مصری	66.35a	49.72cd	58.04abc	404.2bc	398.9 a	401.5a	18.30e	31.60cde	24.95de	54.75a	37.83a	46.29a
Selected line	لاین سلکسیون	67.65a	50.74bcd	59.19abc	421.9bc	360.0 ab	391.0a	27.73ab	35.13abc	31.42abc	50.50a-d	38.25a	44.37a
Tolidi-e- Dezfoul	تولیدی دزفول	68.03a	53.49abc	60.76a	377.2c	395.3 a	386.3a	28.10a	35.83ab	31.96ab	49.50a-d	38.16a	43.83a
Sacromonte Mazandaran	ساکرومونت مازندران	63.80a	57.81a	60.80a	405.0bc	394.1b	364.6a	25.00bcd	28.83e	26.91b-e	52.75ab	43.08a	47.92a
Polycross Karaj	پلی کراس کرج	66.13a	51.67bcd	58.90abc	400.0c	351.8 ab	375.9a	22.77d	35.15abc	28.4 a-e	52.50ab	38.83a	45.67a
Mean	میانگین	63.95	51.93	57.94	427.10	365.46	393.93	23.78	33.56	28.63	49.38	40.07	44.72

میانگین های با حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی دار ندارند.

Means with similar letters in each column are not significantly different at 5% level of probability.

به علت متفاوت بودن مرحله رشدی در زمان برداشت علوفه ارقام و توده‌های شبدر بررسیم باشد و با که این بعضی از این صفات از نظر آماری معنی دار بودند ولی تفاوت به میزانی نبوده که همبستگی آن‌ها با عملکرد علوفه معنی دار شود.

نتایج نهایی این پژوهش نشان داد که بین ارقام شبدر بررسیم در سال‌ها مختلف از نظر عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیک تفاوت‌هایی وجود دارد و این بیانگر تأثیر شرایط آب و هوایی و تعداد متفاوت چین‌ها (سال اول سه چین و سال دوم چهار چین) در سال‌های آزمایش بر پتانسیل تولید علوفه ارقام شبدر بررسیم است. مقایسه میانگین روز تا گل‌دهی ارقام نشان داد که رقم ایزوله مصری با ۷۰/۸۳ درصد گلدهی زودرس‌ترین و رقم مولتی کات با ۳۵/۴۱ درصد گلدهی دیررس‌ترین ارقام هستند. مشاهدات مزرعه‌ای نشان داد که از بین ارقام مورد بررسی، ارقام تولیدی کرج، ساکرومونت، تولیدی مازندران و اکیناتون نسبت به سفیدک پودری متحمل ترند. مقایسه میانگین دو ساله نشان داد که از بین ارقام مورد بررسی، ارقام وینر، تولیدی دزفول، تولیدی کرج، ساکرومونت تولیدی مازندران، الیت ۲ جز ارقام برتر برای تولید علوفه هستند.

رقم ساکرومونت تولیدی مازندران با نسبت ۴۷/۹۲ بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند. نتایج نشان داد که ارقام شبدر بررسیم از نظر صفات مورفولوژیک عکس العمل‌های متفاوتی داشتند و نسبت برگ به ساقه با عملکرد علوفه نسبت عکس داشت (جدول ۳) و از نظر این صفات ارقام دارای عملکرد علوفه پایین نسبت به ارقام با عملکرد علوفه بالا، یتری نسبی داشتند. در این رابطه گامبرو همکاران (Gumber *et al.*, 1988) با تجزیه علیت صفات مورفولوژیک در ۷۲ رقم شبدر ایرانی گزارش دادند که طول مدت گل‌دهی، طول و تعداد دمبرگ‌ها، طول و عرض برگچه و وزن ساقه بیشترین اثر را بر عملکرد علوفه داشتند. تیلور (Taylor, 1985) معتقد است که بین عملکرد علوفه و ارتفاع بوته همبستگی وجود دارد. ولنس و همکاران (Volence *et al.*, 1987) نیز معتقدند که تعداد ساقه در واحد سطح، ارتفاع بوته و وزن تک ساقه بیشترین تاثیر را بر عملکرد علوفه دارند و این صفات تحت تاثیر رقم، میزان بذر و تاریخ کاشت قرار می‌گیرند. این نتایج با نتایج این پژوهش مطابقت دارد. در این پژوهش مشاهده شد ارقام و توده‌هایی که عملکرد علوفه بیشتری داشتند از ارتفاع بوته و وزن خشک ساقه بالاتری برخوردار بودند. علی‌رغم این برتری همبستگی بین عملکرد علوفه و این صفات معنی دار نشد (جدول ۳) که این می‌تواند

References

- Brink, G. E., and Fairbrother, T. E. 1992.** Forage quality and morphological components of diverse clovers durink primary spring growth. Crop Scince 32: 1043-1048.
- Gumber, K. K., Sohoo, M. S., and Beri, S. M. 1998.** Path coefficient analysis in persian clover. Crop Improvement 15 (2): 167-169.
- Martiniello, P. 1999.** Effect of irrigation and harvest management on dry matter yield and seed yield of annual clovers growth in pure stand and in mixtures with graminaceous species in a Mediterranean environment. Grass and Forage Science 54: 52-61.
- Martha, L., and Koutroubas, M. 2004.** Drought on water use efficiency of berseem clover at various growth stage. <http://www.cropscience.org.au/icsc/2004/poster/1/3/2/849-Lazaridou.htm>.
- Putnam, D., Williams, B., Peterson, G., Graves , W., Gibbs, L., Lamb, C., and Ackerly, T. 2000.** Yield and quality performance of berseem clover cultivars. University of California Division of Agriculture and Natural Resources Publication, 21536. 12pp.
- Rethwisch, M. D., Nelson, J., Graves, W. L., Reay, M., Hayden, P., Berger, L., and Griffin, B. L. 2002.** Comparative yields of four berseem clover varieties in response to three fall 2000 planting dates. <http://www.ag.arizona.edu/pubs/crops/az/1301>.
- Ross, S. M., King, J. R., Izaurrealde, R. C., and Odonovan, J. T. 2001.** Weed Suppression by seven clover species. Agronomy Journal 93: 820-827.
- Ross, S. M., King, J. R., Odonovan, J. T., and Spaner, D. 2005.** The prodictivity of oats and berseem clover intercrops. II. Effects of cutting date and density of oats on annual forage yield. Grass and forage Scince 60: 87-98.
- Shrestha, A., Hesterman, O. B., Squire, J. M., Fisk, J. W., and Sheaffer, C. C. 1998.** Annual medics and berseem clover as emergencey forage. Agronomy Journal 90: 197-201.
- Smith, D. 1970.** Influence of temperature on the yield and chemical composition of five forage legume species. Agronomy Journal 62: 520-525.
- Taylor, N., L. 1985.** Clover Science and Technology. American Society of Agronomy, Inc., Madison, Wisconsin, USA.

- Volence, J. J., Cherney, J. H., and Johnson, K. D. 1987.** Yield components, plant morphology and forage quality of alfalfa as influenced by plant population. Crop Science 27: 321-326.
- Westcott, M. P., Welty, L. E., Knox, M. L., and Prestbye, L. S. 1995.** Managing alfalfa and berseem clover for forage and plowdown nitrogen in barley rotations. Agronomy Journal 87: 1176-1181.
- William, R. O. 2002.** Introduced forage for south and south central Texas. Texas Agricultural Extension Service. <http://www.stephenville.tamu.edu/butter/forage> soft establishment/introduced forage.
- Williams, W. A., Buddenhagen, I. W., Graves, W. L., and Gilbertson, R. L. 1996.** Registration of Joe Burton, berseem clover. Crop Science 36: 465.
- Zamanian, M. 2003.** Berseem Clover Agronomy. Agricultural Extension Publications, Tehran, Iran.
- Zamanian, M., Moghaddam, A., and Shamloo, J. 2002 .** Assessment and comparison of forage yield in six berseem clover cultivars. Seed and Plant 18(4): 497-505 (in Persian).