

شناسایی ژنوتیپ‌های مقاوم نخود به نژادهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ از عامل *Fusarium oxysporum* f.sp. *ciceri* با استفاده از نشانگرهای مولکولی  
بیماری پژمردگی فوزاریومی با استفاده از نشانگرهای مولکولی

## **Identification of Resistant Chickpea Genotypes to Races 1,2,3,4 and 5 of *Fusarium oxysporum* f.sp *ciceri*, the Cause of Fusarium Wilt Using Molecular Markers**

# سمیه فراهانی<sup>۱</sup>، بهار مرید<sup>۲</sup> و مژده ملکی<sup>۳</sup>

<sup>۱ و ۳</sup>- به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین - پیشوای دانشکده

## کشاورزی، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، و رامین

۲- استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، تاکستان

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۲/۱۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۷/۲۳

چکیدہ

بررسی مقاوم نخود به تزادهای Fusarium oxysporum f.sp. ciceri با استفاده از نشانگرهای مولکولی. مجله بهترادی نهال و بذر ۱۰.۲۲۰۹۲/spij.2017.111287

پژمردگی فوزاریومی دومین بیماری مهم نخود محسوب می‌شود. کاهش سالیانه محصول در اثر این بیماری ۱۰ تا ۹۰ درصد تخمین زده شده است. توانایی بقای بیمارگر در خاک برای چندین سال حتی در غیاب میزان، کنترل این بیماری را بسیار مشکل کرده است. استفاده از ارقام مقاوم نخود نسبت به پژمردگی فوزاریومی، مؤثر ترین و سازگارترین روش با محیط زیست است. در این مطالعه نشانگرهای مولکولی RAPD و SCAR برای شناسایی ژنوتیپ‌هایی از نخود که حامل ژن‌های مقاومت به نژادهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قارچ عامل بیماری هستند مورد استفاده قرار گرفتند. از ۴۲ ژنوتیپ نخود، DNA به روش CTAB استخراج شد، سپس واکنش زنجیره‌ای پلیمراز با استفاده از نشانگر مولکولی CS-27<sub>700</sub> و CS-27<sub>400</sub> انجام شد. تعدادی از ژنوتیپ‌ها انتخاب و در شرایط گلخانه مقاومت آن‌ها نسبت به چهار نژاد ۰، ۱، ۲ و ۵ قارچ عامل بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ۴۱ ژنوتیپ از ۴۲ ژنوتیپ مورد بررسی نسبت به هر پنج نژاد بیمارگر حساس و فاقد هر گونه ژن مقاومتی بودند و تنها لاین 06-152c Flip نسبت به پنج نژاد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ مقاوم بود. نتایج ارزیابی فنوتیپی مقاومت ارقام و لاین‌ها در گلخانه، نتایج حاصل از بررسی مولکولی را تأیید کرد.

واژه‌های کلیدی: نخود، پژمردگی، فوزاریومی، نژادها، ژن‌های مقاومت، نشانگر SCAR.

#### مقدمه

خسارت به ۱۰۰ درصد نیز می‌رسد؛ Halila and Strange, 1996). قارچ عامل بیماری خاکزی است و به صورت کلامیدوسبور در بذر و بقایای گیاهی مرده در خاک ادامه حیات می‌دهد و می‌تواند در خاک بیش از پنج سال بقای خود را حفظ کند (Singh, 2003). امروزه سعی بر این است که استفاده از سموم شیمیایی به دلیل آلودگی‌های زیست محیطی و خطرات جدی که برای مصرف کنندگان ایجاد می‌کنند محدود شوند، بنابراین مقاومت ژنتیکی و استفاده از ارقام مقاوم مناسب‌ترین روش کنترل این بیماری است. انتخاب فنوتیپی ارقام مقاوم کاری پیچیده و بسیار زمانبر است. استفاده از نشانگرهای مبتنی بر rDNA در برنامه‌های اصلاح گیاهان تجاری، کمک بزرگی برای شناسایی ارقام مقاوم است (Tanksley et al., 1992).

روش RAPD یک ابزار تشخیصی قدرتمند برای شناسایی همه نژادهای اصلی *FOC* در نواحی مدیترانه گزارش شده است (Jimenez-Gasco et al., 2001) تا به حال هشت نژاد (0, 1A, 1B/C, 2, 3, 4, 5 و 6) عامل بیماری با استفاده از آزمون‌های بیماری‌زایی روی ده رقم افتراقی نخود تعیین شده است (Jimenez- Haware et al., 1980).

5, 4, 3, 2, 1A (Diaz et al., 1992) و 6 باعث ایجاد پژمردگی و نژادهای 0 و 1B/C باعث زردی می‌شوند.

بیماری پژمردگی فوزاریومی و یا بوته زردی نخود توسط قارچ *Fusarium oxysporum* f. sp. *ciceri* (*FOC*) ایجاد می‌شود (Jalali and Chand, 1992). این بیماری اولین بار از هند گزارش شد (Jimenez- Diaz et al., 1992). Singh, 2003 نخود از تمام مناطق نخودکاری جهان از جمله شبه قاره هند، ایران، پرو، سوریه، ایسوپی، مکزیک، اسپانیا، تونس، ترکیه، آمریکا و سوروی سابق گزارش شده است (Westerland et al., 1974). Trampero-Casas and Jimenez- Diaz, 1985 ایران ابتدا قارچ *F. lateritium* f. sp. *ciceris* به عنوان عامل بیماری گزارش شده بود (Manoocheri and Mesri Alamdari, 1966). ولی *F. oxysporum* بعداً در کرج عامل بیماری شناسایی شد (Gerlach and Ershad, 1970). بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که ۱۹ درصد نخود در شمال غرب کشور در سال ۱۳۷۸ به این بیماری آلوده بودند و شدت بیماری ۵-۶۰ درصد بوده است (Akem, 1988). خسارت بیماری در جهان ۱۰-۹۰ درصد برآورد شده است (Jimenez- Diaz et al., 1989). Singh and Reddy, 1991 همه‌گیری بیماری گاهی سبب خسارت عمده به محصول می‌شود و در شرایط مساعد توسعه بیماری، میزان

سرکوسپورایی سویا (Filho *et al.*, 2000) پوسیدگی قمز ریشه توت فرنگی (Haymes *et al.*, 2000)، پژمردگی ورتیسیلیومی و کلادوسپوریوم در گوجه‌فرنگی (Wang *et al.*, 2007)، گچ، کپک سفید، آنتراکنوز و پژمردگی فوزاریومی در لوییا (Miklas *et al.*, 2009)، Soule *et al.*, 2011؛ Park *et al.*, 2008؛ Vallejo and Kelly, 2008 استفاده شده است.

(Brick *et al.*, 2006) هدف از انجام این پژوهش ردیابی ژن‌های مقاومت و حساسیت ۴۲ ژنوتیپ نخود در برابر با استفاده از نشانگر RAPD و SCAR و FOC تایید نتایج حاصل از ارزیابی فتوتیپی در گلخانه بود.

## مواد و روش‌ها

### مواد گیاهی

در این تحقیق از ۴۲ رقم و لاین نخود استفاده شد. بذر این ژنوتیپ‌ها از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج و مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه دریافت شد (جدول ۱).

تهیه گیاهچه برای استخراج DNA: از هر ژنوتیپ پنج بذر در گلدان کاشته و گلدان‌ها در گلخانه در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. در مرحله ۴ تا ۵ برگی، برگ‌های گیاهچه‌ها برای تهیه عصاره مورد

دو Jimenez- Diaz *et al.*, 1992) کلاستر مجرابهای ژن‌های مقاومت (R genes) به بیماری پژمردگی فوزاریومی شناسایی شده است: گروه لینکاژی [LG2 کروموزوم F (یا G)] که یک کلاستر ژنی متشكل از پنج ژن foc-1، foc-2، foc-3 و foc-4 است و در برگیرنده ژن‌های مؤثر علیه پاتوتیپ‌های پژمردگی است. گروه لینکاژی دیگر-LG-3 کروموزوم (یا D) که در برگیرنده ژن مقاومت به پاتوتیپ زردی (نژاد ۰ ۱B/C) است. ژن‌های مقاومت به نژادهای ۶ و C هنوز مکانیابی نشده‌اند (Sharma and Muehlbauer, 2007).

در سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰ از نشانگر RAPD برای شناسایی ژن‌های مقاومت نسبت به بیماری‌های سفیدک پودری در کرچک (Singh *et al.*, 2011)، پژمردگی فوزاریومی، آنتراکنوز و زنگ در لوییا (Young and Kelly, 1996)، آلتوناریا در هیبریدهای نارنگی (Falerio *et al.*, 2000a) و Dalkilic *et al.*, 2005) پژمردگی فوزاریومی در بادنجان (Mutlu, 2008) شناسایی ژن مقاومت نسبت به Cladosporium flavum در گوجه فرنگی (Wang *et al.*, 2007) و شناسایی ارقام مقاوم برنج نسبت به بیماری بلاست (Araujo *et al.*, 2010) استفاده شده است. از نشانگرهای SCAR برای شناسایی ژن‌های مقاومت نسبت به بیماری‌های لکه برگی

## جدول ۱- نام و مشخصات ارقام و لاین های آزمایشی نخود

Table 1. Name and specifications of experimental chickpea cultivars and lines

No./. شماره/.	Line/Cultivar	لاین/رقم	Received Institute	موسسه محل دریافت	Origin	منشاء
1	Azad	آزاد	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
2	Arman	آرمان	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
3	Kc215474	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	Khorasan Razavi	خراسان رضوی
4	Hashem	هاشم	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
5	Kc216193	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	Tehran	تهران
6	Kc215950	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	Khorasan Razavi	خراسان رضوی
7	Kc215920	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	Khorasan Razavi	خراسان رضوی
8	Kc215079	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	Mazandaran	مازندران
9	Kc215887	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	East Azarbaijan	آذربایجان شرقی
10	Bionej	بینوئی	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
11	Kc216084	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	East Azarbaijan	آذربایجان شرقی
12	Fillip 97-102c	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
13	KC216313	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	East Azarbaijan	آذربایجان شرقی
14	ILC482	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
15	KC215377	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	Khorasan Razavi	خراسان رضوی
16	Jam	جم	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	Isfahan	اصفهان
17	KC216194	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	Tehran	تهران
18	Kc215004	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	Markazi Province	استان مرکزی
19	Kc216223	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	Bakhtaran	باختران
20	Filip97-116c	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
21	KC 215437	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	Khorasan Razavi	خراسان رضوی
22	KC215909	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	East Azarbaijan	آذربایجان شرقی
23	KC 215002	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	Markazi	مرکزی
24	KC 216364	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	East Azarbaijan	آذربایجان شرقی
25	KC 216195	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	Isfahan	اصفهان
26	Kc 216228	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	East Azarbaijan	آذربایجان شرقی
27	Khoram Abad	خرم آباد	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	Khoram Abad	خرم آباد
28	Kc 215543	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	Fars	فارس
29	Filip97-109c	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
30	Kc 215858	-	SPII	موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر	Khorasan Razavi	خراسان رضوی
31	Filip08-90c	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
32	Filip05-77c	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
33	Filip07-177c	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
34	Filip06-152c	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
35	Filip08-93c	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
36	Filip07-123c	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
37	Filip07-216c	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
38	Filip03-28c	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
39	Filip07-197c	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
40	Filip08-81c	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
41	Filip02-04c	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا
42	Filip05-183c	-	DARI	موسسه تحقیقات کشاورزی دیم	ICARDA	ایکاردا

DARI: Dryland Agricultural Research Institute, Maragheh, Iran.

SPII: Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran.

ICARDA: International Center for Agricultural Research in the Dry Areas, Aleppo, Syria.

استخراج DNA از روشن CTAB با اندکی

تغییرات استفاده شد (Ausubel *et al.*, 1994)

استفاده قرار گرفت.

استخراج DNA از بافت گیاهی: برای

آن ۳۵ چرخه با واسرت در دمای ۹۴ درجه سانتی گراد به مدت ۵۰ ثانیه، اتصال در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد به مدت ۵۰ ثانیه و بسط در دمای ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰۵ ثانیه که با یک بسط انتهایی در دمای ۷۲ درجه سانتی گراد و به مدت ۱۰ دقیقه خاتمه یافت. قطعات تکثیر شده روی ژل آگاروز٪۲ الکتروفورز شدند. ژل ها با رنگ ژل رد رنگ آمیزی شدند. سپس زیر نور UV مشاهده و از آن ها عکس تهییه شد.

و DNA از ۰/۰۵ میلی گرم بافت تازه برگ گیاهان نخود استخراج شد.

#### ارزیابی مولکولی

واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت تعیین ژن های مقاومت به نژادهای ۱، ۲ و ۵ با استفاده از نشانگر RAPD به نام CS-27700 انجام شد. اجزای واکنش در جدول ۲ آورده شده است. برنامه حرارتی شامل واسرت اولیه در ۹۴ درجه سانتی گراد پنج دقیقه بود و به دنبال

جدول ۲- اجزای واکنش زنجیره ای پلیمراز برای استفاده از نشانگر CS-27<sub>700</sub>

Table 2. Components of polymerase chain reaction for using CS-27<sub>700</sub> marker

PCR buffer (10X)	2.5 μl
MgCl <sub>2</sub> (50 mm)	0.75 μl
dNTP (10 mm)	0.5 μl
Primer (10 pmol ml <sup>-1</sup> )	1.0 μl
Taq DNA polymerase (5 unit ml <sup>-1</sup> )	0.25 μl
DNA	2.0 μl
ddH <sub>2</sub> O	18.0 μl

آورده شده است. در این آزمایش برنامه حرارتی شامل واسرت اولیه در ۹۵ درجه سانتی گراد پنج دقیقه و به دنبال آن ۳۵ چرخه با واسرت در دمای ۹۴ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ ثانیه، اتصال در دمای ۶۵ درجه سانتی گراد به مدت ۴۰ ثانیه و بسط در دمای ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۴۰ ثانیه که با یک بسط انتهایی در دمای ۷۲ درجه سانتی گراد و به مدت

تک اوغل وو همکاران (Tekeoglu *et al.*, 2000) بعد از کلون کردن و تعیین توالی نشانگر CS-27، آن را به عنوان نشانگر اختصاصی آلل با نام CS-27<sub>700</sub> F/R طراحی کردند.

برای تعیین ژن های مقاومت به نژادهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قارچ، از نشانگر SCAR با نام CS-27 استفاده شد. اجزای واکنش در جدول ۳

**جدول ۳- اجزای واکنش زنجیره‌ای پلیمراز برای استفاده از نشانگر CS-27**  
**Table 3. Components of polymerase chain reaction for using CS-27 marker**

PCR buffer (10X)	2.5 $\mu$ l
MgCl <sub>2</sub> (50 mm)	0.9 $\mu$ l
dNTP (10 mm)	0.5 $\mu$ l
Primer F (10 pmolml <sup>-1</sup> )	1.0 $\mu$ l
Primer R (10 pmolml <sup>-1</sup> )	1.0 $\mu$ l
Taq DNA polymerase (5 unitml <sup>-1</sup> )	0.25 $\mu$ l
DNA	2.0 $\mu$ l
ddH <sub>2</sub> O	16.85 $\mu$ l

مقاومت به نژاد صفر قابل بررسی نیست زیرا  
ژن‌های مقاومت به پاتوتیپ زردی (نژاد صفر)  
روی کروموزوم C در منطقه ۳ تا ۶ قرار دارند  
. (Sharma and Muehlbauer, 2007)

هر نژاد در یک ارلن ۲۵۰ میلی‌لیتری حاوی  
۵۰ میلی‌لیتر محیط کشت PDB کشت داده شد  
و در شیکر- انکوباتور با سرعت ۱۲۵ دور در  
دقیقه در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد به مدت  
هفت روز زیر نور فلورسنت با ۱۲ ساعت  
روشنایی نگهداری شد.  
کشت مایع از گاز استریل دو لایه عبور داده  
شد و تعداد اسپورها با لام هماسیوتومتر شمارش  
و غلظت سوسپانسیون  $4 \times 10^6$  cfu/g تنظیم شد.  
مخلوط شن و آرد ذرت (به نسبت وزنی ۹ به ۱)  
تهیه و دو بار هر بار به مدت یک ساعت در  
دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد استریل شد.  
سوسپانسیون اسپور به این مخلوط اضافه و به  
مدت ۱۵ روز در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد و  
زیر نور فلورسنت نگهداری شد

۸ دقیقه خاتمه یافت. قطعات تکثیر شده روی  
ژل آگاروز ۲٪ الکتروفورز، با رنگ ژل رد  
رنگ آمیزی و سپس زیر نور UV از آن ها  
عکس تهیه شد.

ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های نخود در  
گلخانه (ارزیابی فنوتیپی)

در این بررسی از نمونه‌های قارچ عامل  
بیماری که از استان ایلام توسط بیگی  
(Beigi, 2013) جمع‌آوری شده و با استفاده از  
آغازگرهای مولکولی نژادهای آن‌ها شناسایی  
شده بود استفاده شد. مایه تلقیح از نژاد ۱، ۲ و ۵  
تهیه شد.

بر اساس تحقیقات بیگی و همکاران (۲۰۱۳)  
نژادهای ۳ و ۴ در استان ایلام یافت نشده است و  
بیشترین تنوع ژنتیکی مربوط به نژاد ۰، ۱B/C، ۵  
و ۶ بود. ژن‌های مقاومت به نژادهای C و ۱B/C  
هنوز مکان یابی نشده‌اند و با استفاده از  
مارکرهای مولکولی CS-27<sub>700</sub> و CS-27

پیشرفت بیماری از روز ۱۰ تا ۵۰ هر پنج روز یک بار بررسی شد. علایم و شدت بیماری با روش مشاهده عینی یادداشت برداری شدند و در آخر براساس بیشترین شدت بیماری، ژنوتیپ‌ها از نظر تیپ‌های آلدگی واکنش آن تعیین شد (جدول ۴).

در پایان آزمایش برای تأیید گونه قارچ عامل بیماری، گیاهان آلدود از گلدان‌ها خارج شده و نتایج با اصول کخ تأیید شدند. برای شناسایی از کلید شناسایی (Nelson *et al.*, 1983) استفاده شد.

#### نتایج و بحث

نتایج الگوی نواری حاصل از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز با استفاده از نشانگر RAPD : نشانگر RAPD با نام CS-27<sub>700</sub> به گونه‌ای طراحی شده است که ژن‌های مقاومت به هر سه نژاد ۱، ۴ و ۵ را در قارچ *F. oxysporum* f. sp. *ciceri* (Sharma and Muehlbauer, 2007) اساس ژنوتیپ‌هایی که فاقد ژن مقاومت هستند با این نشانگر باندی به وزن ۷۰۰ جفت باز تولید می‌کنند. نتایج نشان داد که تمامی ژنوتیپ‌ها به جزء لاین Flip06-152c (شکل شماره ۳، ردیف ۳۴) دارای باند ۷۰۰ جفت بازی بودند، (شکل‌های ۱، ۲ و ۳) بنابراین فقط لاین Flip06-152c دارای ژن مقاومت بود و سایر ژنوتیپ‌های مورد بررسی فاقد ژن مقاومت به سه نژاد ۱، ۴ و ۵ بودند.

Trampero-Casas and Jimenez-Diaz, 1985) (Haware, 1980

به دلیل تعدد زیاد ژنوتیپ‌ها و این که هدف از انجام آزمایش‌های فتوتیپی تنها تائید نتایج مولکولی بود، تنها شانزده رقم و لاين نخود در آزمایش گلخانه‌ای مورد استفاده قرار گرفتند. بذرهای نخود به منظور جوانه‌زنی در سینی‌های حاوی شن که دو بار هر بار به مدت یک ساعت در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد استریل شده بودند قرار داده شدند.

مايه تلقيح با غلظت  $4 \times 10^6$  cfu/g به خاک گلدان‌های پلاستيكي ۰/۵ لیتری حاوی خاک-شن-پيت که دو بار هر بار به مدت یک ساعت در دمای ۱۲۱ درجه سانتي‌گراد استريل شده بسود، اضافه و مخلوط شد (Kaiser *et al.*, 1994)


از هر رقم ده عدد بذر روی محیط کشت PDA قرار داده شد تا از عدم آلدگی آن‌ها اطمینان حاصل شود. بذرهای سالم از پيش جوانه زده شده به گلدان‌ها منتقل شدند. در هر گلدان سه بذر قرار داده شد و برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد. از هر ژنوتیپ سه گلدان به عنوان شاهد (خاک بدون مايه تلقيح) تهييه شد.

اولين آبياري بعد از کاشت به ميزان ۱۰۰ ميلي لیتر انجام شد و از روز دوم گلدان‌ها روزانه با ۵۰ ميلي لیتر آب آبياري شدند. گلدان‌ها در گلخانه با دمای ۲۰-۲۵ درجه سانتي‌گراد و شرایط عادي نور نگهداري شدند.

جدول ۴- نحوه یادداشت برداری از تیپ آلودگی و تعیین واکنش ژنوتیپ های نخود نسبت به  
*Fusarium oxysporum* f. sp. *ciceri* قارچ

Table 4. Assessment of infection type and response of chickpea genotypes to  
*Fusarium oxysporum* f. sp. *ciceri*

Response	واکنش	تیپ آلودگی Infection type	Visual Symptoms	علائم ظاهری
Resistant (R)	مقاوم	0	No symptom	بدون علامت
Moderately Resistant (MR)	نیمه مقاوم	1	Slight chlorosis	کلروز ملایم
Moderately Susceptible (MS)	نیمه حساس	2	Medium chlorosis	کلروز متوسط
Susceptible (S)	حساس	3	Severe chlorosis + wilting	کلروز یا پژمردگی شدید
Very Susceptible (VS)	بسیار حساس	4	Dead of plant	مرگ گیاه




شکل ۱- محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از نشانگر CS-27<sub>700</sub>، ۱-۱۴: شماره ژنوتیپ ها مطابق جدول ۱ است.

M: مارکر 100bp (شرکت Metabion آلمان)، B: بلانک

Fig. 1. Polymerase chain reaction products using CS-27<sub>700</sub> marker, 1-14 genotypes numbers are according to the Table 1.

M: marker 100bp (by Metabion, Germany), B: Blank




شکل ۲- محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از نشانگر CS-27<sub>700</sub>، ۱۵-۲۸: شماره ژنوتیپ ها مطابق جدول ۱ است.

M: مارکر 100bp (شرکت Metabion آلمان)، B: بلانک

Fig. 2. Polymerase chain reaction products using CS-27<sub>700</sub> marker, 15-28 genotypes numbers are according to the Table 1.

M: marker 100bp (by Metabion, Germany), B: Blank



شکل ۳- محصول واکنش زنجیره‌ای پلیمراز با استفاده از نشانگر CS-27<sub>700</sub>، ۴۲-۲۹: شماره ژنوتیپ‌ها مطابق جدول ۱ است.

M: مارکر 100bp (شرکت Metabion آلمان) B: بلانک

Fig. 3. Polymerase chain reaction products using CS-27<sub>700</sub> marker, 29-42 genotypes numbers are according to the Table 1.

M: marker 100bp (by Metabion, Germany), B: Blank

#### (شکل‌های ۴، ۵ و ۶).


نتایج ارزیابی فتوتیپی ارقام ولاین‌های نخود  
نسبت به نژادهای ۱A، ۲ و ۵ عامل بیماری: تیپ  
آلودگی و واکنش شانزده ژنوتیپ مورد نخود  
نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در  
جدول ۵ آمده است.

تهیه ارقام مقاوم نخود مهم‌ترین و  
اقتصادی‌ترین روش کنترل بیماری پژمردگی  
فوزاریومی است. استفاده از ارقام مقاوم مزایای  
زیادی نسبت به کارگیری ترکیبات شیمیایی و  
سایر روش‌های مبارزه دارد، زیرا هزینه سوم،  
نیروی کار و زمان کاهش پیدا می‌کند. مقاومت  
ژنتیکی ناشی از حضور ژن‌های مقاومت علیه  
بیماری‌ها در ژنوم گیاه است. شناسایی ژن‌های  
مقاومت در ارقام نخود مهم‌ترین گام به منظور  
دستیابی به ارقام تجاری مقاوم به این بیماری  
است. تاکنون روش‌های مختلفی به منظور بررسی  
ژن‌های مقاومت به پژمردگی فوزاریومی نخود و

#### نتایج الگوی نواری حاصل از واکنش

زنجره‌ای پلیمراز با استفاده از نشانگر SCAR  
نشانگر SCAR با نام CS-27 در  
ژنوتیپ‌های فاقد ژن مقاومت به نژادهای  
۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ تولید باندی به وزن ۷۰۰ جفت  
باز می‌کند. این نشانگر در ژنوتیپ‌های  
فاقد ژن مقاومت به نژاد ۳ علاوه بر  
این باند تولید باندی شاخص به وزن  
تقریبی ۵۶۵ جفت باز می‌کند.  
(Sharma and Muehlbauer, 2007)

نتایج نشان داد ۴۱ ژنوتیپ از ۴۲ ژنوتیپ  
مورد بررسی دارای باند ۷۰۰ جفت  
بازی بودند که نشان دهنده عدم  
وجود ژن‌های مقاومت به نژادهای  
۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در آن‌ها بود. علاوه بر این،  
ژنوتیپ‌های حساس با این نشانگر تولید باندی به  
وزن تقریبی ۵۶۵ جفت کردند، که تأکیدی بر  
حساسیت این ۴۱ ژنوتیپ به نژاد ۳ بود.




شکل ۴- محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از نشانگر CS-27، ۱-۱۴: شماره ژنوتیپ‌ها مطابق جدول ۱ است.

M: مارکر 100bp (شرکت Metabion، آلمان) B: بلانک

Fig. 4. Polymerase chain reaction products using CS-27 marker, 1-14 genotypes numbers are according to the Table 1.

M: marker 100bp (by Metabion, Germany), B: Blank




شکل ۵- محصول واکنش زنجیره‌ای پلیمراز با استفاده از نشانگر CS-27، ۱۵-۲۸: شماره ژنوتیپ‌ها مطابق جدول ۱ است.

M: مارکر 100bp (شرکت Metabion، آلمان) B: بلانک

Fig. 5. Polymerase chain reaction products using CS-27 marker, 15-28 genotypes numbers are according to the Table 1.

M: marker 100 bp (by Metabion, Germany), B: Blank



شکل ۶- محصول واکنش زنجیره‌ای پلیمراز با استفاده از نشانگر CS-27، ۲۹-۴۲: شماره ژنوتیپ‌ها مطابق جدول ۱ است.

M: مارکر 100bp (شرکت Metabion، آلمان) B: بلانک

Fig. 6. Polymerase chain reaction products using CS-27 marker, 29-42 genotypes numbers are according to the Table 1.

M: marker 100 bp (by Metabion, Germany), B: Blank

جدول ۵- تیپ آلودگی و واکنش ارقام و لاین‌های نخود نسبت به نژادهای در گلخانه

Table 5. Infection type and response of chickpea cultivars and lines to races of *F. oxysporum* f.sp *ciceri* in greenhouse

Genotype name	نام ژنوتیپ	Race 1A	نژاد ۱A	Race 2	نژاد ۲	Race 5	نژاد ۵
		تیپ آلودگی Infection type	واکنش Response	تیپ آلودگی Infection type	واکنش Response	تیپ آلودگی Infection type	واکنش Response
Azad	آزاد	4	HS	4	HS	4	HS
Arman	آرمان	4	HS	4	HS	3	S
Hashem	حاشم	4	HS	4	HS	3	S
KC215079	-	3	S	3	S	4	HS
KC215887	-	3	S	3	S	3	S
Bionej	بیونیژ	4	HS	3	S	3	S
KC216084	-	3	S	3	S	1	MR
Jam	جم	3	S	3	S	3	S
KC216194	-	2	MS	2	MS	2	MS
KC216223	-	2	MS	2	MS	2	MS
KC215002	-	4	HS	4	HS	1	MR
KC216195	-	4	HS	2	MS	1	MR
KC216228	-	2	MS	4	HS	1	MR
Khoramabad	خرم آباد	1	MR	1	MR	3	S
KC215858	-	4	HS	2	MS	4	HS
Flip06-152c	-	0	R	0	R	0	R

R: Resistant

MR: Moderately Resistant

مقاوم

نیمه مقاوم

MS: Moderately Susceptible

S: Susceptible

نیمه حساس

حساس

HS: Highly Susceptible

خیلی حساس

(Zhang *et al.*, 2005). از این روش به طور موفقیت‌آمیزی برای ایجاد نشانگرها در موجودات مختلف و همچنین ساخت نقشه‌های ژنتیکی استفاده شده است. نشانگر RAPD تعداد زیادی از نشانگرهای چند جایگاهی را فراهم می‌کند که می‌توانند نمونه‌ها را با وضوح بالا از متمایز کنند (Singh, *et al.*, 2011). نشانگرها RAPD زمانی برای انتخاب بر مبنای نشانگر مفید هستند که با درجه اطمینان بالا به ژنی مقاوم نسبت به یک بیماری یا صفات دیگر مرتبط بوده و از یک لاین منفرد غالب به تعداد زیادی جمعیت‌های مختلف منتقل شوند (Brown and Myers, 2001).

تعیین ژنوتیپ مقاوم معرفی شده است. روش‌های کلاسیک نیازمند ارزیابی تعداد زیادی ژنوتیپ است، این نوع ارزیابی‌های فنوتیپی برای مقاومت به بیمارگر مشکل، پر هزینه و تحت تأثیر عوامل محیطی است (Gumber *et al.*, 1995; Landa *et al.*, 2004; Landa *et al.*, 2002). استفاده از نشانگرهای RAPD به دلیل شناسایی ساده و سریع و نیز عدم نیاز به آگاهی از توالی ژنومی نسبت به سایر روش‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این در روش مذکور DNA به آسانی تکثیر شده و نیازی به استفاده از ایزووتایپ‌ها ندارد.

(بررسی فنتوپی) تأییدی بر نتایج نشانگرهای مولکولی (بررسی ژنوپی) بودند، بنابراین لاین مقاوم شناسایی شده برای مطالعات تکمیلی در مزرعه و در مناطقی که بیمارگر وجود دارد توصیه می‌شود. یافته‌های این تحقیق با نتایج به دست آمده از بررسی‌های فنتوپی و ژنوپی که توسط حاجی الله‌وردی پور و همکاران گزارش (Hajiallahverdipour *et al.*, 2011) شده همخوانی دارد.

در ایران مطالعاتی با استفاده از نشانگر مولکولی SCAR روی شناسایی ارقام مقاوم لوییا به بیماری کپک سفید (Bakhshi *et al.*, 2013) و با استفاده از نشانگر RAPD در رابطه با رديابی ژن‌های مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی طوقه گوجه فرنگی انجام شده است (Morid and Hajmansoor, 2011).

از بين ۴۲ ژنوپ نخود مورد بررسی فقط لاین c-152c-06 Flip نسبت به پنج نژاد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ مقاوم بود. نتایج آزمون بیماری‌زایی

## References

- Akem, C. 1998.** Survey on chickpea diseases in Iran. ICARDA, Aleppo, Syria.
- Araujo, L. G., Prabhu, A. S., Pereira, P. A., and Silva, G. B. 2010.** Marker-assisted selection for the rice blast resistance gene *Pi-ar* in a back crosses population. Crop Breeding and Applied Biotechnology 10: 23-31.
- Ausubel, F. M., Brent, R., Kingston, R. E., Moore, D. D., Seidman, J. G., Smith, J. A., and Struhl, K. 1994.** Current Protocols in Molecular Biology. John Wiley and Sons Inc., New York, USA.
- Bakhshi, S., Morid, B., and Zamanizadeh, H. R. 2013.** Identification of the resistance cultivar of *Phaseolus vulgaris* to *Scelerotinia sclerotorum* using SCAR marker. The Second Congress on Organic and Conventional Agriculture, Tehran, Iran (in Persian).
- Beigi, A. 2013.** Detection of genetic variation and identification of *Fusarium oxysporum* f. sp. *ciceris* in pea in Ilam region. MSc. Thesis, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran (in Persian).
- Brick, M. A., Byrne, P. F., Schwartz, H. F., Ogg, J. B., Otto, K., and Fall, A. L. 2006.** Reaction to three races of fusarium wilt in the *Phaseolus vulgaris* core collection. Crop Science 46: 1245-1252.
- Brown, R. N., and Myers, J. R. 2001.** RAPD Markers linked to morphological and disease resistance traits in squash, cucurbit. Genetics and Crop Reports 24: 91-93.

- Dalkilic, Z., Timmer, L. W., and Gmitter, F. G. 2005.** Linkage of an alternaria disease resistance gene in mandarin hybrids with RAPD fragments. Journal of American Society for Horticultural Science 130: 66-71.
- Faleiro, F. G., Vinhadelli, W. S., Ragagnin, V. A., Correa, R. X., Moreira, M. A., and Barros, E. G. 2000.** RAPD markers linked to a block of genes conferring rust resistance to the common bean. Genetics and Molecular Biology 23: 399-402.
- Filho, S. M., Sediyyama, C. S., Moreira, M. A., and de Barros, E. G. 2002.** RAPD and SCAR markers linked to resistance to frog eye leaf spot in soybean. Genetics and Molecular Biology 25(3): 317-321.
- Gerlach, W., and Ershad, J. 1970.** Beiträg zur Kenntnis der Fusarium und Cylindrocarpon. Nova Hedwigia 20: 725-784.
- Gumber, R. K., Kumar, J., and Haware, M. P. 1995.** Inheritance of resistance to fusarium wilts in chickpea. Plant Breeding 114: 277-279.
- Hajiallahverdipour, K., Bahramnejad, B., and Amini, J. 2011.** Selection of molecular markers associated with resistance to fusarium wilt disease in chickpea using multivariate statistical techniques. Australian Journal of Crop Science 5 (13): 1801-1809.
- Halila, M. H., and Strange, R. N. 1996.** Identification of the causal agent of wilt of chickpea in Tunisia as *Fusarium oxysporum* f.sp. *ciceris* race 0. Phytopathology 86: 67-74.
- Haware, M. P., Kumar, J., and Reddy, M. V. 1980.** Disease resistance in Kabuli-desi chickpea introgression. pp: 67-69. In: Haware, M. P., Kumar, J., and Reddy, M.V. (eds.) Proceedings of the International Workshop on Chickpea Improvement, ICRISAT, Hyderabad, India.
- Haymes, K. M., van de Weg, W. E., and Arens, P. 2000.** Development of SCAR markers linked to a *Phytophthora fragariae* resistance gene and their assessment in European and North American strawberry genotypes. Journal of American Society for Horticultural Science 125(3): 330-339.
- Huttle, B., Santra, D., Muehlbauer, F. J., and Kahle, G. 2002.** Resistance gene analogs of chickpea: isolation, genetic mapping and association with fusarium resistance gene cluster. Theoretical and Applied Genetics 105: 479-490.
- Jalali, M., and Chand, L. 1992.** Races of *Fusarium oxysporum* f. sp. *ciceris*. Plant

Disease 66: 809-810.

- Jimenez-Diaz, R. M., Basallote-Ureba, M. J., and Rappoport, H. 1989.** Colonization and pathogenesis in chickpea infected by races of *Fusarium oxysporum* f.sp. *ciceris*. pp.113-121. In: Tjamos, E.C., and Beckmann, C. (eds.) Wascular Wilt Diseases of Palses. Springer Verlag, Berlin, Germany.
- Jimenez-Diaz, R. M., Trapero-Casas, A. T., and Cubero, J. I. 1992.** Importance of chickpea soil-borne diseases in the Mediterranean Basin. pp. 155-169 In: Singh, K. B., and Saxena, M. C. (eds.) Disease Resistance Breeding in Chickpea. ICARDA, Aleppo, Syria.
- Jimenez-Gasco, M. M., Perez-Artes, E., and Jimenez-Diaz, R. M. 2001.** Identification of pathogenic races 0, 1B/C, 5 and 6 of *Fusarium oxysporum* f.sp. *ciceri* with random amplified polymorphic DNA. European Journal of Plant Pathology 107: 237-248.
- Kaiser, W. J., Alcala-Jimenez, A. R., Herves-Vargas, A., Trapero-Casas, J. L., and Jimenez-Diaz, R. M. 1994.** Screening of wild Cicer species for resistance to races 0 and 5 of *Fusarium oxysporum* f. sp. *ciceris*. Plant Disease 78: 962-967.
- Kawchuk, L. M., Hachey, J., and Lynch, D. R. 1998.** Development of sequence characterized DNA markers linked to a dominant verticillium wilt resistance gene in tomato. Genome 41: 91-95.
- Landa, B., Navas-Cortes, J. A., and Jimenez-Diaz, R. M. 2004.** Integrated management of fusarium wilt of chickpea with sowing date, host resistance and biological control. Phytopathology 94: 946-960.
- Manouchehri, A., and Mesri Alamdar, Y. 1966.** Iranian chickpea fusarium wilt disease. Iranian Journal of Plant Pathology 3: 1-11 (in Persian).
- Miklas, P. N., Fourie, D., Wagner, J., Larsen, R. C., and Mienie, C. 2009.** Tagging and mapping *Pse-1* gene for resistance to halo blight in common bean host differential cultivar UI-3. Crop Science 49: 41-48.
- Morid, B., and Hajmansoor, S. 2011.** Screening of resistance genes to fusarium crown rot disease in tomato (*Lycopersicon esculentum*) cultivars using RAPD markers. Journal of Microbial World 3(4): 251-259.
- Mutlu, N., Boyac, F. H., Gocmen, M., and Abak, K. 2008.** Development of SRAP, SRAP-RGA, RAPD, and SCAR markers linked with a fusarium wilt resistance gene

- in eggplant. *Theoretical and Applied Genetics* 117: 1303-1312.
- Nelson, P. E., Toussoun, T. A. and Marasas, W. F. O. 1983.** Fusarium Species. An Illustrated Manual for Identification. Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania, USA. 193 pp.
- Park, S. O., Steadman, J. R., Coyne, D. P., and Crosby, K. M. 2008.** Development of a coupling phase SCAR marker linked to the *Ur-7* rust resistance gene and its occurrence in diverse common bean lines. *Crop Science* 48: 357-363.
- Sharma, K. D., and Muehlbauer, F. J. 2007.** Fusarium wilt of chickpea: physiological specialization, genetics of resistance and resistance gene tagging. *Euphytica* 157: 1-14.
- Singh, K. B., and Reddy, M. V. 1991.** Advances in disease-resistance breeding in chickpea. *Advances in Agronomy* 49: 191-222.
- Singh, M., Chaudhuri, I., Mandal, S. K., and Chaudhuri, R. K. 2011.** Development of RAPD markers linked to fusarium wilt resistance gene in castor bean (*Ricinus communis* L.). *Genetics and Engineering Biotechnology Journal* 28: 1-9.
- Singh, S. D. 2003.** Soil Borne Diseases of Chickpea. ICRICAT, Patancheru Pradesh, India.
- Soule, M., Porter, L., Medina, J., Santana, G. P., Blair, M. W., and Miklas, P. N. 2011.** Comparative QTL map for white mold resistance in common bean and characterization of partial resistance in dry bean lines VA19 and I9365-31. *Crop Science* 51: 123-139.
- Tanksley, S. D., Ganapati, M. W., Prince, J. P., de Vicente, M. C., Bonierbale, M. W., Broun, P., Fulton, T. M., Giovannoni, J. J., Martin, S., Messeguer, G. B., Miller, R. J. C., Paterson, A. H., Pineda, O., Ro, M. S., Wing, R. A., Wu, W., and Young, N. D. 1992.** High density molecular linkage maps of the tomato and potato genomes. *Genetics* 132: 1141-1160.
- Tekeoglu M., Santra, D. K., Kaiser, W. J., and Muehlbauer, F. J. 2000.** Ascachytal blight resistance inheritance in three chickpea recombinant inbred line populations. *Crop Science* 40: 1251-1259.
- Trampero-Casas, A. T., and Jimenez-Diaz, R. M. 1985.** Fungal wilt and root rot of chickpea in southern Spain. *Phytopathology* 75: 1146-1151.
- Vallejo, V. A., and Kelly, J. D. 2008.** Molecular tagging and genetic characterization

of alleles at the *Co-1* anthracnose resistance locus in common bean. *Journal of Genetics and Evolution* 1: 7-20.

**Wang, A., Meng, F., Xu, X., Wang, Y., and Li, J. 2007.** Development of molecular markers linked to *Cladosporium fulvum* resistance gene *Cf-6* in tomato by RAPD and SSR methods. *HortScience* 42: 11-15.

**Westerland, F. V., Campbell, R. N., and Kimble, K. A. 1974.** Fungal root rot and wilt of chickpea in California. *Phytopathology* 64: 632-635.

**Young, R. A., and Kelly, J. D. 1996.** RAPD markers flanking the *Are* gene for anthracnose resistance in common bean. *Journal of American Society for Horticultural Science* 121: 37-41.

**Zhang, H. Y., Liu, X., and He, Z. 2005.** Random amplified DNA polymorphism of *Nicotianata tabacum* L. cultivars. *Biologia Plantarum* 49: 605-607.