

سازگاری برخی ارقام وارداتی و بومی فندق در شرایط منطقه الموت

Adaptability of some Local and Introduced Cultivars of Hazelnuts (*Corylus avellana*) in Alamout Conditions

سونا حسین آوا^۱، منصوره کشاورزی^۲ و ژاله ساعدی^۳

۱ و ۲- به ترتیب دانشیار و استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
۳- کارشناس، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۴/۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۹/۵

چکیده

حسین آوا، س.، کشاورزی، م. و ساعدی، ژ. ۱۳۹۵. سازگاری برخی ارقام وارداتی و بومی فندق در شرایط منطقه الموت. مجله به‌نژادی نهال و بذر ۱-۳۲: ۸۳-۹۳. [10.22092/spij.2017.111290](https://doi.org/10.22092/spij.2017.111290)

فندق از خشکبارهای مهم و ارزآور است که با توجه به تنوع آب و هوایی ایران، امکان توسعه کشت آن وجود دارد. هدف از این تحقیق، بررسی خصوصیات کمی و کیفی هشت رقم داخلی و وارداتی فندق شامل فرتیل دکوتارد، رونددوپیومونت، نگرت، رسمی، شصتک ۲، پشمینه ۸۹، گرچه و گردویی ۸۹ در منطقه الموت قزوین بود. نهال‌ها در سال ۱۳۸۸ در فواصل ۴×۴ متر در ایستگاه تحقیقات گل و گیاه الموت قزوین کاشته شدند و خصوصیات رویشی و زایشی آن‌ها در دو سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارقام پشمینه ۸۹، گرچه، نگرت و گردویی ۸۹ زودتر به بار نشستند. ارقام از نظر عملکرد، تعداد پاجوش و درصد روغن متفاوت بودند. بیشترین عملکرد مربوط به ارقام پشمینه ۸۹، گرچه و گردویی ۸۹ (به ترتیب ۳/۵۸، ۳/۳۴ و ۳/۰۰ کیلوگرم در هر درخت) و کمترین مربوط به رقم فرتیل دکوتارد (۰/۳۶ کیلوگرم در هر درخت) بود. کم‌ترین درصد روغن مربوط به رقم فرتیل دکوتارد (۰/۵۷/۰۶) و بیشترین آن به ارقام رونددوپیومونت و نگرت (به ترتیب ۸۰/۶۶/۷۷٪ و ۶۶/۷۷٪) مربوط بود. در مجموع، از بین ارقام ایرانی، گردویی ۸۹، پشمینه ۸۹ و گرچه و از بین ارقام خارجی، نگرت، بهترین ارقام سازگار و رقم رسمی بهترین گرده‌زا برای منطقه الموت قزوین شناسایی شدند. رقم‌های رونددوپیومونت و شصتک ۲ سازگاری متوسطی در این منطقه نشان دادند ولی رقم فرتیل دکوتارد سازگاری مناسبی نداشت.

واژه‌های کلیدی: فندق، ارقام، عملکرد، روغن، کیفیت.

مقدمه

فندق (*Corylus avellana*) از خانواده Betulaceae و دارای ۲۵ گونه است که ۹ گونه آن از نظر اقتصادی و به‌نژادی اهمیت دارند. اکثراً به صورت درختچه بوده و به ندرت به صورت درختی دیده می‌شود. این گیاه در بیش از بیست کشور جهان عمدتاً در حوزه‌های آبی بزرگ مانند دریای سیاه، خزر، مدیترانه و اقیانوس آرام کشت و کار می‌شود. از مراکز اصلی تولید آن می‌توان به ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، امریکا، روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان اشاره کرد. کشور ایران با توجه به تنوع آب و هوایی می‌تواند به یکی از کشورهای عمده تولیدکننده عمده فندق تبدیل شود. در ایران استان‌های گیلان، اردبیل، قزوین، گرگان، مازندران و قم از مناطقی فندق کاری محسوب می‌شوند (Rahemi and Javadi, 2000).

ارقام فندق در سراسر جهان از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی‌های متعدد قرار گرفته‌اند. ارزیابی صفات مختلف کمی و کیفی میوه، عملکرد، تاریخ گلدهی، مقاومت به تنش‌های محیطی، پاجوش‌دهی، قدرت درخت و سازگاری منطقه‌ای در کشورهای مختلفی از جمله استرالیا (Baldwin, 2009)، ایتالیا (Barratta et al., 1994)، هلند (Schnepers and Kwanten, 2005)، اسپانیا (Rovira et al., 2014)، شیلی (Grau and Torres, 2001)، یوگسلاوی (Mileteic et al., 1997)،

ترکیه (Balta et al., 2006)، چین (Xie et al., 2005) و هند (Sharma and Kumar, 2001) انجام شده و در برخی برنامه‌های به‌نژادی، منابع ژنتیک مورد نیاز از میان ژنوتیپ‌های وحشی انتخاب شده‌اند (Xie et al., 2005)؛ Schnepers and Kwanten, 2005). با توجه به این که بیش از ۹۰٪ فندق دنیا برای مصارف صنعتی است (Germain and Sarraquingen, 2004)، ارقام مناسب برای شیرینی‌سازی از اولویت بالاتری برخوردارند و یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های به‌نژادی فندق، دستیابی به ارقام پوست نازک، گرد، صاف و دارای عمر انباری بالا بوده است (Okay and Ozenic, 2001)؛ McCluskey et al., 2009). موفق‌ترین برنامه‌های به‌نژادی و به‌گزینی فندق در جهان در اورگون امریکا انجام و به معرفی ارقام متنوعی منجر شده‌است (McCluskey et al., 2001, 2009)؛ Mehlenbacher et al., 2006, 2007). هدف از این تحقیق، مقایسه خصوصیات رویشی، زایشی، عملکرد و درصد روغن هشت رقم ایرانی و خارجی فندق در منطقه الموت قزوین به منظور انتخاب بهترین رقم سازگار و گرده‌زای مناسب برای آن منطقه بود.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق سه رقم خارجی (فرتیل دکوتارد، رونددوپیمونت و نگر) و پنج رقم

به صورت یکسان انجام شد و آبیاری به صورت نشتی بود. بر اساس شرایط آب و هوایی منطقه، نیاز آبی برای هر نهال به صورت تجربی و معادل ۱۰-۵ لیتر در هر ده روز برآورد شد. آبیاری تکمیلی در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور انجام شد. کنترل علف‌های هرز به صورت مکانیکی و کنترل آفت برگ‌خوار با استفاده از سموم شیمیایی در زمان مناسب انجام شد.

نتایج و بحث

نتایج مشاهدات نشان داد که ارقام رسمی، پشمینه ۸۹، گردویی ۸۹ و روند دوپیمونت پروتوژن (Protogenous)، فرتیل دکوتارد و شصتک ۲، پرتاندر (Protanderous) و نگر و گرچه هموگام (Homogamous) بودند. ارقام از نظر رشد قطر تنه، ارتفاع درخت و فاصله جوانه با هم اختلاف معنی‌داری نداشتند اما عملکرد درخت، تعداد پاجوش و درصد روغن آن‌ها اختلاف معنی‌داری داشت. بیشترین عملکرد درخت مربوط به ارقام پشمینه ۸۹، گرچه و گردویی ۸۹ و کم‌ترین مربوط به رقم فرتیل دکوتارد بود (جدول ۱). مقایسه این داده‌ها با نتایج بررسی‌های سازگاری همین مواد گیاهی در سال ۱۳۹۲ در کرج و آستارا (حسین آوا و همکاران، گزارش منتشر نشده) نشان داد که در کرج و آستارا نیز ارقام پشمینه ۸۹، گرچه و گردویی ۸۹ بهترین عملکرد را داشتند اما از نظر کمی، مقدار عملکرد در آستارا در مجموع بیش از الموت و کرج بود که

داخلی (رسمی، شصتک ۲، پشمینه ۸۹، گرچه و گردویی ۸۹) مورد بررسی قرار گرفتند. این ارقام در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات گل و گیاه الموت قزوین در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار هر یک حاوی سه نهال (مجموعاً ۷۲ نهال) کاشته شدند. بدین منظور، پاجوش‌ها در گودال‌هایی به ابعاد ۵۰×۵۰×۵۰ سانتی‌متر و با فواصل ۴×۴ متر کاشته شدند. نوع تربیت، درختچه‌ای با چهار تنه بود. در سال سوم و چهارم (۱۳۹۰ و ۱۳۹۱)، خصوصیات رویشی و زایشی شامل تعداد پاجوش، عملکرد، درصد روغن، قطر تنه، تیپ گلدهی، قطر و ارتفاع درخت، فاصله جوانه‌ها، طول شاخه‌های اصلی و فرعی، فاصله میانگره، طول و عرض برگ و طول دم‌برگ مورد بررسی قرار گرفتند. زمان گلدهی در ارقام مختلف از اول تا بیستم اسفند یادداشت‌برداری شد. زمان رسیدن میوه بر اساس زمان تغییر رنگ پوسته چوبی از سبز به قهوه‌ای تعیین شد. ارتفاع درخت و قطر تاج با متر و قطر تنه با کولیس به دقت ۰/۱ میلی‌متر اندازه‌گیری شد. درصد روغن با استفاده از دستگاه سوکسیله اندازه‌گیری شد.

سالی یک بار از کود حیوانی به میزان ۵-۶ کیلوگرم و سولفات آمونیوم به میزان ۵۰ گرم برای هر نهال استفاده شد. مقداری از کود نیتروژن در اواخر زمستان و بقیه آن در بهار (حداکثر تا اوایل تیرماه) مصرف شد (Makhno et al., 1994). اعمال آبیاری و کود

جدول ۱- میانگین عملکرد، تعداد پاجوش و درصد روغن ارقام فندق در منطقه الموت قزوین
Table 1. Mean values of yield, suckers and oil percentage of hazelnut cultivars in Almout, Qazvin

| Cultivars | ارقام | عملکرد درخت Yield (kg/tree) | تعداد پاجوش بر درخت Suckers/tree | روغن (درصد) Oil content (%) |
|--------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Pashmineh 89 | پشمینه ۸۹ | 3.58a | 7.22ab | 60.47d |
| Gercheh | گرچه | 3.34a | 8.56a | 62.20c |
| Gerdoeh 89 | گردویی ۸۹ | 3.00a | 8.33a | 62.57c |
| Shastak2 | شصتک ۲ | 2.67ab | 5.44b | 65.13b |
| Rasmi | رسمی | 2.48ab | 8.56a | 65.60b |
| Negret | نگرت | 1.63bc | 1.56d | 66.77a |
| Rond de Pimont | رونددوپیمنت | 1.26cd | 3.11cb | 66.80a |
| Fertile de Coutard | فرتیل دکوتارد | 0.36d | 2.67d | 57.06e |

در هر ستون، میانگین‌هایی که با حروف مشابه دنبال شده‌اند از نظر اماری اختلاف معنی‌داری ندارند ($P \leq 0.01$).
In each column, means followed by similar letters are not significantly different ($P \leq 0.01$).

الموت قزوین پوکی میوه مشاهده نشد. کلیه این ارقام در سال ۱۳۹۲ در کرج و آستارا نیز پوکی میوه نشان نداده بودند (حسین آوا و همکاران، گزارش منتشر نشده). در هر سه منطقه الموت، کرج و آستارا، رقم پشمینه ۸۹ گرده‌زای مناسبی بود.

درصد روغن ارقام مختلف نیز متفاوت بود و بیشترین درصد روغن در رقم رونددوپیمنت و کم‌ترین در رقم شصتک ۲ به دست آمد. در آستارا و کرج ارقام گرچه، گردویی ۸۹ و پشمینه ۸۹ بیشترین و شصتک ۲ کم‌ترین درصد روغن را داشتند (حسین آوا و همکاران، گزارش منتشر نشده).

میانگین برخی صفات رویشی در جدول ۲ آمده است. از نظر صفت طول شاخه اصلی، ارقام شصتک ۲ و رسمی بیشترین و رقم رونددوپیمنت کم‌ترین رشد شاخه اصلی را داشتند. رقم گردویی بیشترین و رقم

می‌تواند به دلیل رطوبت نسبی بالاتر مناطق مجاور دریای خزر باشد.

از نظر تعداد پاجوش، ارقام گرچه، رسمی و گردویی ۸۹ بیشترین و رقم فرتیل دکوتارد کم‌ترین تعداد پاجوش را داشتند و نگرت پاجوشی نداد. پاجوش این ارقام در منطقه الموت مشابه آستارا و کرج بود و رقم نگرت در آستارا و کرج نیز پاجوش نداشت اما برخلاف منطقه الموت، رقم فرتیل دکوتارد در آستارا و کرج پاجوش دهی مطوبی داشت. رقم نگرت بر اساس دستورالعمل توصیفی فندق (Koksal and Tuna, 2008) نیز پاجوش بسیار پائینی دارد. پاجوش دهی بالا در باغداری مدرن و مکانیزه مشکل ساز است و رفع آن نیازمند سمپاشی ۵-۶ نوبت علف کش در فصل رشد و قطع دستی پاجوش‌ها در زمستان است.

بر اساس مشاهدات، به جز رقم فرتیل دکوتارد با ۵/۵٪ پوکی، در سایر ارقام در منطقه

جدول ۲- میانگین برخی صفات رویشی در ارقام فندق در منطقه الموت قزوین

Table 2. Mean values of some vegetative traits of hazelnut cultivars in Alamout, Qazvin

| Cultivars | رقم | طول دمبرگ Petiole length (cm) | عرض برگ Leaf width (cm) | طول برگ Leaf length (cm) | طول میانگره Internodes length (cm) | طول شاخه ثانویه Secondary shoot length (cm) | طول شاخه اصلی Primary shoot length (cm) | فاصله جوانه ها Buds distance (cm) |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|
| Shastak 2 | شصتک ۲ | 2.16ab | 10.04b | 11.68b | 2.22bc | 11.01bcd | 13.5a | 2.1d |
| Rasmi | رسمی | 1.91ab | 10.04b. | 12.04ab | 2.19bc | 10.28c | 13.4a | 2.2a |
| Gerdoe 89 | گردویی ۸۹ | 2.12ab | 11.88a | 13.07a | 2.32abc | 12.92a | 13.19ab | 2.2a |
| Fertile de Coutard | فرتیل دکوتارد | 2.18a | 8.4d | 10.61c | 2.51ab | 11.91abc | 12.26bc | 2.1a |
| Gerche | گرچه | 2.13ab | 10.42b | 11.91b | 2.07c | 11.68bcd | 11.78cd | 2.2a |
| Negret | نگرت | 1.79b | 7.38e | 9.07d | 2.25abc | 12.38ab | 11.49cd | 2.3b |
| Pashmineh 89 | پشمینه ۸۹ | 2.24a | 9.03c | 12.38ab | 2.31abc | 11.7abc | 10.83cd | 2.2a |
| Rond de Pimont | روند دوپیمونت | 2.23a | 9.3c | 12.51ab | 2.59a | 9.6d | 9.92e | 2.3b |

در هر ستون، میانگین‌هایی که با حروف مشابه دنبال شده‌اند از نظر آماری اختلاف معنی‌داری ندارند ($P \leq 0.01$).

In each column, means followed by similar letters are not significantly different ($P \leq 0.01$).

ایرانی، گردویی ۸۹، پشمینه ۸۹ و گرچه و در بین ارقام خارجی، نگرت بهترین ارقام سازگار و رقم محلی رسمی بهترین گرده‌زا برای منطقه الموت ارزیابی شدند. رقم شصتک ۲ سازگاری متوسطی در این منطقه نشان داد ولی ارقام فرتیل دکوتارد و روندوپیومنت سازگاری مناسبی در منطقه الموت نداشتند. در شرایط کرج ارقام پشمینه ۸۹، گردویی ۸۹ و گرچه گرده‌زای مناسب و فرتیل دکوتارد، روندوپیومنت و نگرت ارقام سازگاری بودند. عملکرد رقم نگرت در کرج همیشه یکسان و خوب بود و سال اوری نداشت. در آستارا رقم پشمینه ۸۹ و گرچه گرده‌زای مناسب و ارقام فرتیل دکوتارد، روندوپیومنت، نگرت، گردویی ۸۹ و پشمینه ۸۹ ارقام سازگار مناسبی بودند اما رقم محلی رسمی مناسب منطقه آستارا نبود (حسین آوا و همکاران، گزارش منتشر نشده).

صفات قطر تنه، ارتفاع درخت و قطر تاج نیز در دو سال متوالی اندازه‌گیری شدند (جدول ۴). اثر این صفات به‌صورت تجمعی است یعنی مقدار صفت در سال بعد برابر با میزان رشد سالیانه به علاوه مقدار رشد سال‌های قبلی خواهد بود. به‌عنوان مثال ارتفاع دانهال در سال ۱۳۹۱ برابر با میزان رشد ارتفاع در همان سال به علاوه ارتفاع دانهال در سال‌های قبل بوده است که این حالت در مورد صفات قطر تنه و قطر تاج نیز صادق است. بنابراین بدیهی است که میزان این صفات در هر سال بیشتر از سال‌های قبلی است. لذا با توجه به اثر تجمعی این صفات

روندوپیومنت کم‌ترین رشد شاخه ثانویه را داشتند. مقایسه میانگین صفت طول میانگره نشان داد که بیشترین و کم‌ترین میانگین طول میانگره به ترتیب در ارقام روندوپیومنت و گرچه بود. بیشترین طول و عرض برگ مربوط به رقم گردویی ۸۹ و کم‌ترین در رقم نگرت مشاهده شد. بر این اساس، رقم گردویی ۸۹ بزرگ‌ترین و رقم نگرت کوچک‌ترین برگ را داشتند. نتایج مقایسه میانگین مربوط به طول دم‌برگ نیز نشان داد که رقم‌های پشمینه ۸۹، روندوپیومنت و فرتیل دکوتارد بیشترین و رقم نگرت کم‌ترین طول دم‌برگ را داشتند. فاصله جوانه‌ها نیز در ارقام مختلف متفاوت و بیشترین مقادیر آن در ارقام روندوپیومنت و نگرت دیده شد.

مقایسه میانگین این صفات در دو سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در جدول ۳ نشان داده شده است. با توجه به این نتایج مشخص شد که در مجموع، در سال ۱۳۹۱ بیشتر صفات مقادیر بیشتری نسبت به سال ۱۳۹۰ داشتند که می‌تواند ناشی از عوامل محیطی یا مدیریتی مساعدتر در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل باشد. میانگین طول شاخه اصلی، طول شاخه ثانویه، طول و عرض برگ در سال ۱۳۹۱ بیش از سال ۱۳۹۰ بود ولی طول میانگره، طول دم‌برگ و فاصله جوانه چندان تحت تاثیر سال قرار نگرفتند. چنین به نظر می‌رسد این صفات کم‌تر تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می‌گیرند و کنترل آن‌ها بیشتر به صورت ژنتیکی است.

بر اساس نتایج این تحقیق، در بین ارقام

جدول ۳- مقایسه میانگین صفات رویشی ارقام فندق ر دو سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در منطقه الموت قزوین

Table 3. Comparison of mean values of vegetative traits of hazelnut cultivars in two years 2011 and 2012 in Alamout, Qazvin

| Year | سال | فاصله جوانه Buds distance (cm) | طول دمیرگ Petiole length (cm) | عرض برگ Leaf width (cm) | طول برگ Leaf length (cm) | طول میانگره Internode length (cm) | طول شاخه ثانویه Secondary shoot length (cm) | طول شاخه اصلی Primary shoot length (cm) |
|------|------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| 2012 | ۱۳۹۱ | 2.2a | 2.0a | 10.0a | 12.1a | 2.4a | 12.2a | 12.6a |
| 2011 | ۱۳۹۰ | 2.1a | 2.0b | 9.1a | 11.2b | 2.2a | 10.4b | 11.5b |

در هر ستون، میانگین‌هایی که با حروف مشابه دنبال شده‌اند از نظر آماری اختلاف معنی‌داری ندارند ($P \leq 0.01$).

In each column, means followed by similar letters are not significantly different ($P \leq 0.01$).

جدول ۴- مقایسه میانگین قطر تنه، قطر تاج و ارتفاع درخت در ارقام فندقی در دو سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در منطقه الموت قزوین

Table 4. Comparison of mean values of trunk diameter, tree diameter and tree height in hazelnut cultivars in two years 2011 and 2012 in Alamout, Qazvin

| Cultivar | رقم | قطر تاج Tree diameter (cm) | | ارتفاع درخت Tree height (cm) | | قطر تنه Trunk diameter (cm) | |
|--------------------|---------------|----------------------------------|---------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| | | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ |
| | | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Gerdoe89 | گردونی ۸۹ | 157.44a | 178.56a | 149.4a | 162.8a | 3.94a | 4.80a |
| Shastak 2 | شصتک ۲ | 142.33b | 56.78b | 149.1a | 161.4a | 3.69a | 4.56ab |
| Rasmi | رسمی | 141.44b | 148.11b | 126.9b | 146.3b | 3.53ab | 4.06bc |
| Gerche | گرچه | 81.34c | 92.51c | 118.0bc | 123.0c | 3.53ab | 3.66c |
| Rond de Pimont | روند دوپیمونت | 60.79d | 71.22d | 112.0c | 125.0c | 3.08bc | 3.74c |
| Pashmineh 89 | پشمینه ۸۹ | 55.34d | 64.79de | 62.3d | 67.8d | 2.97c | 3.93bc |
| Negret | نگرت | 49.4d | 56.64e | 50.9e | 59.3d | 2.74c | 3.32c |
| Fertile de Coutard | فرتیل دکوتارد | 47.98d | 55.76e | 50.6e | 58.8d | 1.7d | 2.49d |

در هر ستون، میانگین‌هایی که با حروف مشابه دنبال شده‌اند از نظر آماری اختلاف معنی‌داری ندارند ($P \leq 0.01$).

In each column, means followed by similar letters are not significantly different ($P \leq 0.01$).

سال، رقم شصتک ۲ بیشترین قطر تاج را داشت. کم‌ترین قطر تاج در سال اول مربوط به ارقام پشمینه، نگرت، رونددوپیمنت و فرتیل دکوتارد و در سال ۱۳۹۱ مربوط به رونددوپیمنت و فرتیل دکوتارد بود (جدول ۴).

نتایج بررسی همبستگی صفات مختلف در جدول ۵ آمده است. با توجه به نتایج به دست آمده صفات قطر تنه با ارتفاع درخت ($R^2=0/69$)، قطر تاج ($R^2=0/66$)، طول برگ ($R^2=0/45$) و عرض برگ ($R^2=0/66$) همبستگی نشان دادند. طول شاخه اصلی با طول شاخه ثانویه ($R^2=0/38$)، قطر تنه ($R^2=0/43$)، قطر تاج ($R^2=0/64$) و ارتفاع درخت ($R^2=0/52$) نیز با هم همبستگی داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که طول شاخه اصلی عامل مهمی در تعیین اندازه و ارتفاع درخت است. به علاوه ارتفاع درخت نیز با اندازه برگ (طول و عرض برگ) همبستگی مثبت و طول شاخه اصلی با ارتفاع درخت همبستگی مثبت معنی‌داری نشان دادند ولی طول شاخه ثانویه با ارتفاع درخت همبستگی معنی‌داری نشان نداد.

امکان تجزیه مرکب برای این صفات وجود نداشت و تجزیه واریانس آن‌ها به صورت مستقل در هر سال انجام شد که براساس نتایج، میانگین قطر تنه، ارتفاع دانهال و قطر تاج ارقام در هر دو سال متفاوت بود. مقایسه این مقادیر با داده‌های کرج و آستارا (حسین‌آوا و همکاران، گزارش منتشر نشده) نشان می‌دهد که در مجموع، رشد رویشی نسبی ارقام فندق در هر سه منطقه مشابه بود اما مجموع رشد رویشی در الموت از دو منطقه دیگر کم‌تر بود.

نتایج مقایسه میانگین قطر تنه نشان داد که در سال ۱۳۹۰ ارقام گردوئی ۸۹ و شصتک ۲ بیشترین قطر تنه را داشتند. رقم گردوئی ۸۹ در سال ۱۳۹۱ نیز بیشترین قطر تنه را داشت و رقم شصتک ۲ نزدیک‌ترین رقم به آن بود. کم‌ترین قطر تنه در هر دو سال مربوط به رقم فرتیل دکوتارد به دست آمد.

مقایسه میانگین صفت ارتفاع درخت نشان داد که در هر دو سال، ارقام گردوئی ۸۹ و شصتک ۲ بیشترین ارتفاع را داشتند. کم‌ترین ارتفاع در سال اول مربوط به ارقام نگرت و فرتیل دکوتارد و در سال دوم در سه رقم رونددوپیمنت، نگرت و فرتیل مشاهده شد. مقایسه میانگین قطر تاج نشان داد که در هر دو

جدول ۵- ضریب همبستگی بین صفات رویشی در ارقام فندق در منطقه الموت قزوین
 Table 5. Correlation coefficients between vegetative traits of hazelnut cultivars in Alamout Qazvin

| Traits | صفات | طول شاخه اصلی Primary shoot length | قطر تنه Trunk diameter | ارتفاع درخت Tree height | طول شاخه ثانویه Secondary shoot length | فاصله میانگره Internode length | طول برگ Leaf length | عرض برگ Leaf width | طول دمبرگ Petiole length | فاصله جوانه Buds distance |
|------------------------|-----------------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Trunk diameter | قطر تنه | 0.43** | | | | | | | | |
| Tree height | ارتفاع درخت | 0.52** | 0.69** | | | | | | | |
| Secondary shoot length | طول شاخه ثانویه | 0.38** | 0.16 | 11.0 | | | | | | |
| Internode length | طول میانگره | 0.11 | 0.04 | -0.26 | 0.1 | | | | | |
| Leaf length | طول برگ | 0.14 | 0.45** | 0.42** | 0.01 | 0.14 | | | | |
| Leaf width | عرض برگ | 0.17 | 0.66** | 0.72** | 0.17 | 0.03 | 0.56** | | | |
| Petiole length | طول دمبرگ | 0.60* | 0.19 | 0.1 | 0.06 | 0.36** | 0.44** | 0.28** | | |
| Bud distance | فاصله جوانه | 0.08 | 0.07 | 0.23 | 0.03 | 0.26 | -0.03 | 0.01 | 0.07 | |
| Tree diameter | قطر تاج | 0.64** | 0.66** | 0.85** | 0.1 | 0.19 | 0.3** | 0.3** | 0.01 | -0.06 |

* و **: به ترتیب معنی دار در سطح ۵٪ و ۱٪.

***: Significant at 5% and 1% levels of probability, respectively.

References

- Baldwin, B. 2009.** The effects of site and seasonal conditions on nut yield and kernel quality of hazelnut genotypes grown in Australia. *Acta Horticulturae* 845: 83-88.
- Balta, M., Yarılgaç, T., Askin, M., Kuçuk, M., Balta, F., and Ozrenk, K. 2006.** Determination of fatty acid compositions, oil contents and some quality traits of hazelnut genetic resources grown in Eastern Anatolia of Turkey. *Journal of Food Composition Analysis* 19: 681-686.
- Baratta, B., Raimondo, A., Calderone, F., and Campisi, G. 1994.** Four years of trials on comparing 45 hazelnut cultivars in the Nebrodi Area (Me). *Acta Horticulturae* 351: 79-92
- Botu, I., Turcu, E., Preda, S., Botu, M., and Achim, G. 2005.** 25 years of achievements and perspectives in hazelnut breeding in Romania. *Acta Horticulturae* 686: 91-94.
- Germain, E., and Sarraquigne, J. P. 2004.** Le noisetier. Centre Technique interprofessionnel des Fruits et Legumes (CTIFL), Paris, France.
- Grau, P., and Torres, A. 2001.** Preliminary evaluation of hazelnut performance in Chile. *Acta Horticulturae* 556: 49-54.
- Koksal, A. I., and Tunna, N. 2008.** Descriptors for Hazelnut Biodiversity International. CIHEM-FAO, F. A. O., Rome, Italy. 55 pp.
- Makhno, V., Hoseinava, S., and Hoseinia, A. 2004.** Hazelnut Culture Guide in Golestan Province. Horticultural Deputy Publication, Ministry of Jihad-e-Agriculture, Tehran, Iran (in Persian).
- McCluskey, R. I., Azarenco, A. N., Mehenbacher, S. A., and Smith, D. C. 2001.** Commercial hazelnut cultivar and advanced selection evaluations at Oregon State University. *Acta Horticulturae* 556: 89-95.
- McCluskey, R. I., Mehenbacher, S. A., Smith, D. C., and Azarenco, A. N. 2009.** Advanced selection and new cultivar performance in hazelnut trials planted in 1998 and 2000 at Oregon State University. *Acta Horticulturae* 845: 67-71
- Mehlenbacher, S. A., Azarenko, A. N., Smith, D. C., and McCluskey, R. L. 2007.** ‘Santiam’ hazelnut. *HortScience* 42: 715-717.
- Mehlenbacher, S. A., Smith, D. C., and McCluskey, R. L. 2006.** Sacajawea Hazelnut

- cultivar. Ext. Ser. OSU, 540.130.
- Mileteic, R., Ogasanovic, D., Mitrovic, M., and Plazinic, R. 1997.** Result of investigating some hazelnut cultivars in arid conditions. *Acta Horticulturae* 445: 73-78.
- Okay, A. N., and Ozenic, N. 2001.** Hazelnut improvement through hybridization. *Acta Horticulturae* 556: 235-240.
- Rahemi, M., and Javadi, D. 2000.** Effect of pollen source on nut and kernel characteristics of hazelnut. *Acta Horticulturae* 556:371-376.
- Rovira, M., Tous, J., Hermoso, J. F., and Romero, A. 2014.** Performance of eleven hazelnut cultivars from different countries in Torragona (Spain). *Acta Horticulturae* 1052: 35-38.
- Schnepers, H. T. A. M., and Kwanten, E. F. J. 2005.** Selection and breeding of hazelnut cultivars suitable for organic cultivation in The Netherlands. *Acta Horticulturae* 686: 87-89.
- Sharma, S. D., and Kumar, A. K. 2001.** Preliminary evaluation of hazelnut seedling tree native to India. *Acta Horticulturae* 556: 29-43.
- Xie, M., Zheng, J., Radicati, L., and Me, G. 2005.** Interspecific hybridization of hazelnut and performance of 5 varieties in China. *Acta Horticulturae* 686: 65-70.