

نشریه علوم دامی

(بژوهش و سازندگی)

شماره ۱۱۴، بهار ۱۳۹۶

صفحه: ۱۲۸~۱۱۳

مقایسه اثر انسانس میخک، آنتی بیوتیک ویرجینیامايسین و پروبیوتیک پروتکسین بر عملکرد، فراسنجه های خونی، جمعیت میکروبی و بافت شناسی روده کوچک

- حمید جهانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد
- مژگان مظہری (نویسنده مسئول)
استادیار گروه علوم دامی دانشگاه جیرفت.
- نعمت ضیایی
استادیار گروه علوم دامی دانشگاه جیرفت
- روح الله میر محمودی
استادیار گروه علوم دامی دانشگاه جیرفت

تاریخ دریافت: بهمن ۱۳۹۴ تاریخ پذیرش: اردیبهشت ۱۳۹۵

شماره تماس نویسنده مسئول: ۰۳۴۳۲۷۲۳۴۱۸

Email: mozhgan.mazhari@gmail.com

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر آنتی بیوتیک ویرجینیامايسین، انسانس میخک و پروبیوتیک پروتکسین بر عملکرد، فراسنجه های خونی، جمعیت میکروبی و بافت شناسی روده کوچک جوچه های گوشته ای انجام شد. برای این منظور، ۲۴ قطعه جوجه نر گوشته سویه راس ۳۰۸ در ۲۴ واحد آزمایش با ۶ تیمار و ۴ تکرار ۱۰ قطعه ای در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. تیمارها شامل: جیره پایه (شاهد)، دو گروه آزمایشی تغذیه شده با جیره شاهد و افرودن ۰/۰۲ درصد آنتی بیوتیک ویرجینیامايسین و پروبیوتیک پروتکسین و سه گروه آزمایشی تغذیه شده با جیره شاهد و سطوح ۱۵۰، ۳۰۰ و ۴۵۰ میلی گرم در کیلوگرم جیره، انسانس میخک بودند. نتایج نشان دادند که تیمارهای حاوی آنتی بیوتیک، پروبیوتیک و سطوح ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم انسانس میخک وزن زنده، ضربت تبدیل خوراک، وزن نسبی لاشه، سینه و ران را به طور معنی دار بهبود بخشیدند ($P < 0/05$). میانگین وزن نسبی اندام های اینتنی بورس و طحال و همچنین کبد، در تمامی تیمارها در مقایسه با تیمار کنترل افزایش یافت ($P < 0/05$). تمامی پروبیوتیک و تمامی سطوح انسانس، میزان کلسترول و LDL پلاسمای خون را به طور معنی دار کاهش دادند ($P < 0/05$). تمامی تیمارها به جز آنتی بیوتیک، تعداد باکتری های لاكتوباسیلوس را افزایش و تعداد باکتری های اشريشیاکلی را کاهش دادند ($P < 0/05$). آنتی بیوتیک، پروبیوتیک و سطوح ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم انسانس میخک ارتفاع و عرض پرز را افزایش و عمق کریبت را کاهش دادند. تمامی تیمارها نسبت هتروفیل به لنفویت را بهبود بخشیدند ($P < 0/05$). بنابراین می توان از پروبیوتیک و انسانس میخک تا سطح ۳۰۰ میلی گرم به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک در جهت بهبود عملکرد و اینمنی جوچه های گوشته استفاده کرد.

واژه های کلیدی: انسانس میخک، آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، عملکرد، جوچه گوشته

Animal Science Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 114 pp: 113-128

Comparison of the effect of Dianthus extract, Protexin probiotic and Virginiamycin on performance, blood metabolites, microbial community and intestine histopathology of broilers

By: H. Jahani¹, M. Mazhari^{2*}, N. Ziae², R. Mirmahmoudi²

1. Msc student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Jiroft

2. Assistant professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Jiroft

Received: February 2016

Accepted: May 2016

This experiment was conducted to investigate the effects of dietary *dianthus* extract, virginiamycin and Protexin probiotic on the growth performance, blood metabolites, microbial community and small intestine histopathology of male broilers from 1 to 42 days of age. A total of 240 Ross male broilers were randomly distributed to 24 experimental units and 6 dietary treatments (4 replicates with 10 birds in each). Treatments were included control (basal diet), basal diet+Virginiamycin antibiotic, basal diet+ Protexin probiotic, basal diet + 100 mg *dianthus* extract, basal diet + 300 mg *dianthus* extract and basal diet + 450 mg *dianthus* extract per kg of diet. The result showed that the average body weight gain of broilers fed with Virginiamycin, Protexin, 150 and 300 mg *dianthus* extract was significantly more and feed conversion ratio was less than control group in all periods ($P<0.05$). The relative weights of carcass, breast and leg were improved by all treatments except for 450 mg *dianthus* extract. The relative weights of liver, Bursa and spleen were increased by all treatments. The serum concentration of cholesterol and LDL were decreased by Protexin and all levels of *dianthus* extract. All treatments increased *Lactobacillus* bacteria and decreased *Escherichia coli* bacteria except Virginiamycin treatment. Villus height and width increased and crypt depth decreased by all supplementation. All treatment groups increased blood lymphocyte, decreased heterophile and improved heterophile to lymphocyte ratio. Based on these results, Protexin and *dianthus* extract up to 300 mg/kg of diet may be good replacement for antibiotic to improve broiler performance and immunity.

Key words: Dianthus extract, Antibiotic, Probiotic, Performance, broiler

مقدمه

خوراک می باشد. ویرجینیاماکسین یک آنتی بیوتیک محرک رشد می باشد که به طور اختصاصی بر باکتری های گرم مثبت اثر می گذارد و باعث تغییر فلور میکروبی رودها می شود. این عمل با جلوگیری از ساخت پروتئین در پیکر میکروب هایی که با تکثیر آنها جدار روده ضخیم می شود، انجام می گیرد. بدین ترتیب جدار روده به حال عادی باز گشته، جذب مواد غذایی بهتر و بیشتر انجام می شود و در نتیجه ضریب تبدیل ماده غذایی کاهش می یابد (Pedroso و همکاران، ۲۰۰۶).

آنتی بیوتیک های محرک رشد از دهه ۱۹۴۰ در جهت افزایش رشد حیوانات مزرعه ای استفاده شده اند. اگرچه مکانیسم دقیق اثر آنتی بیوتیک ها در تحریک رشد به درستی اثبات نشده است، اما این باور وجود دارد که آنها از طریق خاصیت ضد میکروبی و از بین بردن باکتری ها و عوامل بیماری زایی که منجر به کاهش رشد می شوند، در تحریک رشد نقش دارند (Lee و Lillehoj، ۲۰۱۲). نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که تأثیر آنتی بیوتیک ها در افزایش عملکرد جوجه های گوشته همراه با افزایش مصرف

می باشد (Vahdatpour و همکاران، ۲۰۱۱).^۱ گل میخک با نام علمی دیانتوس^۲ گل بومی منطقه خاور نزدیک است. اسانس میخک ترکیبات فعال مختلفی دارد که فعالیت های فیزیولوژیک و متابولیسمی حیوان را تحت تاثیر قرار می دهنند. مهمترین ترکیبات فعال این اسانس شامل اوژنول^۳، کاربوفلین^۴، وانیلین^۵، کراتگولیک اسید^۶، متیل سالیسیلات^۷، کامفرون^۸، تری ترپنیوئید مانند اوکانولیک اسید^۹ و استیگماسترول^{۱۰} می باشد. مهمترین این جایگزین های مناسبی نیز برای آن ها معرفی شده است که از (Jirovetz و همکاران، ۲۰۰۶). میخک جریان آنزیمی را افزایش داده و در نتیجه فعالیت گوارشی را تقویت می کند. همچنین مقوی معده و هاضمه است و کبد و کلیه را تقویت می کند. اوژنول ترکیب فعال موجود در اسانس میخک می تواند تأثیر بسزایی بر ارتفاع پرز و تعداد سلول های گابلت داشته و به دنبال آن جذب مواد مغذی را افزایش دهد (Jirovetz و همکاران، ۲۰۰۶).

اسانس میخک خاصیت آنتی میکروبی بسیار قوی داشته و همچنین محرک هضم بوده (Kamel و همکاران، ۱۹۹۹) و دارای فعالیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی می باشد (Dragland و همکاران، ۲۰۰۳). هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر آنتی بیوتیک، اسانس میخک و پروپیوتیک، بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فرآسنجه های خونی، جمعیت میکروبی و صفات بافتی روده کوچک جوجه های گوشته می باشد.

مواد و روشهای

طرح آزمایش و تیمارها

جهت انجام این آزمایش، ۲۴۰ قطعه جوجه گوشته نر سویه تجاری راس ۳۰۸ پس از وزن کشی به طور تصادفی در ۲۴ پن، با

^۱. *Dianthus*

^۲. Eugenol

^۳. Caryophyllen

^۴. Vanillin

^۵. Catecholic acid

^۶. Methyl Salicylate

^۷. Kaempferol

^۸. Oleanolic acid

^۹. Stigmasterol

استفاده از آنتی بیوتیک ها در زمینه مبارزه با عوامل بیماری زا و بهبود عملکرد در کنار آن ها مشکلاتی را نیز در بر داشته است که از جمله این مشکلات می توان به پیدا شدن گونه های میکروبی مقاوم در مقابل آنتی بیوتیک ها، باقی ماندن بقایای آن ها در تولیدات و اثرات سوء این مواد بر مصرف کنندگان اشاره کرد در کنار این محدودیت در مصرف آنتی بیوتیک ها، جایگزین های مناسبی نیز برای آن ها معرفی شده است که از مهمترین این جایگزین ها، می توان به گیاهان دارویی و مشتقات مختلف آن ها اشاره کرد (Cervantes و همکاران، ۲۰۱۱).

مواد افروندنی گیاهی و فرآورده های آن ها شامل عصاره های گیاهی، اسانس ها و یا مواد تشکیل دهنده آن ها از جمله محرک های رشد جایگزین هستند که به علت دارا بودن خصوصیات ضد میکروبی، در صنعت خوراک دام و طیور استفاده می شوند. چنین فرآورده هایی نسبت به آنتی بیوتیک های صنعتی مزایای مختلفی دارند و بدون این که باقیمانده ای از خود بر جای بگذارند به عنوان اقلام خوراکی سالم و مطمئن در صنعت خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار گرفته اند (Brenes و همکاران، ۲۰۱۰).

پری بیوتیک ها، پروپیوتیک ها و اسید های آلی سه مورد از افروندنی هایی هستند که مشکلات و بیماری های روده ای را کاهش داده و عملکرد طیور را بهبود می بخشد. پروپیوتیک ها میکرووار گانیزم های زنده ای هستند که به بهبود فلور میکروبی روده حیوان میزبان در جهت افزایش جمعیت میکروبی مفید و کاهش میکرووار گانیسم های پاتوژن (بیماری زا) کمک کرده و منجر به بهبود عملکرد رشد و ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشته می شوند (Tabidi و همکاران، ۲۰۱۳). نتایج تأثیر مثبت پروپیوتیک ها بر افزایش وزن بدن در مطالعات مختلف آمده است.

پروپیوتیک ها با کاهش اشریشیا کلی و افزایش باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک، افزایش وزن بدن، افزایش غلظت اسید لاکتیک و فعالیت فاگو سیتوزی لوکوسیت ها می توانند در جهت Kalavathy حفظ سلامت دستگاه گوارش طیور استفاده شوند (۲۰۰۳). یکی از کاربردی ترین پروپیوتیک ها در جیره طیور، پروپیوتیک پروتکسین است که شامل نه سویه باکتری

دوره به میانگین افزایش وزن روزانه هر پن محاسبه گردید. داده ها برای تلفات تصحیح شدند.

در سن ۴۲ روزگی از هر تکرار یک قطعه پرنده بر اساس میانگین وزن هر پن انتخاب، توزین و کشتار شدند. وزن لاشه بعد از کشتار پرنده و جداسازی سر، پاهای و کنده پوست بدن به عنوان وزن لاشه در نظر گرفته شد. مقادیر وزن سینه، ران ها، کبد، طحال، بورس، بخش های مختلف روده و سکوم و طول آنها اندازه گیری شدند. سپس با تقسیم وزن و طول اندام های داخلی بر وزن زنده، وزن و طول نسبی آنها محاسبه گردید. لازم به ذکر است که به منظور حداقل کردن اثر وزن محتويات دستگاه گوارش و خالی ماندن آن حدود ۴ ساعت قبل از کشتار به جوجه ها گرسنگی داده شد.

فراسنجه های خونی

در پایان آزمایش دو جوجه از هر پن به طور تصادفی انتخاب و خون گیری از سیاهرگ زیر بال انجام گرفت. از نیمی از نمونه های خون پس از تفکیک لخته، نمونه سرم جدا و با دور ۵۰۰۰ به مدت ۳ دقیقه سانتریفیوژ شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. غلظت فراسنجه های خونی شامل گلوکز، تری گلیسرید، کلسیرون و لیپوپروتئین های با چگالی کم و زیاد با استفاده از دستگاه اتو آنالایزر و با استفاده از کیت مخصوص زیست شیمی تعیین گردیدند. نیمی دیگر از نمونه ها جهت تعیین تعداد سلول های خونی در لوله های حاوی هپارین جمع آوری شده و پس از همگن سازی نمونه خون، یک قطره از آن را روی لام ریخته و با زاویه ۴۵ درجه، لبه لام دیگر را روی آن کشیده و گسترش آن تهیه شد. سلول های خونی روی گسترش توسط متابول ثابت شده و با محلول گیمسا رنگ آمیزی شدند. قسمتی از لام که سلول های خونی به بهترین نحو روی آن پخش شده بود را زیر میکروسکوپ قرار داده و سلول های هتروفیل و لمفوسیت شمارش شدند. سلول های خونی شامل گلbul های سفید و گلbul های قرمز با استفاده از دستگاه Sysmex K-1000 ساخت کشور ژاپن اندازه گیری شدند (Dover و Elliott، ۱۹۸۵).

۶ تیمار ۴۰ قطعه ای و هر کدام با ۴ تکرار داخل پنهانی با ابعاد ۱/۵×۱ متر قرار داده شدند. در طول دوره پرورش که تا سن ۴۲ روزگی به طول انجامید، دسترسی پرندگان به آب و خوراک آزاد بوده و مراقبت های لازم بر اساس روش های توصیه شده سویه تجاری راس ۳۰۸ انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: گروه کنترل، گروه تیمار شده با آنتی بیوتیک ویرجینیا مایسین، گروه تیمار شده با پرو بیوتیک پروتکسین، گروه تیمار شده با ۱۵۰ میلی گرم در کیلو گرم جیره اسانس میخک، گروه تیمار شده با ۳۰۰ میلی گرم در کیلو گرم جیره اسانس میخک و گروه تیمار شده با ۴۵۰ میلی گرم اسانس میخک در کیلو گرم جیره که در دوره های آغازین (۰-۱۰ روزگی)، رشد ۲۴-۱۱ روزگی) و پایانی (۲۵-۴۲ روزگی) تغذیه شدند. پرو بیوتیک Probiotics مورد استفاده در این آزمایش محصول شرکت International Ltd انگلستان بود که شامل ۸ سویه از برترین باکتری های لاکتوباسیلوس شامل لاکتوباسیلوس پلاتسراوم، لاکتوباسیلوس دلبروکی بولگاریکوس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوزوس، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، استرپتوكوکوس ترموفیلوس، استرپتوكوکوس سالیاریوس، انتروكوکوس فازیوم، قارچ اورینزا آسپرژیلوس و مخمر کاندیدا پیتولوپسی. برای افزودن اسانس میخک، مقدار تعیین شده به صورت روزانه به روغن سویای مورد نیاز روزانه اضافه شد و سپس سایر ترکیبات جیره با آن مخلوط شد (جیره ها به صورت روزانه تهیه شدند تا به دلیل فرار بودن اسانس از وجود میزان مشخص آن در جیره اطمینان حاصل شود). آنتی بیوتیک و پرو بیوتیک (۰/۰۴ درصد جیره) استفاده شده در این آزمایش طبق توصیه های شرکت سازنده به جیره اضافه شدند. جیره ها طبق دستورالعمل راس ۲۰۰۷ تهیه و استفاده شد (جدول ۱).

صفات عملکردی

جوجه های هر تکرار به صورت گروهی در پایان هر دوره وزن کشی شدند.

میزان مصرف خوراک در پایان هر دوره اندازه گیری شد. ضریب تبدیل خوراک از تقسیم مصرف خوراک جوجه های هر پن در

آنالیز آماری

نتایج به دست آمده از این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی و با استفاده از نرم افزار آماری SAS و رویه خطی GLM مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. مقایسه میانگین ها با آزمون توکی در سطح احتمال ($P < 0.05$) انجام شد. داده های نسبی پس از تبدیل arcsin، مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. مدل آماری به صورت زیر بود:

$$Y_{ij} = \mu + t_i + e_{ij}$$

μ = میانگین کل مشاهدات t_i = اثر تیمار e_{ij} = خطای آزمایشی

نتایج و بحث صفات عملکردی

تأثیر آنتی بیوتیک ویرجینیامايسین، پروبیوتیک پروتکسین و سطوح مختلف اسانس میخک بر عملکرد چوجه های گوشتی در دوره های آغازین، رشد، پایانی و کل دوره در جدول ۲، نشان داده شده است. اثر تیمارهای آزمایش بر صفات عملکردی در همه دوره ها معنی دار بود. در تمامی دوره ها میانگین مصرف خوراک در تیمارهای آنتی بیوتیک ویرجینیامايسین، پروبیوتیک پروتکسین و سطوح ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم اسانس میخک در مقایسه با تیمار کنترل بالاتر بود ($P < 0.05$), اما اختلاف مصرف خوراک سطح ۴۵۰ میلی گرم اسانس میخک در مقایسه با گروه کنترل معنی دار نبود. بالاترین میانگین وزن زنده در تیمارهای آنتی بیوتیک و پروبیوتیک مشاهده شد ($P < 0.05$). همچنین سطوح ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم اسانس میخک هم وزن زنده را به طور معنی دار بهبود بخشیدند ($P < 0.05$), اما اختلاف وزن زنده سطح ۴۵۰ میلی گرم اسانس میخک در مقایسه با گروه کنترل معنی دار نبود. بهترین میانگین ضریب تبدیل خوراک در تیمارهای آنتی بیوتیک ویرجینیامايسین و پروبیوتیک پروتکسین مشاهده شد ($P < 0.05$). همچنین سطوح ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم اسانس میخک هم ضریب تبدیل خوراک را در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی دار بهبود بخشیدند ($P < 0.05$), اما اختلاف ضریب تبدیل خوراک با سطح ۴۵۰ میلی گرم اسانس میخک در مقایسه با گروه شاهد معنی دار نبود.

جمعیت میکروبی ایلئوم

جهت تعیین جمعیت میکروبی یک پرنده از هر پن به روش جابه جایی مهره گردن کشتار شد. پس از خروج روده ها از بدن، ایلشوم از زائده میکل تا محل اتصال سکوم ها به روده کوچک (ایلئوسکال) جدا شده و با حرکت آرام انگشت، محتويات آن ها خارج و جمع آوری شدند. سپس محتويات با هم یکی شده و یکتواخت شدند و تا زمان انتقال به آزمایشگاه بر روی یخ قرار گرفتند. یک گرم از محتويات ایلئوم هر تکرار در ۹ میلی لیتر آب مقطر رقيق شد و پس از تصفیه این محتوى رقيق شده، کاملاً هم زده شد تا همگن گردید. دو رقت (10^{-1} و سپس 10^{-2}) از این محلول همگن تهیه شد و هر رقت بر روی محیط کشت مخصوص خود کشت شد. برای شمارش لاکتوباسیلوس و اشريشیاکلی، رقت های تهیه شده از آن ها به ترتیب بر روی محیط کشت مخصوص خود یعنی محیط کشت MRS به مدت ۴۸ ساعت در انکوباتور 37°C در شرایط بی هوایی و محیط کشت MC (مک کانکی) به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور 37°C در شرایط هوایی قرار گرفتند (Guban و همکاران، ۲۰۰۶).

بافت شناسی روده

ژژونوم در روز ۴۲ جدا شده و حدود سه سانتی متر از قسمت میانی آن داخل محلول فرمالین ۱۰ درصد قرار گرفت. برای آماده سازی نمونه های بافتی سه مرحله آبگیری، شفاف سازی و پارافینه شدن انجام شد. به وسیله میکروتوم چرخان برش هایی با ضخامت ۵-۶ میکرومتر زده و برش های حاصله داخل آب ۴۰ درجه سانتی گراد شناور شدند تا پس از صاف شدن چروک های احتمالی، به راحتی روی لام قرار گیرند. رنگ آمیزی بافت های پایدار شده روی لام، پس از پارافین گیری با زایلان و آب دهی با درجات نزولی الكل اتیلیک، به کمک هماتوکسیلین و ائوزین انجام گرفت و با استفاده از دستگاه و نرم افزار مربوطه، فراسنجه های مورد نظر اندازه گیری شدند. بدین ترتیب ارتفاع پرز (از نوک پرز تا محل اتصال کریپت)، عرض پرز و عمق کریپت مطابق روش IJi و همکاران (۲۰۰۱) محاسبه شد.

ستنتر کلسترول و اسید چرب و همچنین اسید چرب امگا ۳ نقش دارند که همه این‌ها می‌توانند در بهبود عملکرد جوجه‌های گوشتی موثر باشند (Jirovetz و همکاران، ۲۰۰۶). گزارش شده است که اوژنول ترکیب فعال موجود در انسانس میخک در سطوح بالای مصرف در حیوانات کوچک جثه می‌تواند اثرات سمی داشته باشد که احتمالاً دلیل کاهش عملکرد پرندگان با سطح مصرف ۴۵۰ میلی‌گرم می‌باشد (Hartnoll و همکاران، ۱۹۹۳).

اجزای لашه و برخی اندام‌های سیستم ایمنی
تأثیر آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین، پروپیوتیک پروتکسین و سطوح مختلف انسانس میخک بر خصوصیات لاشه (گرم ۱۰۰/۰ گرم وزن زنده) جوجه‌های نر گوشتی در ۴۲ روزگی در جدول ۳، نشان داده شده است. بالاترین میانگین وزن نسبی لاشه، سینه و ران در تیمارهای آنتی‌بیوتیک و پروپیوتیک مشاهده شد ($P < 0.05$). همچنین سطوح ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم انسانس میخک هم وزن نسبی لاشه، سینه و ران را به طور معنی‌دار بهبود بخشیدند ($P < 0.05$ ، اما اختلاف وزن نسبی لاشه، سینه و ران سطح ۴۵۰ میلی‌گرم انسانس میخک در مقایسه با گروه کنترل معنی‌دار نبود). نتایج مختلفی برای تأثیر استفاده از پروپیوتیک در جیره بر خصوصیات لاشه توسط دیگر محققین نیز گزارش شده است. استفاده از پروپیوتیک پریمالاک در جیره جوجه‌های گوشتی وزن لاشه و سینه را افزایش داد (Dabiri و همکاران، ۲۰۰۹).

گیاهان دارویی به دلیل وجود ترکیبات خالص ثانویه، بر تولید و بهبود فعالیت آنزیم‌های گوارشی تأثیر می‌گذارند و در نهایت بر رشد پرندگان و قابلیت هضم خوراک تأثیر می‌گذارند (Lee و همکاران، ۲۰۰۴). هم‌چنین گیاهان دارویی، ترشحات هضمی دستگاه گوارش و تحرک روده‌ها را نیز افزایش می‌دهند که سبب افزایش قابلیت هضم و استفاده بهتر مواد مغذی توسط حیوان می‌گردد (Lewis و همکاران، ۲۰۰۳). افزایش وزن لاشه در گروه تغذیه شده با انسانس میخک در مقایسه با گروه شاهد می‌تواند به دلیل افزایش فعالیت‌های گوارشی و افزایش وزن پرندگان باشد.

میانگین وزن نسبی اندام‌های ایمنی بورس و طحال و همچنین کبد در تمامی تیمارهای آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین، پروپیوتیک

این نتایج با یافته‌های حاصل از کار دیگر محققان که به اثر مثبت آنتی‌بیوتیک (Cervantes و همکاران، ۲۰۱۱) و پروپیوتیک (Kim و Jeong، ۲۰۱۴) بر عملکرد جوجه‌های گوشتی اشاره نمودند، مطابقت دارد. افزایش وزن ایجاد شده در جوجه‌ها در نتیجه مصرف محرك‌های رشد آنتی‌بیوتیکی و پروپیوتیکی را می‌توان به افزایش مصرف خوراک، افزایش ابقای چربی جیره و افزایش انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری آن، بهبود کارایی جذب مواد مغذی انرژی‌زا و افزایش به کارگیری پروتئین جیره نسبت داد (Bai و همکاران، ۲۰۱۳). بهبود ضریب تبدیل غذایی توسط پروتکسین توسط دیگر محققین در جوجه‌های گوشتی گزارش شده است. آن‌ها بیان داشتند که این بهبود ضریب تبدیل احتمالاً در اثر فراهم شدن برخی مواد مغذی مانند ویتامین‌ها از طریق باکتری‌های موجود در پروپیوتیک‌ها برای میزان، افزایش هضم غذای خورده شده به‌واسطه تولید برخی آنزیم‌های هضم کننده و نیز مهار میکروب‌های بیماری‌زا و ختی کردن سوم حاصله به‌واسطه تولید اسیدهای آلی و باکتریوسین‌ها بوده است (Vahdatpour و همکاران، ۲۰۱۱). گزارش شده است که مصرف پروپیوتیک در جوجه‌های گوشتی به طور معنی‌داری وزن بدن را افزایش و ضریب تبدیل خوراک را کاهش می‌دهد (Taherpour و همکاران، ۲۰۰۹).

احتمال دارد بهبود افزایش وزن جوجه‌ها در گروه انسانس میخک به‌خاطر اثرات ضد میکروبی انسانس‌های گیاهی و تأثیر آن‌ها بر افزایش ترشح آنزیم‌های هضمی باشد (Lee و همکاران، ۲۰۰۴). در تحقیق آزادگان مهر و همکاران (۲۰۱۴)، مصرف ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم انسانس میخک، میانگین وزنی و ضریب تبدیل خوراک جوجه‌های گوشتی را به ترتیب در دوره آغازین و پایانی بهبود بخشید که دلیل این بهبود، افزایش هضم و جذب خوراک گزارش شده است. محققین نشان دادند که مصرف ۲۰۰ میلی‌گرم ترکیب انسانس‌های پونه، میخک و رازیانه در مقایسه با ۱۰۰ و ۴۰۰ میلی‌گرم، وزن زنده و ضریب تبدیل غذایی را بهبود بخشید (Ertas و همکاران، ۲۰۰۵). انسانس میخک غنی از منگنز و دیگر مواد معدنی کمیاب بوده که در متاپولیسم پروتئین و کربوهیدرات،

بیوتیک ویرجینیاماپسین و پروبیوتیک بیولاس را در جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی نشان داده‌اند (Rahimi و Khaksefidi، ۲۰۰۶؛ Shoeib و همکاران، ۱۹۹۷) نشان دادند که پروبیوتیک تعداد گلbul‌های سفید و قرمز و درصد لنفوسیت‌ها را افزایش می‌دهد. کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت با مصرف اسانس مرزه و آویشن در جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی توسط دیگر محققین نشان داده شده است که به ترکیبات فنولی موجود در این اسانس‌ها و خواص آنتی اکسیدانی آن‌ها نسبت داده شده است (Saadat Shad و همکاران، ۲۰۱۶). گزارش شده است که اسانس‌های مشتق شده از گیاهان دارویی نه تنها منجر به تحريك اشتها و هضم می‌شوند بلکه از طریق عملکردهای فیزیولوژیکی منجر به سلامت خون و جلوگیری از رشد میکروارگانیسم‌های مضر می‌شوند (Frankic و همکاران، ۲۰۰۹). با این وجود دیگر فراسنجه‌های خونی در این تحقیق تحت تأثیر قرار نگرفتند که این می‌تواند به عواملی همچون سن پرندگان، غلظت افروزندهای خوراکی و روش مصرف آن‌ها مربوط شود. در جدول ۵، مقدار گلوکز و فراسنجه‌های لیپیدی پلاسمای خون جوجه‌های نر گوشتی در ۴۲ روزگی، نشان داده شده است. تیمارهای پروبیوتیک پروتکسین و تمامی سطوح اسانس میخک میزان کلسترول و LDL پلاسمای خون را به طور معنی‌دار کاهش دادند ($P < 0.05$) و اگر چه تیمار آنتی بیوتیک ویرجینیاماپسین میزان کلسترول و LDL را به لحاظ عددی کاهش داد، اما این کاهش در مقایسه با گروه کنترل معنی‌دار نبود. اما هیچ کدام از تیمارها تأثیری بر میزان گلوکز و همچنین تری‌گلیسرید و HDL نداشتند.

مطالعات مشابهی، کاهش کلسترول، تری‌گلیسرید، LDL و HDL را در نتیجه مصرف پروبیوتیک پریمالاک + بیولکس-امبی (Taherpour و همکاران، ۲۰۰۹) و پروبیوتیک بر پایه لاکتوپاسیلوس (Kalavathy و همکاران، ۲۰۰۳) را گزارش کرده‌اند. همچنین گزارش شده است که استفاده از روغن فرار گیاهان در جیره جوجه‌های گوشتی، غلظت کلسترول و تری‌گلیسرید را کاهش می‌دهد. این محققین دلیل کاهش کلسترول

پروتکسین و سطوح مختلف اسانس میخک در مقایسه با تیمار کنترل افزایش یافت ($P < 0.05$).

گزارش شده که پروبیوتیک پاسیلوس سوبتیلیس به طور معنی‌داری وزن بورس و تیموس را در مقایسه با گروه کنترل افزایش می‌دهد (Teo و Tan، ۲۰۰۷). همچنین دیگر محققین بیان داشتند که تغذیه پروتکسین باعث افزایش معنی‌دار وزن نسبی بورس و کبد در جوجه‌های گوشتی شد (Azadeganmehr و همکاران، ۲۰۱۴).

محققین بیان کردند که گیاهان دارویی رشد اندام‌های اینمی را تحریک می‌کنند. تحت تأثیر قرار گرفتن اندام‌های اینمی توسط اسانس میخک در این آزمایش را می‌توان به خاصیت آنتی اکسیدانی این گیاه نسبت داد. فلاونوئیدهای موجود در میخک می‌تواند در افزایش پاسخ اینمی حیوانات نقش مهمی ایفا کند (Dragland و همکاران، ۲۰۰۳). محققین گزارش کرده‌اند که گیاهان غنی از فلاونوئیدها با اثر ضد باکتریایی خود موجب تقویت سیستم اینمی در حیوانات می‌شوند. مطابق با این پژوهش نسبت وزنی کبد در جوجه‌هایی که مخلوطی از گیاهان دارویی آویشن و رزماری را دریافت کرده بودند، ۴/۵۶ درصد بیشتر از گروه کنترل بود (Hernandez و همکاران، ۲۰۰۴).

فراسنجه‌های خونی

در جدول ۴، تأثیر آنتی بیوتیک، پروبیوتیک و سطوح مختلف اسانس میخک بر تعداد گلbul‌های قرمز و سفید خون، هموگلوبین، نسبت هتروفیل به لنفوسیت و درصد هماتوکریت جوجه‌های نر گوشتی در سن ۴۲ روزگی نشان داده شده است. تمامی تیمارهای آزمایش نسبت هتروفیل به لنفوسیت را بهبود بخشیدند ($P < 0.05$). اما سایر متابولیت‌های خونی تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند.

نسبت هتروفیل به لنفوسیت مدت‌هاست که به عنوان نشانگر فیزیکی انواع تنش می‌باشد (Maxwell، ۱۹۹۳) و کاهش این نسبت در این تحقیق نشانگر کاهش تنش در جوجه‌های گوشتی بود که به دنبال آن بهبود جمعیت میکروبی ایلئوم توجیه می‌شود. محققین، کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت با مصرف آنتی

سولفات را گزارش کرده‌اند (Cao و همکاران، ۲۰۱۳). دیگر محققین نیز کاهش جمعیت لاکتوباسیلوس با مصرف آنتی بیوتیک‌ها را گزارش کرده‌اند (Guban و همکاران، ۲۰۰۶).

بهبود فلور میکروبی دستگاه گوارش جوجه‌هایی که گیاه دارویی میخک را مصرف کردند، بدون شک به نقش ترکیبات فعال موجود در این گیاه ارتباط پیدا می‌کند که دارای فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی و ضد التهابی وسیعی می‌باشد (Dragland و همکاران، ۲۰۰۳). مصرف پروپیوتیک در جیره طیور فلور میکروبی دستگاه گوارش را بهبود می‌دهد و در شرایط آزمایشگاهی از رشد بسیاری از باکتری‌های مضر روده‌ای جلوگیری می‌کند (Cao و همکاران، ۲۰۱۳).

از آنجایی که ترکیبات فعال موجود در انسان‌ها میزان اسیدیته دستگاه گوارش را کاهش می‌دهند، بنابراین، این ترکیبات می‌توانند مانع از رشد باکتری‌های پاتوژن و تحریک کننده رشد باکتری‌های مفید همچون لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم شوند (Akyurek و Yell، ۲۰۱۱). گزارش شده که ترکیبات فیتوژنیک با کاهش کلی فرم‌ها و افزایش لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم، ترکیب میکروبی روده را بهبود می‌دهند (Mountzouris، ۲۰۱۱). محققین گزارش کرده‌اند که مصرف گیاهان دارویی تعداد باکتری‌های اشريشیاکلی را در مقایسه با گروه کنترل کاهش می‌دهد (Jamroze و همکاران، ۲۰۰۶). همچنین در یک آزمایش با کاربرد ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی‌گرم انسان میخک جمعیت باکتری لاکتوباسیل افزایش یافت (Agostini و همکاران، ۲۰۱۲).

وزن و طول نسبی قسمت‌های مختلف روده و بافت شناسی ژرژنوم

تأثیر آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین، پروپیوتیک پروتکسین و سطوح مختلف انسان میخک بر جمعیت میکروبی ایلئوم Log CFU در هر گرم محتويات) جوجه‌های نر گوشتشی در ۴۲ روزگی در جدول ۶، نشان داده شده است.

بیشترین طول و عرض پرز و کمترین عمق کریپت در تیمارهای آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین و پروپیوتیک پروتکسین مشاهده شد

خون با انسان‌های گیاهی را ممانعت از فعالیت آنزیم کبدی هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآنزیم آ، که آنزیم کلیدی در سنتر کلسترول می‌باشد، بیان کرده‌اند. بنابراین، تاثیر هیپوکلسترولیمیک انسان‌ها می‌تواند مورد انتظار باشد (Lee و همکاران، ۲۰۰۴). به طور کلی کاهش کلسترول خون در جوجه‌های گوشتشی بر اثر مصرف محرك‌های رشد از طریق مکانیسم‌های مختلف توجیه می‌شود که برخی از آن‌ها عبارتند از: ۱) ممانعت از فعالیت آنزیم ۳-هیدروکسی-۳-متیل گلوتاریل کوآنزیم آ، که آنزیم تنظیم کننده و کلیدی در سنتر کلسترول است (Lee و همکاران، ۲۰۰۴). ۲) مهار فعالیت فارنیزیل پیروفسفات که پیش ماده سنتر کلسترول است (Hood، ۱۹۷۸) ۳) مصرف کلسترول موجود در لوله گوارش پرنده توسط میکرووارگانیسم‌های موجود در ساختار پروپیوتیک جهت متابولیسم (Mohan، ۱۹۹۶).

جمعیت میکروبی ایلئوم

تأثیر آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین، پروپیوتیک پروتکسین و سطوح مختلف انسان میخک بر جمعیت میکروبی ایلئوم در هر گرم محتويات) جوجه‌های نر گوشتشی در ۴۲ روزگی در جدول ۶، نشان داده شده است.

همان‌طور که انتظار می‌رفت تیمارهای پروپیوتیک پروتکسین و سطوح مختلف انسان میخک در این آزمایش تعداد باکتری‌های مفید لاکتوباسیلوس را افزایش و تعداد باکتری‌های مضر اشريشیاکلی را کاهش دادند ($P < 0.05$) با این حال میزان اثرگذاری سطح ۴۵۰ میلی‌گرم انسان میخک بر تعداد این باکتری‌ها در مقایسه با سایر تیمارها کمتر بود. در مقابل آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین، هم جمعیت اشريشیاکلی و هم جمعیت لاکتوباسیل را به طور معنی‌داری کاهش داد. گفته می‌شود آنتی‌بیوتیک‌ها باکتری‌های گرم مثبت مفید دستگاه گوارش پرنده را که تولید ایمونوگلوبین می‌کنند را از بین می‌برند و این عامل اصلی کاهش آنتی‌بادی با تغذیه این مواد در مقایسه با سایر محرك‌های رشد می‌باشد (عبدی‌نی و همکاران، ۱۳۹۰). محققین کاهش جمعیت اشريشیاکلی در روده جوجه‌های گوشتشی تغذیه شده با پروپیوتیک انتروکوکوس فازیوم و آنتی‌بیوتیک کولیستین

نو سازی سلول های اپیتیلیال مرتبط است. اعتقاد بر این است که افزایش ارتفاع پرز در روده کوچک باعث افزایش سطح تماس و به دنبال آن افزایش سطح جذب مواد مغذی می گردد. محققین نشان دادند که مصرف ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیگرم اسانس میخک در هر کیلو گرم جیره سلول های اپیتیلیوم روده کوچک جوجه های گوشتی را بهبود بخشد (Agostini و همکاران، ۲۰۱۲). دیگر محققین نشان دادند که پرنده گانی که با مخلوطی از اسانس های پونه کوهی، رازیانه و پوسته مرکبات تغذیه شدند، دارای پرز های بلندتر و سلول های گابلت بیشتر در ایلثوم بودند (Reisinger و همکاران، ۲۰۱۱).

نتیجه گیری

در صنعت پرورش طیور، عمدۀ مطالعات اسانس گیاهان دارویی مربوط به تأثیر این مواد بر دستگاه گوارش و اثر مثبت مصرف این اسانس ها بر عملکرد به دلیل بهره وری بیشتر بدن از مواد مغذی مصرفی در دستگاه گوارش می باشد. در مطالعه اخیر تأثیر مثبت مصرف اسانس میخک بر عملکرد جوجه های گوشتی مشاهده شد. استفاده از محرك های رشد (اسانس میخک یا پروبیوتیک پروتکسین) در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره ذرت - سویا می تواند عملکرد را بهبود بخشد، اما میزان بهبود عملکرد در حضور پروبیوتیک پروتکسین در مقایسه با اسانس میخک بیشتر بود. به طور کل در مطالعه اخیر، پرنده گانی که با آنتی بیوتیک، پروبیوتیک و اسانس میخک تغذیه کردند عملکرد بهتری را در مقایسه با گروه کنترل در تمامی دوره ها داشتند که این امر می تواند همچنین به دلیل ایجاد تعادل میکروبی مفید و بهبود صفات بافتی دستگاه گوارش این پرنده گان باشد که هر دو دلیل در این مطالعه ثابت شده اند.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از دانشگاه جیرفت و نیز اعضای محترم گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی برای همکاری در اجرای تحقیق حاضر قدردانی می گردد.

(P<۰/۰۵). همچنین سطوح ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم اسانس میخک در مقایسه با گروه کنترل، طول و عرض پرز را به طور معنی دار بهبود بخشیده و عمق کریپت را کاهش دادند (P<۰/۰۵)، اما اختلاف طول و عرض پرز و عمق کریپت سطح ۴۵۰ میلی گرم اسانس میخک در مقایسه با گروه کنترل معنی دار نبود. نسبت طول پرز به عمق کریپت با همه تیمارها به جز سطح ۴۵۰ میلی گرم اسانس میخک، افزایش معنی داری نشان داد و بیشترین نسبت با تیمارهای آنتی بیوتیک و پروبیوتیک مشاهده شد. طول نسبی ژرژونوم در تمامی تیمارهای آنتی بیوتیک و پروبیوتیک ویرجینیامايسین، پروبیوتیک پروتکسین و سطوح مختلف اسانس میخک در مقایسه با تیمار کنترل افزایش یافت (P<۰/۰۵). اما طول نسبی ویا وزن نسبی سایر قسمت های روده تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند. گزارش شده است که مصرف پروبیوتیک، طول و عرض پرز، ضخامت لایه ماهیچه ای و تعداد سلول های گابلت را در مقایسه با گروه کنترل افزایش می دهد (Chichlowski و همکاران، ۲۰۰۷). افزایش معنی دار طول پرز و نسبت طول پرز به عمق کریپت روده جوجه های گوشتی با مصرف پروبیوتیک سویه لاکتو باسیل و سین بیوتیک توسط دیگر محققین گزارش شده است (Awad و همکاران، ۲۰۰۹). در مطالعه Cao و همکاران (۲۰۱۳)، مصرف پروبیوتیک انتروکوس فازیوم، طول پرز های روده جوجه های گوشتی را افزایش و عمق کریپت را کاهش داد. پرز های روده نقش بسیار مهمی در پروسه هضم و جذب روده کوچک ایفا می کند، چرا که اولین محل تماس مواد مغذی مصرف شده توسط حیوان با لوله گوارشی می باشد. هر چه ارتفاع پرز بیشتر باشد بیانگر این است که میزان جایگزینی سلول های انتروسیت و نو سازی بافتی کمتر می باشد. به عبارت دیگر افزایش ارتفاع ویلی و کاهش عمق کریپت مستقیماً با نو سازی سلول های اپیتیلیال در ارتباط است (Fan و همکاران، ۱۹۹۷). این بدین معنی است که افزایش ارتفاع پرز و کاهش عمق کریپت که در مطالعه اخیر مشاهده شد با افزایش جذب مواد مغذی در روده و بهبود

جدول ۱- ترکیب جیره پایه آزمایشی در دوره‌های آغازین، رشد و پایانی

جزایی جیره (درصد)	آغازین (۱۰-۱ روزگی)	رشد (۲۴-۱ روزگی)	پایانی (۲۵-۴۲) روزگی
ذرت	۵۳/۳۸	۵۴/۸۱	۹/۰/۶۳
کنجاله سویا	۳۸/۴۵	۳۶/۲۴	۳۰/۸۵
روغن	۳/۴۹	۴/۸۰	۴/۰/۰
آهک	۱/۵۴	۱/۳۵	۱/۳۰
دی کلسم فسفات	۱/۶۴	۱/۲۹	۱/۲۱
مکمل ویتامینی - معدنی *	۰/۵۰	۰/۲۹	۰/۲۵
ندک	۰/۲۹	۰/۲۹	۰/۲۹
دی - ال - متیوتین	۰/۳۹	۰/۲۹	۰/۲۹
ال - لزین	۰/۳۳	۰/۲۳	۰/۱۳
مقادیر محاسبه شده			
انرژی (Kcal/kg)	۳۱۵۰	۳۰۲۵	۳۲۰
پروتئین خام (%)	۲۱	۲۲	۱۹
لزین (%)	۱/۳۰	۱/۴۳	۱/۰۹
متروزین + میستین (%)	۰/۹۵	۱/۰۷	۰/۸۶
کلسم (%)	۱/۰۵	۰/۹۰	۰/۱۰
فسفر (%)	۰/۵۲	۰/۴۵	۰/۴۲

این مقدار به ازای هر کیلو گرم جبره وین می‌گردد. فولیک، ۱ میلی گرم، بیوین، ۱۰۰ میلی گرم؛ آهن، ۵ میلی گرم.

جدول ۲- تأثیر آنتی بیوتیک، پر جینیاماپسین و سطوح مختلف اسانس میخک بر عملکرد جوگهای نو گوشی در دوره‌های آغازین، رشد، پایانی و کل دوره.

تعداد تیمارها	آنتی بیوتیک و پر جینیاماپسین	پر جینیاماپسین	آنتی بیوتیک	صرف خوارک (گرم/پرنده)	افزایش وزن (گرم/پرنده)	ضریب تبدیل خوارک	
						۰-۱۱-۲۴	۰-۱۱-۴۲
۱۱۴۳ ^a	۲/۱۱۳ ^a	۱/۵۰ ^a	۱/۲۰ ^a	۴۶۲۸/۸ ^b	۳۱۸۳/۴ ^b	۱۱۸۸/۵ ^b	۲۵۷/۰ ^b
۱۷۳۴ ^c	۱/۹۸ ^c	۱/۴۵ ^b	۱/۱۳ ^b	۵۷۳۴/۸ ^a	۳۲۰/۵ ^a	۱۲۴۵/۸ ^a	۲۸۳/۳ ^a
۱۷۵۵ ^c	۲/۱۰۰ ^c	۱/۴۶ ^b	۱/۱۳ ^b	۴۷۴۵/۰ ^a	۳۳۰/۹ ^a	۱۲۵۵/۳ ^a	۲۸۰/۳ ^a
۱۸۱۱ ^b	۲/۱۰۴ ^b	۱/۵۱ ^a	۱/۲۱ ^a	۴۷۴۹/۳ ^a	۳۲۱۷/۸ ^a	۱۲۴۹/۵ ^a	۲۸۲/۰ ^a
۱۸۸۱ ^b	۲/۱۰۷ ^b	۱/۵۱ ^a	۱/۲۱ ^a	۴۷۵۹/۸ ^a	۳۲۱۵/۳ ^a	۱۲۵۷/۸ ^a	۲۸۶/۸ ^a
۱۸۸۴ ^a	۲/۱۱۲ ^a	۱/۵۰ ^a	۱/۱۸ ^a	۴۹۲۴/۵ ^b	۳۱۷۶/۵ ^b	۱۱۹۳/۳ ^b	۲۵۴/۸ ^b
۰/۰۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰۱۰	۰/۰۲۲	۷/۷۱۹	۴/۴۷۷	۳/۳۳۴	۳/۵۴۱
۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰

میانگین‌های هشتون با حروف متفاوت، اختلاف معنی‌دار دارند ($P < 0.05$).

a,b,c

P-value

SEM

۱۵ میلی گرم اسانس میخک

۳۰ میلی گرم اسانس میخک

۴۵ میلی گرم اسانس میخک

۲۱۵/۸٪

۲۴۹/۷٪

۲۳۲/۵٪

۲۱۶/۵٪

۲۱۷/۳٪

۲۱۴/۵٪

۲۱۳/۵٪

۲۱۲/۵٪

۲۱۱/۵٪

۲۱۰/۵٪

۲۰۹/۵٪

۲۰۸/۵٪

جدول ۳- تأثیر آنتی بیوتیک، پروبیوتیک و سطوح مختلف اسانس میخک بر خصوصیات لاشه (گرم وزن زنده) جوچه های نر گوشته در ۴۲ روزگی.

تیمارها	درصد لاشه	درصد سینه	درصد ران	کبد	بورس فابر سیوس	طحال
شاهد	۵۴/۷ ^c	۱۹/۳ ^b	۱۹/۱ ^b	۱/۸ ^b	۰/۱۳ ^c	۰/۱۴ ^b
آنتی بیوتیک و برجینیامايسین	۶۴/۵ ^a	۲۳/۶ ^a	۲۲/۴ ^a	۲/۱ ^a	۰/۲۱ ^a	۰/۲۶ ^a
پروبیوتیک پروتکسین	۶۳/۱ ^a	۲۳/۱ ^a	۲۲/۴ ^a	۲/۱ ^a	۰/۲۱ ^a	۰/۲۵ ^a
۱۵۰ میلی گرم اسانس میخک	۵۸/۸ ^b	۲۱/۸ ^{ab}	۲۱/۴ ^{ab}	۲/۲ ^a	۰/۱۷ ^b	۰/۲۱ ^a
۳۰۰ میلی گرم اسانس میخک	۵۹/۰ ^b	۲۱/۵ ^{ab}	۲۱/۱ ^{ab}	۲/۱ ^a	۰/۱۷ ^b	۰/۲۲ ^a
۴۵۰ میلی گرم اسانس میخک	۵۴/۸ ^c	۱۹/۶ ^b	۱۹/۶ ^b	۲/۰ ^a	۰/۱۸ ^b	۰/۲۱ ^a
SEM	۰/۷۵۰	۰/۶۷۶	۰/۵۸۵	۰/۰۶۰	۰/۰۰۶	۰/۰۱۲
P-value	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۹	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۱

^{a,b,c} میانگین های هر ستون با حروف متفاوت، اختلاف معنی داری دارند ($P < 0.05$).

جدول ۴- تأثیر آنتی بیوتیک، پروبیوتیک و سطوح مختلف اسانس میخک بر فراسنجه های خونی جوچه های گوشته در ۴۲ روزگی.

تیمارها	گلوبول های قرمز	گلوبول های سفید	همو گلوبین	هماتو کریت	هتروفیل به لنفو سیت
شاهد	۲/۵۸	۲۲/۱۵	۱۰/۸۵	۳۴/۴۲	۰/۲۴ ^a
آنتی بیوتیک و برجینیامايسین	۲/۴۵	۲۴/۸۳	۱۰/۳۰	۳۳/۳۰	۰/۱۹ ^{ab}
پروبیوتیک پروتکسین	۲/۷۴	۲۳/۹۸	۱۱/۲۰	۳۷/۴۰	۰/۱۸ ^b
۱۵۰ میلی گرم اسانس میخک	۲/۶۱	۲۳/۵۷	۱۰/۳۲	۳۴/۸۳	۰/۱۹ ^{ab}
۳۰۰ میلی گرم اسانس میخک	۲/۵۵	۲۳/۴۲	۱۰/۹۳	۳۴/۷۳	۰/۲۰ ^{ab}
۴۵۰ میلی گرم اسانس میخک	۲/۵۵	۲۲/۶۲	۱۰/۹۰	۳۵/۳۰	۰/۲۰ ^{ab}
SEM	۰/۴۱۲	۰/۶۷	۰/۳۳۵	۰/۴۳۰	۰/۳۳۵
P-value	۰/۱۵۲	۰/۱۲	۰/۹۲۴	۰/۱۱۷	۰/۰۳۳

^{a,b} میانگین های هر ستون با حروف متفاوت، اختلاف معنی داری دارند ($P < 0.05$).

جدول ۵- تاثیر آنتی بیوتیک، پروپیوتوک و سطوح مختلف اسانس میخک بر گلوكز و فراسنجه های لیپیدی (میلی گرم/دسمی لیتر) پلاسمای خون جوجه های گوشتی در ۴۲ روزگی.

LDL	HDL	کلسترول	تری گلیسرید	گلوكز	تیمارها
۲۲/۰ ^a	۶۵/۳۰	۱۱۵/۵ ^a	۸۱/۳	۲۳۲/۰	شاهد
۲۰/۳ ^{ab}	۶۸/۸۰	۱۱۸/۸ ^{ab}	۷۳/۳	۲۲۶/۵	آنتی بیوتیک ویرجینیا مایسین
۱۷/۸ ^b	۷۲/۵۰	۱۱۰/۵ ^b	۶۹/۵	۲۲۵/۸	پروپیوتوک پروتکسین
۱۷/۸ ^b	۶۹/۵۰	۱۱۰/۸ ^b	۷۶/۰	۲۲۷/۰	۱۵۰ میلی گرم اسانس میخک
۱۷/۵ ^b	۷۱/۰۰	۱۰۵/۵ ^b	۷۱/۳	۲۲۴/۳	۳۰۰ میلی گرم اسانس میخک
۱۷/۳ ^b	۷۱/۸۰	۱۱۰/۳ ^b	۷۰/۳	۲۲۹/۸	۴۵۰ میلی گرم اسانس میخک
۰/۸۱۶	۳/۵۸۷	۱/۳۷۱	۰/۴۲۲	۱/۷۲۱	SEM
۰/۰۰۳	۰/۷۴۷	۰/۰۰۱	۰/۴۴۴	۰/۰۶۲	P-value

^{a,b} میانگین های هر ستون با حروف متفاوت، اختلاف معنی داری دارند ($P < 0.05$).

جدول ۶- تاثیر آنتی بیوتیک، پروپیوتوک و سطوح مختلف اسانس میخک بر جمعیت میکروبی ایلئوم (Log CFU / گرم محتویات) جوجه های گوشتی در ۴۲ روزگی.

اشریشیا کلی	لاکتوباسیلوس	تیمارها
۷/۴۳ ^a	۸/۲۴ ^b	شاهد
۶/۶۶ ^b	۷/۴۳ ^c	آنتی بیوتیک ویرجینیا مایسین
۶/۰۶ ^c	۸/۶۷ ^a	پروپیوتوک پروتکسین
۶/۰۷ ^c	۸/۵۲ ^a	۱۵۰ میلی گرم اسانس میخک
۶/۱۳ ^c	۸/۶۰ ^a	۳۰۰ میلی گرم اسانس میخک
۶/۶۴ ^b	۸/۲۷ ^b	۴۵۰ میلی گرم اسانس میخک
۰/۰۵۶	۰/۰۴۶	SEM
۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۱	P-value

^{a,b,c} میانگین های هر ستون با حروف متفاوت، اختلاف معنی داری دارند ($P < 0.05$).

جدول ۱- تاثیر آنتی بیوتیک و در جنبه ایامیسین، پروپیوئیک پروکسین و سطوح مختلف اسانس میخک بر بافت شناسی ژرژنوم جوچدهای نزگوشتی در ۳۰ روزگی.

a,b,c میانگین های هر سنتون با حروف متفاوت، اختلاف معنی دارند ($P < 0.05$).

منابع

- bacteria and ileal, cecal and colonic epithelium in chicks fed a direct-fed microbial, primalac, and salinomycin. *Poultry science*. 86:1121-1132.
- Cervantes, H. M., Shim, M. Y., Hooper, S. E. Bafundo, K. W. and Pesti, G. M. (2011). The influence of virginiamycin on the live and processing performance of Nicholas turkey hens. *Journal of Applied Poultry Research*. 20:347-352.
- Dabiri, N., Ashayerizadeh, A., Ashayerizadeh, O., Mirzadeh, K.H., Roshanfekr, H. and Mamooee, M. (2009). Effect of dietary antibiotic, probiotic and prebiotic as growth promoters, on growth performance, carcass characteristics and hematological indices of broiler chickens. *Pakistan Journal of Biological Science*, 12:52-57.
- Dragland, S., Senoo, H., Wake, K., Holte, K., Blomhoff, R. (2003). Several culinary and medicinal herbs are important sources of dietary antioxidants. *Journal of Nutrition*. 133:1286-1290.
- Elliott J.C. and Dover S.D. (1985). X-ray microscopy using computerized axial tomography. *J. Microscop*. 138(3):329-331.
- Ertas, O.N., Guler, Çiftci, M., Dalkilic, B. and Simsek, U.G. (2005). The effect of an essential oil mix derived from oregano, clove and anise on broiler performance. *International Journal of Poultry Science*. 4: 879-884.
- Fan, Y., Croom, J., Christensen, V., Black, B., Bird, A., Daniel, L., McBride, B. and Eisen, E. (1997). Jejunal glucose uptake and oxygen consumption in turkey poult selected for rapid growth. *Poultry Science*. 76:1738-1745.
- Frankic, T., Voljc, M., Salobir, J. and Rezar, V. (2009). Use of herbs and spices and their extracts in animal nutrition. *Acta Agriculture Slovenica*. 94:95-102.
- Guban, J., Korver, D.R., Allison, G.E. and Tannock, G.W. (2006). Relationship of Dietary Antimicrobial Drug Administration with Broiler Performance, Decreased Population Levels of *Lactobacillus salivarius*, and Reduced Bile Salt Deconjugation in the Ileum of Broiler Chickens. *Poultry Science*. 85:2186-2194.
- Hartnoll, G., Moore, D., Douek, D. (1993). Near fatal ingestion of oil of cloves. *Archives of Disease in Childhood*. 69(3): 392-393.
- Hernandez, F., Madrid, J., Garcia, V., Orengo, J. and Megias, M.D. (2004). Influence of two plant extracts on broiler performance, digestibility and digestive organ size. *Poultry Science*. 83:169-174.
- عابدینی سانیجی، م.، شریعتمداری، ف. و کریمی ترشیزی، م.ا. (۱۳۹۰). مقایسه اثر گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی بیوتیک در جیره حاوی جو و آنزیم بر عملکرد، فاکتورهای خونی، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده چوجه های گوشتی. مجله تولیدات دامی. شماره ۲۰(۱۳). ص ۲۷-۴۹.
- Agostini, P.S., Sola-Oriol, D., Nofrarias, M., Barroeta, A.C., Gasa, J. and Manzanilla, E.G. (2012). Role of in-feed clove supplementation on growth performance, intestinal microbiology, and morphology in broiler chicken. *Livestock Science*. 147:113-118.
- Akyurek, H., and Yel, A. (2011). Influence of dietary thymol and carvacrol preparation and/or an organic acid blend on growth performance, digestive organs and intestinal microbiota of broiler chickens. *African Journal of Microbial Research*. 5 (8): 979-984.
- Awad, W. A., Ghareeb, K., Abdel-Raheem, S. and Bohm. J. (2009). Effects of dietary inclusion of probiotic and synbiotic on growth performance, organ weights, and intestinal histomorphology of broiler chickens. *Poultry Science*. 88:49-55.
- Azadegan Mehr, M., Hassanabadi, A., Nassiri Moghaddam, H., and Kermanshahi, H. (2014).Supplementation of Clove Essential Oils and Probiotic to the Broiler's Diet on Performance, Carcass Traits and Blood Components. *Iranian Journal of Applied Animal Science*. 4(1):117-122.
- Bai, S. P., Wu, A. M. Ding, X. M., Lei, Y., Bai, J., Zhang, K. Y., and Chio, J. S. (2013). Effects of probiotic-supplemented diets on growth performance and intestinal immune characteristics of broiler chickens. *Poultry Science*. 92:663-670.
- Brenes, A. and Roura, E. (2010). Essential oils in poultry nutrition: main effects and modes of action. *Animal Feed Science*. 158: 1-14.
- Cao, G. T., Zeng, X. F., Chen, A. G., Zhou, L. Zhang, L. Xiao, Y. P. and Yang, C. M. (2013). Effects of a probiotic, *Enterococcus faecium*, on growth performance, intestinal morphology, immune response, and cecal microflora in broiler chickens challenged with *Escherichia coli* K88. *Poultry Science*. 92:2949-2955.
- Chichlowski, M., Croom, W.J., Eden, F.W., McBride, B.W., Qiu, R., Chiang, C.C., Daniel, L.R, Havenstein, G.B. and Koci, M.D. (2007). Microarchitecture and spatial relationship between

- Hood, R.L., Bailey, W.M. and Svoronos, D. (1978). The effect of dietary monoterpenes on the cholesterol level of eggs. *Poultry Science*. 57:304-306.
- Iji P. A, Hughes, R. J, Choct and Tivey D. R (2001). Intestinal structure and function of broiler chickens on wheat-based diets supplemented with a microbial enzyme. *Animal Science*. 14: 54-60.
- Jeong, J. S. and Kim, I. H. (2014). Effect of *Bacillus subtilis* C-3102 spores as a probiotic feed supplement on growth performance, noxious gas emission, and intestinal microflora in broilers. *Poultry Science*. 93:3097–3103.
- Jirovetz, L., Buchbauer, G., Stoilova, I., Stoyanova, A., Krastanov, A. and Schmidt, E. (2006). Chemical composition and antioxidant properties of clove leaf essential oil. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* . 54: 6303–6307.
- Jamroz, D., Wertelecki, T., Houszka, M. and Kamel, C. (2006). Influence of diet type on the inclusion of plant origin active substances on morphological and histochemical characteristics of the stomach and jejunum walls in chicken. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition* . 90: 255–268.
- Kamel, C. (1999). Use of plants extracts in european pig diets. *Feed Compounder*. 19: 23–27.
- Kalavathy, R., Abdullah, N., Jalaludin, S. and Ho, Y.W. (2003). Effects of Lactobacillus cultures on growth performance, abdominal fat deposition, serum lipids and weight of organs of broiler chickens. *British Poultry Science*. 44: 139 - 44.
- Lee, K.W., Everts, H. and Beynen, A.C. (2004). Essential Oils in Broiler Nutrition. *International Journal of Poultry Science*. 3(12):738-752.
- Lewis, M.R., Rose, S.P. MaKenzie, A.M. and Tucker, L.A. (2003). Effects of dietary inclusion of plant extracts on the growth performance of male broiler chickens. *British Poultry Science*. 44: 42-43.
- Lillehoj, H.S., Lee, K.W. (2012). Immune modulation of innate immunity as alternatives-to-antibiotics strategies to mitigate the use of drugs in poultry production. *Poultry Science*. 91: 1286-1291.
- Maxwell, M.H. (1993). Avian blood leucocyte responses to stress. *World's Poultry Science*. 49:34-43.
- Mohan, B., Kadirvel, R., Natarajan, A. and Bhaskaran, M. (1996). Effect of probiotic supplementation on growth, nitrogen utilisation and serum cholesterol in broilers. *British Poultry Science*. 37:395-401.
- Mountzouris, K.C., Paraskevas, V., Tsirtsikos, P., Palamidi, I., Steiner, T., Schatzmayr, G. and Fegeros, K. (2011). Assessment of a phytogenic feed additive effect on broiler growth performance, nutrient digestibility and caecal. *Animal Feed Science Technology*. 168:223-231.
- Pedroso, A., Menten, A., Lambais, J.F.M., Racanicci, M.R., Longo, F.A. and Sorbara, J.O.B. (2006). Intestinal bacterial community and growth performance of chickens fed diets containing antibiotics. *Poultry Science*. 85:747-75.
- Rahimi, S., Khaksefid, A. (2006). A comparison between the effects of a probiotic (Bioplus 2B) and an antibiotic (virginiamycin) on the performance of broiler chickens under heat stress condition. *Iranian Journal of Veterinary Research* . 7(3):23-38.
- Reisinger, N., Steiner, T., Nitsch, S., Schatzmayr, G. and Applegate, T. J. (2011). Effects of a blend of essential oils on broiler performance and intestinal morphology during coccidial vaccine exposure. *Journal of applied Poultry Research*. 20:272-283.
- Saadat Shad, H., Mazhari, M., Esmaeilipour, O. and Khosravinia, H. (2016). Effects of Thymol and Carvacrol on Productive Performance, Antioxidant Enzyme Activity and Certain Blood Metabolites in Heat Stressed Broilers. *Iranian Journal of Applied Animal Science*. 6(1):195-202.
- Shoeib, H.K., Sayed, A.N., Sotohy, S.A. and Abdel Haffar, S.K. (1997). Response of broiler chicks to probiotic (Pronifer) supplementation. *Assiut Veterinary Medical Journal*. 36(71): 103-116.
- Tabidi, M. H., Mukhtar, A. M. and Mohammed, H. I. (2013). Effects of probiotic and antibiotic on performance and growth attributes of broiler chicks. *Global Journal of Medicinal Plant Research*. 1:136–142.
- Taherpour, R., Moravej, H., Shivazad, M., Adibmoradi, M. and Yakhchali, B. (2009). Effects of dietary probiotic, prebiotic and butyric acid glycerides on performance and serum composition in broiler chickens. *African Journal of Biotechnology*. 8: 2329-2334.
- Teo, A.Y., Tan, H.M. (2007). Evaluation of the performance and intestinal gut microflora of broilers fed on corn-soy diets supplemented with *Bacillus subtilis* PB6. *Journal of Applied Poultry Research*. 16: 296-303.
- Vahdatpour, T., Nikpiram H., Babazadeh, D., Vahdatpour, S. and Jafargholipour, M.A. (2011). Effects of Protexin, Fermacto and combination of them on blood enzymes and performance of Japanese quails (*Coturnix Japonica*) *Annals of Biological Research*. 2:283-291

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪