



# بررسی اپی فیتها و چراکنندگان موجود در کشت و پرورش جلبک قرمز *Gracilaria corticata* در حوضچه های فایبرگلاس

- حسن اکبری، مدیریت شیلات استان مرکزی، اراک
- فرشته سراجی، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بندرعباس
- حجت‌الله فروغی‌فرد، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بندرعباس

تاریخ دریافت: اسفند ماه ۱۳۸۲ تاریخ پذیرش: خرداد ماه ۱۳۸۳

## چکیده

به منظور تعیین و معرفی اپی فیتها و چراکنندگان موجود در پرورش جلبک قرمز گراسیلاریا (*G. corticata*) که در ۳ تیمار، ۵۰۰.۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ گرم در مترمربع در حوضچه های فایبرگلاس با ظرفیت ۱۰۰۰ مترمکعب به مدت یکسال از زمستان ۱۳۸۰ لغایت پایان پاییز ۱۳۸۱ پرورش داده شده بود، این تحقیق انجام و اپی فیتها و چراکنندگان در چهار فصل سال مشخص شدند. در این تحقیق که *Gracilaria corticata* به شکل اتصال بر روی تور در حوضچه های فوق پرورش داده می شد اپی فیتها و جلبک های میکروسکوپی و ماکروسکوپی ناخواسته و همچین گروهی از چراکنندگان در چهار فصل سال معرفی و تراکم و تنوع آنها گزارش گردید، به شکلی که فصلهای زمستان و تابستان حداقل تراکم و تنوع اپی فیتها و فصل های بهار و پاییز حداقل تراکم اپی فیتها را نشان داد. در فصل زمستان *Enteromorpha*, *Ulva* و *Enteromorpha*, *Navicula*, *Nitzschia*, *Tahalassiosira* گروهی از اپی فیتها بودند که در حوضچه های پرورشی وجود داشتند، علاوه بر این *Oscillatoria* و *Peridinium* گروههای دیگری از اپی فیتها بودند که در فصل تابستان دیده شد. تراکم و تنوع اپی فیتها در فصلهای بهار و پاییز متفاوت بوده و گروه هایی از *Nemertin* و *Nitzschia* (فصل پاییز) را نشان داد. در این بررسی گروهی از چراکنندگان کوچک مثل *Amphipoda*, *Isopoda* و *Chatoceros* (فصل بهار) را مشاهده شد که تراکم آنها در فصل زمستان که اپی فیتها تراکم کمتری را دارا بودند بالاتر بود، علاوه بر این در این تحقیق مشخص شدکه تراکم بالاتر جلبکهای ذخیره سازی شده (تیمار ۳) تراکم و تنوع بیشتری از اپی فیتها را نسبت به دیگر تیمارها داشته است.

کلمات کلیدی: *Gracilaria corticata*, اپی فیتها، چراکنندگان، حوضچه های فایبرگلاس، پرورش.

Pajouhesh &amp; Sazandegi No:63 pp: 89-94

**Epiphites and Grazer in *Gracilaria corticata* cultivation in fiber glass tanks**

By: H.Akbari: Fisheries Markazi Province, Arak, Iran. F. Sarajee and H.A. Forooghi Fard Oman sea and Persian Gulf Institute Ecology. Bandar Abbas, Iran.

In order to determination of epiphytes and grazers in *Gracilaria corticata* cultivation in fiber glass tanks three treatment was chosen (500,1000 and 2000 gr/m<sup>2</sup>) and this survey was done at during Winter 2001 to Autumn 2002. In study maximum and minimum of epiphytes had showed in Winter, Summer and Spring and Autumn respectively. *Navicula*, *Nitzschia*, *Thalassiosira*, *Enteromorpha* and *Ulva* are common epiphytes that observed in Winter and Oscillatoria and *Peridinium* were other groups which observed in Summer density and diversity of epiphytes in Summer and Autumn was showed groups of *Navicula* and *Nitzschia* (Spring) and *Chatoceros* (Autumn). In study some grazer so Isopoda, Amphipoda, Small crabs, Nemertin and Nereis recognaized showed those density was high in Winter and Summer. In survey density higher of *Gracilaria corticata* have most epiphytes than others.

**Key words:** *Gracilaria cirticata*, Epiphyte, Grazer, Fiberglass Tank, Cultivation.

**مقدمه**

بیماری‌ها و آفات یکی از مشکلات عمده پرورش علفهای دریابی به شمار می‌روند. از آفات مهمی که در طول دوره پرورش جلبکهای دریابی بخصوص جلبک گراسیلاریا بوجود می‌آید، اپی فیتها و چراکنندگان را می‌توان نام برد. اپی فیتها که به ۳ گروه اصلی جلبکها (کلروفیتا، فتوفیتا، ردوفیتا) و گروهی از دیاتومه‌ها و جلبکهای سبز آبی تقسیم می‌شوند. (۱۰)، به گروههای فرصت طلب شهرت داشته (۱۷) که در جذب موادغذایی بخصوص در سطوح بالای نوتروپینها و نیتروژن واکنش نشان داده و آنها را جذب می‌کنند (۱۳). اپی فیتها که چرخه زندگی ساده‌ای دارند دارای ظرفیت تولید مثل بالابی بوده و بر همین اساس نسبتی‌های رشد آنها از گیاهان دریابی پرورش داده شده بالاتر است (۹). تجمع و افزایش اپی فیتها که نقش مهمی در آلوده کردن محیط‌های پرورش علفهای دریابی ایفاء می‌کند (۱۱) معمولاً بین ۷۰ تا ۶۰ درصد به مزارع پرورشی گراسیلاریا آسیب رسانده و باعث از بین رفتن و عدم رشد آنها می‌گردد. (۴)

در پرورش گیاهان دریابی به خصوص در مناطق جزر و مدی و استخر چراکنندگان مزاجمین دیگری برای گیاهان دریابی هستند که مشکل ساز بوده و می‌توانند به بافت گیاهان دریابی آسیب برسانند. چراکنندگانی از قبیل ماهی و بی مهرگان با تغذیه از گراسیلاریا به خصوص در نواحی گرم‌سریری به بسترهای طبیعی و پرورش گراسیلاریا آسیب می‌رسانند. Smith و همکاران در سال ۱۹۸۴ آسیب‌های ایجاد شده بر G.debitus را که بویلله طوطی ماهی ایجاد شده بود را بیان نمودند (۲۰).

در استخرهای پرورشی مسئله دارابودن ماهی فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد ماهیان در استخرها زیاد بوده و شروع به خوردن محصول نمایند. (۶)

در سیستم حوضچه‌های پرورشی به علت انتقال تالهای جلبک از محیط طبیعی به محیط پرورشی تانک و عمل غذاهی، گروه‌های خاصی از اپی فیتها و چراکنندگان مشاهده شده می‌شوند. اپی فیتها مشاهده شده در این سیستم که ممکن است در درون آب حوضچه‌ها، چسبیده به تانکها و یا حتی چسبیده به سیستم هواده‌ی دیده شوند تراکم و تنوع خاصی را در فضول مختلف سال نشان می‌دهند. (۱۲)

در مورد چراکنندگان موجود در سیستم‌های پرورشی با حوضچه نیز با توجه به انتقال تالهای جلبک از محیط وحشی و طبیعی به محیط پرورشی و جداکردن تالهای سالم برای پرورش خواه ناخواه چراکنندگان بزرگ جداسده و فقط گروهی از آمفی پودا، ایزوپودا، خرچنگهای کوچک (نوزاد خرچنگها) و گروهی از کرمها را می‌توان دید که در لابلای تالهای جلبکهای پرورشی وجود دارند (۱۹).

در ایران با توجه به نوپا بودن بحث پرورش گیاهان آبزی به خصوص پرورش گراسیلاریا، اپی فیتها و چراکنندگانی که در طول دوره پرورش دیده می‌شوند معرفی نشده و در این مورد گزارشی ارائه نشده است، در این تحقیق که در کنار پرورش چراکنندگانی که در حوضچه‌های فایبرگلاس صورت گرفته است سعی شده است که تا حد امکان اپی فیتها و چراکنندگانی که در فضول مختلف سال در سیستم‌های پرورشی حوضچه دیده می‌شود معرفی و حتی الامکان راههای مبارزه با آن نیز بیان گردد.

## مواد و روش کار

عملیات پرورش جلبک *Gracilaria corticata* در چهار فصل سال از زمستان ۱۳۸۰ لغاًیت پایان پاییز ۱۳۸۱ در ۳ تیمار مختلف با تراکم‌های ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ گرم در مترمربع به روش اتصال بر روی تور و قراردادن در ۹ عدد حوضچه فایبرکلاس با حجم ۱۰۰۰ مترمکعب انجام شد.

جلبکهای مورد پرورش از سواحل بندر استانه در ۴۰ کیلومتری غرب بندر لنگه و سواحل بندر برس در ۸۰ کیلومتر شرق بندر چابهار جمع آوری گردید و توسط یونولیت در بین گونه‌های مرطوب به پژوهشکده خلیج فارس و دریای عمان انتقال داده شد. در پژوهشکده ابتدا جلبکها با آب دریا شسته شده، گل ولای و اپی فیتها و جلبکهای ماکروسکوپی دیگر از آن جدا و سپس با توزین آنها در دستجات ۱۰ گرمی و بستن بر روی تور با استفاده از نخهای پلاستیکی نرم، وزن های اولیه مشخص و درنهایت در حوضچه‌های موجود که با آب دریای فیلتر شده، تارتفاع ۸۰ سانتیمتر پر شده بودند قرار گرفت. همزمان با ذخیره سازی عمل هوادهی به شکل فشرده با استفاده از سنگهای هوا از کف حوضچه انجام (۱۶) و عمل غذادهی و تعویض آب نیز یک روز در میان به میزان ۳۰ - ۲۰ درصد حجم آب صورت می‌گرفت (۱۸).

غذای داده شده در طول دوره پرورش که همزمان با تعویض آب به میزان  $\frac{1}{3}$  گرم در مترمربع، به حوضچه‌ها اضافه می‌شد اوره بود که به صورت محلول در حوضچه‌ها ریخته می‌شد. همزمان با عملیات زیست سنجی که هر هفت‌هی یک بار صورت می‌گرفت چراکتدگان و اپی فیتها که بر روی جلبکهای پرورشی و یا دیواره حوضچه‌ها قرار گرفته بودند جدا و نمونه‌های نیز برای شناسایی جمع آوری و در فرمانیں  $\frac{4}{4}$  فیکس می‌شد (۱).

در نهایت تراکم اپی فیتها و چرنده‌ها به صورت نسبی مشخص و از نمونه‌های فیکس شده عکس تهیه گردید. این عمل برای چهار فصل سال انجام و نتایج بدست آمده ثبت گردید. در این طرح حتی الامکان سعی می‌شد که تراکم و تنوع جلبکهای ناخواسته با استفاده از روشهای ارائه شده و امکانات موجود به حداقل رسانیده و آنها را کاهش داد. بر همین اساس با استفاده از روشهای ذکر شده توسط Westermeier و همکاران در سال ۱۹۸۰ Doty، ۱۹۹۲ این عمل انجام و در هر فصل تراکم و تنوع آنها کاهش داده می‌شد.

## نتایج

جدول شماره ۱ اسامی اپی فیتها و چراکتدگان موجود در طی دوره پرورش جلبک قرمز گراسیلاریا (*G. corticata*) را در تیمارهای مورد بررسی (T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub>) نشان می‌دهد. در این جدول اپی فیتها

تصویر (۲) : جنس Nitzschia از جلبکهای میکروسکوپی (Obj. ۴۰x)


میکروسکوپی و همچنین چراکتدگان به تفکیک فصول مختلف سال و تیمارهای موربدبررسی مشخص شده است، به شکلی که تراکم و تنوع آنها در فصول مختلف سال و حتی تیمارهای موربدبررسی متفاوت بوده و هر فصل و هر تیمار تراکم خاصی را نشان داده است. در فصل زمستان گونه‌هایی از جلبکهای ماکروسکوپی ناخواسته از قبیل Enteromorpha در روی دیواره حوضچه‌ها، شلنگهای هوادهی و خود جلبکها دیده شد (تصویر ۱)، علاوه بر این Nitzschia و Thalassiosira، Nitzschia گروه‌های دیگری از جلبکهای میکروسکوپی ناخواسته بودند که در درون آب حوضچه‌های پرورشی وجود داشتند (تصاویر ۲ و ۳).

در فصل بهار هیچ اثری از اپی فیتها میکروسکوپی بر روی دیواره حوضچه‌ها و قسمتهای دیگر مشاهده نشد ولی از جنسهای دیگر جلبکها گروهی از جلبکهای ماکروسکوپی با نام Hypnea در کنار بعضی از جلبکهای ذخیره سازی شده مشاهده شد. از اپی فیتها میکروسکوپی دیده شده در این فصل نیز می‌توان به Nitzschia و Navicula اشاره کرد. در فصل تابستان می‌توان جنس‌های Oscillatoria و Peridinium را نام برد که به مقدار فراوان بر روی تالهای جلبکهای پرورشی در درون آب حوضچه‌ها وجود داشت (تصویر ۴). در فصل پاییز از اپی فیتها میکروسکوپی فقط جنس Chaetoceros که تراکم آن پایین بود گزارش گردید (تصویر ۵). علاوه بر اپی فیتها و جلبکهای ناخواسته گروهی از چراکتدگان از قبیل خرچنگهای کوچک (نوزاد خرچنگ)، آمفی پودا، Nereis ایزوپودا از سخت پوستان و گروهی از کرمها به نام Nemertin در تمام فصول سال مقادیر فراوانی را در لابلای تالهای جلبکهای پرورشی تشکیل می‌داد. (تصاویر ۶ و ۷).

## بحث و نتیجه گیری

اپی فیتها دامنه بسیار وسیعی از اثرات مضر را بر روی تولید تجاری

تصویر (۱) : جلبک *Ulva* که به شکل اپی فیتها میکروسکوپی بر روی تال جلبک گراسیلاریا قرار گرفته است. (Obj. ۱۰x)



گروهی از جلبکهای ناخواسته ماکروسکوپی از قبیل، *Hypnea* و *Ulva* بر روی دیواره حوضچه ها و شلنگ های هوادهی و حتی چسبیده به تال گیاه میزان دیده شد که اوج آنها مربوط به فصل زمستان و تیمار ۳ بود.

در فصل تابستان با وجود اینکه تراکم اپی فیتها دیده شده در حوضچه های پرورشی بالا بود ولی تنوع آنها نسبت به فصل زمستان متفاوت بوده و انواعی از *Oscillatoria* و *Peridinium* با مقادیر بالا دیده شد.

در بهار و پاییز تراکم و تنوع اپی فیتها کاهش یافته و جنس هایی از قبیل *Nitzschia* و *Navicula* (فصل پاییز) در حوضچه های پرورشی دیده شد با وجود اینکه تراکم و تنوع اپی فیتها فوق در این دو فصل تغییر یافته بود ولی باز هم دیده می شد که تراکم بالاتر مقادیر بیشتری از اپی فیتها فوق را دارا بود. یکی از عواملی را که می توان به کاهش اپی فیتها در فصل بهار و پاییز ربط داد حضور چراکنندگانی از قبیل ایزوپودا، آمفی پودا و حتی کرمهای *Nemertin* و *Nereis* است که به شکل فراوان در تمام تیمارها مورد بررسی در این فصل وجود داشت. ایزوپودا و آمفی پودا به علت رژیم گیاه خواری خود می توانند اپی فیتها را در جمعیت های پرورشی گراسیلاریا مورد تعذیه قرار داده و آنها را کاهش دهد(۱۹).

از عوامل دیگری را که می توان به کاهش اپی فیتها در دو فصل بهار و پاییز به خصوص فصل پاییز مرتبط دانست. تعذیه و کوددهی حوضچه های پرورشی در هنگام غروب است، در گراسیلاریا نسبت جذب نیتروژن در تاریکی کاهش نمی یابد ولی در اپی فیتها این قضیه صادق نبوده و آنها نمی توانند در غروب نیتروژن را جذب و در خود ذخیره نمایند (۲۰). بر همین اساس گراسیلاریا در شب نیتروژن را جذب و در خود ذخیره نموده و در هنگام روز از آن استفاده می کند در صورتی که اپی فیتها قادر به انجام این کار نبوده و نمی توانند این عمل را انجام دهن. این عمل تاثیر به سزاگیری در کاهش اپی فیتها داشت به صورتی که نه تنها تنوع آن کاهش یافت بلکه از تها اپی فیتها بیکاران در این فصل دیده شد تنها جلبک *Chaetoceros* موجود بود که تراکم کمی را دارا بود. براساس مشاهدات کیفی، در این تحقیق مشخص گردید که در درجه حرارت های بالا و تراکم بالاتر تراکم و تنوع اپی فیتها بیشتر بوده است.

### تشکر و قدردانی

در انجام این تحقیق لازم می دانم از کلیه همکاران در بخش آبزی

تصویر (۳) : جنس *Thalassiosira* از جلبکهای میکروسکوپی (Obj. ۴۰X)

علفهای دریایی ایجاد می کنند (۵). مضرات اصلی اپی فیتها و ارگانیسم های آلوده به رقابت آنها

با جلبکهای دریایی در کسب نوتریتیها، کربن غیرآلی و سایه دار کردن تالهای جلبکهای پرورشی به طریق قرار گرفتن بر روی تالها و پوشاندن آنها در نتیجه جلوگیری از فتوسنتز و تنفس جلبکهای پرورشی به واسطه جلوگیری از رسیدن نور و بسته بودن روزنه های تنفسی در ستون آب بر می گردد (۴). این عوامل به طور محسوس رشد در گیاه میزان را کاهش داده و حتی باعث صدمه زدن به بافت گیاه میزان و شکستن و له نمودن آنها می شود (۲).

از آسیب های دیگری که اپی فیتها و ارگانیسم های آلوده کننده در سیستم های پرورشی بخصوص سیستم های پرورش بسته، که هوادهی صورت نمی گیرد به وجود می آورند، می توان به افزایش رقابت برای گرفتن گازهای محلول اشاره کرد، علاوه بر این آلودگی باعث توزیع غیریکسان گیاه میزان و جلوگیری از چرخش آنها می گردد (۱۴). روی هم رفته مسائل اشاره شده در بالا باعث کاهش تولید در یک سیستم پرورشی شده و تولید را کاهش می دهد (۳). تغییرات فصلی اپی فیتها در حوضچه های پرورش قابل ملاحظه است و اساساً در فصلهای مختلف سال تنوع و تراکم آنها متفاوت است (۲۱)، علاوه بر این درجه حرارت و تراکم بالای جلبکهای دریایی ذخیره سازی شده توسعه اپی فیتها را در پرورش گراسیلاریا در سیستم حوضچه افزایش می دهد (۲۲).

در مطالعاتی که Edding و همکاران در سال ۱۹۸۷ بر روی پرورش Gracilaria sp در کشور شیلی انجام دادند بیان نمودند که در تیمارهای مورد بررسی (۲، ۴، ۶، ۸، ۲، ۴ کیلوگرم در متريمع) از تراکم ۴ کیلو به بالا اپی فیتها ای از تانکهای پرورشی دیده شد (۸). در بررسی که دیاتومه های رشته ای در تانکهای پرورشی دیده شد (۸). در بررسی که بر روی پرورش جلبک *G. Corticata* صورت گرفت اوج اپی فیتها در فصل تابستان و زمستان دیده شد. در فصل زمستان گروههایی از اپی فیتها شامل *Tahlassiosira* و *Nitzschia* و *Navicula* دیده شد که تراکم آنها در تیمار ۲ و ۳ (۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ گرم) بالاتر از تیمار ۱ (۵۰۰ گرم) بوده علاوه بر این در فصل زمستان و پاییز به علت مناسب بودن شرایط محیطی

تصویر (۴) : جنس *Oscillatoria* از جلبکهای میکروسکوپی (Obj. ۴۰X)

8- Edding, M.J, Macchavello H, Black 1987. Culture of *Gracilaria* sp. In outdoor tanks, *Hydrobiologia*.151/152:369-373.

9. Enright , C.T, 1979. Copercitive interaction between *Chondrus crispus* and *Ulva lactuca* in chondrus aquaculture.Proceedings of the Ninth International Seaweed Symposium.University Botonic Gardens. Cambridge 193-215.

10- Fletcher, R.L, 1995. The occurrence of green tides: A review. In schramm W,Nichhuis p (eds), marine benethic vegetation in Europe recent chang and effects of eutrophication.

11-Fletcher, R.L, 1981. Marine algae as fouling organisms. In proceeding of the Third Economic and Medical Plants Research Association Symposium. University Botanic Garden. Cambridge: 193-215.

12- Friedlander, M. Shalev, R, Ganor, T, 1987. Seasonal fluctuation of growth rate and chemical composition of *G. conferta* in out Door Culture in Israel.*Hydrobiologia*,151/152:501-507.

13- Fujita, R.M, 1985. The role of nitrogen status in regulation transient ammonium uptake and nitrogen storage by macroalgea J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 92:283-301.

14- Hanisak, M.D, 1987. Cultivation of *Gracilaria* and other macroalgae in horida for energy production, *Fisheries Science*. 191-218.

15- Lopes P.F,M. C. Oliveria, P. Colepicolo 1997. Diurnal fluctuation



تصویر (۵) : جنس *Chaetoceros* از جلبکهای میکروسکوپی (Obj. ۴۰x)

پروری پژوهشکده به خاطر همکاری بی دریغشان و همچنین سرکار خانم عباسی که تحقیق فوق را تایپ نمودند تشکر و قدردانی به عمل آورم.

#### منابع مورد استفاده

1-Barens, R.D.1987. Invertebrate zoology, Fifth edition.Sunders College Publishing edition, 883 pp.

2- Buschman, A.H. Vergara, P.A, Schulz, J.A, 1992. Intertidal gracilria farming in southern Chile. *Aquat. Bot.* 42:327-337.

3- Buschman, A.H. And F.A, Kuschell, 1988. Cultivo intermareal de *Gracilaria* sp. Colonization de spores e interaccion con *Ulva*

*lactuca*,*Biota*, 4: 107-113.

4. Buschman, A.H. and. P, Gomez, 1993. Interaction mechanisms between *G.chilensis* and epiphytes.Fourteenth international Seaweed Symposium Reprinted from *Hydrobiologia*, 260/261: 345-351.

5-Cancino, J.M, Munaz, M,Orellana, M.C, 1987. Effects of epifauna on alge growth and quality of the agar produced by *G. verrucosa*,*Hydrobiologia*, 151 1152: 233-237.

6-Chiang, Y.M, 1981.Cultivation of *gracilaria* in Taiwan, Int seaweed Symp. 10:569- 574.

7. Doty M.S, 1980. Outplanting eucheurma species and *Gracilaria* species in the tropics. California Sea Grant College Program. Lajolla : 19-22.



تصویر (۷) : گروهی از کرمها شامل جنس *Nereis* که به صورت چراکنده در لابلای تالهای جلبک گراسیلاریا وجود داشت (Obj. 10x)



تصویر (۸) : گروهی از چراکنده‌گان شامل ایزوپود آ که در لابلای جلبکهای گراسیلاریا پرورشی وجود داشت (Obj.10x)

جدول شماره ۱: گروههای ناخواسته جلبکها و چراکنندگان موجود در حوضچه‌های پرورش  
جلبک *G.corticata* در فصول مختلف سال (۱۳۸۰-۱۳۸۱)

فصل سال	تیمارها	اپی فیتها میکروسکوپی	جلبکهای ناخواسته میکروسکوپی	چراکنندگان
زمستان	T <sup>۱</sup> ۵۰۰ gr	+ Navicula- ++ Nitzschia - + Tahlassiosira-	++ Enteromorpho - + Ulva -	+ Nemertin - ++ Amphipoda - + Nereis -
	T <sup>۲</sup> ۱۰۰۰ gr	++ Navicula- ++ Nitzschia - ++ Tahlassiosira -	++ Enteromorpha - ++ Ulva -	+ Nemertin - ++ Nereis - +++ Isopoda - ++ Amphipoda -
	T <sup>۳</sup> ۲۰۰۰ gr	++ Navicula- +++ Nitzschia - +++ Tahlassiosira -	+++ Enteromorpho - ++ Ulva -	++ Nereis - ++ Isopoda - ++ Amphipoda -
بهار	T <sup>۱</sup>	+ Navicula - -++ Nitzschia	+ Hypnea -	++ Nereis - ++ Isopoda - ++ Amphipoda -
	T <sup>۲</sup>	++ Navicula- ++ Nitzschia -	+ Hypnea -	++ Nereis - ++ Isopoda - ++ Amphipoda -
	T <sup>۳</sup>	++ Navicula - ++ Nitzschia -	+ Hypnea -	+++ Nereis - +++ Isopoda - +++ Amphipoda - ++ Nemertin -
تابستان	T <sup>۱</sup>	++ Oscillatoria- ++ Peridinium -	----	++ Amphipoda - + Nereis - + Isopoda -
	T <sup>۲</sup>	+++ Oscillatoria- -+++ Peridinium	----	+ Amphipoda - + Nereis -
	T <sup>۳</sup>	+++ Oscillatoria - +++ Peridinium -	----	++ Amphipoda - ++ Nereis -
پاییز	T <sup>۱</sup>	+ Chaetoceras -	----	+++ Isopoda - +++ Amphipoda - ++ Nereis - ++ Nemertin -
	T <sup>۲</sup>	++ Chaetoceras -	+ Enteromorpha -	+++ Isopoda - +++ Amphipoda - ++ Nereis -
	T <sup>۳</sup>	+++ Chaetoceros -	+ Enteromorpha -	+++ Isopoda - +++ Amphipoda - ++ Nereis - ++ Nemertin -

of hitrate reducyase activity in the marine alge *G. tenuiatipitata*, J. Phycil. 33 : 225-231.

16- Masao, O. And A.T, Critchley, 1993. Seaweed cultivation and marine ranching, J.CA, 100-107.

17-Pickering, T.D. Gordon, M.E. Tong, L.J, 1995. Effect of nutrient pulse concentration and frequency on growth of *gracilaria chilensis* plants and levels of epiphytic algae. J. Appl. Phycol. 5: 525-5330.

18- Salszar, M, 1996. Experimental tank cultivation of *Gracilaria* sp in Ecuador, Hydrobiologia, 326-327: 353-354.

19- Shacklock, P.F. and R.W, Doyle, 1983. Control of epiphites in seaweed cultures using grazer, Aquaculture, 31:141-151.

20- Smith, A. K. Nichols, and J. McLachlan, 1984, Cultivation of sea moss (*Gracilaria*) in st. Olucia, west indies. Hydrobiologia, 116/117: 249-251.

21- Ugart, R and B, Santelices, 1992. Experimental tank cultivation of *G. chilensis* in central Chile. Aquaculture, 101:7-16.

22- Westermeier, R.I. Gomez and P. Rivera, 1992. Suspended farming of *G.chilensis* at Cariquila river, maullin, chile. Aquaculture, 113: 215-229.

23-Westermeier, R. Gomez, I.P, Rivera 1993. Suspended farming of *G.chilensis* at Cariguilda river, Chile, Aquaculture, 113: 215-229.