

اثر دانه گرده بر صفات کمی و کیفی میوه خرما رقم شاهانی

Effect of Pollen on Quantitative and Qualitative Characteristics of Date Fruit (*Phoenix dactylifera L.*) cv. Shahani

عباس خواجه پور تادوانی^۱، کاظم ارزانی^۲، حمید زرگری^۳
و سعادت ساریخانی خرمی^۱

۱ و ۲- به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دکتری و استاد، گروه علوم باگبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

۳- مریم، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باگبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جهرم، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۹/۱۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۶

چکیده

خواجه پور تادوانی، ع.، ارزانی، ک.، زرگری، ح. و ساریخانی خرمی، س. ۱۳۹۵. اثر دانه گرده بر صفات کمی و کیفی میوه خرما رقم شاهانی. مجله بهنژادی نهال و بذر ۱-۳۲-۳۱۰: ۲۹۳-۲۹۰. 10.22092/spij.2016.113060

گرده‌افشانی از مهم‌ترین فاکتورها در مدیریت نخلستان‌ها است که نقش مهمی در بهبود کمیت و کیفیت محصول خرما دارد. این پژوهش با هدف تعیین مناسب‌ترین پایه گرده‌زا برای خرمای شاهانی در قالب دو آزمایش جداگانه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم و دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۲ انجام شد. آزمایش اول به منظور تعیین مناسب‌ترین پایه گرده‌زا در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تیمار (گرده نر بومی جهرم، بومی داراب، بومی قیرو-کارزین، بومی لارستان، بومی فراشبند و گرده نر کشت بافتی بویر ۱۱) و چهار تکرار انجام شد. آزمایش دوم به منظور بررسی درصد قوه نامیه دانه گرده، در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار پایه گرده‌زا و چهار تکرار اجرا شد. نتایج حاصل از آزمایش اول نشان داد که اثر پایه‌های گرده‌زا بر صفات درصد تشکیل میوه، عملکرد، طول، قطر، وزن و حجم میوه معنی دار بود. بیشترین درصد تشکیل میوه و عملکرد به ترتیب در تیمارهای استفاده از پایه گرده‌زا بومی لارستان و پایه‌های بومی لارستان و بومی داراب به دست آمد. برخلاف صفات درصد رطوبت و خاکستر میوه، pH و اسیدیته آب میوه، اثر تیمارهای مختلف دانه گرده بر صفات نسبت گوشت به هسته و TSS معنی دار بود. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش دوم، بین پایه‌های نر مورد مطالعه اختلاف معنی داری از نظر درصد جوانه‌زنی دانه گرده مشاهده شد. بیشترین و کمترین درصد جوانه‌زنی دانه گرده به ترتیب مربوط به پایه نر بومی لارستان و کشت بافتی بویر ۱۱ بود. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که پایه‌های گرده‌زا بومی لارستان و بومی داراب مناسب‌ترین پایه گرده‌زا در بین پایه‌های نر برای خرما رقم شاهانی در منطقه جهرم استان فارس هستند.

واژه‌های کلیدی: خرما رقم شاهانی، جوانه‌زنی دانه گرده، رقم گرده‌زا، گرده‌افشانی.

مقدمه

تولید می شوند. بذر محل اصلی تولید ترکیبات مختلف محرك رشد از جمله تنظیم کننده های رشد است که نقش کلیدی در رشد کمی و کیفی میوه دارند. نوع و مقدار این مواد، به میزان زیادی با نوع دانه گرده در ارتباط است. از این رو، علاوه بر این که دانه گرده خرما باید از درختان قوی، سالم، تنومند و مرغوب انتخاب شود و رقم درخت گردهزا بسیار حائز اهمیت است (Mohebi *et al.*, 2012). به عبارت دیگر، ژنتیک رقم گردهزا و میزان سازگاری آن با رقم مورد نظر نقش بسیار مهمی در موفقیت عمل تلچیح و تشکیل میوه خرما دارد که تحت عنوان پدیده متازنیا (Metaxenia) شناخته می شود (El-Sharabasy and El-Banna, 2009).

رضه ازاده و همکاران (Rezazadeh *et al.*, 2013) در بررسی اثر دانه گرده بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم بر حی در مناطق ساحلی جنوب ایران، دوازده منبع دانه گرده را مورد آزمایش قرار دادند و گزارش کردند که رقم گردهزا M10 سبب دستیابی به حداقل درصد تشکیل میوه و عملکرد تجاری شد و مناسب ترین رقم گردهزا برای خرما رقم بر حی در مناطق ساحلی جنوب ایران بود. بررسی های صورت انجام شده بر روی اثر سه نوع دانه گرده بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم Seewy نشان داد که تنوع بسیار زیادی از نظر خصوصیات میوه در نتیجه کاربرد منابع مختلف دانه گرده حاصل شد. به عبارت دیگر، کمیت و کیفیت میوه خرما

خرما با نام علمی *Phoenix dactylifera* L. یکی از مهم ترین میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان به شمار می رود. خرما از مهم ترین منابع غذایی انسان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک بوده که از ارزش غذایی بسیار بالایی برخوردار است (Saddiq and Bawazir, 2010). خرما از قدیمی ترین محصولات تجاری در جنوب ایران است (Rezazadeh *et al.*, 2013). براساس آخرین آمار سازمان خوار و بار جهانی (FAO) در سال ۲۰۱۳، ایران با تولید بیش از ۱۰۸ میلیون تن خرما در رتبه دوم جهان قرار داشت. همچنین از نظر سطح زیر کشت (۱۶۲ هزار هکتار)، پس از کشورهای الجزایر و عربستان سعودی، رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده است (Anonymous, 2013).

خرما درختی دوپایه است که به صورت طبیعی گرده افشاری آن با باد انجام می شود، اما برای دستیابی به محصول تجاری عملیات گرده افشاری توسط انسان هم انجام می شود و برای هر ۵۰ درخت خرما، یک درخت نر لازم است (Zaid and de Wet, 2002). مرحله گرده افشاری از مهم ترین و حساس ترین عملیات به زراعی نخل خرماست که نقش بسیار مهمی در تولید میوه و بهبود کمیت و کیفیت آن دارد (Al-Khalifah and Askari, 2011). پس از گرده افشاری و انجام لقادح موفق، بذر و میوه

رقم گرده‌زای محلی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خرمای زاهدی نشان داد که ارقام تُورز و زاهدی در منطقه جهرم مناسب‌ترین منبع دانه گرده برای گردهافشانی خرمای زاهدی هستند (Heydari, 2000). حیدری و عباسی (Zargari, 2000) گزارش کردند که نوع دانه گرده علاوه بر اثر بر طول و وزن میوه‌ی خرمای رقم برحی، بر سایر صفات فیزیکی (از قبیل وزن میوه، وزن گوشت و قطر هسته) و بیوشیمیایی میوه (pH، مواد جامد محلول، اسیدیته گوشت و میزان قند کل) اثر معنی‌داری داشت.

البته گزارش‌هایی مبنی بر عدم تأثیر منبع و فراوانی دانه گرده بر خصوصیات میوه خرمای نیز وجود دارد. در مطالعات انجام شده روی خرمای کشت بافتی رقم نبات سیف مشخص شد که نوع و تراکم دانه گرده اثر معنی‌داری بر میزان تشکیل میوه نداشت (Awad, 2005). همچنین بررسی اثر منبع و فراوانی دانه گرده بر ریزش میوه، عملکرد و کیفیت میوه خرمای رقم داکی نشان داد که نوع و فراوانی دانه گرده بر ریزش میوه و عملکرد اثر معنی‌دار نداشت، اما برخی از صفات کیفی میوه را به‌طور معنی‌دار تحت تأثیر قرار داد (Shafique *et al.*, 2011).

نظر به وجود تنوع ژنتیکی بالا در بین پایه‌های نر خرما در ایران، نخل‌داران از ژنتیپ‌های مختلف رقم گرده‌زا به عنوان منبع گرده در نخلستان استفاده می‌کنند که همین امر سبب تغییر در درصد تشکیل میوه، زمان

رقم Seewy به شدت تحت تأثیر منبع دانه گرده قرار گرفت (Moustafa, 2001). نتایج مشابهی در مطالعات انجام شده بر روی ارقام خرمای داکی و زاهدی (Iqbal *et al.*, 2008) (Al-Muhtaseb and Ghnaim, 2006) گزارش شده است. بررسی اثر پنج رقم گرده‌زا بر خصوصیات کمی و کیفی میوه دو رقم خرمای برحی و نبات سفید نشان داد که منبع دانه گرده بر صفاتی از قبیل درصد میوه‌های غیرطبیعی، زمان رسیدن، درصد تشکیل، وزن، اندازه و کیفیت میوه و عملکرد اثر معنی‌داری داشت و این صفات در هر دو رقم خرمای برحی و نبات سفید به شدت تحت تأثیر منبع دانه گرده قرار گرفت (Al-Khalifah, 2006). نتایج مشابهی در بررسی اثر هفت رقم گرده‌زا بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرمای رقم زاهدی گزارش شده است (Shafaat and Shabana, 1980).

طلایی و پناهی (Talaei and Panahi, 1995) در بررسی اثر دانه گرده پنج رقم گرده‌زا انتخابی از منطقه شهداد، کرمان بر خصوصیات شیمیایی میوه خرمای رقم مضائقی جیرفت گزارش کردند که برخلاف میزان pH آب میوه، صفاتی از قبیل میزان مواد جامد محلول در آب میوه (TSS)، ماده خشک، رطوبت، قند کل و مقدار خاکستر میوه تحت تأثیر رقم گرده‌زا قرار گرفت. بررسی اثر دانه گرده پایه‌های زاهدی، شاهانی، تور و دو

۵۱ درجه و ۵ دقیقه شرقی، ارتفاع از سطح دریا ۵۰ متر)، استان فارس در سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۲ انجام شد. به علاوه، به منظور تعیین قوه نامیه دانه گرده پایه های نر مورد مطالعه، در صد جوانه زنی آنها در قالب یک آزمایش مجزا نیز مورد بررسی قرار گرفت.

آزمایش های انجام شده در این تحقیق به شرح زیر بودند:

آزمایش اول: تعیین مناسب ترین پایه گردهزا برای خرما رقم «شاهانی»

این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار منبع دانه گرده و چهار تکرار در دو سال و روی ۲۴ اصله نخل خرمای شاهانی هم سن و یکسان (۲۰ ساله) پیاده اجرا شد. به منظور اعمال تیمارهای مختلف گرده افشاری، در اسفند ماه هر سال، با ظهور اسپات های نر، ۶-۷ اسپات از هر پایه گرده زای مورد مطالعه جمع آوری شد. به منظور جلوگیری از گرده افشاری طبیعی درختان مورد مطالعه، خوش های آنها توسط کیسه های پارچه ای پوشانده شدند. گرده افشاری درختان ماده مورد مطالعه، سه روز پس از باز شدن طبیعی اسپات و با قرار دادن خوش های گل نر در بین خوش های گل ماده انجام شد. در نهایت برای اطمینان از انجام گرده افشاری و جلوگیری از گرده افشاری ناخواسته، خوش های گل با کیسه های حاوی دانه های گرده مورد نظر پوشانده شدند.

رسیدن و سایر خصوصیات کمی و کیفی میوه در یک رقم ثابت در نخلستان می شود (Rezazadeh *et al.*, 2013) است تا برای هر یک از ارقام تجاری خرمای کشور، مناسب ترین پایه گردهزا انتخاب و معرفی شود. خرما رقم شاهانی یکی از مهم ترین ارقام خرمای ایران است که در سطح وسیعی در استان فارس کشت شده است. این در حالی است که نخل داران استان هیچ گونه اطلاع دقیقی از ارقام گردهزا سازگار با این رقم نداشته و از پایه های مختلف درختان نر بومی جهت گرده افشاری استفاده می کنند، لذا این پژوهش با هدف تعیین مناسب ترین و سازگار ترین پایه ی گردهزا و بررسی اثر منبع دانه گرده بر خصوصیات کمی و کیفی خرما رقم شاهانی انجام شد.

مواد و روش ها

به منظور تعیین مناسب ترین پایه گردهزا برای خرما رقم شاهانی، این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار پایه گردهزا شامل گرده نر بومی جهرم (کد شماره ۷۰۰۱)، گرده نر بومی داراب (کد شماره ۷۰۰۴)، گرده نر بومی قیر و کارزین (کد شماره ۷۰۰۶)، گرده نر بومی لارستان (کد شماره ۷۰۲۶)، گرده نر بومی فراشبند (کد شماره ۷۰۳۰)، گرده نر کشت بافتی بویر ۱۱) و چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم (عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۲۳ دقیقه شمالی، طول جغرافیایی

و سپس با ۴۰ میلی لیتر آب مقطر ترکیب شد. این محلول برای تهیه عصاره میوه به مدت ۱۰ دقیقه با دور ۱۰۰۰۰ دور بر دقیقه در دمای چهار درجه سانتی گراد سانتریفیوژ شد. مقدار TSS و pH آب میوه به ترتیب با استفاده از دستگاه رفراکتومتر دیجیتال و pH متر دیجیتال اندازه گیری شد. برای اندازه گیری اسیدیته میوه از روش تیتراسیون آب میوه با سود ۱٪ نرمال تا رسیدن به $pH = 8.3$ استفاده و در نهایت میزان اسیدیته میوه به کمک رابطه زیر محاسبه شد:

$$(\text{S} \times 10) / (\text{V} \times \text{Meq} \times 100) = \text{اسیدیته قابل تیتراسیون میوه}$$

لازم به ذکر است که اسید غالب میوه خرما در مرحله خرما، اسید مالیک است. در این فرمول، V: حجم سود مصرفی برای تیتراسیون اسید میوه (میلی لیتر)، Meq: میلی اکسی والان گرم اسید غالب میوه (در این آزمایش $0.0067 \text{ Meq} = S$) و S: حجم نمونه عصاره میوه (میلی لیتر) است.

برای اندازه گیری درصد رطوبت میوه، در هر واحد آزمایشی، ۱۰ گرم از گوشت میوه، وزن شده و درون آون با دمای ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت قرار داده شد. با توجه به وزن نمونه قبل (W_1) و بعد از خشک کردن (W_2)، درصد رطوبت میوه از طریق فرمول های زیر محاسبه شد:

$$(W_1 - W_2) \times 100 / W_1 = \text{درصد رطوبت}$$

برای اندازه گیری گرم درصد خاکستر میوه، ۵ گرم از گوشت میوه در بوته چینی درون کوره الکتریکی با دمای ۵۵ درجه سانتی گراد

صفات مورد مطالعه در این پژوهش شامل درصد تشکیل میوه، عملکرد در هکتار، صفات فیزیکی میوه و هسته، درصد رطوبت و خاکستر میوه، مواد جامد محلول (TSS)، pH و اسیدیته آب میوه بود. درصد تشکیل میوه، پنج هفته پس از اعمال تیمار گرده افشاری و بر اساس نسبت میوه های طبیعی تکی بر تعداد گل در خوش و به صورت درصد محاسبه شد. به منظور ارزیابی عملکرد، مقدار محصول به ازای هر درخت با استفاده از ترازوی دقیق اندازه گیری شد و با توجه به این که در حدود ۱۵۶ نخل خرما در هر هکتار وجود دارد، لذا با ضرب مقدار محصول محاسبه شده در این عدد، میزان عملکرد در هکتار تعیین شد. به منظور اندازه گیری صفات فیزیکی میوه و هسته، در هر واحد آزمایشی تعداد ده عدد میوه به طور تصادفی انتخاب و صفات فیزیکی میوه از قبیل وزن، طول، قطر و حجم میوه و هسته، نسبت طول به قطر میوه و نسبت وزنی گوشت به هسته اندازه گیری شد. طول و قطر میوه و هسته با استفاده از کولیس دیجیتال بر حسب میلی متر، وزن میوه و هسته با استفاده از ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی بر حسب گرم و حجم میوه با کمک استوانه مدرج و بر اساس روش جابه جایی آب (Water displacement method) بر حسب سانتی متر مکعب اندازه گیری شد.

برای اندازه گیری صفات pH، TSS و اسیدیته قابل تیتراسیون میوه، مقدار ۱۰ گرم از نمونه همگن گوشت میوه در هاون چینی له شده

استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:

به مدت ۲ الی ۳ ساعت قرار داده شد.

میزان گرم درصد خاکستر میوه با

$$\text{وزن نمونه اولیه} / (100 \times (\text{وزن بوته چینی خالی} - \text{وزن بوته چینی با خاکستر})) = \text{گرم درصد خاکستر میوه}$$

جوانه‌زده محسوب شد که طول لوله گرده آن برابر یا بیشتر از قطر دانه گرده بود (Ahmadi, 1999).

آزمایش دوم: تعیین درصد جوانه‌زنی دانه گرده پایه‌های نر در شرایط درون شیشه‌ای به منظور بررسی درصد قوه نامیه دانه گرده پایه‌های نر مورد مطالعه، این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با شش تیمار پایه گردهزا و چهار تکرار در آزمایشگاه گروه علوم باگبانی دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۱ انجام شد. بدین منظور و بلافاصله پس از انتقال دانه‌های گرده از ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم به دانشگاه تربیت مدرس، از محیط کشت گزارش شده توسط بروباکر و کواک (Brewbaker and Kwack, 1963) بررسی قوه نامیه دانه‌های گرده مورد مطالعه استفاده شد. در طول مدت انتقال که نهایت یک هفته به طول انجامید، دانه‌های گرده در دمای ۴-۷ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. بدین منظور از تشکیک‌های پتروی کشت شده در زیر میکروسکوپ فلورسانس (مدل Olympus) با عدسی شیئی X10 که بر روی آن دوربین دیجیتال DP12 نصب شده بود، عکس برداری شد. در هر تشکیک پتروی، پنج میدان دید به طور تصادفی انتخاب شد. درصد جوانه‌زنی از نسبت دانه‌های گرده جوانه‌زده به کل دانه‌های گرده در هر میدان دید، محاسبه شد. دانه گردهای

تجزیه و تحلیل داده‌ها

پس از ارزیابی صفات مورد مطالعه در هر دو آزمایش و انجام آزمون نرمال بودن داده‌های به دست آمده، تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SAS انجام و توسط همین نرم افزار و با آزمون چند دامنه‌ای دانکن، مقایسه میانگین‌ها در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد انجام شد.

نتایج و بحث

آزمایش اول: تعیین بهترین پایه گردهزا برای خرما رقم شاهانی
بررسی اثر پایه‌های مختلف گردهزا بر صفات کمی و کیفی میوه خرما رقم شاهانی نشان داد که اثر سال و اثر متقابل سال و تیمار بر هیچ یک از صفات مورد مطالعه معنی دار نبود، با این وجود، اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف پایه گردهزا از نظر صفات درصد تشکیل میوه، عملکرد، طول، وزن و حجم میوه، وزن گوشت میوه، نسبت وزن گوشت به هسته و

نشان داد که بیشترین وزن (۱۲/۸ گرم) و حجم (۱۰/۸ سانتی متر مکعب) میوه مربوط به تیمار گرده افشاری با پایه گرده زای کشت بافتی بویر ۱۱ بود. از نظر حجم میوه، سایر تیمارهای مورد مطالعه اختلاف معنی داری با یک دیگر نداشتند ولی با تیمار پایه نر کشت بافتی بویر ۱۱ اختلاف معنی داری نشان دادند. کمترین میزان وزن میوه در استفاده از پایه های گرده زای بومی لارستان و بومی فراشبند به دست آمد که اختلاف معنی داری با یک دیگر نداشتند (جدول ۵). همان طور که گفته شد، نسبت طول به قطر میوه و نسبت طول به قطر هسته در دو سال آزمایش تحت تأثیر منبع دانه گرده قرار نگرفت و تیمارهای مورد مطالعه از نظر آماری در یک سطح قرار داشتند (جدول ۲). با این وجود اختلاف معنی داری از نظر طول و قطر هسته مشاهده شد، به طوری که بیشترین طول هسته در گرده افشاری با پایه گرده زای کشت بافتی بویر ۱۱ (۳۷/۲۴ میلی متر) و بومی داراب (۵۰/۲۳ میلی متر) به دست آمد که با یک دیگر اختلاف معنی داری نداشتند. همچنین بیشترین (۶۸/۶ میلی متر) و کمترین (۲۶/۶ میلی متر) قطر هسته نیز به ترتیب در گرده افشاری با پایه های گرده زای بومی فراشبند (T5) و بومی لارستان به دست آمد (جدول ۵).

بررسی اثر منابع مختلف دانه گرده بر وزن هسته و گوشت میوه نشان داد که بیشترین وزن هسته (۸۵/۰ گرم) و گوشت میوه (۲۰/۷ گرم)

میزان مواد جامد محلول در آب میوه در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. اثر منابع مختلف دانه گرده نیز بر قطر میوه، طول، قطر و وزن هسته در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود. اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف دانه گرده از نظر نسبت طول به قطر میوه، نسبت طول به قطر هسته، درصد رطوبت و خاکستر میوه، اسیدیته و pH آب میوه مشاهده نشد (جدول های ۱، ۲ و ۳).

بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش، بیشترین (۸۷/۶ درصد) و کمترین (۵۷/۵۵ درصد) درصد تشکیل میوه خرما رقم شاهانی به ترتیب مربوط به پایه های گرده زای بومی لارستان و کشت بافتی بویر ۱۱ بود. اختلاف معنی داری از نظر درصد تشکیل میوه بین پایه های گرده زای بومی داراب و قیر و کارزین مشاهده نشد. بیشترین عملکرد خرما رقم شاهانی در تیمار گرده افشاری با پایه گرده زای بومی لارستان (۹۹/۱۳ کیلو گرم در هکتار) و بومی داراب (۵۸/۱۳ کیلو گرم در هکتار) به دست آمد. در گرده افشاری با دیگر پایه های گرده زای اختلاف معنی داری از نظر عملکرد مشاهده نشد. بیشترین طول (۴۷ میلی متر) و قطر میوه (۵۲/۱۹ میلی متر) مربوط به گرده افشاری با پایه گرده زای کشت بافتی بویر ۱۱ بود. کمترین طول و قطر میوه نیز در گرده افشاری با پایه بومی لارستان مشاهده شد (جدول ۴).

بررسی نتایج مربوط به حجم و وزن میوه

جدول ۱- تجزیه واریانس عملکرد و برخی خصوصیات مرتبط با عملکرد خرما رقم شاهانی تحت تاثیر پایه‌های نر گردهزا

Table 1. Variance analysis of yield and some characteristics related to yield of date palm cv. Shahani as affected by pollinizer male palm

S.O.V.	متابع تغییرات	درجه آزادی df.	میانگین مربعات					
			درصد تشکیل میوه Fruit set	عملکرد Yield	طول میوه Fruit length	قطر میوه Fruit diameter	وزن میوه Fruit weight	حجم میوه Fruit volume
Year	سال	1	6.02 ^{ns}	188125.5 ^{ns}	13.86 ^{ns}	0.16 ^{ns}	0.55 ^{ns}	1.88 ^{ns}
First Error	خطای اول	3	2.29 ^{ns}	176182.1 ^{ns}	5.97 ^{ns}	0.55 ^{ns}	0.87 ^{ns}	1.23 ^{ns}
Treatment	تیمار	5	162.03 ^{**}	23122898.0 ^{**}	42.76 ^{**}	5.05 [*]	2.91 ^{**}	3.58 ^{**}
Year × Treatment	سال × تیمار	5	6.67 ^{ns}	169780.8 ^{ns}	0.49 ^{ns}	0.07 ^{ns}	0.15 ^{ns}	0.18 ^{ns}
Second Error	خطای آزمایش	33	1.799	1735765.4	3.80	1.05	0.292	0.482

ns: به ترتیب اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد و ۵ درصد و عدم وجود اختلاف معنی دار.

*, ** and ns: Significant difference at 1% and 5 % levels of probability, respectively and not significant.

جدول ۲- تجزیه واریانس برخی خصوصیات هسته و میوه خرما رقم شاهانی

تحت تاثیر پایه‌های نر گردهزا

Table 2. Variance analysis of some fruit and stone characteristics of date palm cv. Shahani as affected by pollinizer male palm

S.O.V.	متابع تغییرات	درجه آزادی df.	میانگین مربعات					
			نسبت طول به قطر میوه Fruit length to diameter ratio	طول هسته Stone length	قطر هسته Stone diameter	نسبت طول به قطر هسته Stone length to diameter ratio	وزن هسته Stone weight	وزن گوشت میوه Flesh weight
Year	سال	1	0.02 ^{ns}	33.16 ^{ns}	0.24 ^{ns}	0.36 ^{ns}	0.009 ^{ns}	0.61 ^{ns}
First Error	خطای اول	3	0.01 ^{ns}	5.42 ^{ns}	0.05 ^{ns}	0.12 ^{ns}	0.002 ^{ns}	0.91 ^{ns}
Treatment	تیمار	5	0.02 ^{ns}	6.16 [*]	0.36 [*]	0.16 ^{ns}	0.013 [*]	2.68 ^{**}
Year × Treatment	سال × تیمار	5	0.01 ^{ns}	0.81 ^{ns}	0.02 ^{ns}	0.04 ^{ns}	0.001 ^{ns}	0.02 ^{ns}
Second Error	خطای آزمایش	33	0.01	2.01	0.10	0.06	0.002	0.27

ns: به ترتیب اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد و ۵ درصد و عدم وجود اختلاف معنی دار.

*, ** and ns: Significant difference at 1% and 5 % levels of probability, respectively and not significant.

جدول ۳- تجزیه واریانس برخی خصوصیات کیفی میوه خرما رقم شاهانی

تحت تاثیر پایه‌های نر گردهزا

Table 3. Variance analysis of some fruit qualitative characteristics of date palm cv. Shahani as affected by pollinizer male palm

S.O.V.	متابع تغییرات	درجه آزادی df.	میانگین مربعات					
			نسبت وزن گوشت به هسته Flesh to stone weight ratio	رطوبت Fruit moisture	درصد خاکستر میوه Fruit ash percentage	اسیدیته Fruit acidity	pH آب میوه	مواد جامد محلول TSS
Year	سال	1	0.02 ^{ns}	18.75 ^{ns}	0.023 ^{ns}	0.007 ^{ns}	0.005 ^{ns}	0.04 ^{ns}
First Error	خطای اول	3	0.94 ^{ns}	2.22 ^{ns}	0.005 ^{ns}	0.073 ^{ns}	0.033 ^{ns}	4.49 ^{ns}
Treatment	تیمار	5	1.96 ^{**}	6.13 ^{ns}	0.108 ^{ns}	0.062 ^{ns}	0.022 ^{ns}	15.88 ^{**}
Year × Treatment	سال × تیمار	5	0.08 ^{ns}	0.75 ^{ns}	0.001 ^{ns}	0.001 ^{ns}	0.001 ^{ns}	0.55 ^{ns}
Second Error	خطای آزمایش	33	0.47	4.26	0.004	0.028	0.010	2.49

ns: به ترتیب اختلاف معنی دار در سطح احتمال یک درصد و ۵ درصد و عدم وجود اختلاف معنی دار.

*, ** and ns: Significant difference at 1% and 5 % levels of probability, respectively and not significant.

جدول ۴- مقایسه میانگین عملکرد و برخی خصوصیات کمی میوه خرما رقم شاهانی تحت تاثیر پایه‌های نر گردهزا

Table 4. Average comparison of yield and some fruit quantitative characteristics of date palm cv. Shahani as affected by pollinizer male palm

Pollinizer cultivars	پایه‌های گردهزا	درصد تشکیل میوه Fruit set (%)	عملکرد Yield (kg ha^{-1})	طول میوه Fruit length (mm)	قطر میوه Fruit diameter (mm)
Jahrom native pollen	گرده بومی جهرم	61.5c	10253.0bc	42.75b	18.30bc
Darab native pollen	گرده بومی داراب	62.87b	13058.1a	42.56b	17.67bc
Ghir and Karzin native pollen	گرده بومی قیر و کارزین	63.37b	10938.4b	42.26b	18.37bc
Larestan native pollen	گرده بومی لارستان	68.87a	13299.0a	40.00c	17.45c
Frashband native pollen	گرده بومی فراشبند	58.50d	10813.9b	43.00b	19.07ab
Boyer 11 pollen	گرده کشت بافی بویر ۱۱	55.57e	8859.9c	47.00a	19.52a

در هر ستون، میانگین‌ها با حروف مشترک از نظر آماری اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.

Means with similar letters in each column are not significantly different at the 1% level of probability.

جدول ۵- مقایسه میانگین برخی خصوصیات فیزیکی میوه و هسته خرما رقم شاهانی تحت تاثیر پایه‌های نر گردهزا

Table 5. Mean comparison of some fruit and stone physical characteristics of date fruit cv. Shahani as affected by pollinizer male palm

Pollinizer cultivars	پایه‌های گردهزا	وزن میوه Fruit weight (g)	حجم میوه Fruit volume (cm^3)	طول هسته Stone length (mm)	قطر هسته Stone diameter (mm)
Jahrom native pollen	گرده بومی جهرم	7.23b	6.76b	23.00b	6.37bc
Darab native pollen	گرده بومی داراب	7.43b	6.70b	23.50ab	6.67ab
Ghir and Karzin native pollen	گرده بومی قیر و کارزین	7.05b	6.75b	22.12b	6.36bc
Larestan native pollen	گرده بومی لارستان	6.37c	6.23b	22.78b	6.26c
Frashband native pollen	گرده بومی فراشبند	6.37c	7.01b	23.00b	6.81a
Boyer 11 pollen	گرده کشت بافی بویر ۱۱	8.12a	8.10a	24.37a	6.45bc

در هر ستون، میانگین‌ها با حروف مشترک از نظر آماری اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.

Means with similar letters in each column are not significantly different at the 1% level of probability.

با سایر تیمارهای مورد مطالعه اختلاف معنی داری داشت (جدول ۶).

آزمایش دوم: تعیین درصد جوانه‌زنی دانه گرده پایه‌های نر در شرایط درون شیشه‌ای بررسی درصد جوانه‌زنی دانه گرده پایه‌های مختلف نر خرما در این آزمایش نشان داد که اختلاف معنی داری بین پایه‌های نر مورد مطالعه از نظر درصد جوانه‌زنی دانه گرده در شرایط درون شیشه‌ای در سطح احتمال یک درصد وجود داشت، به طوری که بیشترین درصد جوانه‌زنی دانه گرده مربوط به پایه نر بومی لارستان (۶۰/۵۶ درصد) بود که اختلاف معنی داری با سایر پایه‌های مورد مطالعه داشت. همچنین کمترین درصد جوانه‌زنی دانه گرده مربوط به پایه کشتبند بافتی بویر ۱ (۲۳ درصد) بود (شکل ۱).

بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، اثر تیمارهای مختلف پایه‌های گردهزا بر صفات درصد تشکیل میوه، عملکرد، طول، قطر، وزن و حجم میوه معنی داری بود (جدول های ۱ و ۲). بیشترین درصد تشکیل میوه در استفاده از پایه گردهزا بومی داراب، بیشترین عملکرد نخل خرما در استفاده از پایه‌های بومی لارستان و بومی داراب، بیشترین طول، قطر، وزن و حجم میوه در استفاده از پایه گردهزا کشتبند بافتی بویر ۱۱ به دست آمد که با نتایج زرگری (زرگری، گزارش منتشر نشده) مبنی بر اثرات دانه گرده خرما بر بهبود خصوصیات

مربوط به تیمار گردهافشانی با پایه گردهزا کشتبند بافتی بویر ۱ بود. همچنین کمترین میزان وزن هسته مربوط به تیمار دانه گرده بومی قیر و کارزین بود که با پایه‌های گردهزا بومی لارستان و بومی فراشبند اختلاف معنی داری نداشت. درختانی که با دانه گرده بومی لارستان و بومی فراشبند گردهافشانی شده بودند، کمترین میزان وزن گوشت میوه را داشتند. بیشترین نسبت وزن گوشت به هسته در استفاده از پایه گردهزا کشتبند بافتی بویر (۸/۳۹) به دست آمد که اختلاف معنی داری با پایه گردهزا بومی قیر و کارزین (۸/۱۰) نداشت. کمترین نسبت وزن گوشت به هسته نیز مربوط به استفاده از پایه‌های گردهزا بومی لارستان و بومی فراشبند بود که با پایه‌های بومی جهرم و بومی داراب اختلاف معنی داری نشان نداد (جدول ۶). همان‌طور که گفته شد اثر تیمارهای مختلف پایه گردهزا بر صفات کیفی درصد رطوبت و خاکستر میوه، pH و اسیدیتی آب میوه خرمای رقم شاهانی در هر دو سال انجام آزمایش معنی دار نبود و تیمارهای مورد مطالعه از نظر آماری در یک سطح قرار داشتند (جدول ۳). برخلاف pH آب میوه، میزان TSS آب میوه خرمای شاهانی تحت تأثیر تیمار پایه‌های مختلف دانه گرده قرار گرفت. به طوری که، بیشترین TSS آب میوه در استفاده از پایه گردهزا «بومی داراب» (۷۹/۱۲ درصد) مشاهده شد که


جدول ۶- مقایسه میانگین برخی خصوصیات کیفی میوه خرما رقم شاهانی تحت تاثیر پایه‌های نر گردهزا

Table 6. Mean comparison of some qualitative characteristics of date fruit cv. Shahani as affected by pollinizer male palm

Pollinizer cultivars	پایه‌های گردهزا	TSS (%)	نسبت وزن گوشت به هسته Flesh to stone weight ratio	وزن گوشت میوه Flesh weight (g)	وزن هسته Stone weight (g)
Jahrom native pollen	گرده بومی جهرم	75.37b	7.47bc	6.13b	0.82ab
Darab native pollen	گرده بومی داراب	79.12a	7.40bc	6.19b	0.83ab
Ghir and Karzin native pollen	گرده بومی قیر و کارزین	76.53b	8.10ab	6.12b	0.75c
Larestan native pollen	گرده بومی لارستان	76.21b	7.15c	5.48c	0.77c
Frashband native pollen	گرده بومی فراشبند	75.81b	7.31c	5.78bc	0.79bc
Boyer 11 pollen	گرده کشت بافتی بویر ۱۱	75.37b	8.39a	7.20a	0.85a

در هر ستون، میانگین‌ها با حروف مشترک از نظر آماری اختلاف معنی‌داری با یک دیگر ندارند.

Means with similar letters in each column are not significantly different at the 1% level of probability.



شکل ۱- درصد جوانهزنی دانه گرده پایه‌های مختلف در شرایط درون شیشه‌ای ستون‌ها با حروف متفاوت، دارای اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱٪ هستند.

Fig. 1. Pollen germination percentage of different pollinizer male palms in *in vitro* condition
Bars with different letters are significantly different at 1% level of probability.

کمی میوه مطابقت داشت. احتمالاً علت درصد تشکیل میوه و عملکرد بالا در پایه گردهزا بومی لارستان در نتیجه درصد جوانهزنی بالای دانه گرده این رقم است که منجر به بیشترین درصد تشکیل و تعداد میوه شده است می‌شود (Denney, 1992). آل-خیلیه (Al-Khalifeh, 2006) در بررسی پدیده متازنیا در دو رقم خرما گزارش کرد که کمترین و بیشترین اندازه میوه خرما به ترتیب مربوط به رقم هیت و ارقام فوزان و موزامیا بود. نامبرده گزارش کرد که منبع دانه گرده اثر معنی داری بر صفات مرتبط با میوه و هسته خرما رقم بر حی و نبات سفید دارد. نتایج مشابهی توسط اقبال و همکاران (Iqbal *et al.*, 2008) و مصطفی

کمی میوه مطابقت داشت. احتمالاً علت درصد تشکیل میوه و عملکرد بالا در پایه گردهزا بومی لارستان در نتیجه درصد جوانهزنی بالای دانه گرده این رقم است که منجر به بیشترین درصد تشکیل و تعداد میوه شده است (شکل ۱).

به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق وجود پدیده زنیا و متازنیا در خرما را تائید می کند. زنیا و متازنیا به اثر مستقیم منبع دانه گرده بر خصوصیات آندوسپرم، جنین، بذر، بافت و گوشت میوه اطلاق می شود. در سال ۱۹۲۸، سوینگل تأثیر نوع دانه گرده روی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی میوه خرما را متازنیا نامید

دانه گرده حمل می شوند، بر خصوصیات هسته و میوه خرما اثرگذار است و در ارقام گردهزای برتر، تطبیق بیشتری بین پروتئین های رقم گردهزا با پروتئین های تولید شده در کلاله یا خامه وجود دارد (Raven *et al.*, 1981; Heydari and Abbasi, 2011) در تجزیه و تحلیل اثرهای فیزیولوژیک ویژگی های والد پدری بر میوه والد مادری از طریق دانه گرده، باستی از مرحله شکل گیری رویان و داندرون تا مرحله تقسیم و بزرگ شدن یاخته های بافت میوه به طور دقیق مدنظر قرار گیرد. دانه گرده می تواند در نحوه تشکیل و رشد رویان و داندرون مؤثر بوده و اندازه آن را کوچک، بزرگ، ناقص و یا کامل کند. به وجود آمدن هر یک از این حالت ها می تواند در رشد و تکامل فرآبر میوه اثر داشته باشد. برخی از هورمون های رشد میوه، نظیر جیبرلین از داندرون رویان تامین می شود و چنانچه منبع تامین این نوع هورمون ناقص باشد و یا خوب عمل نکند رشد میوه محدود شده و میوه از نظر اندازه کوچک مانده و به حد طبیعی نمی رسد (Dezhampour, and Gerigourian, 2004). احتمالاً ناسازگاری جزئی بین پایه های گردهزای مورد مطالعه با رقم شاهانی با اثر بر میزان هورمون تشکیل شده در میوه بر اندازه میوه اثرگذار باشد که لازم است در مطالعات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

نتایج حاصل از این تحقیق همچنین نشان داد که اثر پایه گردهزا بر صفات نسبت گوشت به

(Moustafa, 2001) روی خرما گزارش شده است.

بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش، اثر پایه های مختلف گردهزا بر صفات طول، قطر و وزن هسته ($P < 0.05$) و وزن گوشت میوه ($P < 0.01$) نیز معنی دار بود (جدول های ۱ و ۲) که این نتایج با مطالعات بسیاری از محققین بروی خرما مطابقت داشت (El-Makhtoun and Abdel-Kader, 1993; Desouky *et al.*, 1993; Gasim, 1993; Ben Salah and Hellali, 1998) اما با نتایج (Ashari *et al.*, 2008) اشاری و همکاران (Ashari *et al.*, 2008) روی پسته مطابقت نداشت.

مصطفی (Moustafa, 2001) در مطالعات خود گزارش کرد که اندازه و وزن میوه، وزن گوشت، ضخامت پوست میوه خرما به میزان زیادی تحت تأثیر منع دانه گرده قرار گرفت. با این وجود برخلاف وزن، حجم میوه تحت تأثیر منع دانه گرده قرار نگرفت و منبع گرده اثر معنی داری بر حجم میوه نداشت. نتایج حاصل از تحقیق حاضر ما نشان داد که علاوه بر اندازه و وزن میوه، حجم میوه نیز تحت تأثیر منع دانه گرده بوده و اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف دانه گرده در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. احتمالاً علت اثر دانه گرده بر خصوصیات هسته و میوه خرما مربوط به میزان دانه گرده و ناسازگاری جزئی بین ارقام گردهزا و رقم تجاری است. به عبارت دیگر، ناسازگاری ناشی از پروتئین های خاص ناسازگاری که با

آل-خليفه (Al-Khalifeh, 2006) مطابقت داشت. آل-خليفه (Al-Khalifeh, 2006) گزارش کرد که درصد زنده‌مانی و جوانه‌زنی دانه گرده در ارقام مختلف خرما متفاوت بود. احتمالاً علت این تفاوت در درصد جوانه‌زنی دانه گرده می‌تواند در نتیجه خصوصیات ژنتیکی رقم باشد (Acar and Kakani, 2010).

به طور کلی بررسی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که گرده بومی لارستان از نظر درصد تشکیل میوه و عملکرد در بالاترین سطح قرار داشت، اما از نظر ظاهری دارای میوه‌های کوچک بود. همچنین گرده کشت بافتی بویر ۱۱۱ اگر چه از نظر درصد تشکیل میوه و عملکرد در پایین‌ترین سطح در بین تیمارها قرار گرفت، اما از نظر ظاهری دارای میوه‌های درشت و با کیفیت ظاهری مناسبی بود. به دست آمدن میوه‌های ریز و درشت را می‌توان به میزان درصد تشکیل میوه ارتباط داد چرا که وقتی خوش‌های درصد تشکیل میوه بالایی دارد، فضای مواد غذایی کافی جهت رشد میوه‌ها کاهش می‌یابد. زمانی که درصد تشکیل میوه کم است، مقدار مواد غذایی و فضایی که برای رشد میوه وجود دارد، افزایش یافته و میوه از کیفیت ظاهری بهتری برخوردار می‌شود. با این وجود از آن جا که دانه گرده بومی دارای درصد تشکیل میوه و اندازه و کیفیت میوه مناسبی بود، به عنوان منبع دانه گرده برتر انتخاب شد. البته در صورت انجام عملیات تنک میوه، دانه گرده بومی لارستان نیز می‌تواند پایه گرده‌زای مناسب

هسته و آب میوه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود (جدول‌های ۳ و ۴) که با گزارش طایی و پناهی (Talaei and Panahi, 1995)، حیدری و عباسی (Heydari and Abbasi, 2011)، مصطفی (Moustafa, 2001) روی خرما و علی‌زاده سالطه و همکاران (Alizadeh-Salteh *et al.*, 2012) مطابقت داشت. حیدری و عباسی (Heydari and Abbasi, 2011) گردند که نوع دانه گرده علاوه بر اثر بر طول و وزن میوه خرما رقم بر حی، بر تغییر ویژگی‌های فیزیکی مانند وزن میوه، وزن گوشت و قطره هسته و همچنین بر ویژگی‌های بیوشیمیایی میوه مانند pH، مواد جامد محلول، اسیدیته گوشت و میزان قند میوه اثر داشت. احتمالاً علت اصلی تغییر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه تحت تأثیر تیمارهای مختلف دانه گرده، به علت اثر ژنتیک ارقام گرده‌زا بر این صفات باید باشد (Moustafa, 2001).

بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، بین پایه‌های نر مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری از نظر درصد جوانه‌زنی دانه گرده در شرایط درون شیشه‌ای در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. به طوری که بیشترین درصد جوانه‌زنی دانه گرده مربوط به پایه بومی لارستان و کمترین درصد جوانه‌زنی دانه گرده مربوط به پایه کشت بافتی بویر^۱ بود که این نتایج با مطالعه آل-خليفه

References

- Acar, I., and Kakani, V. G. 2010.** The effects of temperature on *in vitro* pollen germination and pollen tube growth of *Pistacia* spp. *Scientia Horticulturae* 125: 569-572.
- Afshari, H., Talaei, A., and Sadeghi, G. 2008.** A study of some of the components in the pistachia nut and the effect of pollen grains on quantitative and qualitative traits of them. *Journal of Horticultural Science* 22 (2): 12-23 (in Persian).
- Ahmadi, N. A. 1999.** Effects of storage methods and environmental conditions on citrus pollen germination. MSc. Thesis, Department of Horticultural Science, Faculty of Agricultural Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (in Persian).
- Alizadeh-Salteh, S., Arzani, K., and Irani, K. 2012.** Self-incompatibility studies of some iranian late-blooming almonds and pollen source effect on some characteristics of nuts. *Journal of Nuts* 3(2): 37-44.
- Al-Khalifah, N. S. 2006.** Metaxenia: Influence of pollen on the maternal tissue of fruits of two cultivars of date palm (*Phoenix dactylifera* L.). *Bangladesh Journal of Botany* 35(2): 151-161.
- Al-Khalifah, N. S., and Askari, E. 2011.** Growth Abnormalities Associated with Micropropagation of Date Palm. pp. 205-220. In: Jain, S. M., Johnson, D. V., and Al-Khayri, J. M. (eds.), *Date Palm Biotechnology* Springer, New York, USA.
- Al-Muhtaseb, J. A., and Ghnaim, H. D. 2006.** Effect of pollen source on yield, quality and maturity of 'barhi' date Palm. *Jordan Journal of Agricultural Sciences* 2 (2): 10-20.
- Anonymous 2013.** Food and Agriculture Organization of the United Nations; FAO Statistical Databases Available from: <http://faostat.fao.org>. Accessed Dec.10.2012.
- Awad, M. A. 2005.** Fruit set failure in tissue culture-derived date palm trees (*Phoenix dactylifera* L.) cv. 'Nabat saif' as affected by pollinizer type and pollination density. Proceedings of the International Workshop on True-to-Typeness of Date Palm Tissue Culture-Derived Plants, 23-25 May, Morocco.
- Ben Salah, M., and Hellali, R. 1998.** Metaxenic effects of nine pollinators on three palm date varieties (*Phoenix dactylifera*, L.) growing in Tunisia Coastal Oasis.

Abstracts of the First International Conference on Date Palms, United Arab Emirates University, Al Ain, United Arab Emirates. Page: 61.

- Besbes, S., Blecker, C., Deroanne, C., Drira, N. E., and Attia, H. 2004.** Date seeds: Chemical composition and characteristic profiles of the lipid fraction. *Journal of Food Chemistry* 84: 577-584.
- Brewbaker, J. L., and Kwack, B. H. 1963.** The essential role of calcium ion in pollen germination and pollen tube growth. *American Journal of Botany* 50 (9): 859-865.
- Denney ,J. 1992.** Xenia includes metaxenia. *HortScience* 27: 722-728.
- Desouky, M. I., Al-Amer, M., Faied, M., Jahjah, M. A., and El-Hammady, A. M. 1993.** Effect of different pollinators on fruit set and qualities of some date cultivars. Program and Abstracts of the Third Symposium on Date Palm. King Faisal University, Al-Hassa, Saudi Arabia. page: 91.
- Dezhampour, J., and Gerigourian, V. 2004.** Effects of pollen type on some quantitative and qualitative characteristics of apricot fruit. *Iranian Journal of Horticultural Science and Technology* 5: 1-10 (in Persian).
- El-Makhtoun, M. F., and Abdel-Kader, A. 1993.** Effect of different pollen types on fruit-setting, yield and some physical properties of some date palm cultivars. Program and Abstract of the Third Symposium on Date Palm. King Faisal University, Al-Hassa, Saudi Arabia. page: 90.
- El-Sharabasy, S. F., and El-Banna, A. A. 2009.** The effect of pollen sources on the fruit quality of the new introduced date palm Barhi cultivar in Egypt. *Egyptian Journal of Horticulture* 36 (2): 265-274.
- Gasim, A. A. 1993.** Comparative study of morphological characteristics of six seedling date palm and their effects on the yield of some date cultivars. Program and Abstract of the Third Symposium on Date Palm. King Faisal University, Al-Hassa, Saudi Arabia. page: 181.
- Heydari, M., and Abbasi, M. 2011.** Effects of pollen source and mixing of pollen grains on physical and biochemical characteristics of fruits in tissue culture-derived date palm (*Phoenix dactylifera* L. cv. Barhee). *Iranian Journal of Horticultural Science and Technology* 12 (2): 165-180 (in Persian).

- Iqbal, M., Ghaffar, A. J., and Munir, M.** 2008. Effect of different date male pollinizers on fruit characteristics and yield index of date palm (*Phoenix dactylifera* L.) cultivars Zahidi and Dhakki. *Pakistan Journal of Agriculture Research* 21: 79-85.
- Mohebi, H., Torahi, A., Latifian, M., Mostan, A., Rahkhodi, A., and Rahnama, A.** 2012. Applied Principle of Date Palm Cultivation and Growing. Katibeh Sabz Press, Tehran, Iran. 196 pp. (in Persian).
- Moustafa, A. A.** 2001. The effect of pollen source on fruit characteristics of 'Seewy' date cultivar. Proceedings of the Second International Conference on Date Palms, United Arab Emirates University, Al-Ain, United Arab Emirate. pp. 2-11.
- Raven, P. H., Evert, R. Y., and Curtis, H.** 1981. Biology of Plants. 3rd Edition, Worth Publishers, New York, USA. 686 pp.
- Rezazadeh, R., Hassanzadeh, H., Hosseini, Y., Karami, Y., and Williams, R.R.** 2013. Influence of pollen source on fruit production of date palm (*Phoenix dactylifera* L.) cv. Barhi in humid coastal regions of southern Iran. *Scientia Horticulturae* 160: 182-188.
- Saddiq, A. A., and Bawazir, A. E.** 2010. Antimicrobial activity of date palm (*Phoenix dactylifera*) pits extracts and its role in reducing the side effect of methyl prednisolone on some neurotransmitter content in the brain, hormone testosterone in adulthood. *Acta Horticulturae* 882: 665-690.
- Shafaat, M., and Shabana, R.** 1980. Metaxenic effects in date palm fruit. *Beitrage Trop. Landwirtsch. Veterinarmed* 18 Jg. H8.
- Shafique, M., Khan, M. S., Malik, A., Shaid, M., Rajwana, A., Saleem, B., Amin M. A., and Ahmad, A.** 2011. Influence of pollen source and pollination frequency on fruit drop, yeild and quality of date palm (*Phoenix dactylifera* L.) cv. Dhakki. *Pakistan Journal of Botany* 43 (2): 831-839.
- Swingle, W. T.** 1928. Metaxenia in the date palm. *Journal of Heredity* 19: 256-268.
- Talaei, A., and Panahi, B.** 1995. The effect of pollen of five different male-palm trees on the chemical characteristics of Jiroft Mazafati date cv. *Iranian Journal of Agriculture Sciences* 26 (4): 11-16 (in Persian).
- Zaid, A., and de Wet, P.F.** 2002. Pollination and bunch management. pp. 145-175. In: Zaid, A., and Arias-Jimenez, E. J. (eds.), Date Palm Cultivation. FAO Plant Production and Protection Papers-156, Rev.1, Rome, Italy.

Zargari, H. 2000. Effects of Zahedi (collected from three locations), kings, Tours pollen and two local pollinizer on dioecious palm fruit on the physical and chemical traits of *Phoenix dactylifera* l. cv. Zahedi. Priceedings of the 2nd Iranian Horticultural Science Congress, Karaj, Iran (in Persian).