

اثر تیمارهای قبل از برداشت کلسیم و جیبرلین بر کنترل سرمآذگی میوه فلفل دلمه‌ای در دوره انبارمانی

The Effects of Preharvest Calcium and Gibberellin Treatments on Sweet Pepper Chilling Injury During Storage

میثم محمدی^۱، اورنگ خادمی^۲، مهدی صیدی^۳ و مسعود بازگیر^۳

۱- به ترتیب دانشجوی سابق دوره کارشناسی ارشد و استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
۲- استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۴/۲۸ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۸

چکیده

محمدی، م.، خادمی، ا.، صیدی، م. و بازگیر، م. اثر تیمارهای قبل از برداشت کلسیم و جیبرلین بر کنترل سرمآذگی میوه فلفل دلمه‌ای در دوره انبارمانی. مجله به زراعی نهال و بذر ۲۰۹-۲۲۲: ۳۲-۲. ۱۳۹۵/۰۷/۱۰. 10.22092/sppj.2016.113079.

فلفل دلمه‌ای (*Capsicum annuum* L.) حساس به سرمآذگی است و علائمی همانند، تغییر رنگ، کاهش سفتی، و آلوگی‌های قارچی از جمله علایم سرمآذگی در این محصول هستند. در این بررسی اثر کلرید کلسیم ۰/۵ درصد و اسید جیبرلینک ۵۰ میلی‌گرم بر لیتر در دو و سه دوره محلول‌پاشی قبل از برداشت بر بخشی ویژگی‌های کیفی و کنترل سرمآذگی میوه فلفل دلمه‌ای رقم کالیفرنیا و اندر در انبار سرد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تیمارهای کلسیم و جیبرلین در مقایسه با شاهد شدت سرمآذگی کمتری داشتند و در این بین کمترین سرمآذگی در تیمار کلسیم سه بار محلول‌پاشی مشاهده شد. تیمار کلسیم دارای مقدار مالون دی‌آلدئید کمتری نسبت به تیمار جیبرلین و تیمار جیبرلین نیز دارای مقدار مالون دی‌آلدئید کمتری نسبت به شاهد بود. در تیمارهای اعمال شده، سفتی بافت و اسیدیته قابل تیتراسیون بیشتر و مقدار مواد جامد محلول کمتر از شاهد بود. مقدار اسید آسکوربیک و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در تیمارهای کلرید کلسیم و جیبرلین بیشتر از شاهد بود. بیشترین مقدار کلسیم در نمونه‌های تیمار کلرید کلسیم مشاهده شد. نمونه‌های تیمار جیبرلین نیز دارای کلسیم بیشتری در مقایسه با نمونه‌های شاهد بودند. در بیشتر شاخص‌های کیفی اختلاف معنی‌داری بین دو بار و سه بار محلول‌پاشی مشاهده نشد، بنابراین هر دو تیمار کلرید کلسیم و جیبرلین موجب حفظ کیفیت و کاهش خسارت سرمآذگی میوه فلفل دلمه‌ای در انبار سرد شده و می‌تواند برای افزایش عمر پس از برداشت این میوه مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: فلفل دلمه‌ای، انبارمانی، خسارت سرمآذگی، کلسیم، کیفیت.

مقدمه

فلفل دلمهای بانام علمی *Capsicum annuum L.* از خانواده سولاناسه (Solanaceae) است (Peyvast, 2009). این محصول به دلیل وجود ترکیبات فعال بیولوژیکی از جمله ترکیبات آنتیاکسیدانی، ویتامین‌های ضروری و مواد معدنی، ارزش تغذیه‌ای بالای دارد و روز به روز بر تولید و مصرف آن افزوده می‌شود (Bosland and Votova, 2000) (Deppa et al., 2006).

اکثر محصولات باگبانی به دلیل ویژگی‌های فیزیولوژیکی خاص، از زمان برداشت تا مصرف ضایعاتی از نظر کمی و کیفی دارند. میزان این ضایعات بر اساس آمار بسته به نوع محصول بین ۵ تا ۵۰ درصد در کشورهای مختلف متفاوت است (Ashornejad and Ghasemnejad, 2012) (Rahemi, 2011). بیشتر ضایعات نتیجه عدم تغذیه مناسب محصول در قبل از برداشت و عدم توجه به شیوه‌های درست جابه‌جایی، انبارداری، حمل و نقل و بازاررسانی محصول در پس از برداشت است (Rahemi, 2011). رطوبت بالای محصولات باگبانی باعث فساد پذیری بیشتر آنها و کاهش عمر انبارمانی می‌شود. برای کاستن ضایعات و حفظ کیفیت محصول علاوه بر کاهش دمای انبار توجه به مواردی که از سرمازدگی جلوگیری می‌کند، ضروری است (Ashornejad and Ghasemnejad, 2012).

میوه فلفل همانند بیشتر محصولات مناطق گرمسیری حساس به سرمازدگی است و علایمی مثل تغییر رنگ، کاهش شدید سفتی، تغییرات کیفی در متابولیت‌های میوه و آلودگی‌های قارچی از جمله علایم و پی‌آمددهای ناشی از سرمازدگی در این محصول هستند، از این رو به طور معمول میوه فلفل در دمای بالای ده درجه سانتی گراد نگهداری می‌شود، ولی در این دما میوه سریعاً دچار کاهش وزن شده و با شیوع انواع بیماری‌ها کیفیت خود را از دست می‌دهد (Vicente et al., 2005)؛ Ramana et al., 2011 (Nyanjage et al., 2005). هر گونه روشی که باعث افزایش مقاومت به سرمازدگی و حفظ کیفیت و شادابی این محصول شود به انبارمانی، بازاریابی و صادرات این محصول کمک شایانی خواهد کرد. نشان داده شده است که تیمار اشعه مأموراً بنفس (UV-C) با کاهش آلودگی میکروبی موجب نگهداری میوه فلفل در دمای ده درجه سانتی گراد به مدت ۱۸ روز می‌شود ولی این تیمار با القای مقاومت به سرمازدگی موجب افزایش عمر پس از برداشت میوه فلفل تا روز ۲۲ در دمای صفر درجه سانتی گراد به علاوه چهار روز در دمای معمولی شد (Vicente et al., 2005).

در میان عناصر غذایی کلسیم مهم‌ترین عنصر معدنی در تعیین کیفیت میوه است که به خاطر نقش ساختمانی آن، در تمامی مراحل رشد مورد نیاز گیاهان است، مخصوصاً در سیب، گلابی،

شد. همچنین ابل و همکاران (Abel *et al.*, 2011) گزارش کردند که کاربرد کلسیم قبل از برداشت باعث افزایش محتوی کلسیم میوه و سفتی بافت میوه و همچنین تغییر در فعالیت آنزیم‌های دیواره سلولی میوه سبب شد.

جیرلین نیز یکی از مهم‌ترین تنظیم کننده‌های رشد سلولی است که نقش مهمی در رشد و نمو گیاهان بازی می‌کند. از جمله نقش‌های مهمی که این هورمون در گیاهان دارد می‌توان به طویل شدن سلول‌ها، گلدهی، تولید میوه بکرزایی، طویل شدن ریشه، رشد برگ‌ها، جوانه زنی بذر، بزرگ‌شدن و کیفیت میوه، تأخیر در رسیدن میوه‌ها و افزایش طول میانگره‌ها اشاره کرد (Lange, 1998). جیرلین‌ها بسته به مرحله رشد در گیاه اثر متفاوتی را نشان می‌دهند و در کنترل تنش‌های محیطی از جمله خسارت سرما، خشکی و کنترل بیماری‌های قارچی و باکتریایی نقش دارند. در واقع کاربرد جیرلین در قبل از برداشت با بهبود رشد گیاه موجب افزایش کیفیت و کاهش تلفات پس از برداشت محصولات باغبانی می‌شود (Hedden and Phillips, 2000). نشان داده شده است که کاربرد قبل از برداشت جیرلین موجب افزایش مقدار کلروفیل، مواد جامد محلول و ویتامین C در میوه‌های فلفل دلمه‌ای می‌شود (Fung *et al.*, 2006). بسدا و همکاران (Besada *et al.*, 2008) روی میوه خرمالو نشان دادند که کاربرد قبل از برداشت

توت فرنگی، انگور، کیوی، زردآلو و بسیاری از گل‌های شاخه بربادنی و میوه‌های دیگر عمر نگهداری میوه‌ها را افزایش می‌دهد. کلسیم علاوه بر عامل تثیت کننده کمپلکس پکتین-پروتئین در تیغه میانی، با استقرار در دیواره سلولی به ترکیبات تیغه میانی ثبات می‌بخشد و ساختمان دیواره سلولی را حفظ می‌کند. کلسیم با استحکام بخشیدن به دیواره سلولی و کاهش تولید اتیلن نیز در کاهش عالیم سرمایدگی، کاهش آلدگی‌های قارچی و افزایش انبارمانی محصولات باغبانی نقش خود را ایفا می‌کند (Babalar *et al.*, 1999). کاربرد محلول کلسیم پیش از برداشت موجب جلوگیری از عارضه‌های فیزیولوژیکی و به تأخیر انداختن فرایند پیری و رسیدگی میوه‌ها می‌شود (Lima, 1990; Conway *et al.*, 2002). گزارش شده است که کاربرد کلرید کلسیم پس از برداشت باعث افزایش عمر قفسه‌ای فلفل دلمه‌ای در دماهای ۱۰ و ۲۵ درجه سانتی گراد و همچنین باعث حفظ اسیدیته، مواد جامد محلول و فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، پراکسیداز و اسید آسکوربیک اسیداز در طول ۱۸ روز انبارمانی شده است (Hedden and Phillips, 2000). نتایج تحقیقات کسانوی و همکاران نشان داد که کاربرد قبل و پس از برداشت کلسیم باعث حفظ سفتی و کاهش عوارض فیزیولوژیکی در میوه سبب

تقسیم‌بندی شده و در هر واحد آزمایشی ۲۴ بوته در سه ردیف با فواصل ۷۵ سانتی‌متر بین ردیف‌ها و ۳۵ سانتی‌متر روی ردیف‌ها کاشته شد. آبیاری به صورت قطره‌ای بوده و کود کامل در مرحله استقرار کامل به صورت یکنواخت در واحدهای آزمایشی پخش شد.

تیمارهای اعمال شده شامل: شاهد (محلول پاشی با آب)، اسید جیبرلیک (۵۰ میلی گرم در لیتر و کلرید کلسیم ۰/۵ درصد بود. هر یک از تیمارها به صورت دو بار (زمان ظهور میوه و ۱۵ روز پس از آن) و یا سه بار محلول پاشی (زمان ظهور میوه، ده روز پس از آن و پیست روز پس از آن) اعمال شد. محلول پاشی‌ها پس از غروب آفتاب و به وسیله سempاش موتووری همراه با توین ۲۰ (Tween 20) با غلظت ۰/۱ درصد حجمی- حجمی به عنوان سورفتکانت انجام شد. محلول پاشی تا آنجایی ادامه پیدا کرد که به صورت قطراتی از گیاه در حال چکیدن بود. پیست میوه از هر تیمار (در مجموع ۸۰ میوه از هر تیمار) در مرحله بلوغ باغبانی برداشت و در دمای صفر درجه سانتی گراد انبار شدند. در زمان‌های ۱۰ و ۲۰ روز تعداد ۴۰ میوه از هر تیمار به عنوان چهار تکرار از انبار خارج و پس از دو روز نگهداری در دمای معمولی اتاق و رطوبت ۵۰-۶۰ درصد به عنوان عمر قفسه‌ای از نظر خواص کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفتند. از هر واحد آزمایشی نیز تعداد پنج میوه برداشت شده و برای اندازه‌گیری سفتی، مقدار

جیبرلین موجب القای مقاومت به سرمازدگی در پس از برداشت شد. بهبود انبارمانی میوه هلو توسط محلول پاشی با اسید جیبرلیک نیز گزارش شده است (Ju *et al.*, 1999).

مشکل عمدۀ نگهداری فلفل دلمه‌ای در ایران حساسیت شدید آن به سرمازدگی در صورت نگهداری در دمای پایین و عمر پس از برداشت کوتاه و پوسیدگی در صورت نگهداری در دمای بالا است، بنابراین با القای مقاومت به سرمازدگی، امکان نگهداری طولانی مدت میوه فلفل در دمای سرد وجود خواهد داشت. تا کنون گزارشی مبنی بر کاهش سرمازدگی میوه فلفل دلمه‌ای توسط محلول پاشی قبل از برداشت با کلرید کلسیم و جیبرلین منتشر نشده است، بنابراین در این پژوهش اثر محلول پاشی قبل از برداشت ترکیبات کلسیم و جیبرلین در افزایش عمر مفید پس از برداشت فلفل دلمه‌ای در انبار سرد مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام اجرا شد. رقم مورد استفاده در این آزمایش رقم کالیفرنیا واندر (California wonder) بود که نشاهای آن از مرکز تولید تجاری در شهرستان کرج تهیه و در مرحله چهار برجی در بهار ۱۳۹۲ به زمین اصلی منتقل شد. هر بلوک به شش واحد آزمایشی

مقدار اسید آسکوربیک از روش تیتراسیون با محلول دی کلروفل ایندوفنل استفاده شد (Ranganna *et al.*, 1997). برای این منظور دو گرم از گوشت میوه با محلول متافسفریک اسید سه درصد عصاره گیری شده و عصاره به دست آمده توسط محلول رنگی دی کلروفنل ایندوفنل تا ثبات رنگ ارغوانی تیتر شد. مقدار اسید آسکوربیک بر حسب میلی گرم در ۱۰۰ گرم وزن تر میوه بیان شد.

ظرفیت آنتی اکسیدانی بافت میوه از طریق خاصیت خثی کنندگی رادیکال آزاد تعیین شد (Diphenyl-2-picrylhydrazyl) DPPH (Miliauskas *et al.*, 2004). برای این منظور ۰/۲ گرم از بافت میوه به وسیله نیتروژن مایع در داخل هاون چینی پودر شده و سپس ۱۰ میلی لیتر مтанول خالص به آن اضافه و همگن شد. عصاره حاصل در ۱۰۰۰ دور سانتریفیوژ شد و سپس ۱۰ میکرولیتر عصاره مтанولی به ۱۹۰۰ میکرولیتر محلول DPPH اضافه شد و به مدت ۳۰ دقیقه در تاریکی به منظور رسیدن محلول به حالت یکنواخت قرار گرفت. میزان جذب نمونه ها در ۱۵۵ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر Scinco (مدل S-3100) ساخت کشور کره جنوبی) قرائت و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره ها به صورت درصد بازدارندگی DPPH براساس فرمول زیر محاسبه شد که در آن DPPHsc درصد بازدارندگی، Asamp میزان جذب DPPH+نمونه) و Acont میزان جذب DPPH

مواد جامد محلول و مقدار کلسمیم در زمان برداشت و قبل از انبارداری مورد استفاده قرار گرفتند.

شدت سرمایزدگی میوه ها به صورت مشاهده ای و در محدوده صفر تا سه نمره دهی شد. صفر بدون سرمایزدگی و سه بیشترین شدت سرمایزدگی را شامل می شد. عالیم سرمایزدگی بر اساس شدت آب گزیده شدن سطح میوه تغییر رنگ و نرم شدن شدید رتبه بندی و بر اساس فرمول زیر و به صورت شاخص در هر واحد آزمایشی محاسبه شد (Nyanjage *et al.*, 2005).

$$CI = \sum(n_i \times i) / N \times 5$$

که در آن CI شاخص سرمایزدگی، n_i تعداد میوه هایی که علائم سرمایزدگی درجه i و N درجه سرمایزدگی از صفر تا سه را نشان می دهند.

سفتی بافت میوه (میزان نیروی لازم برای سوراخ کردن گوشت میوه) با استفاده از دستگاه سفتی سنج دستی (مدل FT-011) به صورت میانگین از پنج قسمت متفاوت میوه محاسبه شد. پس از عصاره گیری مقدار مواد جامد محلول با استفاده از دستگاه رفراکتومتر دستی (مدل ATC-1e) در دمای اتاق و بر حسب درجه بریکس و درصد اسیدیته قابل تیتراسیون از طریق تیتر کردن عصاره میوه با سود ۰/۱ نرمال تارسیدن به pH نهایی ۸/۲ و بر اساس غالیت اسید سیتریک اندازه گیری شد (Shabani *et al.*, 2011).

است:

$$DPPHsc = (1 - (A_{\text{samp}} / A_{\text{cont}})) \times 100$$

مقایسه اختلاف بین میانگین‌ها از آزمون LSD در سطح احتمال آماری ۵ درصد استفاده شد. داده‌های زمان برداشت نیز به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج و بحث

خصوصیات میوه در زمان برداشت

بر اساس نتایج مقایسه میانگین، در زمان برداشت اختلاف معنی داری بین تیمارها از نظر مقدار مواد جامد محلول مشاهده نشد. سفتی بافت میوه در تیمارهای کلسیم و جیرلین بیشتر از نمونه‌های شاهد بود. در این بین نمونه‌های تیمار کلسیم سه بار محلول‌پاشی دارای سفتی بافت بیشتری در مقایسه با سایر تیمارها بود هر چند اختلاف آماری معنی داری با تیمار جیرلین سه بار محلول‌پاشی از نظر سفتی بافت نشان نداد. از نظر مقدار کلسیم بافت نیز نمونه‌های تیمار شده با کلرید کلسیم دارای مقدار کلسیم بیشتری در مقایسه با نمونه‌های شاهد و جیرلین و نمونه‌های تیمار شده با جیرلین نیز دارای مقدار کلسیم بیشتری در مقایسه با نمونه‌های شاهد بودند (جدول ۱).

کاهش سرمآذگی در میوه فلفل

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که کمترین شدت سرمآذگی بافت میوه در میوه‌های تیمار کلسیم سه بار محلول‌پاشی وجود داشت. نمونه‌های تیمار کلسیم دو بار محلول‌پاشی نیز دارای شدت سرمآذگی کمتری در مقایسه با

برای اندازه‌گیری نشت یونی از قسمت‌های میانی میوه‌ها تعداد هشت دیسک به وسیله پانچ دستی برداشته و در داخل لوله‌های آزمایش حاوی ۱۰ میلی‌لیتر آب قطر قرار گرفتند. پس از ۴ ساعت روی شیکر با سرعت ۱۵۰ دور در دقیقه هدایت الکتریکی اولیه (EC1) محلول توسط دستگاه هدایت سنج الکتریک (Lutron مدل CD-4330) ساخت کشور تایوان) قرائت شد. نمونه‌ها به مدت ۲۰ دقیقه در داخل حمام آب گرم بادمای ۹۵ درجه سانتی گراد قرار گرفته و پس از سرد شدن هدایت الکتریکی ثانویه (EC2) نمونه‌ها اندازه‌گیری و درصد نشت یونی بر اساس نسبت EC1/EC2 محاسبه شد (Ranganna *et al.*, 1997). سنجش میزان مالون دی آلدئید نیز بر اساس روش زینک و همکاران (Xing *et al.*, 2011) انجام شد. اندازه‌گیری میزان کلسیم بافت میوه توسط دستگاه جذب اتمی AA 919 UNICAM (مدل ساخت کشور استرالیا) و به روش ابل و همکاران (Abel *et al.*, 2011) انجام شد و بر حسب میلی گرم در گرم وزن خشک ثبت شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل تیمارهای اعمال شده و زمان‌های بررسی بودند. داده‌ها پس از جمع آوری و بررسی نرمال بودن توسط نرم‌افزار آماری SAS (نسخه ۹/۲) تجزیه شده و برای

جدول ۱- مقایسه میانگین صفات سفتی، مواد جامد محلول و کلسیم بافت میوه فلفل دلمه‌ای در تیمارهای مختلف کلسیم و جیبرلین (GA3) در زمان برداشت

Table 1. Mean comparison of firmness, TSS and Calcium of sweet pepper fruit tissue in different calcium and gibberellin (GA3) treatments at harvest time

Treatment	تیمار	softness	مواد جامد محلول	کلسیم
		Firmness (kgm ⁻²)	TSS (%)	Ca (mgg ⁻¹ dry mass)
Control (two spraying)	شاهد (۲) محلول پاشی	3.29c	4.5a	2.52c
Control (three spraying)	شاهد (۳) محلول پاشی	3.29c	4.4a	2.51c
GA ₃ (two spraying)	جیبرلین (۲) محلول پاشی	3.88b	4.7a	2.89b
GA ₃ (three spraying)	جیبرلین (۳) محلول پاشی	4.02ab	4.2a	2.87b
CaCl ₂ (two spraying)	کلرید کلسیم (۲) محلول پاشی	3.89b	4.1a	3.82a
CaCl ₂ (three spraying)	کلرید کلسیم (۳) محلول پاشی	4.19a	4.5a	4.03a

در هر ردیف میانگین‌ها با حروف مشابه در سطح احتمال ۵ درصد آزمون LSD فاقد اختلاف معنی‌دار هستند.
Means with the same letters within rows are not significantly different at LSD ($p < 0.05$).

معنی‌داری کاهش یافت (جدول ۳). نمونه‌های تیمار شده با جیبرلین و کلسیم در دو بار و سه بار محلول‌پاشی بدون اختلاف معنی‌دار نسبت به یک‌دیگر دارای درصد اسید قابل تیتر بیشتر و مقدار مواد جامد محلول کمتری در مقایسه با نمونه‌های شاهد بودند (جدول ۲). بر اساس اثر اصلی زمان با گذشت زمان آزمایش درصد اسید قابل تیتر کاهش و مقدار مواد جامد محلول افزایش معنی‌داری نشان داد (جدول ۳).

بر اساس اثر اصلی تیمار نمونه‌های تیمار شده با جیبرلین در سه بار محلول‌پاشی با مقدار ۸۳/۴۱ میلی گرم در ۱۰۰ گرم اسید آسکوربیک بیشترین مقدار اسید آسکوربیک در بین نمونه‌ها را دار بودند که البته با نمونه‌های کلرید کلسیم سه بار محلول‌پاشی اختلاف آماری معنی‌داری را نشان ندادند. نمونه‌های جیبرلین و کلرید کلسیم دو بار محلول‌پاشی نیز بدون اختلاف معنی‌دار نسبت به یک‌دیگر دارای مقدار اسید

تیمارهای جیبرلین و شاهد بودند. نمونه‌های هر دو تیمار جیبرلین دو و سه بار محلول‌پاشی بدون اختلاف معنی‌دار نسبت به یک‌دیگر دارای شدت سرمایه دار شدت سرمایه با شاهد ۱/۳۳ دارای بیشترین شدت سرمایه بودند (جدول ۲). بر اساس نتایج اثر اصلی زمان بر صفات میوه فلفل دلمه‌ای، با گذشت زمان آزمایش شدت سرمایه دار شد. نمونه‌ها به طور معنی‌داری افزایش یافت (جدول ۳).

بر اساس اثر اصلی تیمار، نمونه‌های تیمار شده با جیبرلین و کلسیم بدون اختلاف معنی‌دار نسبت به یک‌دیگر دارای سفتی بافت بیشتری در مقایسه با شاهدهای آزمایش بودند. نمونه‌های شاهد (آب) به صورت دوبار محلول‌پاشی و سه بار محلول‌پاشی به ترتیب با مقدار ۲/۶۲ و ۲/۶۸ کیلو گرم بر مترمربع دارای کمترین میزان سفتی بافت بودند (جدول ۲). سفتی بافت تمامی نمونه‌ها با گذشت زمان آزمایش به طور

جدول ۲- مقایسه میانگین ویژگی های میوه فلفل دلمه ای در تیمارهای قبل از برداشت کلسیم و جیربرلین (GA3) پس از انبار سرد
Table 2. Mean comparison of characteristics of sweet pepper in different pre-harvest treatments of CaCl₂ and gibberelin (GA3) after cold storage

Treatment	تیمار	سرمازدگی Chilling injury (score)	softness Firmness (kgcm ⁻²)	اسید قابل تیر TA (%)	مواد جامد محلول TSS (%Brix)	اسید آسکوربیک Ascorbic acid (mg100g ⁻¹)	آنتی اکسیدان Antioxidant (%)	مالون دی آلدید MDA (μmg ⁻¹)	کلسیم Ca (mgg ⁻¹ dry mass)
Control (two spraying)	شاهد (۲ محلول پاشی)	1.33a	2.62c	1.21b	5.19a	58.33c	52.37c	0.96a	2.46d
Control (three spraying)	شاهد (۳ محلول پاشی)	1.33a	2.68bc	1.22b	5.22a	58.92c	52.87c	0.99a	2.45d
GA ₃ (two spraying)	جیربرلین (۲ محلول پاشی)	0.8b	2.98ab	1.35a	4.43b	67.37b	59.25b	0.8b	2.89c
GA ₃ (three spraying)	جیربرلین (۳ محلول پاشی)	0.84b	3.03a	1.31a	4.68b	83.41a	63.51ab	0.87b	2.86c
CaCl ₂ (two spraying)	کلرید کلسیم (۲ محلول پاشی)	0.53c	3.17a	1.4a	4.6b	72.66b	62.37ab	0.64c	3.74b
CaCl ₂ (three spraying)	کلرید کلسیم (۳ محلول پاشی)	0.29d	3.22a	1.38a	4.44b	76.44ab	65.37a	0.61c	3.95a

در هر ردیف میانگین ها با حروف مشابه در سطح احتمال ۵ درصد آزمون LSD فاقد اختلاف معنی دار هستند.

Means with the same letters within rows are not significantly different at LSD (p < 0.05).

جدول ۳- مقایسه میانگین ویژگی های میوه فلفل دلمه ای در زمان های مختلف انبار مانی

Table 3. Mean comparison of sweet pepper characteristics in different storage times

Storage time	زمان انبار مانی	سرمازدگی Chilling injury (score)	softness Firmness (kgcm ⁻²)	اسید قابل تیر TA (%)	مواد جامد محلول TSS (°Brix)	اسید آسکوربیک Ascorbic acid (mg100g ⁻¹)	آنتی اکسیدان Antioxidant (%)	نشت یونی EC (%)	مالون دی آلدید MDA (μmg ⁻¹)
10 Days	روز ۱۰	0.72b	3.21a	1.39a	4.55b	76.39a	63.66a	9.14b	0.7b
20 Days	روز ۲۰	0.99a	2.69b	1.23b	4.97a	62.23b	54.92b	17.5a	0.92a

در هر ردیف میانگین ها با حروف مشابه در سطح احتمال ۵ درصد آزمون LSD فاقد اختلاف معنی دار هستند.

Means with the same letters within rows are not significantly different at LSD (p < 0.05).

بررسی مقدار کلسیم میوه نشان داد که، تمامی تیمارهای جیرلین و کلرید کلسیم اعمال شده دارای مقدار کلسیم بیشتری در مقایسه با نمونه‌های شاهد بودند. در این بین تیمار کلرید کلسیم سه بار محلول پاشی با مقدار ۳/۹۵ درصد بیشترین مقدار کلسیم در بین نمونه‌ها را دارا بود. نمونه‌های تیمار کلرید کلسیم دو بار محلول پاشی نیز دارای مقدار کلسیم بیشتری در مقایسه با نمونه‌های تیمارهای جیرلین بودند. نمونه‌های تیمارهای جیرلین دو و سه بار محلول پاشی اختلاف معنی‌داری از نظر مقدار کلسیم نشان ندادند (جدول ۲).

میوه‌های نافرازگرا از جمله فلفل دلمه‌ای تغییرات فیزیولوژیکی کمی در مرحله پس از برداشت از خود نشان می‌دهند منتهی با وجود فعالیت متابولیکی کم در این گونه میوه‌ها انبارمانی طولانی می‌تواند منجر به تغییر زیاد در خصوصیات کیفی میوه شود (Rahemi, 2011). در فلفل دلمه‌ای سرمایزدگی از جمله عوامل اصلی محدود کننده عمر انباری این میوه است که منجر به شیوع سریع آلودگی‌های قارچی و کاهش شدید سفتی می‌شود (Nyanjage *et al.*, 2005). نتایج این آزمایش نشان داد که سرمایزدگی میوه‌های فلفل دلمه‌ای با تیمارهای قبل از برداشت کلسیم و جیرلین کاهش معنی‌داری پیدا کرد و تأثیر تیمار کلسیم بیشتر از تأثیر تیمار جیرلین بود. با افزایش دفعات محلول پاشی تیمار کلسیم این اثر بیشتر نیز شد. در این آزمایش رابطه مثبتی بین کاهش

آسکوربیک بیشتری در مقایسه با نمونه‌های شاهد بودند (جدول ۲). با گذشت زمان آزمایش مقدار اسید آسکوربیک نمونه‌ها به طور معنی‌داری کاهش یافت (جدول ۳).

از نظر ظرفیت آنتی اکسیدانی نیز نمونه‌های تیمار شده با جیرلین و کلرید کلسیم دارای ظرفیت آنتی اکسیدانی بیشتری در مقایسه با نمونه‌های شاهد بودند. در این بین با افزایش دفعات محلول پاشی ظرفیت آنتی اکسیدانی نمونه‌ها به طور نسبی بیشتر افزایش یافت ولی اختلاف چندان قابل توجهی بین تیمارهای جیرلین و کلرید کلسیم از نظر ظرفیت آنتی اکسیدانی مشاهده نشد (جدول ۲). با گذشت زمان آزمایش ظرفیت آنتی اکسیدانی نمونه‌ها کاهش یافت (جدول ۳).

نتایج مالون دی آلدئید نشان داد که بیشترین میزان این ترکیب در میوه‌های شاهد با اعدادی معادل ۰/۹۶ و ۰/۹۹ میکرومول بر گرم مشاهده شد. تیمارهای کلرید کلسیم دو و سه بار محلول پاشی به طور معنی‌داری دارای مقدار مالون دی آلدئید کمتری در مقایسه با نمونه‌های جیرلین و شاهد بودند. نمونه‌های تیمار شده با جیرلین دو و سه بار محلول پاشی نیز بدون اختلاف معنی‌دار نسبت به یکدیگر دارای مقدار مالون دی آلدئید کمتری در مقایسه با نمونه‌های شاهد بودند (جدول ۲). با گذشت زمان آزمایش مقدار مالون دی آلدئید تمامی نمونه‌ها به طور معنی‌داری افزایش یافت (جدول ۳).

(Babalar *et al.*, 1999)

در این آزمایش سفتی بافت در هر دو تیمار کلسیم و جیرلین بیشتر از شاهد بود. از آنجایی که کلسیم موجب استحکام دیواره سلولی می‌شود، بالا بودن سفتی بافت در میوه‌های تیمار شده در مقایسه با شاهد میتواند به دلیل افزایش مقدار کلسیم بافت باشد (Conway *et al.*, 2002; Babalar *et al.*, 1999). داگار و همکاران (Dagar *et al.*, 2012) گزارش کردند که تیمار اسیدجیرلیک در میوه هلو علاوه بر افزایش سفتی در زمان برداشت باعث حفظ سفتی میوه نسبت به شاهد پس از سه هفته انبارمانی شد. همچنین اثر تیمار قبل از برداشت کلرید کلسیم بر بهبود عمر پس از برداشت و حفظ دیواره سلولی میوه سیب رقم Fuji Kiku-8 توسط ابل و همکاران (Abel *et al.*, 2011) گزارش شده است.

نتایج مربوط به سرمازدگی با مشاهدات به دست آمده از مقدار مالون دی‌آلدئید میوه‌ها همسو بود، با این تفاوت که بین زمان‌های محلول‌پاشی در هر تیمار اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. تیمارهایی که دارای خسارت سرمازدگی کمتری بودند از محتوی مالون دی‌آلدئید کمتری نیز برخوردار بودند. مقدار مالون دی‌آلدئید به عنوان شاخصی از میزان تنش وارد شده به گیاه محسوب می‌شود (Ding *et al.*, 2001). مقدار مالون دی‌آلدئید یک شاخص برای سنجش میزان پراکسیده شدن

شدت سرمازدگی و مقدار کلسیم بافت مشاهده شد، به طوری که میوه‌های تیمار شده با کلرید کلسیم و جیرلین دارای مقدار کلسیم بیشتری در بافت خود در مقایسه با نمونه‌های شاهد بودند. در این حالت نیز مقدار کلسیم نمونه‌های تیمار کلرید کلسیم بیشتر از نمونه‌های جیرلین بود و با افزایش دفعات محلول‌پاشی کلرید کلسیم مقدار کلسیم بافت بیشتر شد. این امر می‌تواند ناشی از قراردادن مقدار بیشتری از عنصر کلسیم در اختیار میوه‌های در حال رشد با افزایش دفعات محلول‌پاشی کلسیم باشد که منجر به تولید میوه‌هایی با استحکام و کیفیت برتر شده و نسبت به سایر تیمارها دارای مقاومت بیشتری در انبار بودند. تحقیقات نشان داده که کلسیم علاوه بر استحکام بخشیدن به دیواره سلولی با کاهش تولید اتیلن و کنترل تنفس و همچنین کاهش تعرق در کاهش علایم سرمازدگی، کاهش آلودگی‌های قارچی و افزایش انبارمانی محصولات با غبانی نقش خود را ایفا می‌کند (Babalar *et al.*, 1999).

اثر تیمار جیرلین در افزایش مقدار کلسیم بافت قبل نیز گزارش شده است (Jones and Carbonell, 1984) که محتوای کلسیم بافت گیاه با افزایش میزان تعرق افزایش می‌یابد، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش سطح برگ و میوه در گیاه توسط جیرلین، میزان تعرق و جذب کلسیم از خاک توسط گیاه افزایش می‌دهد (Conway *et al.*, 2002).

سرمایدگی میوه خرمالو در انبار می‌شود (Besada *et al.*, 2008).

ترکیب اسیدآسکوربیک از جمله مهم‌ترین ترکیبات آنتیاکسیدانی میوه فلفل دلمه‌ای است که حفظ و افزایش آن در طول دوره انبار به مفهوم حفظ قدرت مبارزه و زدودن رادیکال‌های آزاد تولید شده در شرایط تنش است (Depa *et al.*, 2006; Bosland and Votova, 2000). تیمارهای جیبرلین و کلرید کلسمیم به عنوان تیمارهای موثر در کاهش علایم سرمایدگی میوه فلفل دلمه‌ای دارای مقدار اسیدآسکوربیک بیشتری از نمونه‌های شاهد در این آزمایش بودند. اسیدآسکوربیک یکی از ترکیبات سرشار از گروه CO- است که می‌تواند در متلاشی کردن رادیکال‌های آزاد به وجود آمده در اثر تنش سرما نقش مهمی بازی کند. یکی از رادیکال‌های آزاد مضر ایجاد شده در اثر تنش یون سوپراکسید است که آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز دو یون سوپراکسید را باهم ترکیب و به اکسیژن و H_2O_2 تبدیل می‌کند، سپس گروه دیگر آنزیم‌ها یعنی پراکسیدازها H_2O_2 تولید شده در شرایط تنش را با اکسیداسیون ترکیبات آنتیاکسیدانی حاوی گروه CO- متلاشی می‌سازند و بدین طریق اثر سوء رادیکال‌های آزاد ایجاد شده در اثر تنش سرما خنثی می‌شود (Miliauskas *et al.*, 2008; Depa *et al.*, 2006). در میوه‌های فلفل دلمه‌ای کاهش سرمایدگی انباری میوه با کاربرد

لیپیدهای غشای سلولی است. زمانی که تنش‌های غیرزنده به خصوص تنش دمای پایین به بافت گیاهی وارد می‌شود گونه‌های فعال اکسیژن تولید می‌شوند که با اسیدهای چرب غیراشباع در غشای سلولی واکنش داده و باعث پراکسیده شدن لیپیدهای غشا می‌شوند (Ding *et al.*, 2001; Huang *et al.*, 2010).

تیمارهایی که موجب کاهش خسارت سرمایدگی می‌شوند در واقع پراکسیداسیون چربی غشارا کاهش داده و به این طریق از بروز علایم سرمایدگی ممانعت می‌کنند (Huang *et al.*, 2010). یکی از راهکارهای مهم سلول‌های گیاهی در ممانعت از پراکسیداسیون لیپیدهای غشا بالا بودن ظرفیت آنتیاکسیدانی در آن‌ها است که با خنثی کردن رادیکال‌های آزاد از آسیب به غشاها سلولی در شرایط تنش ممانعت می‌کنند. در آزمایش حاضر نیز کاهش شدت سرمایدگی و مقدار مالون دی آلدئید با افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی در تیمارها همراه بود که با نتایج (Huang *et al.*, 2010) هوانگ و همکاران مطابقت داشت که گزارش کردند کاربرد کلرید کلسمیم در پرتغال ناول کارا کارا (Cara cara Navel Orange) با تنظیم سیستم آنتیاکسیدانی سبب کاهش پراکسیداسیون لیپیدها و کاهش شدت سرمایدگی شد. در گزارشی دیگر نشان داده شد که محلول پاشی با جیبرلین در قبل از برداشت با افزایش ترکیبات آنتیاکسیدانی در میوه باعث مقاومت به

غالباً کاهش اسید قابل تیتر در شرایط تنفس سرما در میوه‌ها امری طبیعی است زیرا که متابولیسم سلولی جهت حفظ سلامتی اندام‌های سلولی افزایش و اسیدهای آلی در تنفس سلولی مورد استفاده قرار می‌گیرند (Sakaldas and Kaynas, 2010).

آزمایش نیز تیمارهای موثر در کاهش شدت سرمazdگی با حفظ بهتر اسید قابل تیتر میوه همراه بودند.

به عنوان نتیجه گیری کلی، اعمال تیمارهای قبل از برداشت کلسیم و جیرلین علاوه از افزایش کیفیت و کمیت میوه‌های تولیدی با کاهش خسارت سرمazdگی و افزایش عمر انبارمانی میوه‌های فلفل دلمه‌ای همراه است و لذا استفاده از این تیمارها می‌تواند به عنوان یک برنامه راهبردی در تولید و نگهداری میوه‌های فلفل دلمه‌ای مورد استفاده تجاری قرار گیرد.

متیل سالیسیلات و متیل جاسمونات به تاثیر تیمارها در افزایش بیان ژن‌های آلترناتیو اکسیداز (Alternative oxidase) نسبت داده شده است که در سیستم دفاعی سلول‌های گیاهی در برابر تنش‌های اکسیدشدنی دخالت دارند (Fung *et al.*, 2006).

بر اساس نتایج این آزمایش نمونه‌های تیمار شده با کلسیم و جیرلین دارای مقدار مواد جامد محلول کمتر و مقدار اسید قابل تیتر بیشتری در مقایسه با شاهد بودند. افزایش مقدار مواد جامد محلول در طی انبارمانی می‌تواند در اثر کاهش آب میوه و تغليظ شیره سلولی باشد (Nyanjage *et al.*, 2005). تیمار استفاده شده در این آزمایش به دلیل استحکام بهتر دیواره سلولی و حفظ یک پارچگی غشای سلولی، احتمالاً با ممانعت از دست دادن آب از تغليظ شیره سلولی و افزایش مقدار مواد جامد محلول ممانعت کردند.

References

- Abel, O., Jordi, G., and Isabel, L. 2011.** Preharvest calcium applications inhibit some cell wall-modifying enzyme activities and delay cell wall disassembly at commercial harvest of 'Fuji Kiku-8' apples. Postharvest Biology and Technology 62: 161-167.
- Ashornejad, M., and Ghasemnejad, M. 2012.** Effect of packaging with cellophane and cold storage on quality and shelf life of Japanese Medlar fruit. Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology 7: 95-375.
- Babalar, M., Dolati Baneh, A., and Sharafatian, D. 1999.** Postharvest effect of calcium chloride on storage quality of two varieties of grape. Seed and Plant 14: 32-40 (in Persian).

- Besada, C., Arnal, L., and Salvador, A. 2008.** Improving storability of persimmon cv. Rojo Brillante by combined use of preharvest and postharvest treatments. Postharvest Biology and Technology 50: 169-175.
- Bosland, P. W., and Votova, J. 2000.** Pepper: Vegetable and Specie Capsicums. CABI Publishing, Wallingford, UK.
- Conway, W. S., Sams, C. E., and Hickey, K. D. 2002.** Pre- and postharvest calcium treatment to apple fruit and its effect on quality. Acta Horticulturae 59: 53-62.
- Dagar, A., Weksler, A., Friedman, H., and Lurie, S. 2012.** Gibberellic acid application at the end of pit ripening: effect on ripening and storage of two harvests of "September Snow" peach. Scientia Horticulturae 140: 125-130.
- Deppa, N., Kaur, C., Singh, B., and Kapoor, H. C. 2006.** Antioxidant activity in some red sweet pepper cultivars. Composition and Analysis 19: 572-578.
- Ding, C. K., Wang, C., Gross, K., and Smith, D. 2001.** Reduction of chilling injury and transcript accumulation of heat shock protein genes in tomatoes by methyl jasmonate and methyl salicylate. Plant Science 161: 1153-1159.
- Fung, R. W. M., Wang, C. Y., Smith, D. L., Gross, K. C., and Tian, M. 2006.** MeSA and MeJA increase steady-state transcript level of alternative oxidase and resistance against chilling injury in sweet peppers (*Capsicum annuum* L.). Plant Science 166: 711-719.
- Hedden, P., and Phillips, A. 2000.** Gibberellin metabolism: new insights revealed by the genes. Trends in Plant Sciences 5: 523-530.
- Huang, R. H., Lixu, J. K. and Lu, Y. M. 2010.** Effect of CaCl₂ in preharvest on the antioxidant system in the pulp of Cara cara navel orange (*Citrus sinensis* L. Osbeck) at different storage temperatures. Postharvest Biology and Technology 54: 235-243.
- Jones, R. L., and Carbonell, J. 1984.** Regulation of the synthesis of barley aleurone α-amylase by giberellic acid and calcium ions. Plant Physiology 76: 213-218.
- Ju, Z. G., Duan, Y. S., and Ju, Z. Q. 1999.** Combinations of GA₃ and AVG delay fruit maturation, increase fruit size and improve storage life of Feicheng peaches. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 74: 579-583.
- Lange, T. 1998.** Molecular biology of gibberellin synthesis. Plantarum 204: 409-419.
- Lima, L. C. O. 1990.** Quality and cell wall components of Anna and Granny smith apples treated with heat, calcium and ethylene. HortScince 115: 954-958.

- Miliauskas, G., Venskutonis, P. R., and van Beek, T. A. 2004.** Screening of radical scavenging activity of some medicinal and aromatic plant extracts. *Food Chemistry* 85: 231-237.
- Nyanjage, M. O., Nyalala, S. P. O., Illa, A. O., Mugo, B. W., Limbe, A. E., and Valimu, E. M. 2005.** Extending post-harvest life of sweet pepper (*Capsicum annuum* L. California Wonder) with modified atmosphere packaging and storage temperature. *Agricultura Tropica et Subtropica* 38: 28-34.
- Peyvast, G. 2009.** Vegetable Production, Daneshpazir Press, Tehran, Iran. 577 pp. (in Persian).
- Rahemi, M. 2011.** Postharvest Physiology. Shiraz University Press, Shiraz, Iran. 437 pp. (in Persian).
- Ramana, T. V. R., Neeta, B. G., and Khlana, K. S. 2011.** Effect of postharvest treatments and storage temperatures on the quality and shelf life of sweet pepper (*Capsicum annuum* L.). *Scientia Horticulturae* 132: 18-26.
- Ranganna, S. 1997.** Manual of Analysis of Fruit and Vegetable Products. McGraw-Hill, New Delhi, India.
- Shabani, T., Peyvast, H., and Olfati, J. 2011.** Effect of substrates on quantitative and qualitative characteristics of three varieties of sweet pepper in soilless culture. *Journal of Greenhouse Culture Science and Technology* 25: 369-375.
- Sakaldas, M., and Kaynas, K. 2010.** Biochemical and quality parameters changes of green sweet bell peppers as affected by different postharvest treatments. *African Journal of Biotechnology* 9: 8174-8181.
- Vicente, A. R., Pineda, C., Lemoine, L., Civello, P. M., Martinez, G. A., and Chaves, A. R. 2005.** UV-C treatments reduce decay, retain quality and alleviate chilling injury in pepper. *Postharvest Biology and Technology* 35: 69-78.
- Xing, Y., Li, X., Xu, Q., Yun, J., Lu, Y., and Tang, Y. 2011.** Effects of chitosan coating enriched with cinnamon oil on qualitative properties of sweet pepper (*Capsicum annuum* L.). *Food Chemistry* 124:1443-1450.