

ارزیابی صفات رویشی و خواص کمی و کیفی چندرقم تجاری سیب در منطقه شاهکوه، استان گلستان

Evaluation of Vegetative Traits and Quantitative and Qualitative Characteristics of some Commercial Cultivars of Apple in Shahkoh, Golestan Province

مینا غزائیان^۱، غلامحسین داوری نژاد^۲، بهروز فناحی^۳ و صدیقه زمانی^۴

- ۱- محقق باغبانی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
- ۲- استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
- ۳- کارشناس باغبانی، سازمان جهاد کشاورزی گلستان، گرگان
- ۴- کارشناس باغبانی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۵/۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

چکیده

غزائیان، م.، داوری نژاد، غ.، فناحی، ب. و زمانی، ص. ۱۳۹۶. ارزیابی صفات رویشی و خواص کمی و کیفی چندرقم تجاری سیب در منطقه شاهکوه، استان گلستان. مجله بهزیارتی نهال و بذر ۱۳۹۶-۲: ۱۲-۱۰. 10.22092/sppj.2017.113717.۱

به منظور بررسی صفات کمی و کیفی و انتخاب ارقام مناسب سیب در استان گلستان، در این تحقیق صفات رویشی و خواص کمی و کیفی پنج رقم تجاری سیب به نام‌های گلدن دلیشس، رد دلیشس، برابرن، فوجی و رد اسپار در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و سه مشاهده برای هر رقم در منطقه شاهکوه استان گلستان در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند. بیشترین کارایی عملکرد متعلق به رقم رد اسپار با میزان ۰/۴۹ کیلوگرم میوه به ازای هر سانتی‌مترمربع سطح مقطع تنه بود و بعد از آن به ترتیب ارقام برابرن، فوجی، گلدن دلیشس و رد دلیشس قرار داشتند. بیشترین سفتی در رقم فوجی (۵/۷۴ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع) و کمترین در رقم برابرن (۴/۸۲ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع) اندازه‌گیری شد. از نظر مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون، رقم گلدن دلیشس به ترتیب با میزان ۱۳/۳۷ و ۱۴/۴۵ بالاترین مقادیر را داشت. نتایج بررسی همبستگی ساده صفات، وجود همبستگی‌های مثبت و منفی بین برخی صفات مانند ضخامت پوست و ابعاد میوه با نوع رقم را نشان داد. بر اساس نتایج به دست آمده، توصیه می‌شود با توجه به کوتاه بودن فصل رشد در منطقه کوهستانی شاهکوه، ارقام زودرس تا میانرس و پایه‌های رویشی نیمه قوی تا پرشد برای کاشت در این منطقه مورد استفاده قرار گیرند.

واژه‌های کلیدی: سیب، ارقام، پایه رویشی، صفات میوه، سازگاری.

دو فاکتور سفتی و عطر و طعم میوه نسبت به سایرین در اولویت هستند (Nour *et al.*, 2010). رضائی و حسنه (Rezaee and Hassani, 2011) حوزه‌های مختلف سیب کاری در منطقه ارومیه بر مبنای خصوصیات کیفی میوه پرداخته و بر اساس صفات کیفی، حوزه‌های سیب کاری رابه دو گروه تقسیم و بهترین مکان‌ها را برای تولید ارقام سیب در این حوزه‌ها معرفی کردند. در تحقیق دیگری مطالعه و ارزیابی صفات رویشی و خصوصیات رشدی سیب ارقام سیب تجاری بومی و وارداتی در شرایط آب و هوایی کرج انجام شد. از نظر قدرت رشدی در این تحقیق ارقام امپایرال رد و گلدن جان در گروه ارقام ضعیف رشد، گلاب اصفهان در گروه ارقام متوسط رشد و مشهد و کولی محلات در گروه پرشد ارزیابی شدند. ارقام از نظر صفات نوع رشد و عادت رشد نیز تفاوت‌های زیادی نشان دادند برای مثال رقم کمپوتی دارای نوع رشد ستونی و بقیه ارقام رشد منشعب داشتند (Tarrahi and Hajnajjar, 2010). ریبعی و همکاران (Rabiei *et al.*, 2010) در پژوهشی به بررسی صفات کمی و کیفی ده رقم تجاری سیب در زنجان پرداختند. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که ده رقم مورد نظر در صفات موردن بررسی با هم اختلاف معنی‌داری داشته و ارقام Golden USA Red Starking Red Delicious و Golden Smoothy

مقدمه سیب (*Malus domestica* Borkh) متعلق به خانواده Rosaceae یکی از مهم‌ترین میوه‌های زیر کشت در مناطق معتدل جهان است. تنوع ارقام و سازگاری آب و هوایی سیب سبب شده تا این درخت وسیع‌ترین سطح کشت شده در مناطق معتدل را داشته باشد. عوامل زیادی رشد رویشی و زایشی درختان میوه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این عوامل در دو گروه درونی و بیرونی تقسیم‌بندی می‌شوند. عوامل درونی مربوط به ژنتیک گیاه است که در ارقام مختلف متفاوت هستند و عوامل بیرونی شامل شرایط آب و هوایی، تغذیه، هرس، تنظیم‌کننده‌های رشد و مدیریت درختان است (Dehghani *et al.*, 2013). در تحقیقی در رومانی صفات کیفی پانزده رقم سیب مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از بررسی ترکیبات میوه در ارقام مختلف نشان داد که بین ارقام از نظر ترکیبات بیوشیمیایی و عناصر معدنی تفاوت وجود دارد (Nour *et al.*, 2010). به نظر می‌رسد فاکتورهایی مانند رنگ، طعم و بافت میوه نقش مهمی در انتخاب از سوی مصرف‌کنندگان دارند و در نقاط مختلف جهان به نژادگران ارقام مختلف را بر اساس ویژگی‌ها و سازگاری‌های رشدی و مقبولیت کیفی از سوی مصرف‌کنندگان مورد ارزیابی قرار می‌دهند (Abbas *et al.*, 2012). در بین این خصوصیات

عمر باغات سیب در این منطقه حدود هشت سال است. اولین باغها در ارتفاع تقریبی ۲۲۰۰ متری و سپس باغهای بیشتری در ارتفاع تقریبی ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ متری احداث شدند.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در قالب طرح کاملاً تصادفی روی درختان سیب هشت ساله پیوند شده روی پایه MM106 با فرم تربیت محور مرکزی واقع در ارتفاعات شاهکوه (۲۴۷۰ متر) در استان گلستان با موقعیت جغرافیایی ۳۶ درجه و ۳۵ دقیقه و ۴۴ ثانیه تا ۳۶ درجه و ۴۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه عرض شمالی و ۵۴ درجه و ۲۸ دقیقه و ۳۹ ثانیه تا ۵۴ درجه و ۳۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه طول شرقی در ۹۰ کیلومتری جنوب گرگان و ۲۵ کیلومتری شمال غرب شاهرود انجام شد. اقلیم منطقه بر اساس طبقه‌بندی اقلیمی آمبرژه، اقلیم سرد کوهستانی و مطابق سیستم دومارتون دارای اقلیم نیمه خشک است. متوسط بارندگی سالانه منطقه ۳۹۹ میلی‌متر است که بیشترین آن در فصل زمستان و به شکل برف، باریده می‌شود. باغ محل آزمایش به مساحت سه هکتار در سال ۱۳۸۳ احداث و مجهز به سیستم آبیاری قطره‌ای است. بافت خاک از نوع متوسط تا سبک و pH آن ۶/۸ است. فاصله کاشت درختان 4×5 است. طرح آزمایشی مورد استفاده به صورت کاملاً تصادفی با سه تکرار و سه مشاهده (سه درخت) در هر تکرار بود. ارقام مورد ارزیابی

با داشتن خصوصیات کمی و کیفی مطلوب برای شرایط اقلیمی زنجان مناسب شناسائی شدند. وجود ارقام متعدد سیب در ایران این امکان را به بهزادگران و تولید کنندگان می‌دهد که در مناطق مختلف سیب کاری دست به انتخاب بهترین ارقام برای هر منطقه زده و با انتخاب صحیح بهترین ارقام، به توسعه کشت آن‌ها بپردازند تا از پتانسیل ارقام مختلف در هر اقلیم استفاده شده و بیشترین راندمان را از شرایط موجود به دست آورند (Attar *et al.*, 2013; Damyar *et al.*, 2007). در تحقیق دامیار و همکاران (Damyar *et al.*, 2007) ارزیابی سی ژنوتیپ بومی سیب در ایران صورت انجام و نشان داده شد برخی از این ژنوتیپ‌ها مانند شکی، بیگی و حبیبی دارای قابلیت‌های مناسبی برای توسعه به عنوان رقم هستند که باستی پس از تکثیر در قالب برنامه‌های بعدی مورد ارزیابی‌های تکمیلی قرار گیرند. با توجه به وجود مناطق مستعد توسعه سیب در استان گلستان و احداث برخی باغات سیب در سال‌های گذشته در این مناطق، در این پژوهش خصوصیات کمی و کیفی تعدادی از ارقام تجاری کاشته شده در استان بررسی شد. نتایج حاصل از این بررسی می‌تواند برای معرفی و کاشت ارقام در استان مورد استفاده قرار گیرد. ارتفاعات شاهکوه در استان گلستان از جنوب به شهر گرگان و از جنوب شرقی با شاهرود هم‌جوار است. این منطقه دارای تابستان‌های معتدل و زمستان‌های سرد است.

شده در درخت است و بنای تعریف از تقسیم مقدار میوه تولید شده (کیلو گرم) بر سطح مقطع تن (سانتی متر مربع) به دست می آید. میانگین تیمارها و انحراف معیار و ضریب تغییرات محاسبه و با استفاده از برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آماره های توصیفی مانند بیشینه، کمینه، میانگین و انحراف معیار در جدول ۱ آمده است. از نظر خصوصیات رویشی، نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع درخت در رقم رد دلیشس و کمترین در رقم رد اسپار به ترتیب ۲۵۱ و ۱۵۹ سانتی متر بود. با وجود آن که تمام ارقام مورد مطالعه روی پایه متوسط رشد مالینگ مرتون ۱۰۶ پیوند شده بودند، اما رقم اسپور دارای ارتفاع کمتر و رشد محدود تری نسبت به سایر ارقام بود که این امر می تواند ناشی از خصوصیت ذاتی این رقم و رشد کم آن باشد. بیشترین سطح مقطع و محیط تن در رقم فوجی به ترتیب با ۳۵/۱۸ سانتی متر مربع و ۲۱/۰۲ سانتی متر و کمترین در رقم رد اسپار (۲۷/۲۵ سانتی متر مربع و ۱۸/۵۰ سانتی متر) بود. بیشترین کارایی عملکرد متعلق به رقم رد اسپار با میزان ۰/۴۹ کیلو گرم میوه به ازای هر سانتی متر مربع سطح مقطع عرضی تن بود و بعد از آن به ترتیب ارقام برابرن، فوجی، گلدن دلیشس و رد دلیشس قرار داشتند. این نتایج با نتایج حسنی و همکاران

شامل گلدن دلیشس، رد دلیشس، برابرن، رد اسپار و فوجی پیوند شده روی پایه رویشی MM106 بودند. ارزیابی صفات از نظر خصوصیات مورفولوژیک، فنولوژیک، پومولوژیک و چشایی بر اساس دسکریپتور UPOV سیب انجام شد. تعداد نمونه میوه برای اندازه گیری ها ۳۰ عدد بود. خصوصیات بررسی شده عبارت بودند از صفات رویشی (ارتفاع درخت، سطح مقطع عرضی تن، قطر تن)، کارایی عملکرد، طول شاخه یک ساله)، خصوصیات میوه (شکل، رنگ، اندازه، وزن، سفتی بافت، اسید قابل تیتراسیون، pH و مواد جامد محلول میوه) و خصوصیات چشائی (عطر و طعم و بافت میوه). اندازه گیری سفتی بافت با استفاده از دستگاه پترومتر دستی مدل RIGN، مواد جامد محلول به وسیله دستگاه رفرکتومتر دیجیتال مدل میلواکی ساخت ایتالیا و به صورت درصد بریکس اندازه گیری شد. اندازه گیری اسیدیته با pH متر و میزان اسیدیته قابل تیتراسیون میوه با کمک اسیدسنج دیجیتال مدل GMK ساخت کره جنوبی تعیین شد. به منظور اندازه گیری حجم میوه از روش جایگزینی آب (Water displacement technique) استفاده شد. خصوصیات چشائی مطابق فرم تهیه شده برای صفات طعم (ترش، ملس، شیرین و نسبتاً شیرین)، بافت (ترد آبدار، آبدار، کم آب، آردی) آزمون توسط هفت نفر کارشناس آموزش دیده ارزیابی شدند. کارآئی عملکرد نشان دهنده نسبت میوه تولید شده به چوب تولید

ارزیابی صفات رویشی و خواص کمی و کیفی چندرقم تجاری سیب ...

در ارومیه که در آن (Hasani *et al.*, 2014)

بیشترین راندمان عملکرد مربوط به رقم رد اسپار

جدول ۱- آماره‌های توصیفی صفات رویشی ارقام سیب در منطقه شاهکوه، گلستان در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

Table 1. Descriptive data of vegetative traits of apple cultivars in Shahkoh, Golestan in 2013 and 2014

Cultivar	رقم	سال Year	محیط تن Trunk circumstance (cm)	سطح مقطع تن Trunk cross area (cm ²)	ارتفاع درخت Tree height (cm)	کارایی عملکرد Yield efficency (kg cm ⁻²)	طول شاخه یک ساله branch length (cm)	
Braeburn	برابرن	۱۳۹۲	18.83	28.23	198	0.35	45	
		۱۳۹۳	20.30	32.81	210	0.46	51	
Golden Delicious	گلدن دلیشس	۱۳۹۲	19.13	29.14	190	0.27	54	
		۱۳۹۳	20.52	33.52	205	0.33	62	
Fuji	فوچی	۱۳۹۲	20.46	33.33	208	0.39	54	
		۱۳۹۳	21.02	35.18	224	0.43	60	
Red Delicious	رد دلیشس	۱۳۹۲	19.63	30.68	236	0.23	59	
		۱۳۹۳	19.98	31.78	251	0.25	64	
Red spur	رد اسپور	۱۳۹۲	18.50	27.25	159	0.37	46	
		۱۳۹۳	18.89	28.41	163	0.49	49	
Descriptive data	آماره‌های توصیفی	Max.	بیشینه	20.74	33.33	251	0.49	
		Min.	کمینه	18.50	27.25	159	0.23	
		Mean	میانگین	19.62	30.29	205	0.36	
		SD	انحراف میانگین	1.58	4.30	65.05	0.18	
		CV%	ضریب تغیرات	8.07	14.19	31.73	51.07	
6								
.....								

و کمترین (۶۰/۲۶ میلی‌متر) قطر میوه به ترتیب در ارقام برابرن و رد اسپار اندازه‌گیری شد. این در حالی است که در تحقیق عطار و همکاران (۲۰۱۳) بیشترین قطر میوه در رقم رد اسپور (۸۰/۰۳ میلی‌متر) و کمترین قطر در رقم علیموری (۴۱/۴۹ میلی‌متر) اندازه‌گیری شد. از نظر نسبت طول به قطر هم بیشترین مقدار در رقم گلدن دلیشس (۰/۹۴) و کمترین در رقم رد اسپور (۰/۸۴) اندازه‌گیری شد. از نظر سفتی بافت که فاکتور مهمی در انبارداری محصول است، بیشترین (۵/۷۴ گرم بر سانتی‌مترمربع) و کمترین (۴/۸۵ گرم بر سانتی‌مترمربع) سفتی میوه به ترتیب در ارقام فوجی و برابرن به دست آمد. در آزمایش حسنی و همکاران (۲۰۱۴) هم که به مقایسه بین ارقام تجاری و اسپور تایپ پرداختند، بیشترین سفتی بافت در بین ارقام مورد بررسی متعلق به رقم فوجی و کمترین متعلق به رقم جونا گلد بود. از نظر بافت میوه تمام ارقام آبدار بوده ولی در ارقام فوجی و رد دلیشس این صفت کمتر بود. عطار و همکاران (۲۰۱۳) نیز گزارش کردند که رقم‌های فوجی و برابرن دارای میوه آبدار هستند. بیشترین ضخامت پوست میوه در رقم رد اسپار با میانگین (۰/۱۶ میلی‌متر) و کمترین ضخامت در رقم گلدن دلیشس با میانگین (۰/۱۱ میلی‌متر) بود. در درختان میوه، رشد رویشی و زایشی به ترتیب بر مبنای رشد شاخه‌های یک ساله و رشد میوه بیان می‌شود. در این آزمایش بیشترین حجم میوه در رقم برابرن با میزان ۲۴۰ سانتی‌مترمکعب و

با میزان ۰/۶۹ کیلوگرم میوه به ازای هر سانتی‌مترمربع سطح مقطع تنہ بود، مطابقت داشت. خصوصیات شکل و رنگ میوه و زمان گلدهی و رسیدن میوه ارقام در (جدول ۲) آورده شده است. درخشندگی و شفافیت پوست میوه که در بازارپسندی فاکتور موثری است وابسته به پوشش موسمی و واکس روی پوست میوه است که جز رقم گلدن دلیشس در سایر ارقام وجود داشت. از طرفی رنگ میوه (جدول ۲) فاکتور مهم دیگری در فروش و بازارپسندی محصول است که وابسته به میزان آنتوسیانین تولیدی در میوه دارد (Quinlan and Tobutt, 1990). از نظر زمان رسیدن میوه، رقم فوجی دیررس‌ترین بودند و ارقام برابرن و رد اسپور نسبت به بقیه ارقام زودرس‌تر نشان بودند. زمان گلدهی از اواخر فروردین در این منطقه آغاز و تا نیمه دوم اردیبهشت بین ارقام مختلف ادامه داشت. به طور متوسط طول دوره گلدهی در ارقام از ۸ تا ۱۲ روز متفاوت بود. درختان از نظر تامین گرده کافی با توجه به نوع ارقام و نیز پراکندگی زمان گلدهی مشکلی نداشتند. مقایسه بین ارقام از نظر اندازه طول و قطر میوه، حجم میوه، سفتی و خصوصیات بیوشیمیایی مانند اسیدیته، مواد جامد محلول و میزان pH در جدول ۳ آورده شده است. در بین ارقام مورد بررسی، بیشترین وزن میوه (۱۷۳/۸۲ گرم) مربوط به رقم برابرن و کمترین وزن (۱۱۰/۷۴ گرم) متعلق به رقم رد اسپار بود. همچنین بیشترین (۷۰/۶۹ میلی‌متر)

جدول ۲- صفات مختلف میوه، زمان گلدهی و زمان رسیدن میوه ارقام سیب در منطقه شاهکوه، گلستان
 Table 2. Fruit traits, flowering time and fruit ripening time of apple cultivars in Shahkoh, Golestan

Cultivar	رقم	رنگ زمینه میوه	رنگ رویی میوه	رنگ گوشت	رنگ افسره	شكل	بافت میوه	مزه میوه	وجود واکس	زمان گلدهی	رسیدن میوه
		Fruit ground color	Fruit over color	Fruit flesh color	Fruit juice color	Fruit shape	Fruit texture	Fruit taste	Wax	Flowering time	Fruit ripening time
Braeburn	برابرن	سبز روشن	لکه قرمز	سفید	نارنجی تیره	کروی پخت	آبدار	ملس	دارد	هفته اول تا نیمه اردیبهشت	نیمه اول مهرماه
		Light green	Red spot	White	Dark orange	Flat globular	Juicy	Inclined sour	Yes	End of April	Early October
Golden Delicious	گلدن دلیشنس	زرد	لکه قرمز گلی	سفید	نارنجی روشن	- هرمی کوتاه - پایین پخت	آبدار	نسبتاً شیرین	ندارد	هفته اول تا نیمه اردیبهشت	نیمه مهرماه
		Yellow	Light red spot	White	Light orange	Conic/ flat	Juicy	Relatively sweet	No	End of April	Early October
Fuji	فوچی	سبز روشن	قرمز نواری	کرم	نارنجی تیره	کروی	نسبتاً آبدار	نسبتاً شیرین	دارد	هفته آخر فروردین تا هفته اول اردیبهشت	نیمه اول آبان
		Light green	Strip red	Light brown	Dark orange	Globular	Relatively juicy	Relatively sweet	Yes	Mid April	Early of October
Red Delicious	رد دلیشنس	قرمز	سفید	- نارنجی تیره - کبد	هرمی در پایین پخت	نسبتاً آبدار	نسبتاً شیرین	دارد	هفته آخر فروردین تا هفته اول اردیبهشت	نیمه دوم مهرماه	
		Red	White	Dark orange	Conic/flat	Relatively juicy	Relatively sweet	Yes	Mid April	Early October	
Red spur	رد اسپور	سبز روشن	زرد قرمز	کرم	نارنجی روشن	هرمی کوتاه	آبدار	شیرین	دارد	هفته دوم تا هفته سوم اردیبهشت	نیمه اول مهرماه
		Light green	Red-yellow	Light brown	Light orange	Conic	Juicy	Sweet	Yes	Early May	End of September

جدول ۳- میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات صفات مختلف میوه ارقام سیب در منطقه شاهکوه، گرگان در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

Table 3. Mean, standard deviation (sd) and coefficient of variance of different fruit traits of apple cultivars in Shahkoh, Golestan in 2013 and 2014

رقم	آمارهای توصیفی	وزن میوه	طول میوه	قطر میوه	سفتی میوه	حجم میوه	طول به قطر میوه	اسیدیته قابل تیتراسیون	مواد جامد محول	اسیدیته	ضیحامت پوست میوه
Cultivar	Descriptive data	Fruit weight (g)	Fruit length (cm)	Fruit width (cm)	Fruit firmness (kg cm ⁻²)	Fruit volume (cm ³)	Fruit L/W	TA	TSS	PH	Skin thickness (mm)
Braeburn	2013	۱۳۹۲	191.92	6.28	8.14	4.70	232.0	0.78	0.75	10.60	3.15
	2014	۱۳۹۳	155.71	6.03	7.24	5.00	248.0	0.83	0.78	12.30	3.19
	Mean	میانگین	173.82	6.16	7.69	4.85	240.0	0.81	0.77	11.45	3.17
	Sd	انحراف معیار	25.60	0.18	0.64	0.21	11.3	0.04	0.02	1.20	0.03
	CV%	ضریب تغییرات	14.73	2.87	8.28	4.37	4.7	4.39	2.77	10.50	0.89
Golden	2013	۱۳۹۲	152.49	6.51	7.05	5.30	199.4	0.92	1.43	12.33	3.63
	2014	۱۳۹۳	133.11	6.22	6.58	5.18	218.0	0.95	1.45	14.40	3.67
	Mean	میانگین	142.80	6.37	6.82	5.24	208.7	0.94	1.44	13.37	3.65
	Sd	انحراف معیار	13.70	0.21	0.33	0.08	13.1	0.02	0.01	1.46	0.03
	CV%	ضریب تغییرات	9.60	3.22	4.88	1.62	6.3	2.01	0.98	10.95	0.77
Fuji	2013	۱۳۹۲	136.15	5.85	6.68	5.78	198.2	0.88	1.00	10.26	3.71
	2014	۱۳۹۳	147.65	5.99	6.88	5.70	187.0	0.87	1.04	12.60	3.78
	Mean	میانگین	141.90	5.92	6.78	5.74	192.6	0.87	1.02	11.43	3.75
	Sd	انحراف معیار	8.13	0.10	0.14	0.05	7.9	0.00	0.03	1.65	0.05
	CV%	ضریب تغییرات	5.73	1.67	2.09	0.99	4.1	0.47	2.77	14.48	1.32

ادامه جدول ۳

Table 3. Continued

رقم	آمارهای توصیفی		وزن میوه	طول میوه	قطر میوه	سفتی میوه	حجم میوه	طول به قطر میوه	اسیدیته قبل تیراسیون	مواد جامد محلول	اسیدیته	ضخامت پوست میوه
Cultivar	Descriptive data		Fruit weight (g)	Fruit length (cm)	Fruit width (cm)	Fruit firmness (kgcm ⁻²)	Fruit volume (cm ³)	Fruit L/W	TA	TSS	PH	Skin thickness (mm)
رد دلیشس	2013	۱۳۹۲	139.02	5.96	6.66	5.70	185.50	0.90	0.90	10.93	3.49	0.13
	2014	۱۳۹۳	189.26	6.76	7.42	5.54	198.00	0.91	0.94	12.70	3.54	0.15
	Red Mean	میانگین	164.14	6.36	7.04	5.62	191.75	0.91	0.92	11.82	3.52	0.14
	Sd	انحراف معیار	35.53	0.57	0.54	0.11	8.84	0.01	0.03	1.25	0.04	0.01
رد اسپور	Delicious	CV%	ضریب تغییرات	21.64	8.89	7.63	2.01	4.61	0.78	3.07	10.59	1.01
	2013	۱۳۹۲	113.75	5.62	6.31	6.08	134.90	0.90	1.00	11.66	3.46	0.15
	2014	۱۳۹۳	107.72	5.18	6.20	5.20	142.00	0.84	1.40	13.40	3.49	0.17
	Mean	میانگین	110.74	5.40	6.26	5.64	138.45	0.87	1.20	12.53	3.48	0.16
	Sd	انحراف معیار	4.26	0.31	0.08	0.62	5.02	0.04	0.28	1.23	0.02	0.01
	CV%	ضریب تغییرات	3.85	5.76	1.24	11.03	3.63	4.88	23.57	9.82	0.61	8.84

دارند می‌توان برای تعیین نوع کاربرد محصول استفاده کرد. به عنوان مثال ارقام با سفتی بیشتر برای ارسال به مناطق دورتر و ارقام با میزان مواد جامد محلول بیشتر برای صنایع تبدیلی انتخاب می‌شوند. تعیین همبستگی بین صفات کمی در ارقام سیب نشان داد که بین وزن میوه با طول، قطر و حجم میوه در سطح احتمال یک درصد همبستگی معنی‌دار وجود داشت به طوری که با افزایش طول و قطر میوه، وزن و حجم آن نیز افزایش می‌یابد. از این رابطه می‌توان برای تعیین الگوی رشد میوه طی فصل رشد و برازش یک مدل ریاضی بر مبنای قطر و حجم میوه استفاده کرد. همچنین میزان ابعاد میوه همبستگی با نوع رقم نشان داد (جدول ۴).

کمترین در رقم رد اسپار با میزان ۱۳۸/۴۵ سانتی متر مکعب اندازه گیری شد. میزان مواد جامد محلول یک میوه معیار مناسبی برای تعیین میزان شیرینی آن و تعیین اسیدیته میوه شاخصی برای طعم آن است (Nour *et al.*, 2010). در این آزمایش از نظر میزان مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون بالاترین در رقم گلدن دلیشنس به ترتیب با میزان ۱۳/۳۷ و ۱/۴۵ او کمترین به ترتیب در رقم فوجی ۱۱/۴۳ و ۱/۰۲ بود. نتایج این تحقیق نشان داد میزان pH و TSS تحت تاثیر رقم قرار دارد که با یافته‌های علیزاده (Alizadeh, 2014) تطابق دارد. از خصوصیاتی مانند میزان مواد جامد محلول، اسیدیته و سفتی میوه که نقش مهمی در تعیین زمان رسیدن میوه

جدول ۴- ضرایب همبستگی بین صفات مختلف ارقام سیب در منطقه شاهکوه، گلستان
Table 4. Correlation coefficients between different traits of apple cultivar in Shahkoh, Golestan

صفات	رقم	وزن میوه	طول میوه	قطر میوه	قطر تنہ	ارتفاع درخت	حجم میوه	طول به قطر میوه
Traits	Cultivar	Fruit weight	Fruit length	Fruit diameter	Trunk diameter	Tree height	Fruit volume	Fruit L/W
Fruit weight	-0.75							
Fruit length	-0.65 ^{***}	0.81 ^{**}						
Fruit diameter	-0.77 ^{***}	0.98	0.75 ^{***}					
Trunk diameter	0.04	-0.006	0.06	-0.10				
Tree height	-0.08	0.12	0.04	0.046	0.40			
Fruit volume	-0.72 ^{***}	0.93 ^{**}	0.85 ^{**}	0.89 ^{**}	-0.005	0.20		
Fruit L/W	0.50 [*]	-0.62 ^{**}	-0.09	-0.68 ^{**}	0.24	-0.04	-0.47 [*]	
TSS	0.22	-0.06	0.22	-0.04	-0.41	-0.61 ^{**}	-0.07	0.37

روی سایر ارقام تجاری و ژنتیک‌های بومی برتر سیب نیز انجام شود. در این پژوهش رقم رد اسپار با توجه به خصوصیات خوب میوه و کارایی عملکرد بالاتر و نیز رشد رویشی محدودتر نسبت به سایر ارقام می‌تواند از جمله

به طور کلی نتایج این تحقیق نشان دادند که منطقه شاهکوه در ارتفاعات جنوبی استان گلستان دارای پتانسیل‌های لازم برای توسعه ارقام سیب است، لذا پیشنهاد می‌شود در آینده در قالب باغ‌های سازگاری، مطالعات جامعی

رشد و نیازهای حرارتی در اولویت قرار گیرند و ارقام با نیاز رشدی طولانی قابل توصیه نخواهند بود. همچنین بایستی به اهمیت و کارایی نقش پایه‌های رویشی نیز توجه شود و استفاده از پایه‌های مقاوم به سرما نیز در برنامه‌های مطالعاتی در این منطقه قرار گیرد.

ارقام مناسب برای توسعه در این منطقه باشد. همچنین ارقام گلدن دلیشس، برابرن و رد دلیشس نیز کیفیت و بازارپسندی مناسبی داشته و از رنگ پذیری مناسب هم برخوردارند. در انتخاب ارقام برای این منطقه با توجه به وجود فصل رشد کوتاه، می‌بایست طول دوره

References

- Abbas, M., Ahmad Mohar, T., and Shabbir, Kh. 2012.** Performance of different apple varieties under climatic condition of Murree hills. Journal of Agricultural Research 50(3): 393-401.
- Alizadeh, A. 2014.** Evaluation of local varieties of apple regarding fruit quantitative and qualitative characteristics. Academic Journal of Applied Science 1 (1): 22-27.
- Attar, S., Davarinejad, Gh., and Nemati, H. 2013.** Identification of some native and foreign apple varieties cultivated in Khorasan Razavi province based on qualitative, quantitative traits and keywords . Journal of Horticultural Science 27(1): 82-94.
- Damyar, S., Hassani, D., Dastjerdi, R., Hajnajari, H., Zeinanloo, A. A., and Fallahi, E. 2007.** Evaluation of Iranian native apple cultivars and genotypes. Journal of Food, Agriculture & Environment 5 (3&4): 211-215.
- Damyar, S., Hassani, D., and Parvaneh, T. 2013.** Evaluation of some characteristics of native red-fleshed apple genotypes of Iran. Seed and Plant Improvement Journal, 29-1 (3): 483-501.
- Dehghani B., Arzani, K., and Sarikhani Khorami, S. 2013.** Pomological evaluation and seasonal variation in fruit growth and development of some Asian pear cultivars under Tehran environmental conditions. Seed and Plant Production Journal 28-2 (4): 419-433 (in Persian).
- Hasani, Gh., Rezaee, R., Peirasteh, Y., and Henareh, M., 2014.** Evaluation of some spur-type and standard apple cultivars in the northwestern region of Iran. International Journal of AgriScience 4(6): 301-306.

- Nour, V., Trandafir, I., and Ionica, M. 2010.** Compositional characteristics of fruits of several apple (*Malus domestica* Borkh.) cultivars. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca* 38 (3): 228-233.
- Quinlan, J. D., and Tobutt, K. R. 1990.** Manipulating fruit tree structure chemically and genetically for improved performance. *HortScience* 25 (1): 60-64.
- Rabiei, V., Rabi-Angorani, H., and Zangani, E. 2010.** Study of some quantitative and qualitative traits of apple cultivars in Zanjan . Proceedings of the 6th Iranian Horticultural Science Congress, University of Guilan, Rasht, Iran (in Persian).
- Rezaee, R., and Hasani, Gh. 2011.** Study of apple area culture in Oromia by fruit qualitative characters. Proceedings of the 7th Congress of Iranian Horticultural Science, Isfahan, Iran. page 309 (in Persian).
- Tarrahi, S., and Hajnajari, H. 2010.** Study on growth characteristics of 30 native and introduced apple cultivars in Karaj climate conditions . Proceedings of the 6th Iranian Horticultural Science Congress, University of Guilan, Rasht, Iran. pp. 1516-1518 (in Persian).