

تعیین غلظت کشندۀ علفکش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهیان قره‌برون (Acipenser persicus) و ازونبرون (Acipenser stellatus)

ذبیح‌اله پژنده^(۱)؛ عباس اسماعیلی‌ساری^(۲) و محمد پیری^(۳)

zpajand@yahoo.com

- ۱- بخش اکولوژی، انسستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری، رشت، صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۴۶۴۶
 - ۲- دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور، صندوق پستی: ۴۶۴۱۴
 - ۳- تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سمنان صندوق پستی: ۳۱۹-۳۵۱۴۵
- تاریخ ورود: اردیبهشت ۱۳۸۲

چکیده

اثرات سمیت بوتاکلر با غلظتهاي ppm ۰/۴ تا ۱/۳ و ۰/۱ تا ۱ بترتیب بر روی بچه ماهیان قره‌برون (Acipenser persicus) و ازونبرون (Acipenser stellatus) در سال ۱۳۷۸ مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشها در ۶ تیمار و ۳ تکرار به همراه شاهد و براساس روش OECD و بصورت ساکن انجام پذیرفت. در طول آزمایشها، عواملی شامل: pH، سختی، دما و اکسیژن محلول در آب مورد سنجش قرار گرفتند که بترتیب ۶/۷ تا ۰/۲، ۰/۲ تا ۰/۱ میلی گرم در لیتر، ۲۰±۱ درجه سانتیگراد و اکسیژن محلول بالای ۶ میلی گرم در لیتر اندازه‌گیری شدند. نتایج آزمایشها نشان داد که میزان ۹۶ LC₅₀ ساعت سم علفکش بوتاکلر بر روی بچه ماهیان ۱ تا ۳ گرمی قره‌برون و ازونبرون بترتیب ۰/۴۴ و ۰/۰۷ میلی گرم در لیتر می‌باشد. میزان LC₅₀، LC₁₀ و LC_{9۰} با استفاده از روش آماری Probit Analysis محاسبه گردید. براین اساس حداکثر غلظت مجاز (Mac value) سم بوتاکلر بر روی بچه ماهیان خاویاری قره‌برون و ازونبرون بترتیب ۰/۰۴۴ و ۰/۰۰۷ میلی گرم در لیتر تعیین و براساس جدول استاندارد سطوح سمیت علفکش‌های مختلف، در ردیف خیلی سی درجه‌بندی گردید.

لغات کلیدی: بوتاکلر، قره‌برون، Acipenser persicus، ازونبرون، Acipenser stellatus، علفکش

مقدمه

روند تخریب ذخایر موجود تاسماهیان دریای خزر به دلایل مختلف از جمله تخریب رودخانه‌های محل زیست و تکثیر طبیعی این ماهیان، ورود بیش از اندازه آلاینده‌ها به دریا و صید بدون نظارت همچنان ادامه دارد (پورکاظمی، ۱۳۷۶ و رضوانی گیل‌کلائی، ۱۳۷۷).

زارعین به منظور کنترل علفهای هرز و آفات و بیماریهای گیاهی مقادیر قابل توجهی سوم شیمیایی را مورد استفاده قرار می‌دهند. ضمن اینکه مقادیر قابل توجهی از این مواد سمی به همراه پسابهای زراعی وارد کانالهای آبیاری و رودخانه‌ها و استخراه‌ای پرورش ماهی می‌گردند و مرگ و میر ماهیان را در این اکوسیستم‌ها از جمله استخراه‌ای پرورش ماهی سبب می‌گردد.

ترکیبات ارگانوکلره از قبیل بوتاکلر از مهمترین آلاینده‌های زیست محیطی می‌باشند. ترکیبات ارگانوکلره در مقابل دما و تجزیه شدن در آب پایدارتر از ترکیبات ارگانوفسفره هستند (سلیمانی و امینی رنجبر، ۱۳۸۰). طبیعت گرچه از قابلیت و توان بازسازی معینی برخوردار است ولی کثرت مواد آلاینده در اغلب حالات این خاصیت خودپالایی را از آن سلب نموده است و سبب تغییرات اساسی در اکوسیستم و از بین رفتن بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری آبزی می‌گردد (پورنگ، ۱۳۷۲).

مطالعات آزمایشگاهی و میدانی، خطر بالقوه سوم را در اکوسیستم‌های آبی نشان می‌دهند. اطلاعات حاصل از آزمایش‌های سمتناسی در علم اکتوکسیکولوژی، تأثیرات این سوم را بر جمعیت ماهیان آب شیرین نمایش داده و از آنجا می‌توان تعیین نمود که پتانسیل کدامیک از مواد آلاینده بیشتر و در چه میزانی از حد مجاز مصرف قرار دارد (Francisco et al., 1994). داده‌های آزمایشگاهی برای ارزیابی پتانسیل اثرات سوم در محیط بکار رفته و همچنین جهت محدودسازی کاربرد مواد سمی و احتمال بررسی وجود مواد آلاینده، چنین آزمایش‌هایی باید صورت گیرد. بنابراین هدف از آزمایش‌های سنجش سمتیت آلاینده رسیدن به معیارهای قابل اعتماد برای حفاظت منابع آبزیان می‌باشد (Millijoprojekt, 1994).

پژوهش‌های انجام شده در تعیین ۹۶ ساعت سم بوتاکلر روی ماهی سیم (جادب نیکو، ۱۳۷۵)، ماهی سفید (پیری زیرکوهی و همکاران، ۱۳۷۵ ب)، فیتفاگ (پیری زیرکوهی و همکاران، ۱۳۷۶) و شاه میگوی آب شیرین (غلامی ثابت، ۱۳۸۱) را می‌توان برشمود.

در این زمینه و بخصوص در شرایط آب و هوای شمال ایران تاکنون مطالعه‌ای در این خصوص انجام نگرفته است. به همین دلیل در این تحقیق LC₅₀ و LC₁₀ در زمینه اثر علفکش بوتاکلر (که بطور عموم در منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرد) بر روی مرگ و میر بچه ماهیان قره‌برون (A. persicus) و ازون برون (A. stellatus) محاسبه شده است.

مواد و روش کار

برای این تحقیق علفکش بوتاکلر انتخاب و تهیه گردید. این آزمایشها برای تعیین سمیت حاد سم بر روی بچه ماهیان خاویاری ۱ تا ۳ گرمی قرهبرون و ازونبرون طی ۴ روز براساس روش OECD (TRC, 1984) انجام گرفت. همچنین آزمایشها بصورت استاتیک (ساکن) انجام یافته بطوریکه محلول مورد استفاده طی آزمایش تغییر نکرده و کاملاً ثابت در نظر گرفته شد. تعیین مرگ و میر ماهیها در زمانهای ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت، ۷۲ ساعت و ۹۶ ساعت اندازه‌گیری شد.

میانگین غلظتی از سم که در این دوره، جمعیت ۵۰ درصد از ماهیان مورد آزمایش را در معرض خطر مرگ قرار دهد تحت عنوان LC_{50} ۹۶ ساعت در منابع مختلف مطرح است. در این آزمایشها از ۳۰ لیتری که ۲۰ لیتر آن آبگیری شده بود، استفاده گردید. آب مورد استفاده در این آزمایش، آب شهر بندر انزلی بود که ۲۴ ساعت قبل از انجام آزمایش به آکواریومها ریخته شد و در این مدت توسط پمپ هوا، هوادهی شد تا آب دکله شود و آهن موجود در آن اکسیده و رسوب نماید. حداقل میزان تراکم ماهی به ازاء یک گرم در یک لیتر آب برای آزمایش استاتیک (ساکن) مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین حداقل از ۱۰ عدد ماهی در هر غلظت آزمایش و همچنین در شاهد استفاده شد. آزمایشها در ۶ تیمار و ۳ تکرار به همراه شاهد انجام شدند و پس از هر روز تعداد بچه ماهیهای خاویاری مرده جدا و یادداشت گردیدند. به دلیل کم بودن زمان آزمایش و جلوگیری از آلودگی محیط آزمایش از دادن غذا به آنها خودداری و معیط کشت نیز در این مدت تعویض نگردید. ماهیها از مخزن نگهداری ماهی توسط ساقچوک با احتیاط صید شده و پس از توزین به هر آکواریوم ۱۰ عدد ماهی توزین شده منتقل گردید. پس از اضافه کردن ماهیها به آکواریومها و سازگار شدن آنها به محیط جدید اضافه نمودن سم انجام شد. محلولی از سم بوتاکلر را با اضافه نمودن ۲۰ میلی لیتر از آن به ۵۰۰ میلی لیتر آب م قطره تهیه و از آن بعنوان بدست آوردن غلظتها مختلف سم به منظور اضافه نمودن آنها به آکواریومها استفاده گردید. در مورد تأثیر بوتاکلر بر بچه ماهی قرهبرون غلظتهاي LC_{10} تا $1/3$ و تأثیر این سم بر بچه ماهی ازونبرون غلظتهاي ppm ۰/۱ تا ۱ پس از انجام آزمایشهاي اوليه در نظر گرفته شد و فواصل بين غلظتهاي مختلف بصورت لگاريتمي محاسبه گردید. پس از اين مرحله، محلول بوسيله پيپ مدرج به اندازه غلظتهاي بدست آمده برداشته شد و به آکواريوهای حاوی ماهی اضافه گردید. حرکات غيرعادی قبل رؤیت، عدم تعادل، رفتار شنا، عمل تنفس، ایجاد رنگدانه، کاملاً ضبط و نوشته شد و میزان pH، اکسیژن و درجه حرارت بطور روزانه اندازه‌گیری گردید. درصد مرگ و میر برای هر غلظت از سمی که بصورت لگاریتمی در ۶ تیمار محاسبه شده بود، ثبت و میزان LC_{10} ، LC_{50} در هر روز با استفاده از داده‌های بدست آمده از روش آماری (Finny, 1971) Probit analysis پس از تجزیه و تحلیل محاسبه گردید. لازم به ذکر است که

حداکثر غلظت مجاز (M.a.c Value)¹ از تقسیم LC₅₀ بر عدد ۱۰ حاصل می‌گردد و درجه‌بندی آنها با در نظر گرفتن سطوح سمیت با استفاده از جدول ۱ مشخص می‌گردد (Wasserweschedstoff-Katalog, 1975).

جدول ۱: سطوح سمیت علف‌کش‌های مختلف (Wasserweschedstoff-Katalog, 1975)

غیر سمی	۵۰۰ > میلی گرم بر لیتر	A
کمی سمی	۱۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر	B
سمی متوسط	۱۰ تا ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر	C
سمی	۱ تا ۹ میلی گرم بر لیتر	D
خیلی سمی	۱ < میلی گرم بر لیتر	E

نتایج

با انجام آزمایش‌های متعدد بر روی بچه ماهی ۱ تا ۳ گرمی قره‌برون و ازون‌برون در نهایت محدوده کشنده‌گی این سم بدست آمد بطوریکه محدوده کشنده‌گی تأثیر سم بوتاکلر بر روی بچه ماهی ۱ تا ۳ گرمی قره‌برون بین $4/0$ تا $1/3$ میلی گرم در لیتر و بر روی بچه ماهی ۱ تا ۳ گرمی ازون‌برون بین $1/0$ تا 1 میلی گرم در لیتر تعیین شد. سپس با استفاده از معادله خط رگرسیون و ضرایب همبستگی آن (جدول ۲ و ۴) میزان در هر 24 ساعت محاسبه گردید. مقادیر در $24, 24, 48, 72, 96$ ساعت در اثر سمیت علف‌کش بوتاکلر بر بچه ماهیان قره‌برون و ازون‌برون برتریب در جداول ۳ و ۵ نشان داده شده است. با در نظر گرفتن حداکثر غلظت مجاز (M.a.c Value) سوم علف‌کش (جدول ۱)، سم بوتاکلر بر روی دو گونه قره‌برون و ازون‌برون برتریب $44/0$ و $44/0$ میلی گرم در لیتر تعیین گردید (جداول ۶ و ۷).

نتایج نشان داد که غلظت کشنده سم در 24 ساعت بیشتر از 96 ساعت می‌باشد و همچنین تأثیر سم بر روی مرگ و میر ماهیان در زمانهای مختلف متفاوت بوده بطوریکه مرگ و میر بچه ماهیان با افزایش زمان کاهش می‌یابد. در داخل آکواریوم شاهد پس از 96 ساعت هیچگونه مرگ و میری مشاهده نشد.

¹- Maximum allowable concentration

جدول ۲: معادله خط رگرسیون و ضریب همبستگی تاثیر سم علف کش بوتاکلر بر بچه ماهی قره برون

اطلاعات آماری	۲۴ ساعت	۴۸ ساعت	۷۲ ساعت	۹۶ ساعت
معادله خط	$Y = 4/660259X + 1/58257$	$Y = 5/374212X + 1/38 + 292$	$Y = 5/971040X + 1/173$	$Y = 8/8911118X + 2/572 + 1$
رگرسیون				
ضریب همبستگی R-square	.980754	.844334	.958816	.757686

جدول ۳: اثر سمیت علف کش بوتاکلر بر بچه ماهی قره برون

نام علف کش	LC	۲۴ ساعت	۴۸ ساعت	۷۲ ساعت	۹۶ ساعت
(میلی گرم در لیتر)					
بوتاکلر (۶۰ درصد)	LC1.	.0/49	.0/32	.0/22	.0/20
LC5.	1/54	.0/71	.0/5	.0/44	
LC9.	4/93	.1/56	.1/14	.0/71	

جدول ۴: معادله خط رگرسیون و ضریب همبستگی تاثیر سم علف کش بوتاکلر بر بچه ماهی ازون برون

اطلاعات آماری	۲۴ ساعت	۴۸ ساعت	۷۲ ساعت	۹۶ ساعت
معادله خط رگرسیون	$Y = 4/0502092 + 2/0776027$	$Y = 5/059743X + 3/776275$	$Y = 7/1049 + 4X + 7/71252$	$Y = 8/8911118X + 2/572 + 1$
ضریب همبستگی R-square	.978143	.989414	.976061	.794836

جدول ۵: اثر سمیت علف کش بوتاکلر بر بچه ماهی ازون برون

نام علف کش	LC	۲۴ ساعت	۴۸ ساعت	۷۲ ساعت	۹۶ ساعت
(میلی گرم در لیتر)					
بوتاکلر (۶۰ درصد)	LC1.	.0/25	.0/6	.0/02	.0/01
LC5.	1/62	.0/53	.0/14	.0/07	
LC9.	1/05	.4/54	.1/83	.0/23	

جدول ۶ : حداکثر غلظت مجاز سم بوتاکلر بر روی ماهی قرهبرون

بوتاکلر	۲۴ ساعت	۴۸ ساعت	۷۲ ساعت	۹۶ ساعت
حداکثر غلظت مجاز (میلی گرم در لیتر)	۰/۱۵۶	۰/۰۷۱	۰/۰۵	۰/۰۴۴

جدول ۷ : حداکثر غلظت مجاز سم بوتاکلر بر روی ماهی ازون بروون

بوتاکلر	۲۴ ساعت	۴۸ ساعت	۷۲ ساعت	۹۶ ساعت
حداکثر غلظت مجاز (میلی گرم در لیتر)	۰/۱۶۲	۰/۰۵۳	۰/۰۱۴	۰/۰۰۷

بحث

عوامل متعددی در نتایج آزمایش‌های سمیت بر روی آبزیان تأثیر دارند که شامل ویژگیهای آب و با خصوصیات زیستی گونه‌های مورد آزمایش می‌باشند. اینرا ضروری است به هنگام اجرای آزمایش‌های سمیت حاد و مزمن، از روش‌های آزمایش استاندارد شده برای به حداقل رساندن متغیرهای خارجی و تصادفی استفاده نمود. اطمینان از اینکه همه موجودات مورد آزمایش از یک گروه سالم بوده و همراه با توزیع تصادفی آنها در محفظه‌های مختلف آزمایش مورد استفاده قرار می‌گیرند، نکته‌ای مهم است (شریعتی فیض آبادی، ۱۳۸۰). میزان LC_{50} سم بوتاکلر بر روی ماهیان قرهبرون و ازونبرون (ترتیب $44.0 \text{ ppm} > 40.0 \text{ ppm}$) نشان می‌دهد که این سم برای ماهیان مذکور خیلی سمی می‌باشد. مقایسه قرهبرون و ازونبرون در برابر این سم نشان داد که LC_{50} سم بوتاکلر بر روی ماهی قره برون تقریباً ۶ برابر ماهی ازون برون می‌باشد. به عبارت دیگر ازونبرون در برابر سم بوتاکلر حساس‌تر از قرهبرون است. پژوهش‌های انجام شده در سالهای گذشته نشان دادند که میزان LC_{50} ۹۶ ساعت سم بوتاکلر بر روی ماهی سیم (جادب نیکو، ۱۳۷۵)، ماهی سفید (پیری زیرکوهی و همکاران، ۱۳۷۵الف)، فیتوفاگ (پیری زیرکوهی و همکاران، ۱۳۷۵ب) و شاه میگوی آب شیرین (غلامی ثابت، ۱۳۸۱) بترتیب $0.43, 1.21, 1.21$ و 0.19 ppm میلی گرم در لیتر می‌باشد.

سم بوتاکلر بر روی قرهبرون در مقایسه با ماهی سیم، سفید، فیتوفاگ و شاه میگوی آب شیرین با توجه به نتایج حاصل نشان داد که ماهی قرهبرون $2/75$ برابر حساس‌تر از ماهی سیم می‌باشد و این در حالی است که قرهبرون در مقایسه با ماهیان سفید، فیتوفاگ و شاه میگوی آب شیرین در برابر این سم بترتیب $1/1, 1/1, 231/5$ برابر مقاوم‌تر است. بنابراین می‌توان ترتیب حساسیت ماهیان فوق الذکر در برابر بوتاکلر را به صورت زیر نشان داد.

سیم < قره برون > سفید < فیتوفاگ > شاه میگوی آب شیرین

LC₅ سم بوتاکلر بر روی ازون برون در مقایسه با ماهی سیم، سفید، فیتوفاگ و شاه میگوی آب شیرین با توجه به نتایج حاصل نشان داد که ماهی ازون برون ۱۷/۲ برابر حساس‌تر از ماهی سیم، ۶/۱ برابر حساس‌تر از ماهی سفید و ۵/۲ برابر حساس‌تر از ماهی فیتوفاگ است. این در حالی است که ازون برون در مقایسه با شاه میگوی آب شیرین در برابر این سم ۳۶/۸ برابر مقاومت‌می‌باشد. بنابراین ترتیب حساسیت ماهیان فوق‌الذکر در برابر بوتاکلر بصورت زیر نشان داده می‌شود.

سیم < سفید < فیتوفاگ < ازون برون > شاه میگوی آب شیرین

سکری (۱۳۷۸) میزان LC₅ ۹۶ ساعت سوم رنستار و ریلوف-اچ را برای تاسماهی ایرانی بترتیب ۱۴/۴۰ و ۸/۸۲ میلی‌گرم در لیتر و برای ازون برون بترتیب ۱۴/۲۰ و ۷/۳۰ میلی‌گرم در لیتر برآورد نمود که در مقایسه با سم بوتاکلر از نظر شدت سمیت بصورت زیر می‌توان نشان داد.

رنستار < ریلوف-اچ < بوتاکلر

این آزمایشها نشان داد که با افزایش زمان آزمایش به ۹۶ ساعت LC₁₀ سم کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و همین موضوع برای مقادیر LC₅ و LC₁₀ نیز صادق است.

مشاهدات حاصل در طول آزمایش نشان داد که در غلظتهاي بالاي سم بكار رفته، ماهیان به سرعت بی‌حال و در غلظتهاي متوسط شروع به فعالiteهاي نامنظم عصبی و در غلظتهاي پایین به نوعی سستی موقت می‌رسيدند. همچنانین برخی از ماهیان نیز پس از مردن با شکم متورم و برخی دیگر با بدنه موجی شکل به دلیل انحنای ستون فقرات در کف آکواریوم مشاهده شده‌اند و این در حالی است که در استفاده از مقادیر بالای استفاده از سم، ماهیان بصورت وارونه شنا نموده و بدنشان دچار رنگ باختگی گردید.

در مجموع با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و نتایج سایر محققین می‌توان گفت سم بوتاکلر اثرات زیانبار مستقیم و غیرمستقیمی بر روی اکوسیستمهای آبی و آبزیان آنها می‌گذارد که کاهش این اثرات سوء، مستلزم مدیریت پایدار جهت استفاده بهینه از این سم می‌باشد.

با اتخاذ روش‌های نوین کشاورزی در جهت توسعه پایدار عملاً ضریب بازگشت ماهیان به رودخانه‌ها جهت تخریبی بالا رفته و به محیطی سالم و امن جهت رهاسازی بچه‌ماهیان خاویاری مبدل گشته و نهایتاً ذخایر آبزیان بصورت کلان حفاظت می‌گردد.

تشکر و قدردانی

از سرکار خانم دکتر مریم فلاحی، مهندس سرپناه و مهندس صلوتیان به جهت همکاری در اجرای

پروژه صمیمانه تشکر می‌گردد.

منابع

- پور کاظمی، م. ، ۱۳۷۶. نگرشی بر وضعیت تاسماهیان دریای خزر و چگونگی حفظ ذخایر آن. مجله علمی شیلات ایران، شماره ۳، سال ششم، پائیز ۷۶، صفحات ۱۳ تا ۲۲.
- پورنگ، ن. ، ۱۳۷۲. تجمع زیستی آلاینده‌ها بویژه فلزات سنگین در اکوسیستمهای آبی. موسسه تحقیقات شیلات ایران. صفحات ۹ تا ۲۳.
- پیری زیرکوهی، م؛ نظامی، ش.؛ امینی رنجبر، غ. و اردگ، و.، ۱۳۷۵. بررسی اثرات سموم دیازینون، ملاتیون، ماجتی و ساترن بر روی مرگ و میر ماهی سفید. مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان. صفحات ۴ تا ۶.
- پیری زیرکوهی، م؛ نظامی، ش.؛ امینی رنجبر، غ. و اردگ، و.، ۱۳۷۵. بررسی اثرات سموم دیازینون، ملاتیون، ماجتی و ساترن بر روی مرگ و میر ماهی فیتوفاگ. مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان. صفحات ۱ تا ۶.
- پیری زیرکوهی، م؛ نظامی، ش.؛ امینی رنجبر. غ. و اردگ. و. . ۱۳۷۶. مطالعات اکوتوكسیکولوژی با و تعیین اثر سموم دیازینون، ملاتیون، ماجتی و ساترن بر این ارگانیزم. مجله علمی شیلات ایران. سال ششم. شماره ۳. پائیز ۱۳۷۶. صفحات ۲۴ تا ۳۰.
- جادب نیکو، ا. ، ۱۳۷۵. بررسی اثرات سموم بوتاکلر ۶۰ درصد و ملاتیون ۵۷ درصد بر روی مرگ و میر ماهی سیم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد شیلات. ۶۵ صفحه.
- رضوانی گیل کلائی، س. ، ۱۳۷۷. بررسی قابلیت‌های پرورش ماهیان خاویاری. هشتمین همایش ملی شیلات ایران، ۲۶-۲۸ بهمن ۱۳۷۷، دانشگاه تهران، کتابچه خلاصه مقالات، صفحات ۴۹ تا ۵۰.
- سکری، م. ، ۱۳۷۸. بررسی سموم علف‌کش انتخابی رنستاو و ریلوف-اچ بر روی دو گونه از بچه ماهیان خاویاری (قره‌برون و ازون‌برون). پایان‌نامه کارشناسی ارشد شیلات. ۹۷ صفحه.
- سلیمانی، پ. و امینی رنجبر، غ. ، ۱۳۸۰. جداسازی و شناسایی سموم ارگانوکلره و ارگانوفسفره در آب تالاب انزلی به کمک دستگاه GC/MS Ion Trap. فصلنامه علمی- پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی، جلد ۱۴، شماره ۱، شماره پی‌آیند ۵۰، ۱۰۰ صفحه.
- شریعتی فیض آبادی، ف. ، ۱۳۸۰. تعیین فتل، ۱- نفتول و قارچ‌کش هینوزان بر روی ماهیان سیم، سفید و کپور نقره‌ای. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی. ۱۶۰ صفحه.
- غلامی ثابت، ن. ، ۱۳۸۱. بررسی اثر زیر مرگ سموم شیمیایی علف‌کش (ساترن و ماجتی) و حشره‌کش (ملاتیون و دیازینون) بر مرگ و میر مینیاتورهای شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus magna Finny, D.J. , 1971. Probitanalysis. Cambridge Univ. Press, London. UK. pp.1-222.

- Francisco, A.A. ; Eugenio, L. and Magdalena, D.A. , 1994. Acute toxicity of the herbicide glyphosate to fish. Chemosphere. Vol. 28, pp.735-745.
- Milijoprojekt, N. , 1994. Ecotoxicological evolution of industrial wastewater. 131 P.
- T.R.C. , 1984. OECD Guidelines for testing of chemicals section 2. Effects on biotic-systems. pp.1-39.
- Wasserweschadstoff-Katalog , 1975. Institut Wasser Wirtschaft, Berlin.?

Determining the lethal concentration (LC_{50} 96h) of Butachlor herbicide for *Acipenser persicus* and *Acipenser stellatus* fingerlings

Padjand Z.(1) ; Esmaieli S.A. (2) and Piri M. (3)

zpjand@yahoo.com

1 – Ecology Dept., International Sturgeon Research Institute, P.O.Box:
41635-3464 Rasht, Iran

2 – Faculty of Marine Science and Natural Resources, Tarbiat Modarres
University, P.O.Box: 14155-356 Noor, Iran

3 – Agriculture Research and Natural Resources of Semnan Province,
P.O.Box: 35145-319 Semnan, Iran

Received: May 2004

Accepted: October 2004

Keywords: Butachlor, *Acipenser persicus*, *A. stellatus*, Herbicide

Abstract

The toxic effects of the herbicide Butachlor were studied using a concentration of 0.4–1.3ppm and 0.1–1ppm on fingerlings of the Persian sturgeon and Stellatus sturgeon respectively in 1999. We carried out six treatments with three replicates and used one control based on the static O.E.C. D. method. Over the experiments, pH ranged between 6.7–8.2, total hardness was measured to be 230 mg/l, water temperature was 20±1 degrees centigrade and dissolved oxygen was above 6 mg/l.

We found that the LC_{50} 96h of the Butachlor on fingerlings of the Persian sturgeon and Stellatus sturgeon weighing 1–3 grams was 0.44 and 0.07 mg/l respectively. Also assessed the LC_{10} , LC_{50} , LC_{90} of the herbicide on the fingerlings of the sturgeons using the Probit Analysis procedure. We determined the maximum allowable concentration of the Butachlor herbicide for the fingerlings of the Persian and Stellatus sturgeons to be 0.044 and 0.007 mg/l. Based on the standards, the herbicide is considered highly toxic for the studied fingerlings.