

تعیین LC_5 طی ۹۶ ساعت دو ترکیب نفتی فتل و ۱ - نفتول

بر بچه ماهیان تاسماهی ایرانی (*Acipenser persicus*)

شعبانعلی نظامی^(۱)؛ ذبیح ا. پژند^(۲)؛ حسین خارا^(۳) و علی افسرده^(۴)

sha_nezami 2004 @ yahoo.com

۱، ۲ و ۴ - دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان ، گروه شیلات ، صندوق پستی ۱۶۱۶

۲ - انسیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری ، رشت صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۳۴۶۴

تاریخ پذیرش: دی ۱۳۸۲ تاریخ دریافت: دی ۱۳۸۲

خلاصه

اثرات سمیت حاد دو ترکیب نفتی فتل و ۱ - نفتول بر روی بچه ماهیان تاسماهی ایرانی (*Acipenser persicus*) در سال ۱۳۸۲ مورد بررسی قرار گرفت . برای این منظور پس از انجام چندین آزمایش و براساس محاسبه های لگاریتمی، در نهایت ۵ تیمار و یک شاهد برای فتل و ۴ تیمار و یک شاهد برای ۱ - نفتول (هر یک با سه تکرار) در نظر گرفته شد. آزمایشها در آکواریومهای ۲۰ لیتری، براساس روش OECD و به صورت ساکن اجرا شدند و درون هر آکواریوم ۱۰ عدد بچه ماهی رهاسازی شدند. در مدت آزمایش pH، سختی آب، دمای آب و اکسیژن محلول اندازه گیری شد. اطلاعات حاصله بوسیله نرم افزارهای Statgraphic و Quatropro و روش آماری Probit Analysis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طبق نتایج بدست آمده در طول آزمایش میزان pH برابر ۷/۲، سختی آب ۱۹۴ میلی گرم در لیتر، دمای آب ۲۵/۱ درجه سانتی گراد و اکسیژن محلول ۷/۲ میلی گرم در لیتر بود. همچنین مقدار LC_5 طی ۹۶ ساعت فتل و ۱ - نفتول بترتیب ۳۶/۶۵ و ۱/۳۲ میلی گرم در لیتر تعیین گردیدند. حداقل غلظت مجاز (MAC) فتل و ۱ - نفتول برای بچه ماهی تاسماهی ایرانی بترتیب ۳/۶۶ و ۰/۱۳ میلی گرم در لیتر محاسبه شدند.

لغات کلیدی: تاسماهی ایرانی، *Acipenser persicus*، فتل، ۱ - نفتول، LC_5

مقدمة

توسعه علم و فناوری باعث شده است که بشر بطور گسترده در جهت استفاده از منابع زیستی و غیرزیستی اکوسیستم‌های آبی اهتمام ورزد. این امر سبب بهم خوردن تعادل اکولوژیک و بیولوژیک آنها شده است. در این بین، دریای خزر نیز از این امر مستثنی نبوده، بلکه به علت وضعیت جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی کشورهای حاشیه این دریا، دچار آلودگی‌های مختلف شده است. در دهه اخیر اکتشاف و بهره‌برداری نفت از دریای خزر موجب صدمات زیست محیطی به این دریا بسته شده، بطوریکه ترکیبات نفتی مختلف مانند فنل، کروزل، نفتول، پیروکاتکول، رزورسین، هیدروکسیول، بیروگالل و فلورورگوسن وارد این دریا شده اند (ثنا، ۱۳۷۶). از ترکیبات فوق الذکر فنل و ۱-نفتول از مهمترین ترکیبات نفتی هستند که استفاده‌های وسیعی در صنایع داشته و بر طبق مطالعات انجام گرفته توییط تمیکنی (۱۳۷۷) میزان غلظت فنل در سواحل دریای خزر طی چند سال گذشته روندی افزایشی داشته است. این ترکیبات از طرق مختلف می‌توانند اثرات منفی بر محیط زیست بگذارند بطوریکه شریعتی (۱۳۸۰) اثرات سمیت خاد (LC₅₀ طی ۹۶ ساعت) این دو ترکیب نفتی را روی بچه ماهیان سیم، سفید و کپور نقره‌ای مورد بررسی قرار داد. همچنین در محققین زیادی بر روی اثرات سمی این دو ترکیب نفتی مطالعه کرده‌اند بطوریکه اثرات سمی فنل توسط Korn et al.; Ghosh (1983); Changon & Lohowskyi (1989); Oksama & Kristoffersson (1979) Ravichundranl & Midhua (1994); Svbodova et al. (1993); Jiang & Cao (1995); al. (1985); Tilak (1982); Tilak et al. (1981) و سمیت ۱-نفتول توسط Crookes & Howe (1996); Cajaraville et al. (1998) مشخص شده‌اند.

از طرف دیگر، دریای خزر زیستگاه ماهیان ارزشمندی مانند ماهیان خاویاری است که تخم استحصالی این ماهیان دارای ارزش غذایی مهمی است و لذا همواره از لحاظ اکولوژیک، بیولوژیک و اقتصادی مورد توجه هستند. در این بین، گونه تاسماهی ایرانی (*Acipenser persicus*, Borodin 1897) بالاترین صید را در سواحل ایرانی دریای خزر بخود اختصاص داد و هر ساله نیز میلیونها بچه ماهی از این گونه توسط شیلات ایران، جهت بازسازی ذخایر به دریای خزر رهاسازی می‌شوند. در ضمن مولدهای این ماهی هر ساله جهت مهاجرت تولید مثلی به رودخانه سفید رود وارد می‌شوند (عباسی و همکاران، ۱۳۷۸).

تاکنون مطالعات مختلفی جهت بررسی اثرات سموم حشره‌کش و علفکش روی بچه ماهیان تاسماهی ایران توسط پژند (۱۳۷۸)، سکری (۱۳۷۸) و نظامی و همکاران (۱۳۸۳) انجام شده است و هدف از این تحقیق بررسی اثرات سمیت فنل و ۱-نفتول بر روی بچه ماهیان تاسماهی ایرانی به منظور مشخص نمودن ابعاد مختلف اثر آلودگی‌های نفتی (در این پژوهش بخصوص فنل و ۱-نفتول) و هشدار به مسئولین ذیربطری بمنظور اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از آلودگی‌های نفتی در دریای خزر می‌باشد.

مواد و روش کار

جهت مشخص نمودن میزان LC_5 طی ۹۶ ساعت دو ترکیب نفتی فنل و ۱-نفتول روی بچه ماهی تاسماهی ایرانی، از بچه ماهیان انگشت قد تاسماهی ایرانی حاصل از تکثیر مصنوعی سال ۱۳۸۲ مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی سد سنگر (رشت) استفاده شد. به همین منظور، در زمان رهاسازی بچه ماهیان انگشت قد به رودخانه سفید رود، جهت بازسازی ذخایر، طی چند مرحله تعدادی از این بچه ماهیان به بخش اکولوژی موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت منتقل و درون وانهای فایبر گلاس از پیش آماده شده، رهاسازی شدند.

در این وانهای، بچه ماهیان برای سازگار شدن با شرایط محیط به مدت ۵ تا ۷ روز نگهداری و با غذای زنده (دافنی) مورد تغذیه قرار گرفتند. آنگاه برای انجام آزمایش‌های تشخیص سمیت، بچه ماهیان خاویاری درون آکواریومهایی به حجم ۲۰ لیتر آب رهاسازی شدند (۱۰ عدد بچه ماهی ۳ گرمی در هر آکواریوم). آنگاه براساس روش (TRC, 1984) حاصل از تحقیقات شریعتی (۱۳۸۰) به منظور تعیین LC_5 این دو ترکیب نفتی بر روی بچه ماهیان سیم و کپور نقره‌ای و تکرار میزانهای این مواد نفتی روی بچه ماهیان تاسماهی ایرانی، غلظتهای ۳۰/۱ تا ۴۰/۹ میلی‌گرم در لیتر برای فنل ۴/۹۹ تا ۰/۵ میلی‌گرم در لیتر برای ۱-نفتول در نظر گرفته شدند که براساس محاسبات لگاریتمی و تکرار مجدد آزمایشها تیمارهای نهایی برای فنل ۵ تیمار و یک شاهد (۱۸ آکواریوم) و برای ۱-نفتول ۴ تیمار و یک شاهد (۱۵ آکواریوم) بدست آمدند. آنگاه آزمایش نهایی بر طبق این تیمارها و با سه تکرار به انجام رسید.

در طول آزمایش ضمن ثبت میزان pH، سختی آب، دمای آب و اکسیژن محلول آب، حرکات و رفتار ماهیان بطور شبانه‌روزی مورد بررسی قرار گرفت. بعد از کسب نتایج نهایی LC_{10} ، LC_5 ، LC_1 و LC_0 طی ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت (اطلاعات حاصله بر طبق روش آماری Probit مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میزان خداکثر غلظت مجاز (میزان LC_5 طی ۹۶ ساعت تقسیم بر ۱۰) و درجه سمیت مشخص شد (TRC, 1984).

نتایج

در طول آزمایش میزان pH آب $7/2$ ، سختی آب ۱۹۴ میلی‌گرم در لیتر، دمای آب ۲۵/۱ میلی‌گرم در لیتر و اکسیژن محلول $7/2$ میلی‌گرم در لیتر بدست آمد. پس از انجام آزمایش‌های ابتدایی به منظور یافتن محدوده غلظت فنل، سرانجام محدوده غلظتهای ۳۰/۱ تا ۴۰/۹ میلی‌گرم در لیتر تعیین گردید که سپس میزان تغییرات نسبت به شاهد، لگاریتم غلظت سم و میزان پروبیت مشخص گردید (جدول ۱). آنگاه براساس آزمایش‌های انجام گرفته مقادیر LC_1 ، LC_5 و LC_{10} و LC_0 طی ۹۶ ساعت بر روی بچه

ماهیان تاسماهی ایرانی بترتیب ۲۸/۹، ۳۶/۶۵ و ۴۶/۶۴ میلی گرم در لیتر اندازه‌گیری شدند. همچنین طی ۲۴ ساعت میزان .LC_۱، .LC_۵ و .LC_۹ بترتیب ۳۰/۷۶، ۳۹/۶۱ و ۵۱/۰۱ میلی گرم در لیتر، در ۴۸ ساعت بترتیب ۴۸/۷۷، ۳۸/۲۴ و ۲۹/۹۸ میلی گرم در لیتر و در ۷۲ ساعت بترتیب ۳۷/۳۱، ۲۹/۳۵ و ۴۷/۴۴ میلی گرم در لیتر بدست آمد (جدول ۲). همچنین معادله خط رگرسیون و ضرایب همبستگی مشخص شد (جدول ۳). طبق این نتایج حداکثر غلظت مجاز نیز ۳/۶۶ میلی گرم در لیتر می‌باشد. از علائم ظاهری اثرات فتل بر روی بچه ماهیان مورد مطالعه در غلظتهای پایین سم حالت غیرعادی شنا و در غلظتهای بالای سم افزایش فعالیت و تحریک‌پذیری، عدم تعادل، روشن شدن رنگ پوست، تشکیل موکوس روی پوست، شناای عمودی، بیرون‌زدگی چشم، تشکیل لکه‌های خونی در اطراف چشم و ناحیه زیرشکم، پرخونی آبششها و انحنای ستون فقرات مشاهده گردید.

نتایج بررسی‌های انجام گرفته درخصوص تعیین غلظت ۱- نفتول نشان داد که غلظتهای ۴/۹۹ تا ۰/۵ میلی گرم در لیتر می‌تواند بر بچه ماهیان تاسماهی ایرانی مورد آزمایش اثر بگذارد، آنگاه می‌توان میزان تغییرات نسبت به شاهد، لگاریتم غلظت سم و میزان پروریت را بدست آورد (جدول ۴). براساس محاسبات انجام شده مقادیر .LC_۱، .LC_۵ و .LC_۹ ۱- نفتول بر روی بچه ماهیان تاسماهی ایرانی طی ۹۶ ساعت به ترتیب ۰/۲۵، ۱/۳۲ و ۳/۸۴ میلی گرم در لیتر اندازه‌گیری شد. ضمن اینکه طی ۲۴ ساعت .LC_۱، .LC_۵ و .LC_۹ بترتیب ۰/۶۱، ۰/۹۱ و ۳۹/۳ میلی گرم در لیتر، در طی ۴۸ ساعت بترتیب ۰/۳۵ و ۰/۳۵ میلی گرم در لیتر و در طی ۷۲ ساعت بترتیب ۰/۲۶، ۰/۱۵۵ و ۶/۶۸ میلی گرم در لیتر بودند (جدول ۵). در ضمن براساس نتایج بدست آمده معادله خط رگرسیون و ضریب همبستگی مشخص شدند (جدول ۶).

بچه ماهیانی که در معرض ۱- نفتول قرار گرفته بودند علائم غیرطبیعی بروز ندادند، اما پس از گذشت مدتی حالت بی‌قراری، شناای نامتعادل و در بعضی موارد شناای عمودی از خود نشان دادند. سپس رنگ پوست ماهیان به روشی گرایید و موکوس روی پوست افزایش یافت. انحنای ستون فقرات، پرخونی آبشش و بیرون‌زدگی چشم نیز در بعضی از ماهیان از علائم دیگر قابل مشاهده بود.

جدول ۱: تأثیر ماده نشی غل پر دود مرگ و سر بجهه ماهیان ۱ تا ۳ گرسنگی ناسنایی ایرانی (میانگین ۳ تکرار)

جدول ۲: غلظت‌های کننده ماده نفتی فتل در طی یازده روز بر روی بچه تاسماهی ایرانی

نام ماده نفتی (میلی گرم در لیتر)	غلظت ماده نفتی قبل	۲۴ ساعت	۴۸ ساعت	۷۲ ساعت	۹۶ ساعت
LC_{10}	LC_{10}	$20/71$	$29/98$	$29/35$	$29/35$
LC_0	$39/61$	$38/24$	$37/31$	$37/75$	$37/75$
LC_9	$51/01$	$47/34$	$43/42$	$43/67$	$43/67$

جدول ۳: معادله خط رگرسیون و ضرب همبستگی تأثیر ماده نفتی بر روی بچه تاسماهی ایرانی

ضریب همبستگی	معادله خط رگرسیون	اطلاعات آماری	۷۲ ساعت	۴۸ ساعت	۲۴ ساعت	۹۶ ساعت
$0.97/0$	$Y = 11.77X - 13.75$	معادله خط رگرسیون	$Y = 11.77X - 13.75$			

جدول ۲: تأثیر ماده نفی - اتفاقی بر روی مرگ و سر بعده ماهیان ۱ تا ۳ گرسنگی تاسماهی ابروی (میانگین ۳ تکرار)

جدول ۵: غلاظتهاي کشنده ماده نفتي ۱-نفتول در طي ۴ روز بروي بهجه تاسماهى ايراني

نام ماده نفتي	غلاظت ماده نفتي (ملي گرم در لپز)	۲۴ ساعت	۸۴ ساعت	۷۲ ساعت	۹۶ ساعت
$LC_{1,1}$	۰/۳۰	۰/۷۰	۰/۳۰	۰/۲۰	۰/۲۰
$LC_{2,1}$	۱/۵۰	۱/۱	۱/۴۰	۱/۳۲	۱/۳۲
$LC_{3,1}$	۰/۷۶	۰/۱۲	۰/۳۹/۳	۰/۲۸	۰/۲۸

جدول ۶: معادله خط رگرسيون و ضربه همبستگي تأثير ماده نفتي ۱-نفتول بر روی بهجه تاسماهى ايراني

اطلاعات آماري	۷۲ ساعت	۹۶ ساعت	۱۴ ساعت	۷۲ ساعت	۹۶ ساعت	۱۴ ساعت
معادله خط رگرسيون	$Y = ۱/۷۱ X - ۱/۷۱$	$Y = ۱/۰۲ X - ۱/۰۲$	$Y = ۱/۱۱ X - ۱/۱۱$	$Y = ۱/۳۳ X - ۱/۳۳$	$Y = ۱/۱۱ X - ۱/۱۱$	$Y = ۱/۱۱ X - ۱/۱۱$
ضربيه همبستگي	۰/۷۷	۰/۸۰	۰/۹۴	۰/۷۷	۰/۸۰	۰/۹۴

بحث

اکتشاف، استخراج و استفاده از فرآورده‌های مختلف نفتی سبب ورود مقادیر زیادی از انواع ترکیبات نفتی از جمله فل و ۱- نفتول به دریای خزر شده است. (تقی پور، ۱۳۷۷؛ بذرافشان، ۱۳۷۳؛ تمسکنی، ۱۳۷۷ و حسنی، ۱۳۷۹). این دو ترکیب نفتی می‌توانند اثرات زیانباری به محیط زیست و بویژه انواع ماهیان خاویاری مانند گونه تاسماهی ایرانی وارد آورند که نتایج این تحقیق نیز بیان کننده این اثرات می‌باشد. طبق این نتایج مواد شیمیایی مختلف اثرات متفاوتی بر روی موجودات زنده دارند. بطوریکه براساس این پژوهش ۱- نفتول نسبت به فل، ۲/۸ برابر مؤثرتر است. همچنین مشخص گردید که عمدۀ سمیت این دو ترکیب نفتی در ۲۴ ساعت اول و تا حدودی ۴۸ ساعت دوم می‌باشد که می‌تواند به دلیل فرار بودن این ترکیبات باشد.

همچنین در تحقیقاتی که سکری (۱۳۷۸) بر روی میزان LC_{50} طی ۹۶ ساعت سم رنستار و ریلوف-اج بر روی بچه ماهیان تاسماهی ایرانی انجام داد میزان آن را بترتیب $14/40$ و $4/28$ میلی‌گرم در لیتر، پژند (۱۳۷۸) میزان LC_{50} طی ۹۶ ساعت سم بوتاکلر و دیازینون را بر روی بچه ماهیان تاسماهی ایرانی بترتیب $0/44$ و $4/38$ میلی‌گرم در لیتر و نظامی و همکاران (۱۳۸۳) میزان LC_{50} طی ۹۶ ساعت سوم ملاتیون و ساترن را بر روی بچه ماهیان تاسماهی ایرانی بترتیب 10 و $0/07$ میلی‌گرم در لیتر بدست آوردند. بنابراین با در نظر گرفتن میزان LC_{50} طی ۹۶ ساعت دو ترکیب نفتی فل (۳۶/۶۵ میلی‌گرم در لیتر) و ۱- نفتول ($1/33$ میلی‌گرم در لیتر) می‌توان گفت که میزان سمیت آنها بر روی بچه ماهی تاسماهی ایرانی به صورت زیر می‌باشد.

فل > رنستار > ملاتیون > ریلوف - اج > دیازینون > ۱- نفتول > بوتاکلر > ساترن
در ضمن بر طبق نتایج تحقیقات شریعتی (۱۳۸۰) در زمینه LC_{50} طی ۹۶ ساعت فل و ۱- نفتول بر روی بچه ماهیان سفید (بترتیب $21/59$ و $2/15$ میلی‌گرم در لیتر)، بچه ماهیان سیم (بترتیب $9/19$ و $2/85$ میلی‌گرم در لیتر) و بچه ماهیان کپور نقره‌ای (بترتیب $22/77$ و $6/59$ میلی‌گرم در لیتر) می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سمیت فل بر روی بچه ماهی سفید بیشتر و ماهی کپور نقره‌ای، سیم و تاسماهی ایرانی در درجه‌های بعدی حساسیت قرار دارند.

TASMAHİ İRAN < MAHİ SİİM < MAHİ KÖPÜR NQREHƏİ < MAHİ SİFİD
این در حالی است که میزان حساسیت نسبت به ۱- نفتول در تاسماهی ایرانی بیش از ماهی سفید، سیم و کپور نقره‌ای می‌باشد:

MAHİ KÖPÜR NQREHƏİ < MAHİ SİİM < MAHİ SİFİD < TASMAHİ İRAN
همچنین در سایر نقاط جهان نیز مطالعات مختلفی در ارتباط با سمیت حاد این دو ترکیب نفتی صورت گرفته است. بطوریکه (Jiang & Cao 1995) میزان LC_{50} Jiang & Cao (1995) طی ۹۶ ساعت را برای ماهی کپور نقره‌ای $8/64$ تا $22/5$ میلی‌گرم در لیتر، کپور غلفخوار $2/5$ تا $70/10$ میلی‌گرم در لیتر و ماهی کپور $27/10$ تا $75/61$ میلی‌گرم در لیتر بدست آوردند.

تعیین ._۵ LC طی ۹۶ ساعت دو ترکیب نفتی فل و -۱ نفتول برای Korn *et al.*, (1985) میزان ._۵ LC طی ۹۶ ساعت فنل برای بچه ماهی نورس آزاد صورتی ۱۰/۳ میلی گرم در لیتر و برای میگوی کلپ (*Eualus suckleyi*) (Oncorhynchus gorbuchua) میلی گرم در لیتر گزارش کردند. Oksama & Kristoffersson (1979) مقدار ._۵ LC طی ۹۶ ساعت فنل را برای ماهی کوهستان (*Phoxinus phoxinus*), گاماروس (*Gammarus duebeni*) و سخت پوست (*Mesidotea entomon*) را بترتیب ۱ میلی گرم در لیتر، ۳۲ تا ۴۱ میلی گرم در لیتر و ۸۵ تا ۱۰۰ میلی گرم در لیتر تعیین نمودند. همچنین (1996) Crookes & Howe سمتی حاد ._۵ LC طی ساعت فنل بر ماهی قزلآلای رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*) را ۱/۷۵ میلی گرم در لیتر گزارش کردند. این در حالی است که Cajaraville *et al.*, (1998) میزان ._۵ LC طی ۹۶ ساعت برای ترکیب نفتی ۱ - نفتول را برای شکمپایی *Litorina litorina* ۲/۸۹ میلی گرم در لیتر گزارش کرد. در همین حال Tilak (1982) این میزان را برای *Channa punctata* ۲/۹۹ میلی گرم در لیتر بیان نمود. همچنین (1981) Tilak *et al.*, مقدار ._۵ LC طی ۹۶ ساعت ترکیب نفتی ۱ - نفتول را برای ماهی کاتلا (*Mystus vittatus* و *Mystus cavasius*، *Anabas testudineus* و *Catla catla*) بترتیب ۳/۴ و ۰/۳۳ و ۱/۱ میلی گرم در لیتر تعیین کردند.

ترکیبات فنل و ۱ - نفتول علاوه بر اینکه در غلظتهاي معيني باعث مرگ آبزيان می شوند، در غلظتهاي پايانين تر نيز اثرات سويي بر جاي می گذارند. چنانچه جذب فنل از طريق سطح بدن، پوست، آبشش و تغذيه باعث بروز طعم فنلي در گوشت ماهيان می شود (اسماعيلي، ۱۳۷۹). همچنین مشاهده شده که قرار گرفتن در معرض ۰/۰ میلی گرم در لیتر از فنلها موجب مهاجرت ماهي به خارج از آبهای الوده می گردد (Svobodova *et al.*, 1993).

در مطالعهای دیگر ثابت شده است که غلظتهاي زير کشende فنل موجب بروز تغييرات فيزيولوژيک در ماهي می گردد که اين تغييرات بنوبه خود بر روی توانايي ماهي برای تحمل تنشهاي زيس است Ravichundran & Change (1989). در تحقيقی که توسط Midhua (1994) انجام شد، مشخص گردید که در غلظتهاي غيرکشende فنل، گلوکر خون ماهي *Oreochromis mossambicus* افزایش می يابد که ظاهراً نشاندهنده افزایش سرعت حمل و نقل گلوکر از كيد به ماهيچه رفع نياز ماهيچه به انرژي برای حرکات غيرعادی است.

همچنین (1983) Ghosh بيان کرد که فنل باعث کاهش تولید باروری ماهي و کاهش جمعیت شکمپایان و شیرونومیده ها می گردد.

در مجموع با توجه به نتایج حاصله و با در نظر گرفتن روند آلودگی نفتی دريای خزر (تمسكنی، ۱۳۷۷؛ تقی پور، ۱۳۷۷؛ حسبنی، ۱۳۷۹ و بذرافshan، ۱۳۷۳) لزوم پيشگيري آلودگيهای نفتی اين دريای ضروري می باشد. ضمن اينکه پيشنهاد می گردد اثرات سميit ساير ترکيبات نفتی بر روی تاسماهی ايراني و همچنین اثر اين دو ترکيب نفتی بر روی دیگر ماهيان خاوياري و ماهيان استخوانی دريای خزر و حوضه آبريز آن مورد مطالعه قرار گيرد.

تشکر و قدردانی

از جناب آقای دکتر محمد پور کاظمی ریاست محترم مؤسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، جناب آقای دکتر محمود بهمنی معاونت محترم تحقیقاتی انتستیتو، جناب آقای مهندس حسین پرند اور ریاست محترم بخش اکولوژی انتستیتو، جناب آقای مهندس آخوندزاده ریاست محترم کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری سد سنگر رشت، سرکار خانم مهندس فاطمه شریعتی، سرکار خانم ها مهندس عما ارشد، مهندس فربیبا کشور دوست، مهندس طوارت محسنیان، ناهید کاظمی و صفیه علیپور و جناب آقای شهرام شفیعی بدلیل مساعدتهای بیدریغ شان نهایت قدردانی و سپاس را داریم.

منابع

- اسماعیلی، ع.، ۱۳۷۹. مبانی مدیریت کیفی آب در آبریز پروری. انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران. صفحات ۱۳۱ تا ۱۳۰.
- بذرآفشن، ع.، ۱۳۷۳. بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و آلودگیهای نفتی در بخش جنوب شرقی دریای خزر (قبل از حفاری چاههای نفت). پایان نامه کارشناسی ارشد آلودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دربند، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال.؟.
- پژند، ذ.، ۱۳۷۸. بررسی تعیین غلظت کشندگان (LC50 96h) سوموم حشره کش دیازینون و علف کش بوتاکلر بر روی دو گونه از ماهیان خاویاری (تاسماهی ایرانی و ازون برون). پایان نامه کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان. ۹۹ صفحه.
- تقی پور، و.، ۱۳۷۷. تعیین بار آلودگی سواحل جنوبی دریای خزر نسبت به ترکیبات فنلی. پایان نامه کارشناسی ارشد آلودگی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. ۹۴ صفحه.
- تمسکنی، م.ر.، ۱۳۷۷. استفاده از روش اسپکتروفوتومتری برای شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات فنلی موجود در آب خلیج گرگان. پایان نامه کارشناسی ارشد آلودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی دربند، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. صفحات ۴ تا ۵۰.
- ثنایی، غ.، ۱۳۷۶. سمشناسی صنعتی. انتشارات دانشگاه تهران. جلد دوم، صفحات ۶۱ تا ۹۵.
- حسنی، س. الف.، ۱۳۷۹. بررسی کیفی هیدروکربن هایی نفتی (PAHs) در آب اسکله صیادی-تجاری بندر انزلی. پایان نامه کارشناسی ارشد آلودگی دریا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. ۱۱۲ صفحه.
- سکری، م.، ۱۳۷۸. تعیین میزان LC50 96h سوموم علف کش رنستار و ریلوف - اج بر بچه ماهیان تاسماهی ایرانی و ازون برون. پایان نامه کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان. ۷۲ صفحه.

سکری، م. ، ۱۳۷۸. تعیین میزان ۹۶h LC50 سوم علفکش رنستار و ریلوف - اچ بر بجه ماهیان تاسماهی ایرانی و ازونبرون. پایان نامه کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان. ۲۲ صفحه.

شریعتی، ف. . ۱۳۸۰. تعیین ۵۰ LC50 فل و ۱ - نفتول و قارچکش هینوزان بر روی بجه ماهیان سیم، سفید و کپور نقره‌ای. پایان نامه کارشناسی ارشد، آبودگی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ۱۹۰ صفحه.

عباسی، ک. : ولی بور، ع. ر. : طالبی حقیقی، د. : سرپناه، ع. ن. و نظامی، ش. ع. ، ۱۳۷۸
اطلس ماهیان ایران، آبهای داخلی گیلان. انتشارات مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان. صفحات ۱۵ تا ۲۵.

نظامی، ش. ع. : پژند، ذ. : خارا، ح. و کشور دوست، ف. ، ۱۳۸۳. تعیین ۹۶h دو سم ساترن (Acipenser persicus) و مالاتیون (حشره‌کش) بر روی بجه ماهیان تاسماهی ایرانی (علفکش) و مالاتیون (حشره‌کش) بر روی بجه ماهیان تاسماهی ایرانی (A. persicus) (علفکش) و مالاتیون (حشره‌کش) بر روی بجه ماهیان تاسماهی ایرانی (A. persicus) مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست. شماره ۲۰، بهار ۱۳۸۳. صفحات ۱ تا ۱۱.

Cajaraville , M.P. ; Recio, A. ; Saez, V. and Marigomez, J.A. , 1998. Acute toxicity of two hydroxylated hydrocarbons to the prosobranch gastropod *Littorina littorea*. Topics in Marine Biology. Proceeding of the 22nd European Marine Biology Symposium. Ros, (ed). Barcelona spain Inst. DF. Ciencias. DEL. Mar. Vol. 53, No. 2-3, pp.745–748.

Changon, N. and Lohowskyi, I. , 1989. Effects of phenol exposure on the thermal tolerance ability of the centroller minnow, Bull. Environ. Contam. Toxicol. Vol. 42, No.4, pp.614–619.

Crookes, M.J. and Howe, P. , 1996. Environmental hazard assessment phenol, Toxic substances division. Department of the Environment. Landon. TSD. pp.25, 95.

Ghosh, T.K. , 1983. Effect of phenol on aquatic life. Environ. Ecol. 1983. Vol. 1, No. 1, pp.1–3.

Jiang, L.F. and Cao, C.H. , 1995. The toxicity of phenol on fish under different temperatures. Journal of Fish China shuchan xuebao. Vol. 9, No. 3, pp.223–230.

Korn, S. ; Rice, S.D. ; Cheatham , D . L and Brown, D.W. , 1985. Contribution of phenol and P- cresol to the toxicity of crude oil to pink salmon (*Oncorhynchus gorbuscha*) fry and Kelp shrimp (*Eualus suckleyi*). Marine pollution and physiology: Recent advances. Vernberg, F.J. ; Thurberg, F.P. ; Calabrese, A. Vernberg, W.B. (eds). No.13, pp.447–458.

- Oksama, M. and Kristoffersson, R. , 1979.** The toxicity of phenol to *Phoxinus phoxinus*, *Gammarus duebeni* and *Mesidotea entomon* in brackish water. Ann. 200 L. Fenn. Vol. 16, No. 3. pp.209–216.
- Ravichundran, S. and Midhua, S. K. , 1994.** Impact of phenol on protein metabolism in the freshwater fish *Oreochromis mossambicus*. Journal of Ecotoxicol. Environ. Monit., Vol. A, No.1, pp.33–38.
- Svobodova, A.R. ; Liroyd, J. and Machova, J. , 1993.** Water quality and fish health. FAO. pp.27–28, 32.
- Tilak, K. ; Mohanarange-Rao, D. ; Priyam vada-Devi, A. and Murty, A.S. , 1981.** Toxicity of carbaryl and 1-naphthol to four species of freshwater Fish. Journal of Biosci. Vol. 3, No. 4, pp.457–461.
- Tilak , K.S. , 1982.** Relative toxicity of carbaryl, 1-naphthol and three formulations of carbaryle to *Channa punctata* (Bloch). Matsya. No. 8, pp.45–47.
- TRC, 1984.** OECD guideline for testing of chemicals. Section 2. Effects on biotic systems. pp.1–39.

Determining the lethal concentration (LC_{50} 96h) of Phenol and 1-Naftol for *Acipenser persicus* fingerlings

Nezami Sh.⁽¹⁾ ; Padjand Z. ⁽²⁾ ; Khara H. ⁽³⁾ and Afsordeh A. ⁽⁴⁾

1,3,4- Islamic Azad university, P.O.Box: 1616 Lahijan Iran

2 – International Sturgeon Research Institute, P.O.Box: 41635-3464

Rasht, Iran

Received: January 2004

Accepted: January 2005

Keywords: Persian sturgeon, *Acipenser persicus*, Phenol, 1-Naphthol, LC_{50}

Abstract

The toxic effects of the oil products Phenol and 1-Naftol on fingerlings of the Persian sturgeon were studied in 2003. We carried out five treatments with three replicates and one control for each of the chemicals using the static O.E.C.D. method in 20 liter aquariums each containing 10 fingerlings. During the experiments, the average pH was recorded as 7.2, total hardness was measured to be 194 mg/l, average water temperature was 25.1 degrees centigrade and dissolved oxygen was 7.2 mg/l.

Using the Probit Analysis procedure, we found that the LC_{50} 96h of the Phenol and 1-Naftol for fingerlings of the Persian sturgeon was 36.65 and 1.32 mg/l respectively. We determined the maximum allowable concentration of the Phenol and 1-Naftol for the fingerlings of the Persian sturgeon to be 3.66 and 0.13 mg/l respectively.