



تعیین میزان جیوه...

دکتر غلامرضا امینی رنجبر
همایون حسین زاده صحافی
موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران



تعیین میزان جیوه

در کوسه‌ماهی گونه *Carcharhinus dussumieri*

در خلیج فارس

چکیده:

یکی از منابع مهم اقتصادی در خلیج فارس و دریای عمان ماهیهای غضروفی بویژه کوسه ماهیها می‌باشند که با تنوع قابل ملاحظه‌ای (در حدود ۵۰ گونه) در این منطقه یافت می‌گردند. از جمله مهمترین مسائل که در ارتباط با بهره‌برداری از گوشت این گروه از آبزیان خلیج فارس می‌باشد تجمع زیستی جیوه در میان آنهاست. از این نظر در محدوده سواحل بندرلنگه به جمع آوری گونه *Carcharhinus dussumieri* پرداخته شد. نمونه‌های یافته عضلانی کوسه را در دستگاه انتیک ابسوریشن و با روش جذب اتمی بدون شعله. مورد آنالیز جیوه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آنالیز یافته عضلانی ۲۹ نمونه از گونه مورد نظر حاکی از آن است که میزان جیوه در نمونه‌های مورد آزمایش پایین تراز حد مجاز تعیین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی (5 ppm) است ($p < 0.01$). دامنه طولی گونه مورد نظر به تفکیک جنسیت به ترتیب $90-61$ برای ترها و $88-57$ برای ماده‌ها می‌باشد و میزان جیوه برای نمونه‌های نر ($n = 11$) مساوی 21 ppm و برای نمونه‌های ماده ($n = 8$) معادل $19\text{ ppm} \pm 0.01$ می‌باشد. میانگین جیوه در کل نمونه‌های صید شده $19 \pm 0.23\text{ ppm}$ برآورد گردیده است.

مقدمه:

یکی از منابع اقتصادی مهم در خلیج فارس و دریای عمان ماهیهای غضروفی بویژه کوسه ماهیها می‌باشند که با تنوع قابل ملاحظه‌ای (در حدود ۵۰ گونه) در این منطقه دیده می‌شوند.

صید این گونه جانوران نه تنها به عنوان منبع تأمین انرژی بلکه بصورت وزنه‌ای در جهت تعدیل اکوسیستم خلیج فارس مطرح می‌باشد. چراکه در طول سالهای گذشته بعلت عدم دستیابی به تکنولوژی صید و برخی مسائل فرهنگی صید این گروه از آبزیان بارکود قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته تنوع کوسه ماهیان بالغ بر ۳۵۰ گونه می‌باشند که از دیدگاه دیرین‌شناسی مربوط به ۴۰۰ میلیون سال پیش هستند. (compagno 1984). بیش از ۶۰٪ گونه‌های کوسه‌ماهیهای خلیج فارس و دریای عمان متعلق به یکی از ۸ راسته موجود در دنیا (Carcharhiniformes) می‌باشد. (حسین زاده ۱۳۶۹).

یکی از مهمترین مسائل در ارتباط با بهره‌برداری از کوسه‌ماهیها تجمع زیستی (Bioaccumulation) جیوه در بدن آنهاست. با توجه به اینکه تغییرات غلظت فلزات سنگین در سحیط‌های آبی اثرات زیستی قابل توجهی را بر روی موجودات آبزی بویژه انواع ماهیها پدید می‌آورد و با عنایت به تسلیل زنجیره‌های غذایی، در عالم موجودات زنده و ثبات و پایداری فلزات سنگین در بدن موجودات زنده و ثبات و پایداری فلزات سنگین در بدن موجودات زنده و انتقال آن به حلقه‌های بعدی زنجیره‌های غذایی تأثیر فلزات سنگین در حیات موجودات آبزی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به همین جهت تحقیقات بسیاری توسط دانشمندان "Anonm Galtieri et all. 1986" "conchie, 1988' was, 1987. 1988, 1990" okazakiet al. 1984, lyle" 1986" Andersen et al., 1974 " Hancock et all., 1977. Elrayis, 1986). خصوص میزان عناصر سنگین نظری روی، مس، کادمیوم، جیوه و سرب غیره ... بر روی انواع ماهیهای غضروفی صورت گرفته است.

با توجه به اینکه کوسه‌ماهیهای موجود در خلیج فارس می‌تواند به عنوان منبع پروتئینی قابل توجهی در جهت تأمین پروتئین اساسی مورد نیاز کشور و یا صادرات محسوب گردند و با در نظر گرفتن بهره‌برداری‌های متعددی که از اجزاء مختلف بدن گروهی از آبزیان صورت می‌پذیرد لزوم انجام یک سلسه تحقیقات بی‌گیر در این زمینه محسوس به نظر می‌رسد و در این راستا ضمن بررسی



تغیین میزان جیوه...


تنوع گونه‌ای از کوسه ماهیان در خلیج فارس (حسین زاده ۱۳۶۹). به تعیین ارزش غذایی و تغییرات فیزیکو شیمیایی ناشی از روش‌های مختلف عمل آوری و عمل بر روی یک گونه از کوسه ماهیهای خلیج فارس با نام علمی *Carcharhinus dussumieri* که از تراکم قابل ملاحظه‌ای در منطقه بوشهر تا بندر عباس برخوردار بوده پرداخته (حسین زاده ۱۳۷۰) و در کنار تحقیقات شیلاتی دریای عمان به بررسی فرآورده‌های گوشتی نظیر سوپسیس کوسه‌ماهی در مرکز تحقیقات شیلاتی دریای عمان به بررسی میزان جیوه دربافت عضلانی این گونه مبادرت ورزیدیم.

۳- ابزار و روش کار

گونه مورد بررسی *Carcharhinus Dussumieri* معروف به گونه پوزه سفید می‌باشد که توسط کشتی صیادی مجدهز به تور گوش گیر (GILLNET) در حد فاصل بندر حسینه تا غرب جزیره قشم در محدوده آبهای لنگه صید گردید. شناسائی گونه بر اساس کلیدهای ارائه شده توسط Compayno, 1984 (F.A.O. 1983) و Fisher (1984) صورت گرفت. نمونه پردازی بصورت سه تکراراز دو جنس نر و ماده و از بافت عضلانی در ناحیه پشتی، جانبی در طرفین محل الحقاق اولین باله پشتی برای هر جنس به مقدار ۱۰ گرم برای هر تکرار از عضلات سفید Fast ordinary muscle صورت گرفت. نمونه‌ها پس از توزین در داخل لوله‌های Gublet قرار گرفت و بوسیله ازت مایع متجمد و به سازمان انرژی اتمی ایران انتقال می‌یافتدند.

نمونه‌ها پس از آماده سازی به روش اسپکترو فتو متری جذب اتمی بدون شعله جهت تعیین مقدار جیوه در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. (Hancock et al., 1977 "Anderson el alo, 1974 " patel & chandy, 1988.

نقشه منطقه مورد مطالعه از نظر صيد نمونه ها





تعیین میزان جیوه

جدول ۱- نتایج حاصل از اندازه گیری میزان جیوه به همراهی مشخصات مر فومتریک در گونه
 (TL : طول بدن و Wt : وزن) *C. dussumieri*

Sample . No	تاریخ نمونه برداری	TL (Cm)	Wt . (g)	SEX	Mercury Mg/g (wet)
۱	۷۲,۵,۴	۷۶	۲۶۰۰	♀	۰,۰۶
۲	۷۲,۵,۴	۷۴	۱۲۵۰	♂	۰,۲۸
۳	۷۲,۵,۴	۷۵,۵	۲۴۰۰	♀	۰,۲۹
۴	۷۲,۵,۴	۷۷	۲۵۰۰	♀	۰,۳۴
۵	۷۲,۵,۴	۷۳,۵	۲۰۰۰	♂	۰,۱۶
۶	۷۲,۵,۴	۷۴	۲۰۰۰	♂	۰,۲۴
۷	۷۲,۵,۴	۷۸,۵	۲۷۰۰	♀	۰,۲۲
۸	۷۲,۵,۴	۷۴	۲۵۰۰	♂	۰,۲۸
۹	۷۲,۵,۴	۸۰,۵	۲۶۵۰	♀	۰,۲۴
۱۰	۷۲,۵,۴	۶۸	۱۷۰۰	♂	۰,۰۸
۱۱	۷۲,۵,۴	۶۷,۵	۱۵۰۰	♀	۰,۰۴
۱۲	۷۲,۵,۱۶	۷۲	۱۴۴۰	♂	۰,۱۲
۱۳	۷۲,۵,۱۶	۸۲	۲۹۰۰	♀	۰,۲۹
۱۴	۷۲,۵,۱۶	۸۲	۱۷۰۰	♀	۰,۲۱
۱۵	۷۲,۵,۱۶	۷۶	۲۷۰۰	♀	۰,۰۴
۱۶	۷۲,۵,۱۶	۷۳	۱۸۰۰	♀	۰,۱۹
۱۷	۷۲,۵,۱۶	۹۰	۲۷۰۰	♂	۰,۰۸
۱۸	۷۲,۵,۱۶	۸۴	۲۹۰۰	♂	۰,۴۶
۱۹	۷۲,۵,۱۶	۸۸	۲۷۰۰	♀	۰,۱۳
۲۰	۷۲,۵,۱۶	۸۲	۳۰۰۰	♀	۰,۱۶
۲۱	۷۲,۵,۱۶	۸۲	۳۶۰۰	♀	۰,۲۳
۲۲	۷۲,۵,۱۶	۸۰	۳۱۰۰	♀	۰,۱۵
۲۳	۷۲,۵,۱۶	۷۶	۲۵۰۰	♂	۰,۰۴
۲۴	۷۲,۵,۲۵	۸۲	۳۱۰۰	♂	۰,۴۲
۲۵	۷۲,۵,۲۵	۷۹	۲۵۰۰	♀	۰,۱۰
۲۶	۷۲,۵,۲۵	۸۱,۵	۳۰۰۰	♂	۰,۱۷
۲۷	۷۲,۵,۲۵	۸۰	۲۹۰۰	♀	۰,۰۶
۲۸	۷۲,۵,۲۵	۸۸	۳۱۰۰	♀	۰,۰۵
۲۹	۷۲,۵,۲۵	۸۶,۵	۳۰۰۰	♀	۰,۰۸




جدول ۲- میزان جیوه اندازه گیری شده در گونه مورد مطالعه و مقایسه با استانداردهای کشورهای مصرف کننده

C. dussumieri $X \pm SEM$	میزان جیوه در $X \pm SEM$	نام کشور	حد مجاز تعیین شده از سوی (PPm) مصرف کننده	P
۰,۱۹±۰,۰۲۳ (ppm)	آمریکا و استرالیا	۰,۵	<0,01	
۰,۱۹±۰,۰۲۳ (ppm)	کانادا	۰,۵	<0,01	
۰,۱۹±۰,۰۲۳ (ppm)	ژاپن	۰,۴	<0,01	
۰,۱۹±۰,۰۲۳ (ppm)	WHO	۰,۵	<0,01	
۰,۱۹±۰,۰۲۳ (ppm)	ایتالیا	۰,۷	<0,01	
۰,۱۹±۰,۰۲۳ (ppm)	سوئد و استرالیای جنوبی	۱	<0,01	

جدول ۳- نتایج حاصل از آنالیز جیوه به تفکیک جنسیت و میانگین وزنی و طولی

جنسیت	دامنه طولی (cm)	میانگین طولی (cm)	میانگین وزنی (g)	میانگین جیوه (Mg G-1 wet wt)
♂	۶۸-۹۰	۷۷,۱	۲۲۸۰	۰,۲۱
♀	۶۷,۵-۸۸	۷۹,۶	۲۵۴۳	۰,۱۹





نتیجه‌گیری و بحث

مدتهاست که اثرات مخرب جیوه در محیط‌های دریایی بویژه بر روی مصرف کنندگان آبزیان آلوهه مورد توجه قرار گرفته است. جیوه در بدن موجودات زنده بصورت متیل جیوه (Methyl mercury) تجمع یافته که این ترکیب به شدت آسیب رساننده بافت‌های عصبی و تخریب کننده روند تقسیم می‌توزد در سلولهاست (Andersen et al. 1974). مشخص شده است که جیوه بطور طبیعی از طریق فرسایش تدریجی قاره‌ها وارد محیط‌های آبی شده که این مقدار از طریق کارخانه‌های صنعتی تشدید می‌شود در واقع تنها پس از واقعه Minamata در ژاپن بود که توجه بشر به اثرات مخرب جیوه ناشی از مصرف آبزیان آلوهه شده جلب شد (Hancock et al. , 1977).

جیوه موجود در بدن کوسه ماهیها با سن جانور ارتباط مستقیم داشته و با افزایش اندازه فروزنی می‌باشد (Tariq 1992). مقدار جیوه نه تنها در بین گونه‌های مختلف متفاوت است بلکه در میان افراد متعلق به یک گونه نیز تفاوت دارد. به همین جهت اغلب کشورها دستورالعمل‌هایی را جهت کاهش میزان جیوه و یا حداقل میزان مجاز قابل مصرف اعمال نموده‌اند (Kreuzer, 1987). مشخص شده است که جیوه معدنی توسط باکتریهای موجود در بین رسوبات دریایی به فرم متیل جیوه در می‌آید (در شرایط هوایی یا بی‌هوایی) و در نتیجه ترکیب آنی جدید در زنجیره غذایی وارد می‌شود و در نهایت در بدن بسیاری از ماهیها تجمع می‌باشد (Friberg & Vos-tallou 1974)، متیل جیوه برای پستانداران بسیار سمی است زیرا تمایل زیادی به ایجاد پیوندهای کرووالانسی با آنزیمهای داشته و در چربی قابل حل می‌باشد توجه اثرات سمی متیل جیوه در ژاپن و همچنین کشف مقادیر زیاد این ترکیب در پرنده‌گان ماهی خوار سوئیس که عمده‌تاً ناشی از فضولات صنعتی بود منجر به الزام دولت‌ها جهت انجام آزمایشات مربوطه بر روی ماهیها و آبهایی که در آن پرورش داده می‌شوند شده است. متیل جیوه در چربی بدن به خوبی حل و ذخیره می‌گردد و چنانچه غلظت آن از 5 ppm / تجاوز کند باعث ضایعات عصبی، اختلال در سیستم کوروموزومی، لطمہ زدن به کلیه‌ها و روده، دستگاه بینایی و شنوایی و عدم تعادل می‌شود.

(Friberg & Vostal 1974) - (پیات ۱۳۶۸)

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میزان جیوه در بین نمونه‌های متعلق به گونه مورد مطالعه در سطح پایین تر از حد مجاز تعیین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی است.

مقایسه میزان جیوه در بافت عضلانی گونه مورد مطالعه با حد مجاز تعیین شده از سوی برخی از کشورهای مصرف کننده و همچنین مشخص کننده آن است که این گونه قابلیت عرضه به بازارهای



کشورهای مورد مصرف را دارد. جدول ۲ به مقایسه میزان جیوه در بافت عضلانی گونه مورد نظر و حمله تعیین شده از سوی کشورهای مصرف کننده پرداخته است.

کوسه ماهیان به دلیل ویژگی طول عمر زیاد تراکم بالاتری از جیوه را در میان سایر ماهیها دارا می باشند که این تراکم با اندازه بدن کوسه نسبت مستقیم دارد. از این نظر امروزه کشورهای مختلف بسته به شرایط حد مجاز خاصی را که مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز می باشد برای جیوه ذخیره شده در گوشت کوسه ماهیها در نظر می گیرند. برای مثال آنچه که توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه شده است در حد 5PPM می باشد لیکن در استرالیا جنوبی، آلمان، انگلیس و تاسمانیا این مقدار 1ppm ، در ایتالیا 7ppm و در آمریکا و کانادا 5ppm می باشد.

(Lyle & Timms 1984; Kreuzer, 1978)

در مجموع میزان جیوه ذخیره شده در بدن کوسه ماهیان را در رابطه با جنسیت، اندازه بدن و گونه مورد نظر می دانند. در تحقیقات انجام شده در استرالیا محققین بی برده اند که میزان جیوه در کوسه ماهیهای نر بیشتر از انواع ماده می باشد.

نتایج حاکی از آن است که اختلاف معنی داری مابین استاندارد تعیین شده در کشور ژاپن (4ppm) و میانگین جیوه موجود در کوسه مطالعه (19ppm) وجود دارد. همچنین مقایسه میزان جیوه با حد تعیین شده از سوی WHO نیز نشان می دهد که در 10ppm (احتمال ۹۹/۹۹) اختلاف معنی دار بوده و میزان آن بسیار کمتر از استاندارد تعیین شده جهانی می باشد.

قابل توجه است که اندازه کوسه های مورد مطالعه بر اساس پژوهش های صورت گرفته در حد تنهایی رشد بوده (Compagno 1984) و با عنایت به این که عمدۀ صید این گونه کوسه ماهی را این محدوده طولی (70-90 Cm) تشکیل می دهنده می توان تیجه گرفت که حد نهایی جذب جیوه با توجه به فصل مطالعه و شرایط کنونی در منطقه مورد مطالعه 55ppm می باشد و این در حالی است که رابطه مستقیمی مابین میزان جذب و طول، وزن بدن و سن جانور وجود دارد. معهدها زدودن جیوه از گوشت کوسه ماهیان به عنوان راهی جهت استفاده بهتر از پروتئین ماهیان مطرح گردیده است که پروسه برداشت به این شرح می باشد. (Okazaki et al. 1984)

گرچه ارتباط میان اندازه و میزان جیوه جذب شده روشن گردیده است لیکن لازم است مطالعات کاملتری در خصوص رابطه بین جنسیت، سن کوسه و میزان جیوه صورت پذیرد. همچنین مطالعات مشابه در سایر نواحی خلیج فارس می تواند تکمیل کننده تحقیق حاضر باشد.

تشکر و قدردانی:

نویسنده‌گان مراتب قدردانی و تشکر خود را از خدمات و راهنمایی‌های جناب آقای دکتر امیر هوشنگ نژاده و مهندس پیمان روستائیان اعلام داشته برو خود لازم می‌دانند از مسئولین محترم مرکز تحقیقات شیلاتی خلیج فارس تشکر نمایند. در خاتمه از همکاران ارجمند در شرکت کارشیار ایران وابسته به سازمان انرژی اتمی که در آنالیز نمونه‌های جیوه همکاری نموده اند سپاسگزاریم.

متابع و مأخذ:

بیات، ایرج و جمال رئوفی، ناهید: ۱۳۶۸: تعیین جیوه در ماهی و سایر مواد

زیست شناختی: سازمان انرژی اتمی واحد پسمانداری

حسین زاده صحافی، همایون: ۱۳۷۱: تعیین ارزش غذایی و بررسی برخی تغییرات فیزیکوشیمیایی در بافت عضلانی یک گونه ماهی در خلیج فارس *Carcharhinus duosmieri*: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

حسین زاده صحافی، همایون: ۱۳۶۹: شناسایی و بررسی بیولوژیک کوسه ماهیان خلیج فارس و دریای عمان: انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

مخیری‌بابا، اعتماد اسمائیل: ۱۳۶۹: ماهیان خلیج فارس

ترجمه هـ. بگلواه- لوپتن: انتشارات دانشگاه تهران



Anderson A.T., B.B. Nee Takantan ; 1974; mercury in some murine organisms from the ostofjord; Norw j. zool, 22:231-235.

Anon, 1986. Bio-magnifications of total mercury in bahia Blana Estuary., mar. pollar. Bull. Vol 17 No.4.

Compagno, L. J. V. 1984. Sharks of the world, FAO fisheries synopsis No. 125: Vol 4 part 1 & 2.

Conchie D. M. , A. W. Mann, M. J. Lintern, D. Longman. , 1988. mercury metal in marine biota, sediments and waters from the shar Bag area in wesien Australia. , J. coast. Res. vol. 4 No 1

Friberg. L. J. vostal. , 1974. , Mercury in the environment. , CRC press ine. pp: 110-168.

Caltieri A. , G Natoli, A Lama; 1986. , I Solation and characterization of cu, zn sape-roxide dismutase of the shark prionace glauca. , comp. Biochem. Physiol. , Vol. ss B. No; 3, Ip. 555-559.

Hancock D. A, j. s. Bdmollps, J. R Edinger. 1977. Mercury in shark in western Australia fish. Res. Bull. west. Aust. 18, 1-21.

Hight, S. C. , 1987. , Rapid Derermination of methyl mercury in fish and shellfish. , collaborative study. , J. Assoc. off. Aanl. chem. , vol 70; No 4.

Lyle J. M. , R. R. pyne. 1. Hooper, S. L Craaker; 1984; A preoavatory Evaluation of the Ocerelopment of an shark fishing industry In Northern Territory waters; Dep.



prim. prod. , fishery report VOL 1, No, 12

Okazaki B. , k. Ramma. T. Kakuchi; 1984. Esmination of meraury from shark flesh,
Bull, Tekai, fish, Res. lab. No. 114.

Oreilly, J. E. , 1982. , Gasehremtojalhic Determination Gaschromatographic of methyl
and ethyl mercury. , Y. Chromatography Vol. 238: pp. 433-444.

Patel, B. , j. p. Chandy. , 1988. , mercury in the Biotic & Abiotic matrices along Bom-
bay coast. , indian Jurunl of Harin ences, vol. 17. pp 55-58.

Vas, P. , Y. Sterens. C. A. Bonwicki. , 1990. Cd, Mn, and zn coneaterations in Verlel-
rue of Blue shark and shortfin mako. , Mar. Pollut, Vol. 21, No. 4, pp 203-206.

Vas p. , 1987. , Obserration of trace metal concntrationa in a Carcharhind shark Galeorh-
inus galeus from Liverpool. B lar. pollut. Bull. , Vol. 18. No.4.

Vas, P. Gordon S. D. 1988. , Trace metal Concentrations in the seGliomnid shark Gale-
us Melastomus from The Rockall trought. , MAR. Pollut. Bull., Vol. 19, No. 8.
pp. 390-398.

Tariq. J, Jaffar M., Ashraf M. ; (1992) Relation ship between mercwy coocent ratien and
leighth, weight and sea of Two sprinid fish; fisheries reseawch 14. pp 335-341