

شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار استان هرمزگان

محمدامین سلطانی پور^۱ و پرویز باباخانلو^۲

e-mail: masoltanipoor@yahoo.com

۱- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

۲- عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار استان هرمزگان از سال ۱۳۷۴ به مدت دو سال در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان انجام شد. با استفاده از منابع موجود و افراد آگاه و مطلع نسبت به جمع‌آوری گیاهان اسانس دار استان اقدام و اطلاعاتی از قبیل نام فارسی، نام محلی، نام علمی، نام خانواده، محل پراکنش، وضعیت رویشگاه، ارتفاع از سطح دریا، اقلیم، متوسط بارندگی سالانه و درجه حرارت متوسط محل رویش و گیاهان همراه برای کلیه گیاهان یادداشت گردید. در پایان بررسی در مجموع ۱۱۳ گونه مربوط به ۷۰ جنس و ۳۱ خانواده شناسایی گردید که تعداد ۸۰ گونه بومی استان و تعداد ۷۹ گونه دارای استفاده‌های درمانی رایج و سنتی بودند. این گیاهان در مناطق مختلف ساحلی، استپی گرم شمال و ارتفاعات و کوه‌های بالتبه بلند استان از ارتفاع ۱۰ تا ۳۰۰۰ متر از سطح دریا در اقلیم‌های مختلف گرم و نیمه خشک، گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و خشک بیابانی و گرم و خشک، با متوسط بارندگی ۱۵۰-۳۰۰ میلیمتر و درجه حرارت متوسط ۲۷/۵ - ۱۷/۵ درجه سانتیگراد پراکنش دارند. تعداد ۲۶ گونه از گیاهان اسانس دار استان به شکل درخت، ۹ گونه حالت درختچه‌ای، ۲۴ گونه حالت بوته‌ای و ۵۴ گونه به شکل علفی دیده می‌شوند. تعداد ۳۱ گونه از این گیاهان از گونه‌های دارویی پر مصرف در بین مردم هستند، تعداد ۱۵ گونه در منابع به آنها اشاره نشده یا کمتر به آنها اشاره شده است و تعداد ۱۲ گونه به صورت سنتی به کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان صادر می‌شود.

واژه‌های کلیدی: اکولوژی، گیاهان اسانس دار، استان هرمزگان

آیند (رضایی و جایمند، ۱۳۸۰). اسانسها و ترکیب‌های آنها

به طور مستقل در صنایع مختلف مصارف زیادی دارند. به علت مصارف زیاد اسانسها روز به روز صنعت استخراج این مواد گسترش یافته است، به طوری که سالانه بیش از ۲۰ میلیون کیلوگرم انواع اسانس از گیاهان استخراج می‌نمایند. از آنجایی که اسانس‌هایی که از طریق مصنوعی تهیه می‌شوند از لحاظ مرغوبیت و لطافت با اسانس‌هایی که منشاء طبیعی دارند قابل قیاس نیستند، بنابراین توجه خیلی زیادی به گیاهان اسانس دار شده است (رضایی و جایمند، ۱۳۸۰). این بررسی با هدف دستیابی مستقیم به نمونه‌های هرباریومی و شناسایی شده گیاهان اسانس دار استان، دستیابی به اطلاعات کامل در زمینه

مقدمه

اسانسها طبقه‌ای از روغن‌های گیاهی هستند که از مخلوط ترکیب‌های شیمیایی آلی فرار، سنگین و چرب تشکیل یافته‌اند و مسئول بوی خوش یا مزه در گیاه می‌باشند. در گیاهان تیره نعناعیان روغن‌های فرار در تارهای ترشح کننده، در تیره فلفل در سلولهای پارانشیم، در تیره چتریان در لوله‌های روغنی، در تیره های کاج و مرکبات در مجراهای لیزیژن و شیزوژن و در تیره گلسرب در گلبرگها وجود دارند. دانشمندان معتقدند که این مواد ممکن است یا به طور مستقیم از تغییرات پرتوپلاسم، یا در اثر تجزیه شدن لایه‌های رزینی شده دیواره سلولی و یا در اثر هیدرولیز بعضی از گلیکوزیدهای مشخصی بوجود

شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان انسانس دار استان هرمزگان

و منابع موجود گیاهان را شناسایی و جهت تأثیر نهایی به بخش گیاه شناسی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع انتقال یافت. برای کلیه گیاهان نام علمی، نام فارسی، نام خانواده، مشخصات اقلیمی همراه با سایر مشخصات فوق ثبت و نوشته شد. برای ثبت مشخصات دارویی گیاهان علاوه بر اطلاعات محلی از کتابهای گیاهان دارویی (زرگری، ۷۰-۱۳۶۴)، معارف گیاهی (میرحیدر، ۱۳۷۳)، گیاهان دارویی سنتی ایران (امین، ۱۳۷۰) و پژوهشی سنتی مردم ایران (افشار، ۱۳۷۰) استفاده گردید. تعیین اقلیم مناطق پراکنش گیاهان با استفاده از نقشه‌های هم‌اقلیم جاماب به مقیاس یک میلیونیم بر اساس روش دو مارتین انجام شده است. همچنین متوسط بارندگی سالانه و درجه حرارت متوسط آنها نیز بر اساس نقشه‌های خطوط هم باران و هم دما به همین مقیاس تهیه شد.

نتایج

در این بررسی ۱۱۳ گونه انسانس دار از استان هرمزگان شناسایی شد که ۸۰ گونه به صورت بومی در استان رویش دارند. در جدول ۱ نام فارسی، نام محلی، نام علمی، نام خانواده و فرم رویشی آنها نشان داده شده است. تعداد ۷۹ گونه دارای مصارف درمانی سنتی هستند. گیاهان انسانس دار استان مربوط به ۷۰ جنس و ۳۱ خانواده بودند که بیشترین تعداد گونه‌ها به ترتیب در خانواده‌های Labiateae با ۲۷ گونه، Compositae با ۱۵ گونه و Umbelliferae با ۱۴ گونه و در جنس‌های Salvia و Citrus با ۷ گونه و Anthemis و Nepeta با ۵ گونه قرار دارند. ۱۶ خانواده دارای یک گونه، ۴ خانواده دارای دو گونه، ۴ خانواده دارای سه گونه، ۳ خانواده دارای چهار گونه و یک خانواده به ترتیب دارای نه، چهارده، پانزده و بیست و هفت گونه می‌باشند (جدول ۲). ۳۳ گونه انسانس دار استان غیربومی بوده که از سالیان پیش در استان کاشته شده و می‌شوند (جدول ۳). همچنین تعداد ۲۶ گونه از گیاهان انسانس دار استان به فرم درخت، ۹ گونه حالت

گیاهان انسانس دار مورد مصرف و چگونگی مصارف آنها، بررسی برخی ویژگیهای اکولوژیک گونه‌ها، برنامه ریزی جهت شناسایی ترکیبیهای شیمیایی، کشت، پرورش و اهلی کردن آنها و در نهایت ارزیابی ذخایر صورت گرفت.

در استان هرمزگان بیش از ۹۳۵ گونه گیاهی پراکنش دارد که شامل رویشهای دریایی، ساحلی، بوته زارهای استپی و پوشش کوهستانهای مرفوع می‌باشد و تعداد ۲۹۲ گونه دارویی هستند (سلطانی‌پور، ۱۳۷۸). مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع طرح ملی شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان انسانس دار ایران را به اجرا درآورده و در راستای آن مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استانها بررسیهایی انجام داده‌اند. در استان کرمان تعداد ۱۳۰ گونه انسانس دار و معطر (صابرآملی، ۱۳۸۰)، در استان مازندران تعداد ۳۶ گونه مهم انسانس دار از خانواده نعناع (قلیچ نیا، ۱۳۷۷)، در منطقه قمصر کاشان تعداد ۱۵ گونه بارز انسانس دار (بتولی، ۱۳۸۰)، در مناطق شمالی و شرق استان خوزستان تعداد ده گونه مهم انسانس دار (هویزه، ۱۳۸۰)، در استان تهران ویژگیهای اکولوژیک همچون محل پراکنش، ارتفاع سطح دریا، جهت شب، جنس خاک، حوزه آبخیز، تیپ، گونه‌های همراه و نقشه پراکنش چهارده گونه انسانس دار (نجف پورنوایی، ۱۳۷۹) و در استان کردستان چهار جنس گیاه انسانس دار معرفی و از نظر اکولوژی بررسی شده‌اند و عوامل محدوده کننده اکولوژیکی آنها را بر شمرده‌اند (حسنی، ۱۳۸۰).

مواد و روشها

روش بررسی بدین صورت بود که از طریق مسافرت به مناطق مختلف استان و مراجعه به افراد آگاه و مطلع و با کمک راهنمایان محلی گیاهان انسانس دار هر منطقه جمع‌آوری و جهت شناسایی به هریاریوم مرکز منتقل شد. اطلاعاتی از قبیل نام محلی، مشخصات رویشگاه، گیاهان همراه، ارتفاع از سطح دریا و محل جمع‌آوری نیز برای هر کدام از گونه‌ها یادداشت گردید. با استفاده از هریاریوم

گیاهان از گونه های دارویی پر مصرف در بین مردم هستند (جدول ۵)، تعداد ۱۶ گونه در منابع به آنها اشاره نشده یا کمتر به آنها اشاره شده است (جدول ۶)، ضمن آنکه تعداد ۱۲ گونه به صورت سنتی به کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان صادر می شود (جدول ۷). مشخصات اقلیمی و رویشگاهی چون اقلیم، درجه حرارت، بارندگی، ارتفاع از سطح دریا، محل رویش و گیاهان همراه این گیاهان در جدول ۸ نشان داده شده است.

در ختچهای، ۲۴ گونه حالت بوتهای و ۵۴ گونه به فرم علفی دیده می شوند. برگ، ساقه، گل، میوه، بذر، ریشه، شیرابه و صمع اندام های مورد مصرف گیاهان دارویی هستند. به طور کلی اندام مورد مصرف در ۴۷ گونه برگ، ۶ گونه ساقه، ۸ گونه ریشه، ۱۳ گونه گل، ۱۳ گونه میوه، ۶ گونه بذر، ۴ گونه صمع، ۴ گونه ساقه زیرزمینی، ۸ گونه اندام های هوایی و ۱۰ گونه کلیه قسمتهای گیاه می باشد. ترکیبیهای شیمیایی تعداد ۴۱ گونه از این گیاهان تاکنون شناسایی شده است که ترکیبیهای شاخص آنها در جدول ۹ نشان داده شده است. تعداد ۳۱ گونه از این

جدول ۱ - اسامی علمی، خانواده، فارسی، محلی و فرم رویشی گیاهان اسانس دار بومی استان هرمزگان

اسم علمی	خانواده	اسم فارسی	اسم محلی	فرم
Achillea eriophora	Compositae	بنجراشک، سرزرد	سرزرد	علفی
Achillea wilhelmsii	Compositae	بومادران	سرزرد، سرزرد	علفی
Adianthum capillus-veneris	Adianthaceae	پرسیاوش	لوکمی، گیس پری، سهلنگ	علفی
Anthemis austro-iranica	Compositae	نوعی بابونه	-	علفی
Anthemis mirheydari	Compositae	نوعی بابونه	-	علفی
Anthemis odontesephana	Compositae	نوعی بابونه	-	علفی
Anthemis psuedocotula	Compositae	نوعی بابونه	-	علفی
Anthemis rhodocentra	Compositae	نوعی بابونه	-	علفی
Anvillea garcinii	Compositae	سنداشی	-	بوتی ای
Artemisia aucheri	Compositae	نوعی درمنه	دریم کوهی	بوتی ای
Artemisia scoparia	Compositae	نوعی درمنه	سلبکو، مولنگ، ام ایلد	بوتی ای
Artemisia sieberi	Compositae	درمنه	دریم، دریمن	بوتی ای
Asphodelus tenuifolius	Liliaceae	-	پی ماوک، نازوک، موکل	علفی
Bunium persicum	Zizirah	زیره	-	علفی
Capsella bursa-pasteris	Cruciferae	کیسه کشیش	-	علفی
Cassia italica	Senna	سنا	کوسن، حشی، کروسه، اشونگنه	بوتی ای
Cleome brachycarpa	Capparidaceae	نوعی علف مار	روزگردش، بلبا، گلزاری، گله پار	علفی
Cleome oxyptala	Capparidaceae	نوعی علف مار	روزگردش، بلبا	علفی
Cleome delichostyla	Capparidaceae	نوعی علف مار	روزگردش	علفی
Cleome quinquenervia	Capparidaceae	نوعی علف مار	روزگردش	علفی
Cymbopogon olivieri	Gramineae	ناگرد	ناغرد، ماده، زغبر، پاشام	بوتی ای
Cynodon dactylon	Gramineae	منغ	مور، مرغ	علفی
Cyperus rotundus	Acyperaceae	اویارسلام	-	علفی
Dalbergia sisso	Papilionaceae	شیشم	چک	درخت
Descurainia Sophia	Cruciferae	خاکشیر	خاکشیر	علفی
Dionysia revoluta	Primulaceae	-	اسفندمحمدی، گورزی، گازبر	علفی
Ducrosia anethifolia	Umbelliferae	مشک بو	می یل، بزپاس، بوغیس، گارک	علفی
Eruca sativa	Compositae	منداب	کهکز	علفی
Ferula assa-foetida	Umbelliferae	آنفوزه	انگر، انگر، پترک، خیل، هنگ	بوتی ای
Francoeuria undulata	Compositae	کک گریز	پرز، تهره	علفی
Fumaria parviflora	Fumariaceae	شاہتره	شاہتره	علفی
Gailonia aucheri	Rubiaceae	-	توسو، تی تیسکو، کرتس	درختچه
Geranium rotundifolium	Geraniaceae	-	سوزنبو	علفی
Gontscharovia popovii	Labiatae	-	اوشن استکو	بوتی ای

شناسایی و بررسی اکولوژیک
گیاهان اساتس دار استان هرمزگان

نام علمی	خانواده	اسم فارسی	اسم محلی	فرم
<i>Haplophyllum canaliculatum</i>	Rutaceae	ساراگنا، گناوه	علفی	
<i>Haplophyllum tuberculatum</i>	Rutaceae	ساراگنا، سرو، هدو، گناوه	علفی	
<i>Juniperus excelsa</i>	Cupressaceae	اورس، گزکوه، هورس	درخت	
<i>Lagoecia cuminoides</i>	-	-	علفی	
<i>Lallemandia royleana</i>	Umbelliferae	-	علفی	
<i>Lavandula stricta</i>	Labiatae	بالنگو	علفی	
<i>Matricaria recutita</i>	Labiatae	اسطوخدوس	اسطوخدوس	بوته ای
<i>Mentha longifolia</i>	Labiatae	بابونک	بابونه	علفی
<i>Mentha mozaffarianii</i>	Labiatae	پودن، پودنه، پده	پونه	بوته ای
<i>Nepeta bracteata</i>	Labiatae	پودن کوهی	پونه کوهی	بوته ای
<i>Nepeta cataria</i>	Labiatae	-	نوعی پونه	علفی
<i>Nepeta depauperata</i>	Labiatae	-	نوعی پونه سا	علفی
<i>Nepeta glomerulosa</i>	Labiatae	-	نوعی پونه سا	علفی
<i>Nepeta ispahanica</i>	Labiatae	-	نوعی پونه سا	علفی
<i>Ochradenus aucheri</i>	Resedaceae	شعع	-	بروته ای
<i>Olea ferruginea</i>	Oleaceae	زیتون کوهی، هیر	زیتون	درخت
<i>Perovskia artemisioides</i>	Labiatae	-	برازمبل	علفی
<i>Pimpinella affinis</i>	Umbelliferae	-	-	علفی
<i>Pimpinella barbata</i>	Umbelliferae	-	-	علفی
<i>Pimpinella eriocarpa</i>	Umbelliferae	-	-	بوته ای
<i>Pistacia atlantica</i>	Anacardiaceae	بنه، گن، تاراش، گل به، برکو	بنه	درخت
<i>Pistacia khinjuk</i>	Anacardiaceae	کسور، کسوردنگ، کوهنگ	خنجکی	درخت
<i>Platychaete aucheri</i>	Compositae	بوئنگ	-	بوته ای
<i>Pycnocycla aucherana</i>	Umbelliferae	سگ دندان	-	بوته ای
<i>Pycnocycla bashagardiana</i>	Umbelliferae	سگ دندان	-	بوته ای
<i>Pycnocycla nodiflora</i>	Umbelliferae	سگ دندان	-	بوته ای
<i>Reseda aucheri</i>	Resedaceae	گرروز، دون اشترو	ورث	علفی
<i>Salvia aegyptiaca</i>	Labiatae	شرتی، برهی، دون سیاه	مریم گلی	علفی
<i>Salvia compressa</i>	Labiatae	مرمزشک	نوعی مریم گلی	علفی
<i>Salvia macilenta</i>	Labiatae	-	نوعی مریم گلی	علفی
<i>Salvia macrosiphon</i>	Labiatae	-	نوعی مریم گلی	بوته ای
<i>Salvia mirzayanii</i>	Labiatae	-	نوعی مریم گلی	بوته ای
<i>Salvia santolinifolia</i>	Labiatae	مور تاخ، مورپرزو، شیرغم	نوعی مریم گلی	بوته ای
<i>Salvia sharpii</i>	Labiatae	-	نوعی مریم گلی	بوته ای
<i>Stachys inflata</i>	Labiatae	بروز، بروج، ببریز، مرمزشک	بولک	علفی
<i>Teucrium orientale</i>	Labiatae	مورخری	نوعی مریم نخدوی	بوته ای
<i>Teucrium polium</i>	Labiatae	گل ماش	مریم نخدوی	علفی
<i>Teucrium scordium</i>	Labiatae	کلپوره، کریشک، کلپورغ	نوعی مریم نخدوی	علفی
<i>Teucrium stocksianum</i>	Labiatae	-	نوعی مریم نخدوی	علفی
<i>Tribulus terresteris</i>	Zygophyllaceae	کریشک آزاد، کریشک کوهی	خارخشک	بوته ای
<i>Vitex agnous- castus</i>	Verbenaceae	خارخشک، نالوک، گل زردخاری	بنگله، بنگلا	درختچه
<i>Vitex negundo</i>	Verbenaceae	-	بنگلا	درختچه
<i>Vitex trifolia</i>	Verbenaceae	فلفل خری، گهچ، بامپلوساخ	نوعی پنج انگشت	درختچه
<i>Zataria multiflora</i>	Labiatae	آبشم، ایگن، اوشن، ازگند	آویشن شیرازی	بوته ای
<i>Zhumeria majdae</i>	Labiatae	مورخوش	مورخوش	بوته ای
<i>Ziziphora tenuir</i>	Labiatae	کاکوتی، گل مشکو، هاردانگشت	کاکوتی	علفی

جدول ۲ - خانواده‌های مختلف گیاهان اسانس دار استان به همراه تعداد جنس و گونه آنها

خانواده	جنس	گونه	خانواده	جنس	گونه	خانواده	جنس	گونه
Labiatae	۱۲	۲۷	Gramineae	۲	۲	Cyperaceae	۱	۱
Compositae	۸	۱۵	Papilionaceae	۲	۲	Elaeagnaceae	۱	۱
Umbelliferae	۱۰	۱۴	Resedaceae	۲	۲	Rubiaceae	۱	۱
Rutaceae	۲	۹	Caesalpiniaceae	۱	۲	Adianthaceae	۱	۱
Myrtaceae	۴	۴	Cupressaceae	۱	۱	Fumariaceae	۱	۱
Oleaceae	۲	۴	Musaceae	۱	۱	Primulaceae	۱	۱
Capparidaceae	۱	۴	Meliaceae	۱	۱	Geraniaceae	۱	۱
Cruciferae	۳	۳	Lythraceae	۱	۱	Zygophyllaceae	۱	۱
Anacardiaceae	۲	۳	Vitaceae	۱	۱	Rosaceae	۱	۱
Liliaceae	۲	۳	Bignoniaceae	۱	۱	Palmae	۱	۱
Verbenaceae	۱	۳						

جدول ۳ - گیاهان اسانس دار کاشته شده استان هرمزگان

ردیف	نام علمی	ردیف	نام خانواده	نام علمی	ردیف	نام خانواده	نام علمی
۱	<i>Allium cepa</i>	۱۸	Liliaceae	<i>Lawsonia inermis</i>	۱	Lythraceae	
۲	<i>Allium sativum</i>	۱۹	Liliaceae	<i>Mangifera indica</i>	۲	Anacardiaceae	
۳	<i>Anethum graveolans</i>	۲۰	Umbelliferae	<i>Melia indica</i>	۳	Meliaceae	
۴	<i>Cassia fistula</i>	۲۱	Caesalpiniaceae	<i>Millingtonia hortensis</i>	۴	Bignoniaceae	
۵	<i>Citrus aurantifolia</i>	۲۲	Rutaceae	<i>Musa sapientum</i>	۵	Musaceae	
۶	<i>Citrus aurantium</i>	۲۳	Rutaceae	<i>Myrtus communis</i>	۶	Myrtaceae	
۷	<i>Citrus limetiodes</i>	۲۴	Rutaceae	<i>Ocimum basilicum</i>	۷	Labiatae	
۸	<i>Citrus limon</i>	۲۵	Rutaceae	<i>Ocimum sanctum</i>	۸	Labiatae	
۹	<i>Citrus paradisi</i>	۲۶	Rutaceae	<i>Olea europaea</i>	۹	Oleaceae	
۱۰	<i>Citrus reticulata</i>	۲۷	Rutaceae	<i>Petroselinum crispum</i>	۱۰	Umbelliferae	
۱۱	<i>Citrus sinensis</i>	۲۸	Rutaceae	<i>Phoenix dactylifera</i>	۱۱	Palmae	
۱۲	<i>Coriandrum sativum</i>	۲۹	Umbelliferae	<i>Psidium guajava</i>	۱۲	Myrtaceae	
۱۳	<i>Elaeagnus angustifolius</i>	۳۰	Elaeagnaceae	<i>Rosa damascena</i>	۱۳	Rosaceae	
۱۴	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	۳۱	Myrtaceae	<i>Syzygium cumini</i>	۱۴	Myrtaceae	
۱۵	<i>Foeniculum vulgare</i>	۳۲	Umbelliferae	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	۱۵	Papilionaceae	
۱۶	<i>Jasminum azoricum</i>	۳۳	Oleaceae	<i>Vitis vinifera</i>	۱۶	Vitaceae	
۱۷	<i>Jasminum sambac</i>		Oleaceae				

جدول ۴ - ترکیبیهای شاخص برخی از گیاهان اسانس دار استان هرمزگان

گونه	ترکیبات شاخص	گونه	ترکیبات شاخص
<i>Achillea wilhelmsii</i>	کامفور، سیتول، بورنول، میرتول	<i>Matricaria recutita</i>	آلفا بیزابولول، ترانس فارنسول، گوایازولن، پتابسیس فارنزن
<i>Anethum graveolans</i>	آلفا-فافالاندرن، لیمونن، پاراسیمن	<i>Mentha longifolia</i>	پپریتون، سیتول، پپریتون
<i>Artemisia scoparia</i>	گاما-تریپین، لیمونن، اوژنول، پاراسیمن	<i>Mentha mozaffarianii</i>	پپریتون، پپریتون اکسید، لیتالول، تیمول
<i>Artemisia sieberi</i>	کامفور، سیتول، آلفاپین، کامفن	<i>Myrtus communis</i>	سیتول، آلفاپین، لیتالول، لیمونن، لیتالیا استات
<i>Bunium persicum</i>	گاما-تریپین، کومینیل آدید، لیمونن+سیتول	<i>Nepeta ispanica</i>	سیتول، پتالاکتون، لیتالول، آلفا-تریپتول
<i>Citrus aurantium</i>	لیتالول، اورنول، آلفا-فارنزوول، تی کادینول	<i>Ocimum basilicum</i>	لیتالول، پتاپراول، گاما-بیزابولن، استراژون اوژنول، پتاپراول، گاما-بیزابولن، استراژون
<i>Citrus limon</i>	لیمونن، گاما-تریپین، پتاپین، پاراسیمن	<i>Ocimum sanctum</i>	پتافالاندرن، مریستیپین، متاتری ان، آلفاپین آلفاپین، گاما-کادین، پتاپین، پتاکاربوفیلن
<i>Citrus paradisi</i>	لیمونن، گاما-تریپین، پاراسیمن	<i>Petroselinum crispum</i>	فنیل اتیل الکل، زراییول، سیترونول، ان نونا دکان
<i>Citrus reticulata</i>	لیمونن، میرسن، لیتالیل استات	<i>Pistacia atlantica</i>	لیتالول، لیتالیل استات، سیتول، تربتیل استات
<i>Citrus sinensis</i>	لیتالول، گاما-تریپین، آلفاپین، زراییل استات	<i>Rosa damascena</i>	آلفاپین، پتاپین، لیمونن
<i>Coriandrum sativum</i>	لیتالول، گاما-تریپین، آلفاپین، زراییل استات	<i>Salvia mirzayani</i>	پتاکاربوفیلن، پتاپین، فارنزن
<i>Cymbopogon oliveri</i>	پپریتون، دی هیدرواسیمن، آلفا کادینول، المول	<i>Salvia santolinifolia</i>	آلفاپین، پتاپین، پتاکوبین، هگزن-۱ ال، لیمونن
<i>Dalbergia sisso</i>	ترولیدول، بیزابولن	<i>Teucrium polium</i>	کوبنول، گاما ایدسمول، آلفامورولن، آلفامورولول
<i>Ducrosia anethifolia</i>	دکانال، ترادکاتال، کریزانتیل استات	<i>Teucrium stocksianum</i>	سیتول، آلفاپین، سایپن، پتاپین
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	ترانس اتیل سینامات، فنیل اتیل الکل	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	ویریدوفلورول، پتاکاربوفیلن، تربتیول، سایپن
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	سیتول، پاراسیمن، اسپاتولول، ویریدوفلورول	<i>Vitex agnous- castus</i>	آلفاپین، کامفن، تربتیل استات، دی تربتیک الکل
<i>Ferula assa-foetida</i>	ترانس پروپنل اس بوتیل دی سولفید، سیس اسیمن، ترانس اسیمن	<i>Vitex negundo</i>	کارواکرول، ارتوسیمین، دودکان، گاما-تریپین
<i>Foeniculum vulgare</i>	ترانس آتنول، فنکون، لیمونن	<i>Vitex trifolia</i>	لیتالول، کامفن، کامفن، لیمونن
<i>Geranium rotundifolium</i>	آلفا-تریپتول استات، پولگون	<i>Zataria multiflora</i>	لیتالول، کامفن، لیمونن، آلفاپین
<i>Haplophyllum tuberculatum</i>	لیمونن، آلفاپین	<i>Zhumeria majdae</i>	

جدول ۵ - گیاهان اسانس دار پر مصرف استان هرمزگان

نام علمی	نام خانواده	نام علمی	نام خانواده
<i>Achillea eriophora</i>	Compositae	<i>Myrtus communis</i>	Myrtaceae
<i>Achillea wilhelmsii</i>	Compositae	<i>Ostostegia persica</i>	Labiatae
<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Adianthaceae	<i>Phoenix dactylifera</i>	Palmae
<i>Artemisia aucheri</i>	Compositae	<i>Pistacia atlantica</i>	Anacardiaceae
<i>Artemisia scoparia</i>	Compositae	<i>Salvia aegyptiaca</i>	Labiatae
<i>Artemisia sieberi</i>	Compositae	<i>Salvia mirzayani</i>	Labiatae
<i>Cassia italicica</i>	Caesalpinaeae	<i>Salvia sharifi</i>	Labiatae
<i>Cymbopogon oliveri</i>	Gramineae	<i>Teucrium orientale</i>	Labiatae
<i>Dionysia revoluta</i>	Primulaceae	<i>Teucrium polium</i>	Labiatae
<i>Ferula assa-foetida</i>	Umbelliferae	<i>Teucrium stocksianum</i>	Labiatae
<i>Gailonia aucheri</i>	Rubiaceae	<i>Tribulus terresteris</i>	Zygophyllaceae
<i>Haplophyllum tuberculatum</i>	Rutaceae	<i>Trigonella foenum- graecum</i>	Papilionaceae
<i>Juniperus excelsa</i>	Cupressaceae	<i>Zataria multiflora</i>	Labiatae
<i>Lavandula stricta</i>	Labiatae	<i>Zhumeria majdae</i>	Labiatae
<i>Matricaria recutita</i>	Compositae	<i>Ziziphora tenuir</i>	Labiatae
<i>Mentha longifolia</i>	Labiatae		

جدول ۶ - گیاهان اسانس دار استان هرمزگان که در منابع به آنها اشاره نشده یا کمتر اشاره شده

نام علمی	نام خانواده	نام علمی	نام خانواده
<i>Cleome quinquenervia</i>	Capparidaceae	<i>Mentha mazzaffariani</i>	Labiatae
<i>Dionysia revoluta</i>	Primulaceae	<i>Ochradenus aucheri</i>	Resedaceae
<i>Ducrosia anethifolia</i>	Umbelliferae	<i>Olea ferruginea</i>	Oleaceae
<i>Francoeuria undulata</i>	Compositae	<i>Pycnocycla aucherana</i>	Umbelliferae
<i>Gailonia aucheri</i>	Rubiaceae	<i>Reseda aucheri</i>	Resedaceae
<i>Gontscharovia popovii</i>	Labiatae	<i>Salvia mirzayanii</i>	Labiatae
<i>Haplophyllum tuberculatum</i>	Rutaceae	<i>Salvia sharifi</i>	Labiatae
<i>Lavandula stricta</i>	Labiatae	<i>Teucrium orientale</i>	Labiatae

جدول ۷ - گیاهان اسانس دار استان که به صورت سنتی به کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان صادر می شود

نام علمی	نام خانواده	نام علمی	نام خانواده
<i>Achillea wilhelmsii</i>	Compositae	<i>Myrtus communis</i>	Myrtaceae
<i>Artemisia aucheri</i>	Compositae	<i>Pistacia atlantica</i>	Anacardiaceae
<i>Cassia italica</i>	Caesalpinaeae	<i>Salvia mirzayanii</i>	Labiatae
<i>Ferula assa-foetida</i>	Umbelliferae	<i>Teucrium polium</i>	Labiatae
<i>Lavandula stricta</i>	Labiatae	<i>Zataria multiflora</i>	Labiatae
<i>Myrtus communis</i>	Myrtaceae	<i>Zhumeria majdae</i>	Labiatae

جدول ۸ - برخی مشخصات اقلیمی و رویشگاهی گیاهان اسانس دار استان هرمزگان

نام علمی	محل رویش	ارتفاع	اقليم	بارندگی	دما	گیاهان همراه
<i>Achillea eriophora</i>	همگ، باغ چنار، رودخانه، دم تنگ باستان، کوه چاهشنبه گاویندی	۹۰۰-۲۲۵۰	گرم و نیمه خشک، گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۰۰-۳۰۰	۱۷/۰-۲۲/۰	<i>Amygdalus scoparia</i> <i>Juniperus excelsa</i> <i>Daphne mucronata</i>
<i>Achillea wilhelmsii</i>	پشاگرد، کوشاه احمدی، کوه باز، کوه آنوه، کوه چاه شنبه	۱۰۰-۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۰-۲۵	<i>Artemisia aucheri</i> <i>Platychaete aucheri</i> <i>Anthemis sp.</i>
<i>Adianthum capillus-veneris</i>	همگ، باغ چنار، رودخانه، دم تنگ باستان، کوه چاهشنبه گاویندی	۵۰۰-۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۱۷/۰-۲۰	<i>Mentha longifolia</i> <i>Samolus valerandi</i> <i>Zataria multiflora</i>
<i>Anthemis austro-iranica</i>	حاجی آباد، بندرلنگه، گاویندی	۱۰۰-۱۰۰۰	گرم و خشک بیابانی، بیابانی	۱۵۰-۳۰۰	۲۲/۰-۲۷/۰	<i>Leptadenia pyrotechnica</i> <i>Gymnocarpus decander</i> <i>Cymbopogon olivieri</i>
<i>Anthemis mirheydari</i>	قطب آباد	۹۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۲/۰-۲۵	<i>Convolvulus sp.</i> <i>Cymbopogon olivieri</i> <i>Gymnocarpus decander</i>
<i>Anthemis odontesephana</i>	کوه گنو	۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۰۰	۲۲/۰-۲۵	<i>Juniperus excelsa</i> <i>Daphne mucronata</i> <i>Ebenus stellata</i>
<i>Anthemis psuedocotula</i>	بندرعباس، میتاب	۵۰-۲۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۰-۲۷/۰	<i>Acacia oerfota</i> <i>Acacia ehrenbergiana</i> <i>Euphorbia larica</i>
<i>Anthemis rhodocentra</i>	بندرعباس، میتاب	۵۰-۲۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۰-۲۷/۰	<i>Hammada salicornica</i> <i>Acacia ehrenbergiana</i> <i>Euphorbia larica</i>
<i>Anvillea garcinii</i>	حاجی آباد، سرچاهان، سرخون، سیاهو	۵۰-۱۳۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۲/۰-۲۷/۰	<i>Cymbopogon olivieri</i> <i>Leptadenia pyrotechnica</i> <i>Salvia santolinifolia</i>

-۸ ادامه جدول ۸

<i>Artemisia aucheri</i>	حاجی آباد، صالح آباد، علی آباد	۸۰۰-۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۵۰-۳۰۰	۲۲/۵	<i>Ebenus stellata</i>
<i>Artemisia scoparia</i>	گاویندی، کوه گنو	۱۰۰-۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک، گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Olea ferruginea</i>
<i>Artemisia sieberi</i>	حاجی آباد، صالح آباد، علی آباد	۸۰۰-۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۵۰-۳۰۰	۲۲/۵	<i>Amygdalus scoparia</i>
<i>Asphodelus tenuifolius</i>	بندرعباس، بندرلنگه، بستک، گاویندی، بشاغرد	۱۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک، گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۰۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Francoeuria undulata</i>
<i>Bunium persicum</i>	کوه درگن و محرب، کوه گنو، کوه باع چنان احمدی	۱۹۰۰-۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Prosopis cineraria</i>
<i>Capsella bursa-pasteris</i>	رودخانه (روستای آب تاریکن)	۵۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Cleome brachycarpa</i>
<i>Cassia italica</i>	بندرعباس، بندرلنگه، بستک، گاویندی، بشاغرد	۱۰-۱۲۰۰	گرم و نیمه خشک، گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Acantholimon sp.</i>
<i>Cleome brachycarpa</i>	قشم، هرمز، جاسک، ابوموسی	۱۰-۵۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Ebenus stellata</i>
<i>Cleome oxypetala</i>	بندرلنگه، سرچاهان	۱۲۰-۷۵۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Convolvulus sp.</i>
<i>Cleome delichostyla</i>	بستک، بندرخمیر، قشم، هرمز	۱۰-۸۰۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Ephedra pachyclada</i>
<i>Cleome quinquenervia</i>	سرچاهان	۷۵۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۵	<i>Bromus tectorum</i>
<i>Cymbopogon olivieri</i>	بستک، بندرلنگه، حاجی آباد، رودان، گاویندی	۱۰-۲۰۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۳۰۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Matricaria recutita</i>
<i>Cynodon dactylon</i>	بندرعباس، بندرلنگه، بستک، گاویندی، بشاغرد	۱۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Erodium cicutarium</i>
<i>Cyperus rotundus</i>	رودان، بندرعباس، بندرلنگه، بستک، گاویندی، حاجی آباد	۱۰-۱۱۰۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۳۰۰	۲۰-۲۷/۵	<i>Heliotropium bacciferum</i>
<i>Dalbergia sisso</i>	جکدان بشاغرد	۹۰۰-۱۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۵	<i>Acacia oerfota</i>
<i>Descurainia sophia</i>	فارغان، حاجی آباد، احمدی	۸۰۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۵۰-۳۰۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Cornulaca monocantha</i>
<i>Dionysia revoluta</i>	کوه گنو، کوه پردي بستک	۲۰۰۰-۲۱۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Gymnocarpus decander</i>
<i>Ducrosia anethifolia</i>	بندرعباس، بستک، حاجی آباد، بندرخمیر، گاویندی	۱۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۷/۵	<i>Anvillea garcinii</i>
<i>Eruca sativa</i>	بندرعباس، میتاب، بندرلنگه، بندرخمیر، قشم، هرمز	۰-۱۰۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۰-۲۷/۵	<i>Cymbopogon olivieri</i>
<i>Ferula foetida</i>	کوههای تنگ زاغ، گنو، پردي، چاهنشی، بشاغرد	۱۸۰۰-۲۰۰۰	گرم و خشک	۲۰۰-۳۰۰	۱۷/۵-۲۲/۵	<i>Taverniera glabra</i>
						<i>Acacia oerfota</i>
						<i>Acacia tortilis</i>
						<i>Artemisia aucheri</i>
						<i>Otostegia persica</i>
						<i>Platychaete aucheri</i>

<i>Francoeuria undulata</i>	بندرعباس، میناب، بندرنگه، حاجی آباد، رودان، گاوپندی	۱۰-۱۷۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۰-۲۷/۵	<i>Centaurea bruguierana</i> <i>Cymbopogon olivieri</i> <i>Platychaete aucheri</i>
<i>Fumaria parviflora</i>	بستک، پوراحمدی، گاوپندی	۱۰۰-۸۰۰	گرم و خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Francoeuria undulata</i> <i>Plantago sp.</i> <i>Stipa capensis</i>
<i>Gailonia aucheri</i>	بندرعباس، میناب، بندرنگه، حاجی آباد، رودان، بشاگرد	۱۰۰-۱۵۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۳۰۰	۲۲/۰-۲۷/۵	<i>Gymnocarpus decander</i> <i>Anvillea garcinii</i> <i>Cymbopogon olivieri</i>
<i>Geranium rotundifolium</i>	بندرنگه، بندرخمیر، گاوپندی	۱۰-۲۰۰	گرم و خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۵-۲۷/۵	<i>Salvia aegyptiaca</i> <i>Erodium sp.</i> <i>Anagallis arvensis</i>
<i>Gontscharovia popovii</i>	کوه بخون	۲۰۰۰-۲۱۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۱-۲۲/۵	<i>Ebenus stellata</i> <i>Platychaete aucheri</i> <i>Amygdalus scoparia</i>
<i>Haplophyllum canaliculatum</i>	بستک، باورد بندرنگه	۵۰-۵۰۰	گرم و خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۰-۲۷/۵	<i>Convolvulus spinosus</i> <i>Cymbopogon olivieri</i> <i>Artemisia aucheri</i>
<i>Haplophyllum tuberculatum</i>	بندرعباس، میناب، گاوپندی، آب گرم گنو	۱۰-۲۱۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و خشک، گرم و خشک بیابانی	۱۵۰-۲۵۰	۲۰/۰-۲۷/۵	<i>Amygdalus scoparia</i> <i>Teucrium stockianum</i> <i>Otostegia persica</i>
<i>Juniperus excelsa</i>	کوههای تنگ زاغ، گنو، پرده، باغ چنار، بشاگرد	۱۷۰۰-۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰	۱۷/۰-۲۰	<i>Daphne mucronata</i> <i>Convolvulus spinosus</i> <i>Amygdalus scoparia</i>
<i>Lagoecia cuminoides</i>	رودان، میناب	۵۰-۲۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و خشک بیابانی	۱۵۰-۲۵۰	۲۰-۲۷/۵	<i>Taverniera sparteae</i> <i>Acacia ehrenbergiana</i> <i>Acacia oerfota</i>
<i>Lallemandia royleana</i>	کوههای تنگ زاغ، گنو	۱۵۰۰-۱۶۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۳۰۰	۲۲/۰-۲۵	<i>Pistacia atlantica</i> <i>Amygdalus scoparia</i> <i>Otostegia persica</i>
<i>Lavandula stricta</i>	بندرعباس، کوه گنو، ایسین	۵۰-۳۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۰-۲۷/۵	<i>Tephrosia persica</i> <i>Otostegia persica</i> <i>Convolvulus sp.</i>
<i>Matricaria recutita</i>	گاوپندی، زیارت‌علی، احمدی، گاوپست	۵۰۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و خشک بیابانی	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۵	<i>Anthemis sp.</i> <i>Anagallis arvensis</i> <i>Cynodon dactylon</i>
<i>Mentha longifolia</i>	رودان، حاجی آباد، سیرویه، پیدویه	۱۰۰-۱۵۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و خشک بیابانی	۲۰۰-۳۰۰	۲۰-۲۵	<i>Anagallis arvensis</i> <i>Adianthus capillus-veneris</i> <i>Nerium indicum</i> <i>Mentha longifolia</i> <i>Anagallis arvensis</i> <i>Haplophyllum sp.</i>
<i>Mentha mozaaffarianii</i>	سیاهو، قطب آباد، دم تنگ، سیخوران	۵۰۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۲/۰-۲۷/۵	<i>Olea ferruginea</i> <i>Juniperus excelsa</i> <i>Daphne mucronata</i> <i>Juniperus excelsa</i>
<i>Nepeta bracteata</i>	کوه باغ چنار احمدی	۲۴۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Convolvulus spinosus</i> <i>Ebenus stellata</i> <i>Ebenus stellata</i> <i>Olea ferruginea</i>
<i>Nepeta cataria</i>	کوه بخون	۱۴۰۰-۱۶۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	<i>Amagdalu scoparia</i> <i>Convolvulus spinosus</i> <i>Ebenus stellata</i> <i>Juniperus excelsa</i>
<i>Nepeta depauperata</i>	کوههای گنو، بخون	۲۴۰۰-۳۰۱۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	
<i>Nepeta glomerulosa</i>	کوه باغ چنار احمدی، کوه بخون	۲۴۰۰-۳۰۱۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۲/۵	

-۸ ادامه جدول

<i>Nepeta ispananica</i>	رودان، قطب آباد	۷۵۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۰۰۰-۲۵۰۰	۲۰-۲۲/۰	<i>Amygdalus scoparia</i> <i>Anvillea garcini</i>
<i>Ochradenus aucheri</i>	آب گرم گنو، بشاگرد، جاسک، سیاهو	۵۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۳۰۰	۲۲/۰-۲۷/۰	<i>Pteropyrum aucheri</i> <i>Periploca aphylla</i> <i>Astragalus sp.</i>
<i>Olea ferruginea</i>	کوههای تنگ زاغ، گنو، پرده، باغ چنار، بشاگرد، هماگ	۱۹۰۰-۲۳۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰۰-۳۰۰۰	۱۷/۰-۲۲/۰	<i>Convolvulus spinosus</i> <i>Acer monspessulanum</i> <i>Pistacia atlantica</i> <i>Amygdalus scoparia</i>
<i>Perovskia artemisioides</i>	حاجی آباد	۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۵۰-۳۰۰	۲۲/۰	<i>Forskalea tennacissima</i> <i>Ochradenus aucheri</i> <i>Echinops sp.</i> <i>Gailonia aucheri</i> <i>Convolvulus sp.</i>
<i>Pimpinella affinis</i>	بارگاه	۷۵۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۰۰۰-۲۵۰۰	۲۰-۲۲/۰	<i>Helianthemum lippii</i> <i>Zygophyllum atriplicoides</i> <i>Gymnocarpus decander</i> <i>Helianthemum lippii</i>
<i>Pimpinella barbata</i>	رودان، بشاگرد، حاجی آباد، سرخون	۱۲۰-۱۴۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۲/۰-۲۷/۰	<i>Pycnocycla nodiflora</i> <i>Convolvulus spinosus</i> <i>Artemisia sieberi</i>
<i>Pimpinella eriocarpa</i>	گنو، گاویندی، روдан، قطب آباد	۶۵۰-۱۹۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۲۰۰۰-۲۵۰۰	۱۷/۰-۲۷/۰	<i>Ebenus stellata</i> <i>Convolvulus sp.</i> <i>Acanthophyllum bracteatum</i>
<i>Pistacia atlantica</i>	کوههای شب، گاری، گنو، پرده، بشاگرد، چاهشتبه	۵۰۰-۲۱۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۲۰۰۰-۲۵۰۰	۱۷/۰-۲۲/۰	<i>Periploca aphylla</i> <i>Amygdalus scoparia</i> <i>Astragalus sp.</i>
<i>Pistacia khinjuk</i>	کوههای شب، گاری، گنو، پرده، باغ چنار، چاهشتبه	۳۰۰-۲۲۰۰	گرم و خشک، گرم و نیمه خشک	۲۰۰۰-۳۰۰۰	۱۷/۰-۲۲/۰	<i>Gymnocarpus decander</i> <i>Anvillea garcinii</i> <i>Leptadenia pyrotechnica</i>
<i>Platychaete aucheri</i>	کوه گنو، کوه سرزه، کوه دل فیتو، بندرعباس، بشاگرد، سیاهو، رودان، حاجی آباد، احمدی، سرچاهان	۸۰-۲۱۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۲/۰-۲۷/۰	<i>Centaurea bruguierana</i> <i>Gymnocarpus decander</i> <i>Blepharis persica</i> <i>Fortunia bungei</i>
<i>Pycnocycla aucherana</i>	حاجی آباد، مسافر آباد، احمدی، گهره، سرچاهان	۵۰۰-۹۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۰۰۰-۳۰۰۰	۲۲/۰-۲۵	<i>Platychaete glaucoscens</i> <i>Salvia santolinifolia</i> <i>Gymnocarpus decander</i> <i>Convolvulus spinosus</i> <i>Cymbopogon olivieri</i>
<i>Pycnocycla bashagardiana</i>	خمین شهر بشاگرد	۱۱۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۰۰۰-۲۵۰۰	۲۰-۲۵	<i>Platychaete aucheri</i> <i>Anvillea garcinii</i> <i>Leptadenia pyrotechnica</i>
<i>Pycnocycla nodiflora</i>	گهره، سرچاهان	۸۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۰۰۰-۳۰۰۰	۲۲/۰-۲۵	<i>Francoeuria undulata</i> <i>Gymnocarpus decander</i> <i>Blepharis persica</i>
<i>Reseda aucheri</i>	بندرعباس، بستک، سیاهو، بندرلنگه	۱۰-۱۲۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۲/۰-۲۷/۰	<i>Anvillea garcinii</i> <i>Platychaete aucheri</i> <i>Otostegia persica</i>
<i>Salvia aegyptiaca</i>	بندرعباس، بستک، بشاگرد	۱۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۰/۰-۲۷/۰	<i>Zygophyllum atriplicoides</i> <i>Gymnocarpus decander</i> <i>Otostegia persica</i>
<i>Salvia compressa</i>	گهره	۸۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۰۰۰-۳۰۰۰	۲۲/۰-۲۵	<i>Platychaete aucheri</i> <i>Otostegia persica</i>
<i>Salvia macilenta</i>	بشاگرد، گنو، رودان	۵۰۰-۱۳۶۰	گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و نیمه خشک	۲۰۰۰-۲۵۰۰	۲۲/۰-۲۵	<i>Platychaete aucheri</i> <i>Periploca aphylla</i> <i>Rumex vesicarius</i> <i>Artemisia aucheri</i>
<i>Salvia macrosiphon</i>	بندرعباس، بشاگرد، سیاهو، رودان	۱۰-۱۰۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۲/۰-۲۷/۰	<i>Gymnocarpus decander</i> <i>Convolvulus spinosus</i> <i>Francoeuria undulata</i> <i>Gymnocarpus decander</i> <i>Blepharis persica</i> <i>Helianthemum lippii</i>
<i>Salvia mirzayanii</i>	کوههای تنگ زاغ، گنو، پرده، گاوپست، چاهشتبه	۹۰۰-۱۸۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۲۰۰۰-۳۰۰۰	۲۲/۰-۲۵	
<i>Salvia santolinifolia</i>	کوه گنو، رودان، بشاگرد سرچاهان	۵۰-۸۰۰	گرم و نیمه خشک بیابانی	۱۵۰-۲۰۰	۲۲/۰-۲۷/۰	
<i>Salvia sharpii</i>	حاجی آباد، سرچاهان، کوههای	۱۵۰-۲۱۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰۰-۳۰۰۰	۲۰-۲۲/۰	

		گنو، پردي		بیابانی، گرم و نیمه خشک		<i>Platychaete aucheri</i> <i>Ephedra pachyclada</i>
<i>Stachys inflata</i>		کوههای تنگ زاغ، گنو، پردي، گاویست، چاهشنه	۱۰۰۰-۲۶۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۳۰۰	۱۷/۵-۲۲/۵
<i>Teucrium orientale</i>		کوه چاهشنه، کوه گاویست	۳۵۰-۱۷۰۰	گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۲۵۰	۲۰-۲۵
<i>Teucrium polium</i>		حاجی آباد، سیاهو، دم تنگ، کوه گنو	۵۰-۱۸۰۰	بیابانی، گرم و نیمه خشک و گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۵
<i>Teucrium scordium</i>		باغ چنان کوشاه احمدی	۲۱۰۰-۲۲۰۰	بیابانی، گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۳۰۰	۱۷/۵-۲۰
<i>Teucrium stocksianum</i>		کوههای گنو، پردي، گاویست، چاهشنه، حاجی آباد، گهره	۸۰۰-۲۰۰۰	گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۰۰	۲۲/۵-۲۵
<i>Tribulus terresteris</i>		بندر عباس، جاسک، بندر خمیر	۱۰-۱۵۰	بیابانی، گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۰۰	۲۰-۲۷/۰
<i>Vitex agnus-castus</i>		سرخون، سیاهو	۵۰-۵۰۰	بیابانی، گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۵
<i>Vitex negundo</i>		سیاهو، ایسین، رودان، قطب آباد	۵۰۰-۷۰۰	بیابانی، گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۵۰	۲۲/۵-۲۷/۰
<i>Vitex trifolia</i>		زیارت‌علی	۵۰۰	بیابانی، گرم و خشک	۲۰۰	۲۰-۲۷/۰
<i>Zataria multiflora</i>		حاجی آباد، فارغان، بوخون، بشاگرد، گاویندی	۷۰۰-۲۱۰۰	بیابانی، گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۳۰۰	۱۷/۵-۲۲/۵
<i>Zhumeria majdae</i>		کوه گنو، قطب آباد، تنگ زاغ	۲۵۰-۱۲۵۰	بیابانی، گرم و نیمه خشک	۱۵۰-۲۰۰	۲۲/۵-۲۵
<i>Ziziphora tenuir</i>		کوه گنو، قطب آباد، حاجی آباد	۵۰۰-۲۵۰۰	بیابانی، گرم و نیمه خشک	۲۰۰-۳۰۰	۲۲/۵-۲۵

وضعیت رویشگاهی، گیاهان اسانس دار استان را می‌توان

به صورت زیر تقسیم کرد:

- ۱- گیاهان اسانس‌دار که در مناطق کوهستانی استان رویش دارند و شامل ۲۲ گونه هستند. این گیاهان بر روی خاکهای رسوبی، کم عمق با بافت سبک، درز و شکاف صخره‌ها، کوههای سنگی و صخره‌ای مشاهده می‌شوند.
- ۲- گیاهان اسانس‌دار که در دشت‌های پهناور، تپه‌ها و دامنه کوهها رویش دارند و شامل ۲۰ گونه می‌باشند.

گیاهان اسانس‌دار استان هرمزگان در مناطق مختلف ساحلی، استپی گرم شمال و ارتفاعات و کوههای بالنسبة بلند استان از ارتفاع ۱۰ تا ۳۰۰۰ متر از سطح دریا در اقلیم‌های مختلف گرم و نیمه خشک، گرم و نیمه خشک بیابانی، گرم و خشک بیابانی و گرم و خشک، متوسط بارندگی ۱۵۰-۳۰۰ میلیمتر، درجه حرارت متوسط ۲۷/۵-۳۰ درجه سانتیگراد پراکنی دارند. از نقطه نظر

بحث

شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار استان هرمزگان

گیاهان اسفند تا اردیبهشت ماه بوده، ضمن آنکه برخی از آنها در طول سال نیز مورد مصرف واقع می شوند.
بررسیهای انجام شده نشان داد که تا کنون هیچ گونه مطالعه‌ای که اختصاص به گیاهان اسانس دار استان هرمزگان داشته باشد انجام نشده است، اما زرگری در کتاب گیاهان دارویی تعداد ۴۳ گونه، میرحیدر در کتاب معارف گیاهی تعداد ۲۴ گونه، امین در کتاب گیاهان دارویی سنتی ایران تعداد ۳۱ گونه، افشار در کتاب پزشکی سنتی مردم ایران به تعداد ۲۴ گونه و نامدار و همکاران ۲۲ گونه اسانس دار از مناطق مختلف استان اشاره کرده‌اند.

منابع مورد استفاده

- افشار، ا. ۱۳۷۰. پزشکی سنتی مردم ایران. انتشارات هما، تهران، ۹۴۲ صفحه.
- امین، غ. ۱۳۷۰. گیاهان دارویی سنتی ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انتشارات فرهنگ، تهران، ۲۳۰ صفحه.
- بتولی، ح. ۱۳۸۰. بررسی ویژگیهای اکولوژیک گیاهان اسانس دار قمصر کاشان. همایش ملی گیاهان دارویی ایران، ۲۶-۲۴ بهمن ۱۳۸۰، موسسه تحقیقات جنگلها و مراع، تهران.
- حسنی، ج. ۱۳۸۰. شناسایی و بررسی اکولوژیک چهار جنس گیاه اسانس دار استان کردستان. همایش ملی گیاهان دارویی ایران، ۲۶-۲۴ بهمن ۱۳۸۰، موسسه تحقیقات جنگلها و مراع، تهران.
- رضایی، م.ب. و جایمند، ک. ۱۳۸۰. اسانس و دستگاههای اسانس‌گیری. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر، ۹، ۱-۱۶۱.
- زرگری، ع. ۱۳۶۴-۷۰. گیاهان دارویی. جلد ۱-۵، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
- سلطانی پور، م. ا. ۱۳۸۰. جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان هرمزگان، همایش ملی گیاهان دارویی ایران، ۲۶-۲۴ بهمن ۱۳۸۰، موسسه تحقیقات جنگلها و مراع، تهران.
- صابرآملی، س. ۱۳۸۰. معرفی برخی اکولوژیک گیاهان اسانس دار استان کرمان. همایش ملی گیاهان دارویی ایران، ۲۶ بهمن ۱۳۸۰، موسسه تحقیقات جنگلها و مراع، تهران.

۳- گیاهان اسانس دار که در آبراهه‌ها، کنار چشمه‌ها، جوی‌های آب و مناطق مرطوب وجود دارند و شامل ۵ گونه هستند.

۴- گیاهان اسانس دار که بر روی تپه‌های شنی ساحلی و حاشیه‌های کم ارتفاع رویش دارند (۱ گونه).

۵- گیاهان اسانس دار که هم در دشت‌های پهناور، تپه‌ها و دامنه کوهها و هم در مناطق کوهستانی رویش دارند و شامل ۲۵ گونه می باشند.

۶- گیاهان اسانس دار که هم بر روی تپه‌های شنی ساحلی و حاشیه‌های کم ارتفاع و هم در دشت‌های پهناور، تپه‌ها و دامنه کوهها رویش دارند و شامل ۲ گونه می باشند.

۷- گیاهان اسانس دار که هم در دشت‌های پهناور و هم در اراضی شور و نسبتاً شور رویش دارند (۱ گونه).

۸- گیاهان اسانس دار که هم در دشت‌های پهناور و دامنه کوهها و هم آبراهه‌ها رویش دارند و شامل ۲ گونه می باشند.

۹- گیاهان اسانس دار که هم بر روی تپه‌های شنی ساحلی و هم آبراهه‌ها رویش دارند (۱ گونه).

۱۰- گیاهان اسانس دار که هم روی تپه‌های شنی ساحلی، هم در مناطق کوهستانی و هم در اراضی شور و نسبتاً شور رویش دارند (۱ گونه).

در میان گیاهان اسانس دار، گونه‌های

Pistacia atlantica, *Ochradenus aucheri*, *Artemisia sieberi*, *Cymbopogon olivieri*, *Gailonia aucheri*, *Pistacia khinjuk*, *Platychaete aucheri*, *Pycnocycla aucherana*, *Pycnocycla bashagardiana*, *Pycnocycla nodiflora*, *Salvia santolinifolia*

تشکیل تیپ می دهند.

بیشترین اندام مورد مصرف برگ می باشد. اندام‌های مورد مصرف به طور مستقیم و غیر مستقیم به صورت تازه یا خشک شده مصرف می شوند. عمل خشک شدن در هوای آزاد و در زیر سایه انجام می گردد. نحوه مصرف بیشتر به صورت جوشانده، دمکرده و یا به صورت چاشنی می باشد. مناسبترین زمان جمع‌آوری اندام‌های اکثر این

- نجف پورنوایی، م.، ۱۳۷۹. بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار شامل جنس های *Mentha*, *Thymus*, *Nepeta* در استان تهران. *تحقیقات گیاهان دارویی و معطر*, ۵: ۲۵-۱.
- هویزه، ح.، ۱۳۸۰. بررسی پراکنش و خصوصیات رویشگاهی گیاهان اسانس دار استان خوزستان. همایش ملی گیاهان دارویی ایران، ۲۶-۲۴ بهمن ۱۳۸۰، موسسه تحقیقات جنگلها و مرتع، تهران.
- قلیچ نیا، ح.، ۱۳۷۷. بررسی پراکنش و اکولوژیک گیاهان اسانس دار استان مازندران. *گزارش نهایی طرح تحقیقاتی*، موسسه تحقیقات جنگلها و مرتع، ۷ صفحه.
- میر حیدر، ح.، ۱۳۷۳. *معارف گیاهی*. جلد ۱-۷، دفتر نشر فرهنگ اسلام، تهران.
- نامدار، م.، سمسار، م. و مجتبایی، م.، ۱۳۴۶. دولپه ای های جدا گلبرگ. *انتشارات دانشگاه تهران*, تهران، ۶۱۹ صفحه.
- نامدار، م.، سمسار، م. و مجتبایی، م.، ۱۳۴۷. دولپه ای های پیوسته گلبرگ. *انتشارات دانشگاه تهران*, تهران، ۴۱۹ صفحه.

Introduction and Ecological Investigation of Aromatic Plants of Hormozgan Province

M.A. Soltanipoor¹ and P. Babakhanlou²

1- Academic member of Hormozgan Agricultural and Natural Resource Research Center,
e-mail: masoltanipoor@yahoo.com

2- Academic member of Research Institute of Forests and Rangelands

Abstract

This investigation was carried out for Introducing of aromatic plants of Hormozgan Province during 1995-1998. Aromatic plants were recognized based on different references and native people. These species were collected by traveling to the various parts of Hormozgan province and noted some information about species such as Persian, local, scientific and family names, geographical distribution, habitat, altitude, companion species, average annual rainfall and temperature. The 113 species were determined that belonged to 70 genus and 31 families. From these, 26 were trees, 9 shrub, 24 bushes and 54 herbaceous. Meanwhile 80 species were native, 31 species were often used by people in province's rural areas. 15 species were not found in references as a medicinal herb and 12 species are exported to Arabic countries. These plants grow at coastal to mountainous areas of Hormozgan Province from 10-3000 m above sea level in a warm and dry climate. Meanwhile mean annual rainfall average and temperature are 150-300 mm and 17.5-27.5 degree centigrade respectively.

Key words: Ecology, Aromatic plants, Hormozgan Province.