

## بررسی چرخه تولید مثل خیار دریایی (*Stichopus hermanni*)

### در آبسنگهای مرجانی جزیره کیش، خلیج فارس

اکرم تهرانی فرد<sup>(۱)</sup>\*؛ شهربانو عربیان<sup>(۲)</sup>؛ غلامحسین وثوقی<sup>(۳)</sup>؛ سید محمد رضا فاطمی<sup>(۴)</sup> و علیرضا نیکویان<sup>(۵)</sup>

a\_Tehranifard2000@yahoo.co.uk!

۱- گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان صندوق پستی: ۱۶۱۶

۲- دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تربیت معلم، تهران خیابان مفتح، پلاک ۴۹

۳- گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران صندوق پستی: ۱۸۱-۱۹۵۸۵

۴- موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران صندوق پستی: ۶۱۱۶-۱۴۱۵۵

تاریخ پذیرش: شهریور ۱۳۸۶

تاریخ دریافت: اردیبهشت ۱۳۸۵

### چکیده

گونه‌های خیار دریایی خانواده Stichopodidae جزء گونه‌های تجاری جهان می‌باشد. با توجه به ارزش تجاری گونه Stichopus hermanni در این تحقیق، بیولوژی تولید مثل آن بررسی شده است. در مدت یکسال روی ۲۵۲ نمونه مطالعه صورت گرفت. مورفولوژی غدد جنسی این گونه شبیه سایر گونه‌های جنس Stichopus بوده و تعیین جنسیت فقط در مرحله رسیدگی جنسی امکانپذیر می‌باشد. نسبت جنسی نر به ماده ۱:۱ بدست آمد. مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی (تهیه بافت) مراحل گامتوئنریزیس را دقیقاً نشان دادند. شاخص گنادی و مراحل رسیدگی غدد جنسی نر و ماده بررسی شد. با توجه به نتایج بدست آمده چرخه تولید مثلی از اوخر زمستان آغاز شده و تا تابستان ادامه می‌یابد. مرحله فعال گامتوئنریزیس مطابق با افزایش تناوب نوری و درجه حرارت بوده و حداقل تخمیریزی در تابستان صورت می‌گیرد. میانگین طول بدن در اولین رسیدگی جنسی ۳۱۰ میلیمتر و میانگین قطر اووسیتها ۲۰۰ میکرون می‌باشد. میزان شناوری اووسیت‌های رسیده بین ۲۰ تا ۳۰ میلیمتر در دقیقه بوده و نشاندهنده آن است که ت Humphreys خارج شده از بدن به سطح ستون آب آمده و این مسئله با مشاهدات غواصان که لاروها را در سطح دیدند، مطابقت دارد.

**لغات کلیدی:** تولید مثل جنسی، خیار دریایی، *Stichopus hermanni*، جزیره کیش، خلیج فارس، ایران

\* نویسنده مسئول

## مقدمه

تحقیق حاضر جزئیاتی در باره چرخه تولید مثل جنسی خیار دریایی موجود در جزیره کیش (*Stichopus hermanni*) را نهاده دهد. نتایج از مطالعات بافت شناسی عدد جنسی بدست آمده است.

## مواد و روش کار

خیارهای دریایی، کفزیان ساکن آبسنگهای مرجانی اطراف جزیره کیش می‌باشند که نمونه برداری در طول یکسال بصورت ماهانه از همه آبسنگها صورت گرفت. تعداد نمونه‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ عدد متغیر بودند. این نمونه‌ها به همراه آب دریا، بصورت زنده به ساحل آورده می‌شدند. از آنجاییکه طبق روش استاندارد برای مطالعه چرخه تولید مثلی، همانگی در تایز نمونه توصیه شده است (Franklin, 1980)، غواص نمونه‌ها را از بین بزرگترین آنها انتخاب می‌نمود.

برای جلوگیری از استرس و خارج شدن لوله گوارش و غدد جنسی از بدن نمونه‌های جمع‌آوری شده ابتدا با اضافه نمودن کلرید منیزیم ۳٪ درصد به ظرف حاوی نمونه‌ها و آب دریا، بیهوش شدند و سپس با فرمالین ۱٪ درصد تثبیت گردیدند (امیدی اشرفی، ۱۳۶۸).

طول کل (TL) برحسب میلیمتر و وزن کل (WT) تا ۰/۱ گرم برای هر نمونه اندازه‌گیری و ثبت شد. غدد جنسی (Wg) با دقیق ۰/۰۱ گرم وزن شده و در فرمالین ۱٪ درصد تثبیت گردید. وزن بدن بعد از خارج کردن لوله گوارش و مایع سلومی (We) اندازه‌گیری شد. اختلاف بین وزن کل و وزن بدن خالی از امعا و احشا، نمایانگر وزن محتویات لوله گوارش و مایع سلومی است: وزن مایع + امعا و احشا = WT-We؛ وزن خشک (DW) بعد از خشک کردن در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۹۶ ساعت اندازه‌گیری شد. وزنها با دقیق ۰/۰۱ گرم اندازه‌گیری و ثبت شدند (Conand, 1981). روده با محتویات از انتهای خلفی معده تا شروع کلواک جدا شده و خارج گردید و غده جنسی از نقطه اتصال به مجرای گنادی جدا شدند. شاخص گنادی (GI) از روش Conand (۱۹۸۲) محاسبه گردید.

$GI = \frac{Wg}{Wd} \times 100$

آزمایش‌های بافت شناسی گنادی انجام گردیده و تغییرات فصلی در قطر لوله‌های گنادی بصورت زیر اندازه‌گیری شدند: لوله‌های گنادی در یک ظرف کم عمق، پهن شده و قطر لوله‌ها در نقاطی تصادفی از آنها با استریو میکروسکپ (لوب)

خیارهای دریایی در شاخه خارپستان (Echinodermata) و رده هولوتورین‌ها (Holothuroidea) جای دارند و طی دوران تکاملی ۵۴۰ میلیون سال پیش در اقیانوسها ظاهر شده‌اند (Alexander & Kim, 2001).

این جانوران از اجزای مهم زنجیره غذایی در اکوسیستمهای معتدل (Temperate) و آبسنگهای مرجانی (Coral reefs) بوده و نقش مهمی بعنوان پوده خوار (Detritus feeder) یا معلق خوار (Suspension feeder) ایفا می‌کنند. آنها مسئول بهم زدن و مخلوط کردن رسوبات بوده و ضمن تسريع باز چرخه مواد پوده‌ای، باعث نفوذ اکسیژن در رسوبات می‌شوند. تخم، لارو و نوزاد آنها نیز منبع غذایی مهمی برای سایر جانوران دریازی می‌باشند (Bruckner et al., 2003). آنها بطور عمده بین آبسنگهای مرجانی زندگی کرده اما در بسترها شنی و گلی هم یافت می‌شوند. عمق زندگی آنها نیز متفاوت است. اکثر گونه‌ها در منطقه بین جزر و مدی زندگی می‌کنند، اما تعداد کمی نیز در اعماق اقیانوسها بسر می‌برند (Smirnow et al., 2000). طول آنها از چند میلیمتر تا بیش از دو متر متغیر بوده و رنگهای متنوعی دارند. در حال حاضر ۱۴۰۰ گونه خیار دریایی در آبهای سراسر جهان شناسایی و گزارش شده است. در دریاهای اطراف هند نزدیک به ۲۰۰ گونه شناسایی شده که ۷۵ درصد آنها در آبهای کم عمق زندگی می‌کنند و نزدیک به ۵۰ گونه در نواحی بین جزر و مدی قابل جمع آوری هستند (James, 2001).

خیارهای دریایی خوارکی را در آسیا Trepang و در فرانسه Beche-de-mer می‌نامند. تاریخچه مصرف آن توسط چینی‌ها بویژه ساکنین نواحی ساحلی به سالهای ۱۶۴۴-۱۳۶۸ قبل از میلاد برمی‌گردد. از آن زمان چینی‌ها خیار دریایی را بعنوان غذا و دارو مصرف می‌کنند. همچنین از گونه Pseudocnus echinits برای تغذیه اردک استفاده می‌شود (Jiaxin, 2003). سم خیارهای دریایی (Anticancer) دارای خواص ضد ویروس (Antiviral)، ضد سرطان (Anticancer) ضد بارداری (Antifertility) و ضد تومور (Antitumoral) بوده و در صنعت داروسازی مصارف زیادی دارد (James, 2001).

با وجود اینکه محیط دریایی متبع عظیمی از این موجودات در اختیار ما گذاشته است، متأسفانه به دلیل عدم آگاهی از فواید تغذیه‌ای، دارویی و حتی سودآوری ارزی در رابطه با صادرات آنها هیچگونه استفاده‌ای از این جانوران با ارزش نمی‌شود. تا کنون در مورد بیولوژی تولید مثل خیارهای دریایی گزارشی منتشر نشده است.

سانتیگراد، شده بود، قرار داده شدند. سپس روی لام گذاشته شده و در آون ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت قرار گرفتند. این روش معمولاً از شکسته شدن، لوله‌های نازک و از دست رفتن گامتها جلوگیری می‌کند. سپس توسط میکروسکوپ مجهز به دوربین از بافت‌های رنگ‌آمیزی شده عکس گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EXCEL انجام پذیرفت. بدین ترتیب که ابتدا میانگین نمونه‌های تحت آزمایش برآورد گردید. سپس برای مقایسه میانگین ۲ نمونه از آزمون  $t$  و به منظور مقایسه کلی میانگین چند تیمار از آزمون Kruskal-Wallis و آزمون تطابق نمونه با توزیع نظری Chi-Square استفاده شد. وجود یا عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین میانگین‌ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد ( $P \leq 0.05$ ) تعیین گردید.

## نتایج

طول کل خیارهای دریایی *S. hermanni* مورد مطالعه در محدوده بین ۱۵۰ تا ۵۱۵ میلیمتر بود. بیشترین فراوانی (۵۰ عدد) طول ۴۴۵ میلیمتر و کمترین فراوانی (۲ عدد) طول ۱۵۰ میلیمتر داشتند (نمودار ۱-الف).

وزن کل خیارهای دریایی *S. hermanni* مورد مطالعه در محدوده بین ۲۰۰ تا ۲۳۰۰ گرم بود. بیشترین فراوانی (۵۰ عدد) وزن ۱۴۰۰ گرم و کمترین فراوانی (۲ عدد) وزن ۲۳۰۰ گرم داشتند (نمودار ۱-ب).

وزن لوله گوارش خیارهای دریایی *S. hermanni* مورد مطالعه در محدوده بین ۱۲۵ تا ۱۸۷۵ گرم بود. بیشترین فراوانی (۶۲ عدد) وزن ۹۰۰ گرم و کمترین فراوانی (۲ عدد) وزن ۱۸۷۵ گرم داشتند (نمودار ۱-ج).

وزن خشک بدن خیارهای دریایی *S. hermanni* مورد مطالعه در محدوده بین ۱۲۵ تا ۲۵۰۰ گرم بود. بیشترین فراوانی (۵۰ عدد) وزن ۹۰۰ گرم و کمترین فراوانی (۲ عدد) وزن ۳۷۵ گرم داشتند (نمودار ۱-د).

مجهز به میکرومتر چشمی مدرج  $\times 10$  اندازه‌گیری شدند. اندازه‌گیری برای هر پنج نر و پنج ماده در هر تاریخ نمونه‌گیری انجام و اطلاعات ثبت شدند (Conand, 1981).


برای مطالعه چرخه تولید مثلثی، آزمایش‌های ماکروسکوپی و میکروسکوپی بر روی گناده‌های تازه و نگهداری شده در فرمالین انجام شدند. جهت تعیین مراحلی رسیدگی گنادی و جنسی، از روش ۵ مرحله‌ای استفاده شد (Uthicke, 1994):

۱- مرحله نارس ۲- مرحله رشد ۳- مرحله رشد پیشرفته ۴- مرحله رسیدگی و تخمیری ۵- مرحله پس از تخمیری: این مراحل براساس شکل، رنگ، ثبات، استحکام، تعداد و طول لوله‌های تخمیری و همچنین خصوصیات میکروسکوپی اووسیتها و اسپرمها که از طریق تهیه بافت و رنگ‌آمیزی آنها بررسی گردید، تعیین شدند.


شاخصهای گنادی (GI) ماهانه اندازه‌گیری و ثبت شدند (نسبت وزن گناد به وزن خشک بدن). درجه حرارت آب دریا از طریق دستگاه ترمومترograf T - VEMCOminilog که سنسور آن در عمق ۳ متری قرار داشت روزانه اندازه‌گیری و یادداشت شده و میانگین آن برای هر ماه استفاده می‌گردید.

طول لوله‌های کوچک، از منشاء گناد تا نوک قسمت دور از مبدأ (Lg) تا حدود ۵ میلی متر اندازه‌گیری شدند. این مقادیر عددی برای توضیح مراحل بلوغ *S. hermanni* از طریق مقایسه آنها با ویژگیهای ماکروسکوپی (نظیر رنگ) مورفولوژی، ثبات و از طریق روش‌های توصیفی دیگر نظری شاخصهای گنادی، مشاهدات میکروسکوپی و مقطع بافتها مورد استفاده قرار گرفتند. این امکان وجود دارد که بتوان جنس ماده را طی مراحل پیشرفته رسیدگی جنسی با استفاده از یک استریوومیکروسکپ (لوب) مشخص نمود، اما بطور کلی برای این کار استفاده از میکروسکوپ ضروری است. همچنین توزیع قطر تخمک براساس نمونه‌های نگهداری شده در فرمالین و برای تعیین ویژگیها و مشخصات مراحل رسیدگی با استفاده از میکروسکوپ اندازه‌گیری گردید.


عدد جنسی از فرمالین خارج شده و به محلول بوئن به مدت ۴ هفته منتقل شدند. سپس مراحل تهیه بافت مطابق روش استاندارد (Junqueira & Carneiro, 1986) انجام شد. برای هر نمونه ۶ برش به قطر ۵ میکرون، توسط میکروتوم انجام شد. این برشها ابتدا داخل ظرف محتوی ژلاتینی که تا ۴۲ درجه




ب



الف



د



ج

نمودار ۱: توزیع فراوانی خیار دریایی (*S. hermanni*) جزیره کیش سال ۱۳۸۴-۱۳۸۲

ب) وزن کل (گرم)

د) وزن خشک (گرم)

الف) طول کل (میلیمتر)

ج) وزن لوله گوارش (گرم)

شاخص گنادی در ماههای مختلف سال محاسبه شد که نتایج آن در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱: میانگین وزن خشک بدن، وزن غده جنسی خیارهای دریابی *S. hermanni* جزیره کیش (بر حسب گرم)

و میزان شاخص گنادی در ماههای مختلف سال (۱۳۸۲-۱۳۸۴)

ماده				نر				ماههای سال
شاخص گنادی (GI)	وزن غده جنسی (گرم)	وزن خشک بدن (گرم)	شاخص گنادی (GI)	وزن غده جنسی (گرم)	وزن خشک بدن (گرم)	شاخص گنادی (GI)	وزن خشک بدن (گرم)	
۰/۰۸۵	۰/۱۷۰	۲۰۰	۰/۲۰	۰/۲۴۰	۲۲۰	۰/۰۸۵	۸۲	بهمن
۰/۰۸۸	۰/۲۲۰	۲۵۰	۰/۲۱	۰/۵۱۰	۲۴۰	۰/۰۸۸	۸۲	اسفند
۰/۰۹۰	۰/۴۳۲	۴۸۰	۰/۲۲	۰/۷۴۸	۳۴۰	۰/۰۹۰	۸۳	فروردین
۰/۳۲۰	۲/۱۱۲	۶۶۰	۰/۴۹	۲/۲۵۴	۴۶۰	۰/۳۲۰	۸۳	اردیبهشت
۰/۷۸۰	۶/۵۵۲	۸۴۰	۱/۳۸	۱۲/۴۲	۹۰۰	۰/۷۸۰	۸۳	خرداد
۲/۰۰۰	۲۷/۶۰۰	۱۳۸۰	۲/۸۳	۴۳/۲۹	۱۳۰۰	۲/۰۰۰	۸۳	تیر
۲/۸۰	۳۷/۲۴	۱۳۳۰	۲/۸۳	۳۹/۹۶	۱۲۰۰	۲/۸۰	۸۳	مرداد
۱/۳۴۰	۱۲/۰۶	۹۰۰	۱/۴۱	۱۲/۶۹	۹۰۰	۱/۳۴۰	۸۳	شهریور
۱/۰۸۰	۷/۷۷۶	۷۲۰	۱/۳۱	۱۰/۰۷	۷۰۰	۱/۰۸۰	۸۳	مهر
۰/۴۰۰	۲/۱۶	۵۴۰	۰/۰۱	۳/۰۶	۶۰۰	۰/۴۰۰	۸۳	آبان
۰/۲۰۰	۰/۷۲۰	۲۶۰	۰/۲۵	۱/۵۷۵	۴۵۰	۰/۲۰۰	۸۳	آذر
۰/۲۱۰	۰/۵۰۴	۲۴۰	۰/۳۰	۰/۹	۳۰۰	۰/۲۱۰	۸۳	دی
۰/۰۸۰	۰/۱۶۸	۲۱۰	۰/۲۷	۰/۰۶۷	۲۱۰	۰/۰۸۰	۸۳	بهمن
۰/۰۷۰	۰/۰۸۴	۱۲۰	۰/۲۵	۰/۳۷۵	۱۸۰	۰/۰۷۰	۸۳	اسفند
۰/۰۸۴	۰/۳۸۰	۴۵۰	۰/۱۷	۰/۴۴	۲۲۰	۰/۰۸۴	۸۴	فروردین
۰/۳۲۰	۱/۹۰۰	۵۸۰	۰/۴۹	۱/۰۷	۳۲۰	۰/۳۲۰	۸۴	اردیبهشت
۰/۸۰۰	۶/۴۰۰	۸۰۰	۱/۷۰	۱/۳۳	۸۰۰	۰/۸۰۰	۸۴	خرداد

در تیر ماه به حداقل خود رسید. سپس بتدریج تا آخر اسفند ماه کاهش می‌یابد. شاخص گنادی نرها بیشتر از شاخص گنادی ماده‌ها می‌باشد ( $P < 0.01$ ). تجزیه و تحلیل قطر لوله‌های گنادی نشان می‌دهد که این پارامتر کاملاً از منحنی GI تعیین می‌کند. همزمان با قطر لوله‌ها، طول لوله‌های گنادی و قطر اووسیت‌ها نیز مطابق با شاخص گنادی تغییر می‌یابند. طول، قطر و رنگ لوله‌ها به مرحله تکاملی گناد بستگی دارد. جدول ۲، قطر لوله‌های تخدمان و اووسیتها را در مراحل مختلف نشان می‌دهد. کوچکترین تخدمان‌ها در مرحله اولیه تکاملی بوده و از ۷ لوله که طولی کمتر از ۷۰ میلیمتر و وزن آنها ۰/۰۹ گرم بود، تشکیل شده بودند.

براساس نتایج حاصله، تغییرات در وزن غده جنسی نرها ۴۲/۸۹ گرم می‌باشد. همزمان با افزایش وزن خشک، وزن غده جنسی نیز، افزایش یافته و بعد از تخریزی، با کاهش نمودار شاخص گنادی (GI)، وزن غده جنسی و وزن خشک دیواره بدن نیز کاهش سریعی را نشان می‌دهد.

براساس نتایج حاصله، تغییرات در وزن غده جنسی ماده‌ها حدود ۲۷/۵ گرم می‌باشد. مطابق با افزایش وزن خشک دیواره بدن، وزن گنادها نیز سریع افزایش یافته و بعد از تخریزی همزمان با سقوط نمودار شاخص گنادی (GI) اندازه گنادها و وزن خشک دیواره بدن نیز کاهش سریعی را نشان می‌دهد. شاخص گنادی در نرها و ماده‌ها از فروردین ماه افزایش یافته و

جدول ۲: تغییرات طول و قطر لوله‌های تخدمانی و قطر اووسیتهاي خیار دریابی *S. hermanni* جزیره کش در

## مراحل مختلف گنادی

مراحل نمو تخدمانی	طول لوله‌ها (سانتیمتر)	قطر لوله‌ها (میلیمتر)	قطر اووسیتها (میکرون)
مرحله نارس	۷۰ میلیمتر	۰/۹	۵-۶۰
مرحله رشد	۲۲-۲۵	۲/۵	۵-۱۱۰
مرحله رشد پیشرفته	۳۰-۴۰	۳-۴	۱۱۰-۱۸۰
مرحله رسیدگی (تخمریزی)	۴۰-۴۵	۴-۵	۱۱۰-۲۴۰
مرحله بعد از تخمریزی	متغیر	چروک شده است	تعدادی اووسیت بزرگ
باقی مانده‌اند			


۳۳ عدد از اووسیتها قابلیت شناوری مشبت را به همراه اضافه شدن قطر، بوضوح نشان دادند ( $P < 0.01$ ،  $t = 167$ ،  $df = 22$ ). نتایج نشان داد که اووسیتها با قطر ۲۱۰ میکرون، با سرعت ۲۰ تا ۳۰ میلیمتر در دقیقه به سمت بالا حرکت می‌کنند. آن تعداد اووسیت که قابلیت شناوری منفی را نشان دادند، احتمالاً صدمه دیده بودند.

اشکال ۱ تا ۴ مراحل مختلف رسیدگی بافتی گناد ماده در خیار دریابی مورد بررسی را نشان می‌دهند.


گنادهای جمع‌آوری شده در یک مرحله نمونه‌برداری همگی در یک مرحله از رسیدگی بودند و این نشان‌دهنده پیشرفت همزمان در کل جمعیت است. اطلاعات مربوط به قطر و طول لوله‌ها نشان می‌دهد که آنها بیشترین قطر و طول را در مرحله تخمریزی داشتند. میانگین قطر تخمکها ۱۸۰ میکرومتر و حداقل آن ۲۴۰ میکرومتر در مرحله پیش از تخمریزی اندازه‌گیری شد.



شکل ۱: تصویری از تخدمان *S. hermanni* غده جنسی نارس در حال احیا، اپتالیوم ژرمینال (GE) دیده می‌شود.  
(بزرگنمایی  $\times 100$ )



شکل ۲: تصویری با بزرگنمایی  $100\times$  از بافت تحمدان در مرحله رشد، اپتیلیوم ژرمینال (GE)، اووسیتهای اولیه (PO) و اووسیتهای ویتلوزنیک (V) در *S. hermanni*




شکل ۳: مرحله رشد پیشرفته، اووسیتهای رسیده (M) و سلوهای بیگانه خوار (فاغوسیت) (P) در *S. hermanni* (بزرگنمایی  $100\times$ )



شکل ۴: مرحله رسیدگی، اووسیت رسیده بزرگ (M) با (GV) مشخص را در *S. hermanni* نشان می‌دهد.  
(G.V= Germinal vesicle) (بزرگنمایی  $100\times$ )


تخمریزی، کاهش می‌یابند ( $P<0.01$ ). لوله‌ها در یک غده جنسی، قدری یکنواخت داشتند بجز مرحله بعد از تخمریزی، که بعضی از لوله‌ها به علت دارا بودن گامتهاخی خارج نشده، متورم بودند.

تغییرات در طول و قطر لوله‌های گنادی و تغییرات بافتی تحمدان در مراحل مختلف نمو اووزن، یک الگوی فصلی منطبق با تغییرات شاخص گنادی را نشان می‌دهد (نمودار ۲). این لوله‌ها حداقل قطر را، قبل از تخمریزی داشته و بلافصله بعد از




نمودار ۲: میانگین تغییرات قطر لوله‌های ژرمینال خیارهای دریایی *S. hermanni* ماده جزیره کیش در ماههای مختلف سال (۱۳۸۴-۱۳۸۳)


شکلهای ۵ تا ۸ مراحل مختلف رسیدگی گناد تر در خیار دریایی مورد بررسی را نشان می‌دهند.




شکل ۵: مرحله نارس از بافت بیضه *S. hermanni* اپیتلیوم ژرمینال (GE) و دو لوله ژرمینال دیده می‌شوند.  
(بزرگنمایی ۱۰۰X)



شکل ۶: مرحله رشد، اپیتلیوم ژرمینال (GE) پیچ خورده، منطقه تکثیر (PZ) و اسپرماتوسیتها (SP) در بافت بیضه *S. hermanni* دیده می‌شوند (بزرگنمایی ۱۰۰X)



شکل ۷: مرحله رشد پیشرفتی در بافت بیضه *S. hermanni*, داخل لوله‌ها پر از اسپرم (SP) می‌باشد (بزرگنمایی ۱۰۰×).





شکل ۸: مرحله رسیدگی در بافت بیضه *S. hermanni* دیواره لوله‌های گنادی (TW) بسیار نازک و داخل لوله‌ها تعداد بیشماری اسپرم وجود دارد (بزرگنمایی ۱۰۰×).

و شهریور ماه، در مرحله (۵) پس از تخم‌ریزی بوده و پاییز و زمستان، در حال استراحت هستند. از اوخر اسفند ماه وارد مرحله نارس (۱) شده تا اردیبهشت ماه که مرحله رشد (۲) را نشان می‌دهند. در این مرحله سرعت گامتوزنر همزمان با گرم شدن هوا و افزایش طول روز، شدت بیشتری یافته، در خرداد ماه، مرحله رشد پیشرفتی (۳) را طی نموده و در تیر ماه آماده تخم‌ریزی (۴) می‌شوند.

تغییرات ضخامت لوله‌های گنادی در جنس نر الگوی فصلی مطابق با تغییرات شاخص گنادی را نرها نشان داد. ضخامت لوله‌های گنادی نرها، قبل از تخم‌ریزی ۲/۵ میلیمتر بود که پس از تخم‌ریزی کاهش یافتند. بنابراین رهاسازی اسپرمها، با کاهش اندازه لوله‌ها همراه است (نمودار ۳).

در ماههای مختلف سال، تغییراتی در لوله‌های گنادی هر دو جنس دیده می‌شود. نمودارهای ۴ و ۵ درصد افراد را در مراحل مختلف جنسی نشان می‌دهند.

نتایج نشان می‌دهند که ۱۰۰ درصد نمونه‌ها در تیر ماه، در مرحله رسیدگی و تخم‌ریزی (مرحله ۴) می‌باشند. در مرداد ماه

نمودار ۳: میانگین تغییرات ماهانه قطر لوله‌های ژرمنیال خیار دریایی *S. hermanni* نر در ماههای مختلف سال (۱۳۸۲-۱۳۸۴)نمودار ۴: میانگین مراحل مختلف رسیدگی خیار دریایی *S. hermanni* نر جزیره کیش در ماههای مختلف سال (۱۳۸۲-۱۳۸۴)نمودار ۵: میانگین مراحل مختلف رسیدگی خیار دریایی *S. hermanni* نر جزیره کیش در ماههای مختلف سال (۱۳۸۲-۱۳۸۴)

## بحث

Atwood, (1974) بطور نامنظم در سرتاسر لومن لوله‌ها پخش شده‌اند ().

*S. hermanni* در لوله‌های گنادی ماده‌ها، در اواخر (Precursor cells) زمستان شروع شده و بصورت تصاعدی در بهار ادامه می‌یابد، بطوریکه تغییر شکل سلولها به اووگونیا و اووسیتهای اولیه صورت می‌گیرد. سپس در مرحله پروفاز I تقسیم میوزی باقی می‌مانند و باید قبل از این امکان لفاح یابد، تا متافاز میوز II پیش روی نمایند. در تابستان، با وارد شدن شوک حرارتی، غدد تناسلی، تقسیم میوز را آغاز کرده، ابتدا اووسیتهای ثانویه تشکیل می‌شوند. کیسه زاینده (G.V) یا هسته اووسیتهای نابالغ در این حالت معمولاً در مرکز قرار گرفته است. اولین رویداد در ارتباط با بلوغ نهایی اووسیتها عبارت است از مهاجرت (G.V) به سمت قطب حیوانی یعنی محلی که میکروپیل واقع شده است. (G.V.M) در این مرحله (G.V) بوسیله میکروسکوب قابل مشاهده است.

سپس مهاجرت کروموزومهای کاملاً متراکم شده متافازی بر روی دوک متافاز اول، ردیف شده و به دنبال آن میوز I، کامل می‌گردد. بعد دوک ثانویه تشکیل شده و کروموزومها بر روی آن قرار می‌گیرند و تا زمانی که اووسیت بالغ، لفاح یابد، در این حالت باقی می‌مانند. تغییرات سیتوپلاسمی مشاهده شده در طول فرآیند G.V.B.D و G.V.M شامل بهم پیوستن قطرات کوچک چربی است که به نام Yolk globule نامیده می‌شود و خود موجب فراتایی (Trancelucency) بیشتر اووسیت می‌شود. در تحقیقی که توسط Maruyama, در سال ۲۰۰۴ میلادی انجام شد، آمده است که ماده استخراج شده از عصب شعاعی خیارهای دریابی (RNF, Radial nerve factor) مسئول القای رسیدگی اووسیتهاست. وی نشان داد که این فاکتور فعل (RNF) یک پپتید با وزن چندین هزار دالتون و مقاوم به حرارت است. این فاکتور عصب شعاعی بر روی تخمدان اثر کرده سبب آزادسازی هورمون القا کننده G.V.B.D از تخمدان می‌گردد. این ماده شبیه به آمتیل آدنین بوده و در محیط *In vitro* سبب القای G.V.B.D در اووسیتها می‌گردد. ترکیب اصلی این ماده هنوز شناخته شده و دانشمندان در حال تحقیق در این زمینه می‌باشند (Hufty & Schroeder, 2004).

در اواسط تیر ماه، سلولهای ۲۱۰ تا ۲۴۰ میکرومتری، خیلی فراوان هستند. بعد از رهاسازی این اووسیتهای بزرگ،

*S. hermanni* لوله‌های گنادی بدون انشعاب، نظیر آنچه در مشاهده شد، در گونه‌های دیگری از خیار دریابی مانند *Psoulus fabricii* و *Cucumaria luberica* نیز وجود دارد (Tyler & Gage, 1983 ; Atwood & Chia, 1974). ولی در سایر گونه‌های خیار دریابی لوله‌های گنادی منشعب گزارش شده است (Atwood, 1974 ; Smiley & Cloney, 1985).

(Cameron & Fankboner, 1986)

در طول سال، غده جنسی *S. hermanni* در نرها بزرگتر از ماده‌ها بود ( $P < 0.01$ ). این بزرگی غده جنسی نر، به تعداد لوله‌های گنادی بستگی دارد و در ارتباط با طول و قطر لوله‌ها نمی‌باشد (تست Z و  $P < 0.01$ ).

هنگام تخم‌ریزی، کاهش وزن بیشتری ادر غدد جنسی نرها مشاهده می‌شود. بنا براین می‌توان نتیجه گرفت که نرها خروجی تولید مثلی بالاتری دارند. در همین رابطه تحقیقات Hamel و Mercier در سال ۱۹۹۶ روی گونه *Psolus fabricii* نتایج مشابهی داشته و در این خیار دریابی نیز وزن غده جنسی نر، در تمام طول سال بیشتر از غده جنسی ماده بوده است. البته باید توجه داشت که این یک ویژگی کلی برای خیارهای دریابی نیست، زیرا در گونه *S. californicus* غده جنسی نر و ماده در اندازه‌های مساوی گزارش شده اند (Cameron & Fankboner, 1986).

آزمون Chi-Square نشان داد که نسبت بین جنسها در *S. hermanni* ۱:۱ می‌باشد که این مطلب در مورد چندین گونه خیار دریابی دیگر نیز به اثبات رسیده است (Cameron & Fankboner, 1986 ; Conand, 1982 ; Engstrom, 1982 ; Jespersen & Lutzen, 1971). اما در بعضی از خیارهای دریابی نسبت نرها به ماده‌ها بیشتر گزارش شده است (Lawrence, 1987).

در *S. hermanni* که سلولهای فولیکولی همکاری بسیار نزدیکی با اووسیتها هنگام مهاجرت آنها به لومن (محوطه داخلی لوله‌ها) در مرحله رسیدگی دارند. این مطلب در مورد گونه *S. elongata* Chia & Buchanan, 1969، توسط *S. californicus*، سلولهای فولیکولی در شده است. اما در مورد *S. californicus*، سلولهای فولیکولی در هنگام مهاجرت اووسیتها به لومن، چسبیده به اپیتلیوم باقی می‌مانند (Smiley & Cloney, 1985).

طبقه‌بندی واضح و روشن اسپرم زایی در *S. hermanni* بر عکس گونه‌های *Cucumaria* و *Leptosynapta clarki* و *luberica* می‌باشد، زیرا در آنها، اسپرماتوگونیا و اسپرماتیدها

## بررسی چرخه تولید مثل خیار دریایی در...

حرارت، گامت زایی را کنترل می‌کند. این مطلب بطور تجربی در تعداد زیادی از رده‌های خارپستان نشان داده شده است  
Pearse & Eernisse, 1990; McClintock & Stephen, 1986).

Costelloe در سال ۱۹۸۵ نشان داد که افزایش وزن غدد جنسی در خیار دریایی *Aslia lefreveri*, ناشی از ذخیره مواد در دیواره لوله هاست که بعداً برای تولید گامتها مورد استفاده قرار گیرند.

نتایج شاخص گنادی با داشتن یک قله (پیک) در مورد *S. hermanni* جزیره کیش، معرف استراتژی تولید مثلی یک بار در سال می‌باشد که مطالعات قبلی روی این گونه توسط Conand در سال ۱۹۸۱ این مطلب را تأیید می‌نماید.

مقادیر میانگین شاخص گنادی حاکی از شاخص تولید مثلی است (Lawrence, 1987). تغییرات ماهانه شاخص گنادی نرها و ماده‌ها، مراحل مختلفی را نشان می‌دهد. در مورد جنس ماده از فروردین تا خرداد، مقادیر رو به افزایش بوده (۰/۰۹ تا ۰/۰۷۸) و در تیر ماه به حداقل خود می‌رسد (۰/۰۰)، سپس بتدریج کاهش پیدا کرده تا اینکه در اسفند ماه به حداقل می‌رسد (۰/۰۷).

وزن تخدمانها نیز از فروردین ماه تا خرداد ماه افزایشی حدود ۶ گرم را نشان داده و در تیر ماه به حداقل خود رسیده است (۲۷/۶ گرم). سپس سقوط منحنی نشاندهنده کاهش وزن آنها می‌باشد تا آنجا که در اسفند ماه به حداقل ۰/۰۸۴ گرم می‌رسد. مقادیر شاخص گنادی نرها نیز در بهار رو به افزایش بود (۰/۰۲۲ تا ۰/۰۳۸) و در تابستان، مشخصاً تیر ماه، به حداقل می‌رسد (۰/۰۲۵)، از این زمان به بعد نمودار سقوط کرده و حداقل شاخص گنادی را در اسفند ماه وجود دارد (۰/۰۲۵).

وزن بیضه‌ها نیز از فروردین ماه تا خرداد ماه، افزایش حدود ۱۲ گرم را نشان داد و نقطه اوج نمودار در تیر ماه است (۴۳/۲۹ گرم)، سپس سقوط منحنی نشاندهنده کاهش وزن بوده تا آنجا که در اسفند ماه به حداقل میزان خود می‌رسد (۰/۰۳۷۵ گرم).

این تغییرات ناشی از تغییراتی است که در داخل لوله‌های گنادی، در هر دو جنس، در طول یک سال رخ داده و منجر به افزایش یا کاهش وزن غدد جنسی و در نتیجه شاخص گنادی می‌گردد. همزمان با شروع مراحل گامتوئنر، طول لوله‌ها و قطر آنها افزایش یافته و با آغاز مرحله دوم تقسیم میور (پروفاز ۲) در نمونه بافتی‌های تهیه شده، اووسیتی‌های ثانویه و اسپرماتوسیتی‌های ثانویه نیز دیده می‌شوند که با پیشرفت مراحل جنسی تبدیل به اووسیت و اسپرم شده و تمامی محوطه داخلی لوله‌ها پر

طی تخریبی، اندازه لوله‌های گنادی کاهش می‌یابد. از زمان تخریبی تا اسفند ماه، فاگوسیتی‌های موجود فعال بوده و اووسیتی‌های باقیمانده را از بین می‌برند. این مطالعه همچنین نشاندهنده یک اسپرماتوئنر طولانی همانند اوژنر است که با تولید یک پیش‌ساز از اواخر زمستان شروع می‌شود. در اواخر بهار، ضخامت دیواره زاینده (زرمیان)، در لوله‌های گنادی کاهش یافته، اسپرماتوگونیا، اسپرماتوسیتها و اسپرماتیدها بصورت تصاعدی در لوله‌ها تجمع می‌یابند. در تابستان وسط لوله‌ها، اسپرمها، به تعداد فراوان وجود دارند. بعد از تخریبی، تغییر اساسی قابل مشاهده، چروکیده شدن لوله‌های گنادی است. اگرچه مشاهدات بافت شناسی، گامتوئنر را سالانه نشان می‌دهد، اما مطالعات با نشانگرهای رادیو اکتیو لازم است تا این دوره را بطور دقیق مشخص نماید.

در گزارش Cloney و Smiley (۱۹۸۵) آمده است که لوله‌های بزرگ، پس از تخلیه اووسیتها، کاملاً باز جذب می‌شوند. اما باز جذب لوله‌ها در *S. hermanni* اتفاق نمی‌افتد. جذب لوله‌های گنادی در *S. japonicus* طی تحقیقات Tanaka در سال ۱۹۸۸ و سه گونه از خیارهای دریایی که توسط Conand در سال ۱۹۸۱ مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، نیز صورت نمی‌گیرد. گامتوئنر در سایر گونه‌ها مانند *Aslia lefreverei* از خانواده Dendrochirotidae لوله‌ها اتفاق می‌افتد (Costelloe, 1985). در ماههای مختلف سال، همه لوله‌ها در یک مرحله مشابه از نمو گامتوئنر هستند و همانند *S. hermanni* باز جذب نمی‌شوند.

مطالعات Hamel و Mercier در سال ۱۹۹۶ نشان داد که گامتوئنر حتی در خیارهای دریایی که ارتباط نزدیکی از نظر رده‌بندی با هم دارند، مشخصاً می‌تواند متفاوت باشد.

مرحله فعال گامت زایی در *S. hermanni*، از اواخر زمستان شروع شده و تا زمان تخریبی ادامه می‌یابد. در هر دو جنس نر و ماده، در زمستان چون شرایط غذایی حداقل است، تغییری در لوله‌های گنادی حاصل نمی‌شود. این مطلب با محتویات روده‌ای آنها که تقریباً فاقد نمونه‌های فیتو و زئوپلانکتونی است، مطابقت دارد. در حقیقت دوره گامت زایی با افزایش طول روز و افزایش درجه حرارت منطبق بوده و در حداقل دریافت روشنایی خورشید و درجه حرارت به قله (پیک) رسیدگی می‌رسد.

این مشاهدات نشان می‌دهد که افزایش تناوب نوری و درجه

رسیدگی و تخریزی می‌شود. در پاییز مرحله بعد از تخریزی و در زمستان مرحله استراحت را سپری می‌نماید.

## منابع

- امیدی اشرفی، ع.ع. ۱۳۶۸. تکنیکهای هیستو پاتولوژی. چاپ اول؛ انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد، صفحات ۱۰۰ تا ۱۵۵.
- Alexander, M.K. and Kim, J., 2001. Phylogeny of Holothuroidea (Echinodermata) inferred from morphology .Zoological Journal of The Linnean Society. Vol. 133, pp.63-81.
- Atwood, D.G. , 1974. Fine structure of the spermatogonia, spermatocytes and spermatids of the sea cucumbers (Echinodermata: Holothuroidea) Canadian Journal of Zoology. Vol.52, pp.1389-1396.
- Atwood, D.G. and Chia, F.S. , 1974. Fine structure of an usual spermatozoa a brooding sea cucumber *Cucumaria lubrica*. Canadian Journal of Zoology. Vol.52, pp.519-523.
- Battaglen, S.C. and Seymour, J.E. , 2002. Spawning induction of three tropical Sea cucumbers, *Holothuria scabra*, *Holothuria fuscogilva* and *Actinopyga mauritiana*. Aquaculture. Vol. 207, pp.29-47
- Bruckner, C.M. ; Stoffell, E.L. and Yoon, R.I. , 2003. Abundance distribution of holothurids (Echinodermata: Holothuroidea) on a windward and leeward fringing coral reef Guam, Marina Island. Bulletin of Marine Science. Vol. 52, pp.780-791.
- Cameron, J.L. and Fankboner, P.V. , 1986. Reproductive biology of the sea-Cucumber *parastichopus californicus* (Echinodermata: Holothuroidea) reproductive periodicity and spawning behavior. Canadian Journal of Zoology. Vol. 64, pp.168-175.
- Chen, A.C. and Kanotani, H. , 1991. Induction of

می‌کنند. همین امر سبب افزایش وزن غدد جنسی تا مرحله (۴) رسیدگی و تخریزی می‌شود.

با انجام تخریزی، غدد جنسی نر و ماده وارد مرحله (۵) پس از تخریزی شده و با خروج تعداد زیادی اووسیت و اسپرم و همچنین کاهش طول و قطر لوله‌ها که به سمت چروکیدگی پیش می‌رود، نمودار شاخص گنادی، نمودار وزن غدد جنسی و نمودار طول و قطر لوله‌های غدد جنسی سقوط می‌کند. با مقایسه نتایج شاخص گنادی و درجه حرارت مشخص می‌شود که تخریزی در تایستان یعنی زمانی که دمای آب در بالاترین حد خود بود (۳۰ درجه سانتیگراد) اتفاق افتاده است.

نتایج بدست آمده در این زمینه با کارهای تحقیقی انجام شده توسط دیگر محققین، مطابقت دارد. دانشمندان معتقدند که شوک حرارتی مهمترین عاملی است که می‌تواند سبب القای Hamel & Mercier, (1996) تخریزی در بی‌مهرگان دریازی گردد ().

در بسیاری از گونه‌های گرم‌سری خیارهای دریابی، افزایش ۳ تا ۵ درجه سانتیگراد، درجه حرارت آب، باعث القای تخریزی & Batlaglene ;Chen & Kanotani, 1991 (Seymour, 2002

در تحقیقی که روی گونه *Cucumaria frondosa* انجام شد، همزمانی گامتوژنر در نرها و ماده‌ها ثبیه نتایج بدست آمده در این تحقیق مشاهده شد (Hamel & Mercier, 1996). براساس مطالعات بافت شناسی این بررسی، در فروردین ماه ۱۰۰ درصد از ماده‌ها و ۱۰۰ درصد از نرها در مرحله (۱) احیا بودند؛ در اردیبهشت ماه ۸۹ درصد از افراد ذر مرحله رشد (۲) قرار داشتند. در خرداد ماه، ۱۲ درصد در مرحله رشد (۲)، ۹۸ درصد از افراد وارد مرحله (۳) رشد پیشرفته شده و نهایتاً در تیر ماه، همه نرها و ماده‌های مورد آزمایش در مرحله (۴) (رسیدگی و تخریزی) مشاهده شدند. در نمونه‌های مرداد ماه، ۱۲ درصد در مرحله (۴) و ۸۸ درصد در مرحله (۵) پس از تخریزی، مشاهده شدند. در شهریور ماه، ۸ درصد از افراد در مرحله (۴) و ۹۲ درصد در مرحله (۵) پس از تخریزی بودند. در مهر ماه، ۱۰۰ درصد آنها در مرحله (۵) پس از تخریزی بودند و این حالت تا پایان بهمن ماه ادامه می‌یابد. از اسفند ماه، ۸۰ درصد افراد وارد مرحله نارس (۱) می‌گردند.

با توجه به درصدهای بدست آمده از مراحل مختلف جنسی *S. hermanni*، می‌توان گفت که این گونه در بهار مراحل احیا و رشد و رشد پیشرفته را گذرانده و در تایستان وارد مرحله

- spawning in the sea cucumber *Scabra* (Echinodermata: Holothuroidea) by temperature shock. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 2, pp.168-194.
- Chia, F.S. and Buchanan, J.B. , 1969.** Larval development of *Cucumaria elongate*. Journal of Marine Biology. Association. UK. Vol. 49, pp.151-158.
- Conand, C. , 1981.** Sexual cycle of three commercially important holothurian species (Echinodermata) from the lagoon of New Caledonia. Bulletin of Marine Science. Vol. 31, pp.523-544.
- Conand, C. , 1982.** Reproductive cycle and biometric relation in a population of *Actinopyga echinates* (Echinodermata: Holothuroidea) from the lagoon of New Caledonia. Marine Biology Journal. Vol. 82, pp.437-442.
- Costelloe, J. , 1985.** The annual reproductive cycle of the holothurian *Aslia lefeuvrei* (Echinodermata: Dendrochirotida). Marine Biology Journal. Vol. 88, pp.155-165.
- Engestrom, N.A. , 1982.** Brooding behavior and reproductive biology of subtidal Puget sound sea cucumber, *Cucumaria lubrica*. Marine Journal of Zoology. Vol. 88, pp.447-450.
- Franklin, S.E. , 1980.** The reproductive biology and some aspect of the population ecology of the holothurians, *Holothuria leucospilota* and *Stichopus chloronotus*. Journal of Marine Science. Vol.169, pp.342-363.
- Hamel, J.F. and Mercier, A. , 1996.** Evidence of chemical communication during the gametogenesis of holothuroids. Journal of Ecology. Vol. 77, pp.1600-1610.
- Hufty, H.M. and Schroeder, P.C. , 2004.** A hormonally active substance produced by the ovary of the holothurian, *Parastichopus californicus*, general and comparative endocrinology. Vol. 23, pp.348-351.
- James, D.B. , 2001.** Twenty sea cucumbers from seas around India. Naga, the ICLARM quarterly. Vol. 24, pp.4-9.
- Jespersen, A. and Lutzen, J. , 1971.** On the ecology of the aspidochirotida sea cucumber *Stichopus termulus*. Norway Journal of Zoology. Vol.19, pp.117-132.
- Jiaxin, C. , 2003.** Overview of sea cucumber farming and sea ranching practices Naga, the ICLARM quarterly. Vol. 14, pp.4-9.
- Junqueira, L. and Carneiro, C.J. , 1986.** Basic Histology, Fifth edition, Lange medical publication of gonad tubules following extirpation. 529P.
- Lawrence, J.M. , 1987.** A functional biology of Echinoderms. Croam Helm Ltd. Australia. 339P.
- Maruyama, Y.K. , 2004.** Induction of sea cucumber oocyte maturation by Starfish radial nerve extracts. Journal of Experimental Zoology. Vol. 238, pp.241-248.
- McClintock, J.B. and Stephen, A. , 1990.** The effect of photoperiod on gametogenesis in the tropical sea urchin, *Eucidaris tribuloides*, (Echinodermata: Echinoidea). Journal Experimental Marine Biology. Vol. 139, pp.175-184.
- Pears, J.S. and Eernisse, G. , 1986.** Photoperiodic regulation of gametogenesis and gonadal growth in the sea star *Pisaster ochraceus*. Journal of the Marine Biology. Vol. 67, pp.125-212.
- Smiley, S. and Cloney, R.A. , 1985.** Ovulation and the fine structure of *Stichopus californicus* (Echinodermata: Holothuroidea) fecund ovarian tubules. Bulletin of Biology. Vol. 169, pp.342-363.
- Smirnov, A.V. ; Gebruk, A.V. ; Galkin, S.V. and Shank, T. , 2000.** New species of Holothurian (Echinodermata: Holothuroidea)

- from hydrothermal vent habitats. Journal of the Marine Biology. Vol. 80, pp.29-36.
- Tanka, Y. , 1988.** Seasonal changes in the gonad of *Stichopus japonicus*. Bulletin of Biology. Vol.9, pp.29-36.
- Tyler, H. and Gage, J.D. , 1983.** The reproductive biology of *Ypsiothuria talisamani* from the northeast Atlantic. Journal of Marine Biology. Vol.63, pp.609-616.
- Uthicke, S. , 1994.** Distribution patterns and growth of two reef flat holothurian, *Holothuria atra* and *Stichopus chloronotus*. Proceeding of the Eight International Conference. Balkema. Rotterdom. Echinoderm Newsletter. pp.35-46.

# Sexual reproduction cycle of the Sea Cucumber (*Stichopus hermanni*) in the coral reefs of Kish Island of Iran

Tehranifard A.<sup>(1)\*</sup>; Oryan Sh.<sup>(2)</sup>; Vosoghi Gh.<sup>(3)</sup>; Fatemy S.M.<sup>(4)</sup> and  
Nikoyan A.R.<sup>(5)</sup>

a\_Tehranifard2000@yahoo.co.uk

1- Marine Biology Department, Islamic Azad University, Lahijan Branch, P.O.Box: 1616  
Lahijan, Iran

2- Biology Department, Faculty of Sciences, Tarbiat Moalem University, No. 49,  
Mofateh Ave., Tehran, Iran

3,4- Marine Biology Department, Islamic Azad University, Science & Research Branch  
P.O.Box: 19585-181 Tehran, Iran

5- Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box: 14155-6116 Tehran, Iran

Received: May 2006 Accepted: September 2007

**Keywords:** *Stichopus hermanni*, Sexual Reproduction, Kish Island, Iran

## Abstract

Sea cucumber are commercially important in the world. Reproductive biology of *Stichopus hermanni* in the coral reefs of the Kish Island was investigated using 252 specimens. Morphology of the gonad of the sea cucumber species of the Kish Island was found to be similar to other species. We showed that the gonad colour is an unreliable character for sex determination except in maturity stage. We reported the gametogenesis sequence of events and found a sex ratio of 1:1 for the species. The sequence begins late in winter and continues until summer. The active stage of gametogenesis coincides with increasing photoperiod and temperature. Very little spawning activity out of season was noticeable and the maximum spawning was seen in summer. Average body length at first maturity was found to be 310 mm and the diameter of mature oocytes was 200 $\mu$ m. Oocytes moved upward at a rate of 20-30mm per minute that confirms divers' reports of the abundance of developing *Stichopus hermanni* embryos near the water surface.

\*Corresponding author