

# شناسایی جلبکهای دریایی سواحل استان سیستان و بلوچستان

بایرام محمد قرنجیک - علی مهدی آبکنار

موسسه تحقیقات شیلات ایران

بخش تنفس و پرورش، مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، چابهار خیابان دانشگاه  
تاریخ دریافت : فروردین ۱۳۷۹      تاریخ پذیرش : خرداد ۱۳۷۹

## چگینه

شناسایی جلبکهای سواحل استان سیستان و بلوچستان از آذر سال ۱۳۷۷ بمدت یک سال با عملیات نمونه برداری در مناطق بین جزر و مدی به صورت گشتیهای ماهانه و دیگری در مناطق زیر جزر و مدی بصورت فصلی توسط عملیات غواصی از منطقه گواتر با طول  $61^{\circ}30'$  و عرض  $25^{\circ}10'$  تا میدانی با طول  $5^{\circ}59'$  و عرض  $24^{\circ}25'$  اجرا گردید.

نمونه‌ها پس از جمع آوری از هر منطقه به آزمایشگاه مرکز تحقیقات انتقال یافته و پس از تیمار لازم، مطالعات و اقدامات اولیه شناسایی بر طبق منابع موجود در مرکز، عکسبرداری و تشکیل آلبوم و هریاربوم، با ذکر مشخصات نمونه برداری بر روی آنها انجام گرفت. پس از انجام مراحل فوق، نمونه‌ها جهت تأیید اسامی علمی به مراجع ذبحصلاح در کشورهای خارج از قبیل آمریکا، چین و پاکستان ارسال گردید.

طی این تحقیق در حال حاضر تعداد ۸۲ گونه در کل شناسایی و به تأیید رسیده است، از این تعداد ۶۸ گونه در حد گونه ۱۵ جلبک در حد جنس بوده است.

از مهمترین شاخه و خانواده جلبکهای شناسایی شده می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره نمود:  
جلبکهای سیز : Gigartinales ، Ulvales ، Ulvaceae ، جلبکهای قسرمز : Gracilariales ، Hypnaceae ، Nemaliales ، Gracilariaeae ، Gilidaceae و جلبکهای قهوه‌ای : Sargaceae ، Fucales

**لغات گلبدی:** جلبک - سیستان و بلوچستان - دریای عمان - ایران

## مقدمه

جلبکهای دریایی موجود در کشورمان در گروه ماکروفیتا به سه دسته عمده جلبکهای سبز، قهوه‌ای و قرمز تقسیم می‌شوند، این جلبکها به دلیل داشتن مواد مهم مانند آگار، کاراگینانها، آلتیناتها و غیره اهمیت‌های فراوانی در صنعت کاغذسازی، نساجی، چرم‌سازی، تهیه لوازم بهداشتی، آرایشی، مواد خوارکی و همچنین علوم پزشکی، داروسازی و داندپزشکی از قبیل ساخت محیط جامد کشت میکروبی، پوشش کپسولهای آنتی‌بیوتیکها، داروها، شربتها، قالب‌های اولیه داندنهای و بسیاری مواد دیگر دارند (Zhanjiang, 1990). از این روش‌باری کشورها مثل چین، ژاپن، تایوان، تایلند، فیلیپین، کره، هند و اندونزی در حدود ۵۰ سال است که از این جلبکها بهره‌برداری اقتصادی می‌نمایند (Govino & Strono Jr., ?) و هر ساله میلیونها دلار ارز از صادرات آنها بصورت ماده خام یا محصولات استخراج شده بدست می‌آورند و سال به سال در این زمینه در حال گسترش می‌باشد (Zhanjiang, 1990). کشور مانیز به جهت دارا بودن منابع غنی از جلبکهای فوق در سواحل جنوبی سواحل استان سیستان و بلوچستان که در جنوب شرقی کشور واقع شده و از نظر داشتن خصوصیات صخره‌ای و رو بشگاههای طبیعی فراوان از این جلبکها مناسبترین محل در خصوص انجام فعالیت‌های مربوط در این زمینه می‌باشد. با توجه به این موارد، فعالیت بر روی شناسایی جلبکهای دریایی از سال ۱۳۷۲ توسط مرکز تحقیقات شیلاتی چابهار آغاز گردیده است، از آنجایی که از سیاستهای شیلات ایران فعالیت اصولی و بنیادی بر روی جلبکهای دریایی تا مرحله بهره‌برداری بهینه بوده بعده موسسه تحقیقات شیلات و در منطقه چابهار متصرف گردیده است. این مرکز جهت انجام و نظم یخخیزی به فعالیت‌های انجام گرفته و رسیدن به هدف مشخص با استراتژی خاص تدوین شده، اقدام به اجرای پروژه‌ای از آذر سال ۱۳۷۷ لغاً پایان سال ۱۳۷۸ در سواحل دریای عمان و در محدوده استان سیستان و بلوچستان به طول حدود ۳۰۰ کیلومتر نموده است. اهداف این پروژه مطالعه پایه‌ای از قبیل شناسایی کامل کلیه جلبکهای دریایی موجود در منطقه تا حد گونه به تأیید مراجع علمی معتبر در کشورهای خارجی (Wynne<sup>(۱)</sup> & Tseng<sup>(۲)</sup>; Qari<sup>(۱)</sup> ; Wynne<sup>(۲)</sup> )، تهیه و تعیین

۱ - Ms. Rashida Qari, CEMB, Krachi University, Pakistan

۲ - Dr. C.K. Tesng, Institute of Oceanology, Chines Academy of Scince.

۳ - Dr. M. Wynne, Department of Biology, Natural Science building, University of Michigan, 48108, U.S.A.

نقشه پراکنش و بررسی تغییرات بیوماس چندگونه مهم و با ارزش منطقه بوده است


## مواد و روشها

در طی گشتهای مقدماتی که در آذر ماه سال ۱۳۷۷ در طول سواحل استان بوسیله خودرو و قایق انجام گرفت، یازده منطقه رویش جلیکی جهت نمونه برداری از شرق به غرب بترتیب منطقه گواتر، پسابندر، بریس، کچو، رمین، چابهار، پزم، کوردیم، تنگ، گالک و میدانی شناسایی و موقعیت جغرافیایی و مشخصات دیگر مناطق و فواصل آنها از طریق خشکی و دریا نسبت به چابهار مشخص گردید (شکل ۱).

از آنجایی که اجرای این پروژه در دو فاز عملیاتی جدا، یکی در مناطق بین جزر و مدی و دیگری زیر جزر و مدی در نظر گرفته شده بود، بدین جهت، پس از تعیین ایستگاههای نمونه برداری، در مناطق بین جزر و مدی عملیات اجرایی براساس جدول جزر و مدی، زمان و مقدار جزر مناسب برای هر منطقه در طول ماه انتخاب گردیده و طبق آن بصورت ماهانه در این مناطق حضور یافته و نمونه برداری از جلیکهای دریایی موجود در منطقه باگشت در طول ساحل انجام و هر نمونه بطور مجزا در بسته‌های پلاستیکی با ذکر مشخصات زمان، تاریخ و محل نمونه برداری قرار داده شده و به مرکز منتقل گردیده است.

مرحله دوم فاز اجرای این پروژه در مناطق زیر جزر و مدی بوده است، فاز عملیاتی این مرحله به برنامه جزر و مدی بستگی نداشته و توسط تیم غواصی حداقل دو نفر و بواسیله قایق صورت پذیرفته است. گشتهای این مناطق بدلیل گستره بودن و کمبود توان غواصی بصورت فصلی در ماههای اردیبهشت، شهریور، آذر و اسفند ماه در نظر گرفته شده بود.

نمونه‌های جمع‌آوری شده از هر دو فاز عملیاتی پس از انتقال به مرکز، با آب شیرین مورد شستشو قرار گرفته تا از هر گونه مواد اضافی پاکسازی گردد و سپس هر کدام از نمونه‌ها بطور مجزا با فرمالین  $4\%$  در صد فیکس و پرس می‌شوند. پس از انجام این مراحل، با استفاده از منابع موجود در مرکز، عمل شناسایی اولیه نمونه‌ها صورت گرفته و پس از عکس‌برداری و تشکیل آلبوم بصورت هر بار یوم جلیکی نگهداری می‌شوند، نمونه‌های شناسایی شده به تأیید مراکز و انجمن‌های علمی معتبر دنیا از قبیل آمریکا، چین و پاکستان رسیده است (Wynne & Tseng & Qari, 1999).



شکل ۱: نقشه پرآشی مناطق رویشگاهی جلیکهای دریایی سواحل ایران، افغانستان و پاکستان

## نتایج

نمونه هایی که در این عملیات مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته اند، مربوط به سه گروه جلبک های سبز، قهوه ای و قرمز بوده است. شناسایی هایی که تاکنون در مورد نمونه های این سه گروه از جلبک ها در این منطقه از کشور انجام گرفته و به تأیید رسیده است شامل ۸۲ گونه و جنس بوده که از این تعداد ۶۸ نمونه جلبک تاحد گونه و ۱۵ نمونه جلبک تاحد جنس مورد شناسایی قرار گرفته اند. از مجموع گونه های شناسایی شده، ۱۵ گونه و ۲ جنس مربوط به جلبک های قهوه ای، ۱۱ گونه و ۳ جنس متعلق به جلبک های سبز و ۴۲ گونه و ۱۰ جنس مربوط به جلبک های قرمز بوده است. اسامی جلبک های مزبور در جداول ۱ تا ۳ نشان داده شده است.

جدول ۱: جلبک های سبز شناسایی شده سواحل سیستان و بلوچستان

شماره محل های نموده برداری	گونه	خانواده	راسته
۴, ۵, ۶	<i>Ulva faciata</i> <sup>(۱)</sup> (Delile)	Ulvaceae	Ulvales
۴, ۵, ۶	<i>U. rigida</i> <sup>*</sup> (۱) (C. Aggrth)	"	"
۵, ۶	<i>Entromorpha sp.</i> <sup>(۱)</sup>	"	"
۲, ۵, ۶, ۹	<i>Chaetomorpha antennina</i> <sup>*</sup> (۱) (Bory)	Cladophoraceae	Cladophorale
۱, ۴, ۵	<i>C. gracilis</i> <sup>(۱)</sup> (Kutzing)	"	"
۶, ۹	<i>Caulerpa racemosa</i> <sup>(۱)</sup> (Forssk ; J. Agardh)	Caulerpa	Codiales
۱, ۱۰	<i>C. sertularioides</i> <sup>(۱)</sup> (Dmel; Howe)	"	"
۵, ۶, ۱۰	<i>C. mexicana</i> <sup>(۱)</sup> (Kutzing)	"	"
۱, ۵, ۹, ۱۰, ۱۱	<i>C. Scalpelliformis</i> <sup>(۱)</sup> (Turner ; C. Agardh)	"	"
۱, ۴, ۵, ۱۰	<i>C. faridii</i> <sup>*</sup> (۱) (Nizamuddin)	"	"
۱, ۵, ۹, ۱۰	<i>Halimeda tuna</i> <sup>(۱)</sup> (Ellis ; Sol.& Lamour)	Codiaceae	"
۵, ۶, ۹	<i>Codium sp.</i> <sup>(۱)</sup>	"	"
۱, ۵, ۹	<i>Bryopsis sp.</i> <sup>(۱)</sup>	Bryopsidaceae	"
۴, ۵, ۹	<i>Valoniopsis pachynema</i> <sup>*</sup> (۱) (Martens ; Borgesen)	Valoniaceae	Siphonocladiales

(۱): جلبک های شناسایی شده توسط دکتر Wynne از کشور آمریکا

(۲): جلبک های شناسایی شده توسط خانم Rashida Qari از کشور پاکستان

\*: اسامی جلبک هایی که برای اولین بار از این منطقه معرفی و گزارش شده اند.

## جدول ۲: جلبکهای قهوه‌ای شناسایی شده سواحل سپستان و بلوچستان

شماره محلهای نموده برداری	گونه	خانواده	راسته
۵، ۶، ۹	<i>Sargassum glaucsesens</i> * <sup>(۱)</sup> (J. Agardh)	Sargassceae	Fucales
۵	<i>S. illicifolium</i> * <sup>(۲)</sup>	"	"
۹	<i>S. sp. 3</i> <sup>(۳)</sup>	"	"
۸، ۹، ۱۰، ۱۱	<i>Cystoseira indica</i> <sup>(۴)</sup> (Tseng)	Cystoseiraceae	"
۱، ۴، ۶			
۶، ۹	<i>Padina australis</i> <sup>(۱)</sup> (Huck)	Dictyotaceae	Dictyotales
۶	<i>P. glabra</i> * <sup>(۱)</sup> (Gaillard)	"	"
۶	<i>P. dubia</i> * <sup>(۱)</sup> (Huck)	"	"
۶، ۹	<i>P. boergesenii</i> <sup>(۱)</sup> (Allender ; Kraft)	"	"
۱، ۶، ۸، ۹، ۱۰	<i>Stoechospermum polypodioides</i> <sup>(۱)</sup> (Lamour ( <i>marginatum</i> ) ; J. Agardh)	"	"
۱، ۹	<i>Taonia atomaria</i> <sup>(۵)</sup>	"	"
۹	<i>Lobophora variegata</i> <sup>(۵)</sup> (Lamour)	"	"
۲، ۵	<i>Spatoglossum asperum</i> * <sup>(۱)</sup> (J. Agardh)	"	"
۰، ۶، ۹، ۱۰	<i>Dictyota sp.</i> <sup>(۱)</sup>	"	"
۱، ۹	<i>Iyengaris stellata</i> <sup>(۱)</sup> (Borg)	Punctariaceae	Dityosiphonales
۱، ۶، ۹، ۱۰	<i>Colpomenia sinuosa</i> <sup>(۱)</sup> (Metrtens ; Solier)	Scyotosiphonseae	"
۹	<i>Rosenvingea orientalis</i> <sup>(۱)</sup> (J. Agardh ; Borgesen)	"	"
۴، ۵، ۶، ۹	<i>Nizimuddinia zanardini</i> * <sup>(۱)</sup> (Schiffner)	"	"

(۱): جلبکهای شناسایی شده توسط دکتر Wynne از کشور آمریکا

(۲): جلبکهای شناسایی شده توسط خانم Rashida Qari از کشور پاکستان

(۳): جلبکهای شناسایی شده توسط Tseng از کشور چین

\*: اسامی جلبکهایی که برای اولین بار از این منطقه معرفی و گزارش شده‌اند.

## جدول ۳: جلبکهای قرمز شناسایی شده سواحل سیستان و بلوچستان

ردیف شماره محلی نامه برداری	گونه	خانواده	راسته
۰.۶	<i>Hypnea nigrescens</i> <sup>(۱)</sup> , (Greville ; J. Agardh)	Hypneaceae	Gigartinales
۵	<i>H. charoides</i> <sup>(۱)</sup> (Lamouroux)	"	"
۵	<i>H. musciformis</i> <sup>(۱)</sup> (Lamouroux)	"	"
۹	<i>H. hamulosa</i> <sup>(۱)</sup> (Esper ; Lamouroux)	"	"
۹	<i>H. boergesenii</i> <sup>(۱)</sup> (Tak.Tanaka)	"	"
۶	<i>H. Valentiae</i> <sup>(۱)</sup> (Turneer ; Mantange)	"	"
۵.۶.۸.۹	<i>Gracilaria corticata</i> <sup>(۱)</sup> (J. Agardh)	Gracilariceae	"
۱.۳.۴			
۱.۵.۶.۸	<i>G. gracilis</i> <sup>(۱)</sup> (Stackhouse; Steenotof; Irvine ; Farnham (tetrasporic)	"	"
۸	<i>G. milardetti</i> <sup>(۱)</sup> (Montagne ; J. Agardh)	"	"
۵	<i>G. arcuata</i> <sup>(۱)</sup> (Zanardini)	"	"
۸	<i>G. pygmaea</i> <sup>(۱)</sup> (Borgesen)	"	"
۹	<i>G. sp.</i> <sup>(۱)</sup>	"	"
۳	<i>Gelidiopsis variabilis</i> <sup>(۱)</sup> (J. Agardh ; Schmitz)	"	"
۱	<i>Sarconema filiforme</i> <sup>(۱)</sup> (Sond; Kylin)	Solieriaceae	"
۱.۵	<i>Solieria robusta</i> <sup>(۱)</sup> Greville ; Kylin) (cystocaric) ; Kraft)	"	"
۹	<i>S. dura</i> <sup>(۱)</sup> (Zanardini)	"	"
۱.۵	<i>Ahnfeltiopsis pygmaea</i> <sup>(۱)</sup> (J. Agardh; Silva & DeCew)	Phyllophoraceae	
۱.۸	<i>Botryocladia leptopoda</i> <sup>(۱)</sup> (J. Agardh; Kylin)	Rhodymeniaceae	Rhodymeniales
۴.۵.۶.۸.۱۰	<i>Champia compressa</i> <sup>(۱)</sup> (Harvey)	Champiaceae	"
۵.۹	<i>C. sp.</i> <sup>(۱)</sup>	"	"

شماره محلهای نمونه برداری	گونه	خانواده	راسته
۱	<i>Acanthophora muscoidea</i> <sup>(۱)</sup> (Linnaeus ; Bory)	Rhodomelaceae	Ceramiales
۷	<i>A. nayadiformis</i> * <sup>(۱)</sup> (Delile; Papefuss)	"	"
۵.۶	<i>Laurencia playclada</i> * <sup>(۱)</sup> (Borgesen) (chondrophycus)	"	"
۹	<i>L. obtusa</i> <sup>(۱)</sup> (Hudson ; Lamouroux ; C. Agardh ; Znardini)	"	"
۷.۸.۹	<i>L. glandulifera</i> * <sup>(۱)</sup> (Kutzing)	"	"
۰.۹	<i>L. filiformis</i> * <sup>(۱)</sup> (C. Agardh ; Montagne ( <i>F. heteroclada</i> ) Harvey ; Saito ; Womersley (tetrasporic)	"	"
۱.۳.۵.۷.۹	<i>L. sp.</i> <sup>(۱)</sup> 1-sp. 8	"	"
۱	<i>Ceramium truncatum</i> * <sup>(۱)</sup> (Petersen; Borgesen)	Ceramiaceae	Ceramiales
۸	<i>Spiridia fusiformis</i> * <sup>(۱)</sup> (Borgesen)	"	"
۷	<i>Chondria cornuta</i> * <sup>(۱)</sup> (Borgesen)	Rhodomelaceae	"
۷.۸	<i>Jania adhaerens</i> <sup>(۷)</sup> (Lamouroux)	Corallinaceae	Crytonemiales
۴	<i>Amphyroa anceps</i> * <sup>(۱)</sup> (Lamarck ; Decaisne)	"	"
۰	<i>Gratelouphia somanlensis</i> * <sup>(۱)</sup> (Lamouroux ; C. Agardh)	Cryptonemiaceae	"
۰	<i>G. filicina</i> * <sup>(۱)</sup> (Lamouroux ; C. Agardh (cystocarpic)	"	"
۱	<i>Halymenia porphyraformis</i> * <sup>(۱)</sup> (Parkinson)	"	"
۱	<i>Scinaia furcellata</i> * <sup>(۱)</sup> (Turneer ; J. Agardh)	Chaetangiaceae	Nemaliales

## بیه سازی شد

شماره محلهای نمونه برداری	گونه	خانواده	راسته
۹	<i>S. carnosa</i> <sup>*(۱)</sup> (Kutz ; J. Agardh)	"	"
۵	<i>S. facicularis</i> <sup>*(۱)</sup> (Borgesen ; Husiman)	"	"
۳، ۵، ۹	<i>S. felabellata</i> <sup>*(۱)</sup> (Turneer)	"	"
۲	<i>Sebdenia india</i> <sup>(۲)</sup>	"	"
۱	<i>Gelidiella acerosa</i> <sup>(۱)</sup> (Forsskal ; Feldman ; Hammel)	Gelidiaceae	"
۳، ۵، ۶، ۹	<i>G. lubrica</i> <sup>*(۱)</sup>	"	"
۳، ۵، ۶، ۸	<i>Gelidium micropterum</i> <sup>(۱)</sup> (Kutzing)	"	"
۱	<i>Helminthocladia australis</i> <sup>*(۱)</sup> (Harvey)	Helminthocladiaeae	"
۶، ۹	<i>Dermonema virens</i> <sup>(۱)</sup> (J. Agardh ; Pedroche & Aivla Ortiz)	"	"
۲، ۳، ۶	<i>Melanothamnus somalensis</i> <sup>*(۱)</sup> (Bornet & Faslenberg)		

(۱) : جلبکهای شناسایی شده توسط Wynne از کشور آمریکا

(۲) : جلبکهای شناسایی شده توسط خانم Rashida Qari از کشور پاکستان

\* : اسمی جلبکهایی که برای اولین بار از این منطقه معرفی و گزارش شده‌اند.

## بحث

در هر دو مرحله نمونه برداری معلوم گردید که در چهار منطقه تنگ، چابهار، گالک و گواتر بدليل دارا بودن شبک کم در سواحل، گسترش زیاد بستر های صخره‌ای و کاهش شدت امواج، جلبکها از تعداد و تنوع بیشتر و پوشش وسیع تری نسبت به بقیه مناطق برخوردار بوده‌اند. همچنین با بررسی‌های صورت گرفته مشخص گردیده که در حالت کلی در این مناطق اغلب جلبکهای قهوه‌ای

در اوآخر پائیز و جلبکهای قرمز در اواسط زمستان و جلبکهای سبز در اوایل بهار به بیشترین رشد و مقدار خود از نظر تراکم می‌رسند و حداقل آنها در تابستان به استثنای چند نمونه از جلبکهای قرمز از جمله گراسیلاریا (Gracilaria) و جلبکهای سبز می‌رسند، از نظر رویشی جلبکهای سبز در بالاترین حد مناطق بین جزر و مدی و اغلب مسطح یعنی جایی که موج شکسته و با سرعت آرام خود تولید اکسیژن زیادی می‌کند وجود داشته و در دوره مانسون بدلیل امواج سهمگین به مناطق بالا دست یعنی جایی که امواج آب بصورت اسپری کردن به آنها می‌رسد منتقل می‌شوند و جلبکهای قهوه‌ای در منطقه پایین تر از جلبکهای سبز قرار گرفته و از مناطق بین جزر و مدی شروع و تا عمقهای متوسط ۴ تا ۷ متری پراکنده شده و با افزایش عمق از تراکم آنها کاسته می‌شود، جلبکهای قرمز بسته به انواع مختلف آنها در مناطق جزر و مدی همراه با جلبکهای قهوه‌ای دیده شده ولی در مناطق زیر جزر و مدی تا عمق بیشتری نسبت به جلبکهای دیگر پراکنده شده‌اند، بطوریکه تا عمق ۱۳ متری نیز نمونه برداری از آنها انجام گرفته است. تفاوت جلبکهای این منطقه با مناطق بین جزر و مدی از نظر ظاهری از رشد و بافت‌های قابل انعطاف زیادی برخوردار بوده‌اند. جلبکهای قرمز همانند جلبکهای قهوه‌ای هر چه به عمق می‌روند از تراکم آنها کاسته می‌شوند.

از مجموع جلبکهای شناسایی شده، چهار نمونه از جلبکهای سبز، شش نمونه از جلبکهای قهوه‌ای و سی نمونه از جلبکهای قرمز برای اولین بار از این منطقه گزارش می‌گردند. این جلبکها عبارتند از:

#### جلبکهای سبز :

*Ulva rigida* , *Chaetomorpha antennina* , *Valoniopsis pachynema* , *Caulerpa faridii*

#### جلبکهای قهوه‌ای :

*Sargassum glaucsesens* , *S. illicifolium* , *Padina glabra* , *P. dubia* , *Spatoglossum asperum* , *Nizimuddinia zanardini*

#### جلبکهای قرمز :

*Hypnea Valentiae* , *H. nigrescens* , *H. charoides* , *H. hamulosa* , *H. boergesenii* ,  
*Solieria robusta* , *Sarconema filiforme* , *Gracilaria pygmaea* , *G. arcuata* , *G. milardetti* ,  
*Laurencia glandulifera* , *L. platyclada* , *L. filiformis* , *Ahnfeltiopsis nayadiformis* ,  
*A. pygmaea* , *Solieria dura* , *Amphyroa anceps* , *Chondria cornuta* , *Spyridia fusiformis* ,  
*Halymenia porphyraformis* , *Grateloupia somanlensis* , *G. filicina* , *Sinaia carnosa*,

*S. fascicularis*, *S. felabellata*, *S. furcellata*, *Ceramium truncatum*.

*Melanothamnus somalensis*, *Helminthocladia australis*, *Gelidiella lubrica*

با توجه به اهمیت و کاربرد روز افرون جلبکهای دریایی در جهان و وجود منابع سرشار جلبکی در این منطقه از کشور، پیشنهاداتی بشرح زیر جهت استفاده از آنها ارائه می‌گردد:

- ۱- ایجاد ارتباط نزدیک با کشورهایی که در این زمینه دارای تجارت کافی هستند، دعوت از متخصصان و برقراری سمینارها و دوره‌های آموزشی علمی در داخل و خارج کشور.
- ۲- تدوین یک استراتژی اصولی و علمی بر روی فعالیتهای جلبکهای دریایی کشور.
- ۳- جهت جلوگیری از فعالیتهای پراکنده و ایجاد نظم و انسجام در فعالیتهای مربوط به جلبکهای دریایی کشور به منظور رسیدن به یک هدف مشترک و مشخص، ایجاد گردهمایی هر چند یکبار با حضور کلیه افراد، نهادها و سازمانهایی که به نحوی در این مورد فعالیت دارند.

## تشکر و قدردانی

با توجه به اهمیت موضوع و وسعت دامنه کاری، از زحمات بیدریغ افراد زیر که در اجرای این پروژه و به نتیجه رسیدن آن با وجود مشقات زیادی که در حین انجام عملیات در مناطق بوده و از هیچ کوششی مضایقه نکرده‌اند، تشکر و قدردانی می‌گردد:

از همکاران محترم بخش تکثیر و پرورش مرکز، برادران گل محمد سوپک، سلیم جدگال، عبدال... حق پناه و سعید سلطانی نسب که بطور مستمر در نمونه‌برداری از کلیه مناطق یاری کرده‌اند. از غواص مرکز، برادر تیمور امینی راد که با وجود خطرات و خستگی‌های فراوانی که این فاز عملیاتی داشته، تلاش زیادی نمودند.

از ریاست محترم مرکز، جناب آقای مهندس حشمت‌ا... از دری که با درک اهمیت موضوع و احساس مسئولیت، از هیچ کوششی در ایجاد هماهنگی اجرای فاز عملیاتی پروره و همچنین برقراری ارتباط و انجام مکاتبات با کشورهای خارج دریغ ننموده‌اند.

از خانم مهندس گیلان عطاران، مسئول قسمت اطلاعات علمی مرکز، که از شروع پروژه تا پایان آن زحمت مکاتبه و نامه‌نگاری با کشورهای خارج در خصوص شناسایی نمونه جلبکها داشته‌اند. از اساتید محترم کشورهای خارج که در تأیید و شناسایی گونه‌های جلبکی کشورمان قبول زحمت کرده‌اند از جمله: دکتر Wynne از کشور آمریکا، دکتر Tseng از کشور چین و خانم Rashida Qari از کشور پاکستان. از برادر گل محمد سوپک که زحمت تایپ این مقاله را بر عهده داشتند،

تشکر مجلد بعمل می آید.

### منابع

- Borgsn, F. , 1937.** Contribution to a South Indian marine algal flora-II. Journal of Indian Botanical Society. Vol. 16, pp.311-357.
- Borgsn, F. , 1939.** Marine algae from the Iranian Gulf especially from the innermost part near Bushehr and Karg. Danish Scientific investigation of Iran. Vol. 1, pp.46-141.
- Lamouroux, J.V.F. , 1809.** Memore sur les Cauderpes nouveaux genre de famille des algues marines. Journal Botanique. Vol. 2, pp.136-146 + IIpls.
- Nizamuddin, M. and Begum, N. , 1978.** Studies on the marine algae (Punctariales) from Karachi. Revue Algologique, New Science. Vol. 14, pp.40-53.
- Nizamuddin, M. 1981.** Contribution to the marine algae of Libya, Dictyotales. Bibliotheca Phycologica. Vol. 54, pp.1-22.
- Nizamuddin, M. and Perveen, S. , 1986.** Taxonomic studies on some members of Dictyotales (Phaeophyta) from the coast of Pakistan. Pakistan Journal of Botany. Vol. 18, pp.123-135.
- Qari, R. and Qasim, R. , 1988.** Seasonal changes in the standing crop of intertidal seaweed from the Karachi coast. In: Marine Science of the Arabian Sea (Eds. Thompson, M.F. and N.M. Tirmizi) American Institute of Biological Sciences, Washington D.C., pp.449-456.
- Tseng, C.K. , 1993.** Common seaweed of China. Institute of Oceanology, Academic sinia, Quinydao China.
- Zhanjiang Fisheries Collage, 1990.** Training manual on Gracilaria culture and seaweed processing in China. People's Repblic of China. Training manual 6. (FAO).