

# معرفی گونه *Rhinogobius similis*, Gill 1895

## از خانواده گاوماهیان (Gobiidae)

به عنوان یک گونه جدید غیر بومی ماهیان آب شیرین ایرانی

اصغر عبدالی<sup>(۱)</sup> - برایان کد<sup>(۲)</sup> و مهدی نادری<sup>(۳)</sup>

- ۱ - دانشکاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
  - ۲ - موزه تاریخ طبیعی کانادا، اوتاوا، کانادا صندوق پستی : ۳۴۴۳
  - ۳ - بخش بوم‌شناسی، مرکز تحقیقات شیلاتی استان هزاردران، ساری صندوق پستی : ۹۶۱
- تاریخ دریافت : تیر ۱۳۷۸      تاریخ پذیرش : اردیبهشت ۱۳۷۹

**لغات کلیدی :** Gobiidae - *Rhinogobius similis* - ایران

گونه *Rhinogobius similis* به عنوان یک گونه غیر بومی (exotic) برای اولین بار در کشور ایران گزارش شده است. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد این گونه به تعداد محدود در هریرود در مراز کشور ایران و ترکمنستان وجود دارد. اغلب خصوصیات ظاهری آن در ایران با خصوصیات ارائه شده برای این گونه در مناطقی از کشورهای کره و ژاپن شباهت دارد.

ماهیان ایران تاکنون به صورت جامع مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. کشف جنس‌ها و گونه‌های جدید در سالهای اخیر بیانگر این مسئله است (Coad & Abdoli, 1993).

در این راستا جهت شناسایی گونه‌های ماهیان آب شیرین ایران در بهمن ۱۳۷۴ نمونه‌برداری از بخش‌هایی از استان خراسان انجام گرفت. بررسیهای به عمل آمده در سالهای گذشته نشان می‌دهند که

پراکنده خانواده گاو ماهیان (Gobiidae) ایران در حوضه جنوب دریای خزر (سواحل دریا و رودخانه‌های متنه‌ی به دریا) و رودخانه‌های حوضه شمال خلیج فارس می‌باشد (Coad, 1995; Berg, 1999).

هر بررود از کوههای شمال غرب افغانستان سرچشمه می‌گیرد و بعد از طی مسافتی حدود ۴۹۰ کیلومتر به مرز ایران با افغانستان می‌رسد و بعد از طی مسافتی حدود ۱۶۰ کیلومتر در منطقه سرخس وارد کشور ترکمنستان می‌شود که در این منطقه به نام تجن (Tedzhen) شناخته می‌شود. این رودخانه در نهایت به کویر قره قوم می‌ریزد. محلی که نمونه‌هایی از گونه *R. similis* به دست آمده است نزدیک شهر سرخس با مشخصات طول شرقی  $۶۱^{\circ} ۱۰'$  و عرض شمالی  $۳۶^{\circ} ۳۰'$  است. مشخصات محل نمونه برداری در بهمن ۱۳۷۴ عبارت بود از :

عمق آب  $۱۲۰-۳۵$  سانتی‌متر، عرض رودخانه  $۱۲-۲۷$  متر، شفافیت  $۱۵$  سانتی‌متر، دمای آب  $۱۲$  درجه سانتی‌گراد، بستر قلوه سنگی و شیب حدود  $۱$  درصد بود. سایر ماهیان صید شده همراه با این گونه شامل :

*Carassius auratus*, *Capoeta capoeta heratensis*, *P. seudorasbora parva*,

*Nemacheilus cristatus*, *Schizothorax pelazmi*.

نمونه‌ها با استفاده از دستگاه الکتروشوکر با ولتاژ  $۲۰۰$  ولت و با چشممه  $۶$  میلی‌متر (گره تاگره مجاور) صید شدند. نمونه‌ها در فرمایین  $۱۰$  درصد ثبیت شده و جهت شناسایی به آزمایشگاه منتقل شدند. اندازه گیری و شمارش فاکتورها براساس Berg, 1949 انجام گرفت. پنج نمونه از این گونه جمع‌آوری گردید. خصوصیات شمارشی در دو نمونه بررسی شده به شرح زیر است:

تعداد شعاعهای سخت باله پشتی اول  $7$  و باله پشتی دوم  $1$  شعاع سخت و  $9$  شعاع نرم بین اولین و دومین شعاع سخت در اولین باله پشتی لکه سیاه وجود ندارد. باله سینه‌ای  $18$  تا  $19$  شعاع نرم، باله مخرجی  $9$  تا  $10$  شعاع نرم، فلس‌های موجود در ردیفهای پهلوی (squ)  $31$  عدد، خارهای آبششی  $11$  عدد، خصوصیات اندازه گیری نسبت به طول استاندارد (برحسب سانتی‌متر) نیز عبارت بودند از: طول سر  $۳/۲$ ، ارتفاع سر  $۵/۵$  تا  $۵/۹$ ، ارتفاع بدن  $۵/۴$  تا  $۵/۸$ ، فاصله جلویی باله مخرجی تانوک

پوزه ۱/۶، فاصله جلوی باله شکمی تانوک پوزه ۳/۳.

برخی اندازه گیریها نسبت به طول سر بر حسب سانتی متر عبارت بودند از:

عرض سر ۱/۳، طول پوزه ۲/۹ تا ۳، قطر چشم ۴/۸ تا ۵، فاصله بین دو حلقه چشم ۶/۸ تا ۸/۵، فاصله پشت حلقه از چشم تا انتهای سرپوش آبتشی ۲.

خصوصیات اندازه گیری و شمارش شده با مشخصات ارائه شده توسط Berg, 1949, کاملاً مطابقت دارد.

این گونه غیر بومی در کانال قره قوم نیز گزارش شده است. (Salnikov, 1995) و احتمالاً به صورت تصادفی از طریق رودخانه آمور از شرق آسیا به این منطقه وارد شده است. این گونه همچنین در ژاپن و کره نیز وجود دارد. تعداد گونه های بومی رودخانه هریر رود براساس Berg, 1949 ; Coad, 1981 ; Salnikov, 1995 ۱۳ گونه از ۴ خانواده است. گونه های غیر بومی زیر را در هریر رود ثبت نموده اند (Coad & Abdoli, 1993).

*Carassius auratus*, Linnaeus, 1785

*Pseudorasbora Parva* Temminck and Schlegel in Siebold, 1842

*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758

*Gambusia holbrooki* Girard, 1859

وجود این تعداد گونه غیر بومی با توجه به اثرات گونه های غیر بومی بر روی گونه های بومی (Coad & Abdoli, 1993) به اضافه گونه غیر بومی جدید *R. similis* می تواند خطرات زیادی را برای گونه های بومی این رودخانه ایجاد نماید.

یافتن گونه اخیر که برای ایران یک جنس و گونه جدید است با توجه به آنکه زیستگاه اصلی آن کشورهای چین، ژاپن و کره می باشد بیانگر این مطلب است که احتمالاً این گونه همراه با گونه های پرورشی و یا احداث کانال قره قوم به ایران یا کشورهای همسایه (با توجه به مرزی بودن رودخانه هریر رود بین ایران و ترکمنستان) منتقل شده است. این مقاله تنها با هدف معرفی این گونه به عنوان یک گونه غیر بومی برای کشور ایران ارائه گردیده است.

## تشکر و قدردانی

از زحمات آقایان آزمایشگاهی و بحثگذاری و یزدان دادکه در جمع آوری نمونه‌های مارا باری دادند تشکر و قدردانی می‌نمائیم.

## منابع

- Berg, L. ,1949.** Freshwater Fishes of the USSR and adjacent countries. Israel Program for Scientific Translation (1962-1965). Jerusalem. Israel. Vol.1-3.
- Coad, B.W. , 1981.** Fishes of Afghanistan, an annotated checklist. Publications in Zoology, National Museum of Canada. Ottawa. Vol. 14. pp.V+26.
- Coad, B.W. , 1995.** Freshwater fishes of Iran: Acta Scientiarum Naturalium Academiae scientiarum Bohemicae, Brno. Vol. 29, No. 1, pp.1-64.
- Coad, B.W. and Abdoli, A. , 1993.** Exotic fish species in the freshwaters of Iran. Zoology in the Middle East, Heldorf. Vol.9, pp.65-80.
- Salnikov, V.B. , 1995.** Possible changes in the composition of the Ichthyofauna after completion of the Karakum canal in Turkmenistan, Bethesda. Journal of Ichthyology, Vol. 35, No. 7, pp.108-121.