

اثر پریوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی و برخی شاخص‌های

ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*)

محسن علی^۱، پریا اکبری^{۲*}، سیاروش سلطانیان^۱، امین غلام حسینی^۱

*paria.akbary@gmail.com

۱- گروه بهداشت و بیماری آبزیان، دانشکده دامپزشکی شیراز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

۲- گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوری و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

تاریخ پذیرش: خرداد ۱۳۹۷

تاریخ دریافت: آذر ۱۳۹۶

چکیده

پریوتیک‌ها مواد غذایی غیرقابل هضم می‌باشند که با تحریک اختصاصی رشد و یا فعالیت باکتری‌های تخصصی ارتقاء دهنده سلامت، اثر مفیدی بر میزان می‌گذارند. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر مکمل غذایی گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی و برخی شاخص‌های ایمنی لارو قزل آلای رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*) به مدت ۶۰ روز صورت گرفت. در این مطالعه، تعداد ۳۶۰ قطعه لارو قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 13 ± 0.1 گرم در یک طرح کاملاً تصادفی به ۴ تیمار آزمایشی و ۳ تکرار (با تعداد ۱۰ قطعه در هر تکرار) تقسیم شدند و بترتیب با رژیم‌های غذایی حاوی ۰، ۱، ۲ و ۳٪ گالاکتوالیگوساکارید مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که بالاترین، افزایش وزن بدست آمده، ضریب رشد ویژه و نسبت کارایی پروتئین در تیمار حاوی ۲ و ۳٪ گالاکتوالیگوساکارید مشاهده شد که با بقیه تیمارها دارای تفاوت معنی دار بود ($p<0.05$). بیشترین فعالیت لیزوزیم، پروتئین تام، گلوبولین، آلبومین، وزن نهایی و بقاء در تیمار حاوی ۰.۲٪ گالاکتوالیگوساکارید مشاهده شد که با بقیه تیمارها تفاوت معنی داری را نشان دادند ($p<0.05$). بر اساس نتایج این تحقیق، افزودن ۲٪ گالاکتوالیگوساکارید در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان به منظور بهبود شاخص‌های رشد، بقاء و پاسخ‌های ایمنی ذاتی در این ماهی موثر است.

کلمات کلیدی: ماهی قزل آلای رنگین کمان، پریوتیک، شاخص‌های رشد، ایمنی ذاتی

*نویسنده مسئول

مقدمه

مثال، گالاکتوالیگوساکارید به عنوان مکمل غذایی، با افزایش باکتری‌های لاكتیک اسید سبب افزایش رشد و تحمل استرس و تعدیل میکروب‌های روده‌ای در نوزاد ماهی کلمه (Rutilus rutilus) شد (HosseiniFar et al., 2013). همچنین Solimani و همکاران (۲۰۱۲) نشان دادند که استفاده از فروکتوالیگوساکارید در جیره غذایی ماهی کلمه منجر به بهبود پاسخ ایمنی، مقاومت در برابر استرس، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و عملکرد رشد می‌گردد. Mokhtari و همکاران (۲۰۱۶) نشان دادند که استفاده از پربریوتیک گالاکتوالیگوساکارید در جیره غذایی ماهی گورامی سه خال (*Trichogaster trichopterus*) منجر به افزایش مقاومت به بروز تنفس شوری گردید. از آنجایی که تاکنون پژوهشی در زمینه استفاده از پربریوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر ماهی قزل آلای رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*) صورت نگرفته است و اکثر ضررهای قبل توجه در صنعت آبزی پروری به دلیل مرگ و میر لاروهای ماهیان مختلف در سرتاسر جهان گزارش شده است (Sugita et al., 2002)، جهت جلوگیری از مرگ و میر بالای لاروهای گونه‌های مختلف ماهیان، افزایش وضعیت ایمنی این لاروها از طریق استفاده از محرك‌های ایمنی برای مبارزه با عوامل عفونی در مراحل اولیه زندگی لازم می‌باشد. لذا، هدف از این تحقیق، بررسی اثر گالاکتوالیگوساکارید به عنوان مکمل غذایی بر رشد، بقاء و برخی شاخص‌های ایمنی ذاتی سرم خون در لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان می‌باشد.

مواد و روش کار**ماهی و شرایط پرورش**

این پژوهش در اوخر آذرماه ۱۳۹۵ در آزمایشگاه بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز انجام شد. تعداد ۵۰۰ قطعه لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان از مزرعه تکثیر و پرورش قزل آلا واقع در سپیدان شیراز خریداری و با استفاده از کیسه‌های دوجداره (یک سوم آب به همراه دوسوم اکسیژن) به محل آزمایش، انتقال داده شد. پس از طی دوره سازگاری به مدت دو هفته و اطمینان از سلامتی آنها، ۳۶۰ قطعه لارو

پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*) طی سالیان اخیر با شتاب زیادی توسعه یافته است، مزارع جدید ساخته شده اند و میزان تولید در واحد سطح افزایش چشمگیری پیدا کرده است. همراه چنین توسعه‌ای که افزایش تراکم ماهی را در واحد سطح طلب می‌نماید، انواع بیماری‌های عفونی با سرعت هرچه تمام‌تر در جمعیت ماهیان پرورشی گسترش می‌یابند، بطوريکه خساراتی بیش از ده درصد تولیدات سالانه را به این صنعت وارد می‌کند Khodadadi et al., 2018; Ravelo et al., 2006).

سلامتی و تغذیه از اصلی ترین نگرانی‌ها در پرورش ماهیان خوراکی و زینتی می‌باشد (Ghosh et al., 2008) در کنار نیاز به واکسن‌ها و آنتی‌بیوتیک‌های مناسب در بعضی مناطق، مکمل‌های غذایی مانند پربریوتیک و محرك‌های ایمنی می‌توانند از حساسیت ماهیان به بیماری بکاهند (Gibson and Roberfroid, 1995) غذایی غیر قابل هضم می‌باشند که با تحریک اختصاصی رشد و یا فعالیت باکتری‌های تخصصی ارتقاء دهنده سلامت، اثر مفیدی بر میزان می‌گذارند. الیگوساکاریدها با فراهم کردن امکان رشد بیشتر برای باکتری‌های مفید روده‌ای، از اصلی‌ترین ترکیبات پربریوتیک می‌باشند (Kakhkesh and Roomiani, 2018; HosseiniFar et al., 2016; Bita et al., 2016) پربریوتیک گالاکتوالیگوساکارید از واکنش آنژیمی لاكتوز حاصل می‌گردد و عمده‌ای از مولکول‌های گلوكز و گالاكتوز تشکیل شده است (Zhou et al., 2007). مطالعات متعددی در زمینه اثرات اینولین، فروکتوالیگوساکارید، مانان‌الیگوساکارید و گالاکتوالیگوساکارید به عنوان پربریوتیک بر عملکرد رشد، پاسخ ایمنی و مقاومت علیه بیماری‌ها در ماهی تیلاپیای نیل (*Orechromis niloticus*), فیل ماهی (Ibrehem et al., 2010) (*Huso huso*), ماهی سفید (HosseiniFar et al., 2011) (*Rutilus frisii*) و (Fenneropenaeus indicus) می‌گویی سفید هندی (HosseiniFar et al., 2016) صورت گرفته است. برای

گرم) و طول (با دقت ۱ میلی‌متر) آنها ثبت گردید. با استفاده از داده‌های حاصل از زیست سنجی‌ها، افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، شاخص وضعیت ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازدهی پروتئین و درصد بقاء تعیین شد (Wahli *et al.*, 2003).

خون گیری از ماهیان

برای سنجش پارامترهای ایمنی (پروتئین تام، آلبومین، گلوبولین و لیزوژیم)، به صورت تصادفی از ۹ قطعه ماهی هر تیمار پس از بیهوشی با عصاره گل میخک (۲ g/L) (Hoseinifar *et al.*, 2014) خون گیری (به میزان ۲ میلی‌لیتر) از قلب با استفاده از سوزن و سرنگ صورت گرفت. سپس نمونه‌ها با دور ۳۰۰۰ بر دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ (Hettich DV200 مدل) ساخت کشور ژاپن) و سرم آن جدا گردید و در دمای ۷۰- درجه سانتی‌گراد داخل میکروتیوب نگهداری شد (Harikrishnan *et al.*, 2012).

شاخص‌های ایمنی ماهی

مقدار پروتئین تام سرم با استفاده از کیت تشخیصی شرکت پارس آزمون و از روش ببوره مورد سنجش قرار گرفت و جذب نوری لوله‌های نمونه و استاندارد را در مقابل بلانک در طول موج ۵۵۰ نانومتر بوسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر (WPAS2000-UV/VIS, Cambridge, UK) خوانده شد و میزان پروتئین تام بر حسب گرم بر دسی‌لیتر (g/dL) محاسبه گردید (Burtis *et al.*, 1994).

مقدار آلبومین تام سرم به روش بروموکربنول سبز و با استفاده از کیت تشخیصی شرکت پارس آزمون مورد سنجش قرار گرفت. جذب نوری این محلول را در طول موج ۶۳۰ نانومتر بوسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر (WPAS2000-UV/VIS, Cambridge, UK) در مقابل بلانک قرائت گردید و میزان آلبومین بر حسب گرم بر دسی‌لیتر محاسبه گردید (Burtis *et al.*, 1994). و از کسر پروتئین تام از آلبومین میزان گلوبولین محاسبه شد (Kumar *et al.*, 2005). میزان نسبت

با میانگین وزنی 130 ± 0.1 گرم و میانگین طولی 230 ± 2 سانتی‌متر شمارش شدند و با تراکم ۳۰ قطعه به ۱۲ آکواریوم ۷۰ لیتری منتقل گردیدند. در طول دوره، فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب اندازه‌گیری شد. به طور میانگین در کل دوره درجه حرارت آب 14.5 ± 1 درجه سانتی‌گراد، اکسیژن محلول 8.0 ± 0.1 میلی‌گرم در لیتر و pH آب 7.1 ± 0.5 بود. طی دوره آزمایش دوره نوری به صورت ۱۲D:۱۲L بود. به منظور هواهی و نیاز اکسیژن ماهیان، به هر یک از مخزن‌ها یک سنگ‌های Liu *et al.*, 2016) تیمار شاهد که تنها با غذای تجاری (شرکت تعاونی تولیدی ۲۱ بیضاء، شیراز)، ۳ تیمار با سطوح ۳٪، ۲٪ و ۱٪ گالاکتوالیگوساکارید بودند که برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد و طی یک دوره ۶۰ روزه مورد استفاده قرار گرفتند (Faghani *et al.*, 2013).

آماده‌سازی جیره و غذاده‌ی به ماهیان

به منظور اضافه نمودن سطوح مختلف مکمل گالاکتوالیگوساکارید به غذای کنسانتره ابتدا مقدار غذا برای کل دوره آزمایش برای هر تیمار محاسبه شد. سپس سطوح مشخص گالاکتوالیگوساکارید (تهیه شده از شرکت Domo, Zwolle, The Netherlands) به همراه ۵۰۰ میلی‌لیتر آب به سطح غذا اسپری شدند. پس از ۴۸ ساعت جیره‌های خشک جمع آوری و در نایلون‌های مجزا در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. تیمار شاهد تنها با ۵۰۰ میلی‌لیتر آب اسپری گردید Soleimani *et al.*, 2012). مقدار غذای روزانه با توجه به درصد وزن بدن (توده زنده) محاسبه شد و در نوبت صبح و عصر به میزان ۳٪ وزن بدن در اختیار ماهیان قرار گرفت. عمل تمیز نمودن به صورت یک روز در میان انجام شد و باقی‌مانده غذایی و مدفعه ماهیان از مخازن خارج گردید.

زیست سنجی و بررسی شاخص‌های رشد و تغذیه به منظور اندازه‌گیری شاخص‌های رشد، در انتهای آزمایش تمام ماهیان هر مخزن خارج شده و وزن (با دقت ۰.۱

نتایج

شاخص‌های رشد و تغذیه

نتایج مربوط به شاخص‌های رشد، تغذیه و بقاء تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش در جدول ۱ ارائه شده است. ماهیان از میانگین وزن اولیه 0.13 ± 0.02 گرم به دامنه میانگین وزن نهایی 0.14 ± 0.02 گرم در طول دوره ۶۰ روزه آزمایش رسیدند. نتایج نشان داد که با افزودن مقادیر مختلف گالاكتووالیگوساکارید تفاوت معنی‌داری را در میانگین وزن نهایی، افزایش وزن بدست آمده، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و میزان بازده پروتئین در مقایسه با تیمار شاهد ایجاد کرد ($p < 0.05$). در کل دوره آزمایش، بیشترین افزایش وزن بدست آمده، ضریب رشد ویژه، نسبت بازده پروتئین و کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای حاوی ۳٪ گالاكتووالیگوساکارید مشاهده شد و اختلاف معنی‌داری را در مقایسه با سایر تیمارها نشان داد ($p < 0.05$).

آلبومن به گلوبولین از تقسیم کردن مقادیر آلبومن تام گلوبولین محاسبه شد (Kumur et al., 2005). سنجش فعالیت لیزوژیم سرم نمونه‌ها، بر اساس روش توصیه شده توسط Ellis (۱۹۹۰) توسط سوسپانسیون میکروکوکوس *Micrococcus lysodeikticus* (محصول سیگما) صورت گرفت.

تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از اندازه گیری شاخص‌های رشد، بقاء و برخی شاخص‌های ایمنی سرم خون با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون مقایسه چند دامنه‌ای دانکن، در سطح احتمال ۵٪ بین تیمارهای مختلف صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS 16 استفاده گردید.

جدول ۱: تغییرات شاخص‌های رشد در تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش

Table 1: Means \pm S.E Changes of growth parameters in different treatments at the end of experiment.

تیمار (درصد گالاكتووالیگوساکارید)				شاخص‌های رشد
۳	۲	۱	۰	
0.13 ± 0.02^a	0.14 ± 0.02^a	0.16 ± 0.02^a	0.13 ± 0.02^a	وزن اولیه (گرم)
0.83 ± 0.02^b	0.86 ± 0.04^a	0.58 ± 0.03^c	0.50 ± 0.02^d	وزن نهایی (گرم)
$332/34 \pm 11/98^a$	$596/0.7 \pm 12/68^a$	$336/57 \pm 6/93^b$	$277/71 \pm 9/15^c$	افزایش وزن بدست آمده (درصد)
$3/0.3 \pm 0.03^a$	$3/0.9 \pm 0.02^a$	$2/45 \pm 0.03^b$	$2/20 \pm 0.04^c$	ضریب رشد ویژه
$1/0.1 \pm 0.13^c$	0.90 ± 0.03^c	$1/47 \pm 0.10^b$	$1/80 \pm 0.23^a$	ضریب تبدیل غذا
$10/47 \pm 0.26^a$	$10/91 \pm 0.43^a$	$6/78 \pm 0.34^b$	$5/59 \pm 0.18^c$	نسبت بازدهی پروتئین
0.93 ± 0.03^{ab}	0.97 ± 0.04^a	0.88 ± 0.02^{ab}	0.86 ± 0.02^b	شاخص وضعیت
$8/0. \pm 0^b$	$93/30 \pm 0^a$	$61/33 \pm 1/81^c$	$60/0 \pm 0^c$	بقاء (درصد)

حروف نامشابه در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی‌دار بین تیمارها است ($p < 0.05$).

تیمار شاهد ایجاد نمود ($p < 0.05$). بیشترین میزان پروتئین تام و گلوبولین، آلیومین و لیزوژیم در تیمار تغذیه شده با ۲٪ گالاكتووالیگوساکارید مشاهده شد و تفاوت معنی‌داری را در مقایسه با سایر تیمارها و تیمار شاهد نشان داد ($p < 0.05$). بین تیمارهای تغذیه شده با ۱٪ گالاكتووالیگوساکارید و تیمار شاهد اختلاف معنی‌داری وجود نداشت ($p > 0.05$).

پارامترهای ایمنی سرم خون

تغییرات میانگین پارامترهای ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان در تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش (روز ۶۰) در جدول ۲ ارائه شده است. افزودن سطوح مختلف گالاكتووالیگوساکارید به جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان تفاوت معنی‌داری را در میزان پروتئین تام، آلبومن، گلوبولین و لیزوژیم سرم خون در مقایسه با

جدول ۲ : میانگین و انحراف معیار سطوح پروتئین تام، آلبومین، گلوبولین و لیزوژیم سرم ماهی قزل آلای رنگین کمان در تیمارهای مختلف در پایان دوره آزمایش

Table 2: Means \pm S.E of serum total protein, Albumin, Glubolin and Lysozyme levels in *Oncorhynchus mykiss* in different treatments at the end of experiment.

تیمار (%) گالاكتواليگوساکارید)				پارامترهای ایمنی
۳	۲	۱	*	
۴/۴۶ \pm ۰/۲۷ ^b	۵/۳۷ \pm ۰/۰۷ ^a	۴/۴۰ \pm ۰/۴۲ ^c	۲/۰۶ \pm ۰/۱۸ ^d	پروتئین تام (g/dL)
۲/۱۷ \pm ۰/۲۳ ^b	۲/۱۸ \pm ۰/۱۰ ^a	۲/۰۳ \pm ۰/۰۵ ^c	۱/۱۶ \pm ۰/۰۱ ^d	آلبومن (g/dL)
۲/۴۲ \pm ۰/۱۵ ^b	۳/۱۸ \pm ۰/۰۶ ^a	۲/۲۲ \pm ۰/۲۸ ^c	۰/۹۰ \pm ۰/۰۵ ^d	گلوبولین (g/dL)
۳/۹۲ \pm ۰/۰۷ ^b	۴/۴۶ \pm ۰/۱۶ ^a	۳/۱۲ \pm ۰/۰۸ ^c	۲/۴۵ \pm ۰/۱۳ ^d	لیزوژیم (U/mL)

حروف نامشابه در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی دار بین تیمارها است ($p < 0.05$).

نتایج این تحقیق همخوانی داشت. همچنین Hosseiniifar و همکاران (۲۰۱۶) نشان دادند که استفاده از سطوح ۱، ۲ و ۳٪ گالاكتواليگوساکارید در جیره غذایی ماهی سفید منجر به بهبود شاخصهای رشد و تغذیه می گردد. بنظر می رسد افزایش رشد به دلیل نقش پربریوتیکها در تقویت میکروفلور رودهای و ممانعت از تشکیل کلنی باکتری های بیماری زا می باشد. باکتری های ساکن روده قادرند به طور انتخابی پربریوتیکها را تخریب کنند، تخریب قندهای موجود در روده سبب افزایش انرژی و رشد این باکتری ها می شود. در نتیجه، منجر به افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی و بهبود سلامت فیزیولوژی روده می گردد (Hosseiniifar et al., 2016).

تحریک پاسخ ایمنی در ماهیان از طریق جیره غذایی از موضوعات مورد علاقه آبزی پروری است. پارامترهای ایمنی غیر اختصاصی نظیر لیزوژیم، پروتئین تام، آلبومین و گلوبولین نقش حیاتی مهمی در دفاع اولیه ماهی در برابر عوامل بیماری زا دارند (Hosseiniifar et al., 2016). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گالاكتواليگوساکارید در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان منجر به افزایش معنی دار پروتئین سرم شد و بیشترین میزان پروتئین تام در تیمار تغذیه شده با ۰.۲٪ گالاكتواليگوساکارید مشاهده شد که با نتایج بدست آمده از تحقیق صورت گرفته بر ماهی سفید تغذیه شده ۱ و ۲٪ گالاكتواليگوساکارید (Hosseiniifar et al., 2016)، ماهی سفید تغذیه شده با ۳ درصد

بحث

یکی از راهکارهای موثر برای حفظ سلامت آبزیان پرورشی و افزایش مقاومت آنها در برابر عوامل بیماری زا و استرس های محیطی استفاده از پربریوتیکها می باشد (Hosseiniifar et al., 2013). پربریوتیکها نه تنها مواد مغذی ضروری را تأمین می کند، بلکه منجر به تقویت میکروفلور روده ای و ممانعت از تشکیل کلنی باکتری های بیماری زا می گردد. از اینرو، سبب تحریک سیستم ایمنی می شود (Firouzbakhs et al., 2011).

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تیمارهای حاوی گالاكتواليگوساکارید نسبت به تیمار شاهد دارای شاخصهای رشد (وزن نهایی، افزایش وزن بدست آمده، ضربی رشد و پیله) و شاخصهای تغذیه ای (ضریب تبدیل غذایی و نسبت بازده پروتئین) بهتری بودند و تیمارهای حاوی ۲ و ۳٪ گالاكتواليگوساکارید، در شاخصهای رشد و تغذیه به طور معنی داری بیشتر بودند. Jenabi Hagparast و همکاران (۲۰۱۳) با بررسی اثرات پربریوتیک باکتوسل و پربریوتیک مانان الیگوساکارید در ماهی قزل آلای رنگین کمان بیان نمودند که استفاده از ۲/۵ و ۵ گرم بر کیلوگرم پربریوتیک منجر به افزایش معنی دار شاخصهای رشد و تغذیه در مقایسه با ماهیان شاهد می گردد. همچنین Mokhtari و همکاران (۲۰۱۶) نشان دادند که استفاده از پربریوتیک گالاكتواليگوساکارید در جیره غذایی ماهی گورامی سه خال نیز منجر به افزایش معنی دار شاخصهای رشد و تغذیه می گردد که با

(Harikrishnan *et al.*, 2012). مطالعه حاضر نشان داد که افزودن از سطوح مختلف گالاكتواليگوساکارید به جирه غذایی منجر به افزایش معنی دار فعالیت لیزوژیم در مقایسه با تیمار شاهد شد و بیشترین میزان فعالیت لیزوژیم در تیمار تغذیه شده با ۲٪ گالاكتواليگوساکارید مشاهده شد که با نتایج بدست آمده از تحقیقات صورت گرفته بر ماهی سفید تغذیه شده با ۲٪ گالاكتواليگوساکارید (HosseiniFar *et al.*, 2016) و ماهی کلمه تغذیه شده با ۲ و ۳ درصد فرکتواليگوساکارید (Soleimani *et al.*, 2012) همخوانی داشت. می توان گفت که پرپیوتیک منجر به تقویت رشد باکتری های مفید نظیر باکتری ها اسید لاکتیک و باسیلوس که در دیواره سلولی خود دارای ترکیبات لیپوپلی ساکارید و دارای خواص تحریک ایمنی هستند، می گردد (Harikrishnan *et al.*, 2012). هر چند Cerezuela و همکاران (۲۰۰۸) گزارش کردند که استفاده از اینولین (۵ و ۱۰ گرم بر کیلوگرم) در مقابسه با گروه شاهد اختلاف معنی داری را از نظر پاسخ ایمنی غیر اختصاصی در ماهی باس (*Sparus auratus*) ایجاد ننمود که دلیل مغایرت نتایج حاصل را می توان به دوره استفاده از پرپیوتیک، غلظت مورد استفاده، مراحل زندگی و نوع گونه ماهی مرتبط دانست (Soleimani *et al.*, 2012).

به طور کلی، نتایج بدست آمده از عملکرد رشد و برخی پارامترهای ایمنی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گالاكتواليگوساکارید در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان منجر به افزایش وزن بدست آمده، ضربیب رشد و پیژه، بقاء، وزن نهایی نسبت بازدهی پروتئین و پروتئین تام، گلوبولین و لیزوژیم و استفاده از سطح ۰.۲٪ گالاكتواليگوساکارید منجر به افزایش بهینه شاخص های رشد و ایمنی می گردد. می توان گفت که پرپیوتیکها نه تنها مواد مغذی ضروری را تامین می کند، بلکه منجر به تقویت میکروفلور روده ای و ممانعت از تشکیل کلنی باکتری های بیماری زا می گردد. تخمیر قندهای موجود در روده سبب افزایش انرژی و رشد این باکتری ها می شود، در نتیجه منجر به افزایش فعالیت آنزیم های گوارشی و بهبود

(HosseiniFar *et al.*, 2014) گزیلوالیگوساکارید همخوانی داشت که این موضوع نشان می دهد که استفاده از مکمل غذایی پرپیوتیک در جیره غذایی منجر به بهبود ایمنی می گردد. همچنین پروتئین تام یک پارامتر وابسته برای ارزیابی وضعیت فیزیولوژیک ماهی است، بنابراین، ابزاری کمکی تشخیصی محسوب می شود. از سویی، میزان پروتئین تام و آلبومین خون می تواند وضعیت تغذیه ای و سلامت ماهیان را به تصویر بکشاند (Mokhtari *et al.*, 2016).

گلوبولین نقش مهمی در حفظ سلامت و ایمنی دارد و گاما گلوبولین به عنوان منع همه پروتئین های لازم برای عملکرد ایمنی در خون شناخته شده است (Harikrishnan *et al.*, 2012). در حالیکه آلبومین نقش مهمی در ثبات فشار اسمزی به منظور توزیع مناسب مایعات بدن دارد و به عنوان حامل پلاسمما و لیگاندهای غیر اختصاصی (به همراه تعدادی جایگاه های اتصال) عمل می نماید (Harikrishnan *et al.*, 2012). از سوی دیگر، افزایش آلبومین سرم خون در این تحقیق را می توان نتیجه پاسخ به افزایش انتقال اسیدهای چرب از بافت ها جهت فرآیند اکسیداسیون دانست که سبب ساخت بیشتر پروتئین و صرفه جویی در مصرف پروتئین توسط بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب شده است (Harikrishnan *et al.*, 2012; Aathi *et al.*, 2013). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزودن از سطوح مختلف گالاكتواليگوساکارید منجر به افزایش معنی دار میزان پروتئین تام، آلبومین و گلوبولین سرم خون در مقایسه با تیمار شاهد شد که با نتایج بدست آمده از تحقیقات صورت گرفته بر ماهی گورامی سه خال تغذیه شده با گالاكتواليگوساکارید همخوانی داشت (Mokhtari *et al.*, 2016).

لیزوژیم یکی از پارامترهای دفاع غیر اختصاصی ذاتی مهم می باشد. همچنین از دسته آنزیم های باکتری سیدال مهم از ایمنی ذاتی است که در زمان عفونت با باکتری گرم مثبت همچنین در شرایط استرس زا به عنوان یک پروتئین فاز حاد عمل می کند و نقش عملکردی آن در مبارزه با عفونت های مختلف ماهیان گزارش شده است

- .Shellfish Immunology, 24:663-668.
DOI:10.1016/j.fsi.2007.10.002
- Ellis, A.E.;1990.** Lysozyme Assays:In Stolen, J.S., Fletcher, T.C., Anderson, D.P., Roberson, B.S. and Van Muiswinkel ,W.B., (ed)Techniques in :Fish Immunology,edn. Fair Haven,: SOS Publications . London, England ,pp. 101-103.
- Faghani, T., Soltani, M., Shamsae, M. and Matinfar, A., 2013.** The effect of dietary natural Astaxanthin(*Haematococcus pluvialis*) on the growth parameters, carcasses and liver chemical composition in juvenile beluga (*Huso huso* Linnaeus, 1758). Journal of Marine Biology, 5: 69-78.
- Firouzbakhsh, F.; Noori, F.; Khalesi, M.K. and JaniKhalili, K., 2011.** Effects of a probiotic, protexin, on the growth performance and hematological parameters in the Oscar (*Astronotus ocellatus*) fingerlings. Fish. Physiology and Biochemistry, 29: 222-229. DOI: 10.1007/s10695-011-9481-4.
- Ghosh, S.; Sinha, A. and Sahu, C.,2008.** Dietary probiotic supplementation in growth and health of live-bearing ornamental fishes. Aquaculture Nutrition, 52: 227-277 .DOI: 10.1111/j.1365-2095.2007.00529.x
- Gibson, G.R. and Roberfroid, M.B., 1995.** Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. J. Nutr. 521: 5205-5252. DOI: 10.1093/jn/125.6.1401.
- سلامت فیزیولوژی روده می‌گردد. لذا، استفاده از ۲ درصد گالاکتوالیگوساکارید به عنوان بهترین سطوح به منظور عملکرد رشد، بقاء و ایمنی در رژیم غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان پیشنهاد می‌گردد.
- ### تشکر و قدردانی
- بدین وسیله از همکاری مسئول محترم آزمایشگاه بخش بهداشت و بیماری آبزیان دانشگاه شیراز و کارشناس محترم آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی شیراز تشکر و قدردانی می‌گردد.
- ### منابع
- Athi, K., Ramasubramanian, V., Uthayakumar, V. and Munirasu, S., 2013.** Effect of chitosan supplemented diet on survival, growth, hematological, biochemical and immunological responses of indian major carp *labeo rohita*. International Research Journal of Pharmacy, 4: 141-147. DOI: 10.7897/2230-8407.04529.
- Bita, S., Akbary, P., Sarhadipour, M. and Negahdaru Jafar Beigi, Y., 2016.** Effect of dietary Biomin Imbo synbiotic on growth, feed and carcass chemical composition in *Mugil cephalus*. Veterinary Researches Biological Products (Pajouhesh-Va-Sazandegi), 114:194-200.
- Burtis, C.A., Ashwood, E.R. and Brund, D.E., 1994.** Tietz Textbook of Clinical Chemistry (5thed.).W.B.Sunders Company. Philadelphia. USA.560P.
- Cerezuela, R., Cuesta, A., Meseguer, J. and Ángeles Esteban, M., 2008.** Effects of inulin on gilthead seabream (*Sparus aurata* L.) innate immune parameters. Fish and

- Harikrishnan, R., Kim, J., Balasundaram, C. and Heo , M., 2012.** Immunomodulatory effects of chitin and chitosan enriched diets in *Epinephelus bruneus* against *Vibrio alginolyticus* infection. Aquaculture, 326: 46-52. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2011.11.034.
- Hoseinifar, S.H., Zare, P. and Merrifield, D.L., 2010.** The effects of inulin on growth factors and survival of the Indian white shrimp larvae and postlarvae (*Fenneropenaeus indicus*). Aquaculture Research, 41:348-352. DOI: 10.1111/j.1365-2109.2010.02485.x.
- Hoseinifar, S.H., Mirvaghefi, A., Merrifield, D.L., Amiri, B., Yelghi, S. and Bastami, K., 2011.** The study of some haematological and serum biochemical parameters of juvenile beluga (*Huso huso*) fed oligofructose. Fish Physiology and Biochemistry, 37:91-96. DOI: 10.1007/s10695-010-9420-9.
- Hoseinifar, S.H.; Khalili, M.; Khoshbavar Rostami, H. and Esteban, M.A., 2013.** Dietary galactooligosaccharide affects intestinal microbiota, stress resistance, and performance of Caspian roach (*Rutilus rutilus*) fry. Fish and Shellfish Immunology, 35:1416-1420. DOI: 10.1016/j.fsi.2013.08.007.
- Hoseinifar, S.H., Sharifian,M., Vesaghi,M.J., Khalili,M. and Esteban, M.A., 2014.** The effects of dietary xylooligosaccharide on mucosal parameters, intestinal microbiota and morphology and growth performance of Caspian whitefish (*Rutilus frisikutum*) fry. Fish and Shellfish Immunology, 13: 231-236. DOI: 10.1016/j.fsi.2014.05.009.
- Hoseinifar, S.H., Zoheiri, F., Dadar, M., Rufchaei, R. and Ringø, E., 2016.** Dietary galactooligosaccharide elicits positive effects on non-specific immune parameters and growth performance in Caspian white fish (*Rutilus frisii kutum*) fry. Fish and Shellfish immunology, 56:467- 472. DOI: 10.1016/j.fsi.2016.08.001.
- Ibrahim, M.D., Fathi, M., Mesalhy, S. and Abd, E.A., 2010.** Effect of dietary supplementation of inulin and vitamin C on the growth, hematology, innate immunity, and resistance of Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*). Fish and Shellfish Immunology, 29:241-246. DOI: 10.1016/j.fsi.2010.03.004.
- Jenabi Haghparast, R., Meshkini, S. and Tokmehchi, A., 2013.** Effects prebiotic Mannanoliosaccharide on growth and immune in *Oncorhynchus mykiss*. Journal of Veterinary Researches, 68: 375-382.
- Kakhesh, M. and Roomiani, L., 2018.** Effect of dietary *Lactobacillus casei* and different levels of immunogen on the activities of immunological and hematological factors of *Cyprinus carpio*. Iranian Scientific Fisheries Journal, 26; 140-151. DOI: 10.22092/ISFJ.2018.115841
- Khodadadi, A., Haghghi, A.,**

- Malekinejad, H., Tukmechi, A. and Afsharnasab, M., 2018.** Dietary effect of celmanax® on growth factor, intestine histology and yersiniosis resistance in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). Iranian Scientific Fisheries Journal, 26;126-139. DOI: 10.22092/ISFJ.2018.115694.
- Kumar, S., Sahu, N.P., Pal, A.K., Choudhury, D., Yengkokpam, S. and Mukherjee, S.C., 2005.** Effect of dietary carbohydrate on hematology, respiratory burst activity and histological changes in *Labeo rohita* juveniles. Fish. Shellfish Immun. 19: 331-344. DOI: 10.1016/j.fsi.2005.03.001.
- Liu, F., Shi, H., Guo, Q., Yu, Y., Wang, A., Lv, F. and Shen, W., 2016.** Effects of astaxanthin and emodin on the growth, stress resistance and disease resistance of yellow catfish (*Pelteobagrus fulvidraco*). Fish and Shellfish Immunology, 51: 125-135. DOI: 10.1016/j.fsi.2016.02.020.
- Mokhtari, M., Imanpour, M.R., Hajimoradloo, A.M. and Hosseinfar, H.S., 2016.** Effects of probiotic Bactocel and Prebiotic galactooligosaccharide on growth, survival, blood parameters and resistance against salt stress in *Trichogaster trichopterus*. Journal of Animal Environment, 3:199-206.
- Ravelo, C., Magariños, B., Herrero, M.C.; Costa, L., Toranzo, A.E. and Romald, J.L., 2006.** Use of adjuvanted vaccines to lengthen the protection against *Lactococcus* in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). Aquaculture, 251: 153-158. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2005.05.027.
- Soleimani, N., Hosseinfar, S.H., Merrifield, D.L., Barati, M. and Hassan Abedi, Z., 2012.** Dietary supplementation of fructooligosaccharide (FOS) improves the innate immune response, stress resistance, digestive enzyme activities and growth performance of Caspian roach (*Rutilus rutilus*) fry. Fish and Shellfish Immunology, 32: 316-321. DOI: 10.1016/j.fsi.2011.11.023.
- Sugita, H., Okano, R., Suzuki, Y., Iwai, D., Mizukami, M., Akiyama, N. and Matsuura, S., 2002.** Antibacterial abilities of intestinal bacteria from larvae and juvenile Japanese flounder against fish pathogens. Fisheries Science, 2: 1004-1011.
- Wahli, T., Verlhac, V., Griling, P., Gabaudan, J. and Aebischer, C., 2003.** Influence of dietary vitamin C on the wound healing process in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). Aquaculture, 225: 371-386. DOI: 10.1016/S0044-8486(03)00302-8.
- Zhou, Q-C., Buentello, J.A. and Gatlin III, D.M., 2007.** Effects of dietary prebiotics on growth performance, immune response and intestinal morphology of red drum (*Sciaenops ocellatus*). Aquaculture, 207: 212-219. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2010.09.003.

Effect of galactooligosaccharide prebiotic on growth performance, survival and several of innate immunity parameters of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) larvae

Ali, M.¹, Akbary, P.^{2*}, Soltanian, S¹., Gholamhosseini, A.¹

*paria.akbary@gmail.com

1- Aquatic Animal Health and Diseases group, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran

2- Fisheries group, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran

Abstract

Prebiotics are non-digestive food ingredients which beneficially affect the host by selectively stimulating the growth and activity of health-promoting bacteria in the intestinal tract. This experiment was conducted to evaluate the effect of dietary supplementation of galactooligosaccharide on the growth performances, survival and several of innate immunity parameters of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) larvae for 60 days. In this experiment, 360 of larvae (with average weight of 0.13 ± 0.01 g) in 4 treatments and 3 replicates (n=30 in each replicate) in a completely randomized design was divided and fed with diets containing 0, 1, 2 and 3 percent galactooligosaccharide respectively. The present results showed that highest WG, SGR and PER were observed in the diet containing 2 and 3 percent of dietary galactooligosaccharide which had a significant difference compared with other treatments ($p<0.05$). The highest, survival, total protein, albumin and globulin levels were observed in treatments containing 2 percent of dietary galactooligosaccharide which showed a significant difference compared with other treatments ($p<0.05$). Finally, the present results suggest that diets containing 2 percent of dietary galactooligosaccharide could improve growth, survival and innate immunity responses of rainbow trout.

Keywords: *Oncorhynchus mykiss*, Prebiotic, Growth parameters, Innate immunity

*Corresponding author