

اثرات میزان غذادهی بر رشد و کارایی تغذیه بچه ماهی صیبیتی (*Sparidentex hasta*) در مرحله نرسی

مجتبی ذبایح نجف آبادی^۱، منصور طرفی موزان زاده^{*}^۱، اسماعیل پقه^۱، جاسم غفله مرمضی^۲، سید جواد حسینی^۱، شاهپور مهرجویان^۱، رحیم اصولی^۱، حمید سقاوی^۱، جواد منعم^۱، رضا نهادوندی^۳

*mansour.torfi@gmail.com

۱- ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره)، بندر امام خمینی (ره)، ایران

۲- مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور، اهواز، ایران

۳- مرکز تحقیقات علوم دامی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ پذیرش: اردیبهشت ۱۳۹۷

تاریخ دریافت: مرداد ۱۳۹۶

لغات کلیدی: سطح تغذیه، مرحله نرسی، شاخص‌های رشد، ماهی صیبیتی

(Rondan *et al.*, 2004) (*Dilodus punctazzo*) صورت پذیرفته است. برای گونه‌هایی که ارتباط رشد شان با میزان غذادهی به صورت منحنی است و با افزایش میزان غذادهی، کارایی تغذیه و رشد کاهش می‌یابد^۳، میزان غذادهی باید در حد متوسط باشد. زیرا کارایی جیره غذایی قبل از رسیدن به بالاترین سطح غذادهی کاهش می‌یابد (Sun *et al.*, 2006).

ماهی صیبیتی با نام علمی *Sparidentex hasta*، به عنوان یکی از مهمترین گونه‌های ماهیان دریایی جهت افزایش تنوع زیستی در گسترش فعالیت‌های پرورش ماهی در قفس مطرح می‌باشد. نیازهای تغذیه‌ای این گونه به سطح مناسب درشت مغذی‌های جیره غذایی در مرحله پرورشی تعیین شده است (Mozanzadeh *et al.*, 2017a). با این وجود، مطالعه‌ای در زمینه تعیین میزان مناسب تغذیه و

از آنجایی که هزینه غذا در حدود ۶۰ درصد هزینه‌های کل تولید را شامل می‌شود، بنابراین دانستن مقدار مناسب غذادهی جهت دانستن مواد مغذی مورد نیاز یک گونه آبزی یک پیش شرط برای پرورش آن می‌باشد. مقدار غذادهی، بر کارایی جیره غذایی و رشد مؤثر بوده بطوریکه غذادهی بیشتر یا کمتر از حد مناسب بترتیب سبب کاهش کارایی جیره غذایی و کاهش رشد خواهد شد (NRC, 2011). در گونه‌های مختلف آبزیان ارتباط رشد با میزان غذادهی به صورت خطی^۱ یا منحنی^۲ است (Bureau *et al.*, 2006). تاکنون مطالعات بسیار زیادی در زمینه تعیین میزان مناسب غذادهی در ماهیان سیم دریایی پرورشی مختلف نظیر سیم سر طلایی (Sparus aurata) و سیم پوزه تیز (Mihelakakis *et al.*, 2002)

¹ Linear

² Curvilinear

³ Decelerating growth–ration relationship

فنوکسی اتانول، مرک) کشته شدند. وزن ماهیان، وزن کبد و احشاء با ترازوی دیجیتال (دقت صدم گرم) سنجیده شد. از فرمول‌های استاندارد برای بررسی پارامترهای رشد، شاخص‌های سوماتیک و کارایی تغذیه استفاده گردید:

$$\text{SGR}^6 = [(\ln \text{BW}_f (\text{g}) - \ln \text{BW}_i (\text{g})) / t] \times 100, \quad t = 30 \text{ days}$$

$\text{FER}^7 = (\text{BW}_f (\text{g}) - \text{BW}_i (\text{g})) / \text{feed intake (g)}$

$\text{HSI} = (\text{liver weight (g)} / \text{BW}_f (\text{g})) \times 100$

$\text{VSI} = (\text{visceral weight (g)} / \text{BW}_f (\text{g})) \times 100$

$\text{K} = (\text{BW}_f (\text{g}) / (\text{total length (cm)})^3) \times 100$

در فرمول‌های فوق BW_i = وزن اولیه بدن، BW_f = وزن نهایی بدن و t = مدت زمان پرورش می‌باشند. داده‌های تحقیق توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ آنالیز شدند. همه داده‌ها به صورت میانگین سه تکرار \pm خطای استاندارد در جدول ارایه گردیدند. برای هموژن نمودن داده‌های درصدی آنها تبدیل به Arcsine و بعد مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. بعد از تأیید نرمالیتی و همگن بودن داده‌ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه⁸ برای سنجش معنی داری اختلاف بین تیمارها در سطح ۰/۰۵ و به دنبال آن آزمون دانکن⁹ برای کلاسه بندی تیمارها استفاده گردید (Duncan, 1955).

نتایج

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بازماندگی ماهی صبیت تحت تأثیر میزان غذادهی در مدت زمان ۳۰ روز قرار نگرفته است (جدول ۱). ماهیان تغذیه شده با سطوح ۲ و ۱۰ درصد جیره غذایی به ترتیب دارای کمترین و بیشترین وزن نهایی و نرخ رشد ویژه نسبت به سایر

غذادهی در مرحله نرسی در ارتباط با این ماهی صورت نپذیرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات سطوح مختلف غذادهی بر رشد و کارایی تغذیه ماهی صبیتی در مرحله نرسی بوده است، همچنین کارایی غذای خشک (جیره فرموله) با غذای تر را نیز مقایسه نموده است.

این تحقیق به مدت ۳۰ روز در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) انجام شد. ماهیان صبیتی انگشت قد به وزن متوسط ۱ گرم به ۱۸ تانک ۲۵۰ لیتری پلایتلینی به تعداد ۵۰ قطعه در هر تانک به طور کاملاً تصادفی منتقل شدند. ماهیان با پنج سطح تغذیه‌ای مختلف بر اساس درصد (%) وزن بدن در روز شامل سطوح: ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ درصد و همچنین یک تیمار شامل غذای *Chirocentros* sp. چون ماهی کم ارزش و صید ضمنی می‌باشد) به میزان ۲۰٪ وزن اولیه بدن تغذیه شدند. در این مطالعه بعد از آنکه میزان غذادهی (گرم) برای هر سطح تغذیه (%) تعیین شد، ماهیان با همان مقدار محاسبه شده تا پایان دوره ۳۰ روزه به صورت ۲ بار در روز (ساعات ۸ و ۱۳) تغذیه شدند. غذای مورد استفاده از شرکت بیومار (فرانسه) تهیه گردید و دارای ۵۶ درصد پروتئین، ۱۸ درصد چربی، ۱۰/۷ درصد خاکستر، ۴ درصد فیبر و به قطر ۸۰۰ میکرومتر بود. تانک‌ها با آب دریایی فیلتر شده و کلر زنی شده جریان دار (۱ لیتر در دقیقه) با شوری متوسط ($۴۷\pm ۰/۵$) قسمت در هزار، دما ($۲۷/۲\pm ۰/۸$) درجه سانتی‌گراد و اسیدیته ($۷/۵\pm ۰/۲$) پر شدند. دوره‌ی نوری در محیط به صورت روزانه ۱۲:۱۲ روشنایی:تاریکی بود. تانک‌ها به صورت روزانه سیفون شدند.

در پایان دوره تغذیه، ماهیان به مدت ۲۴ ساعت گرسنه مانده و پس از آن زیتدوه هر تانک با ترازوی دیجیتال (دقت صدم گرم) وزن گردید و طول ماهیان نیز با کولیس (دقت دهم میلی متر) سنجیده شد. سه قطعه ماهی از هر تانک به منظور بررسی شاخص کبدی (HSI)^{۱۰} و احشایی (VSI)^{۱۱} با دوز بالای ماده‌ی بی‌هوشی (۱۰۰۰ پی پی ام،

⁶ Specific growth rate

⁷ Feed efficiency ratio

⁸ One-way ANOVA

⁹ Duncan

¹⁰ Hepatosomatic index

¹¹ Viscerosomatic index

تر دارای کمترین شاخص کبدی و ماهیان تغذیه شده با جیره ۱۰٪ دارای بیشترین مقدار شاخص کبدی بودند ($p<0.05$). شاخص‌های احشایی و ضریب چاقی تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای مختلف نداشتند ($p>0.05$).

تیمارها بودند ($p < 0.05$). با این وجود، اختلاف معنی‌داری بین نرخ رشد ویژه ماهیان تغذیه شده با جیره‌های ۱۰-۸٪ بین نرخ رشد ویژه ماهیان تغذیه شده با جیره‌های ۲ دیده نشد. ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی تر و جیره درصد بترتیب دارای کمترین و بیشترین کارایی جیره غذایی بودند. ماهیان تغذیه شده با جیره ۲ درصد و غذایی

جدول ۱: پارامتر های رشد و کارایی تغذیه ماهی صبیتی تغذیه شده با سطوح مختلف غذاهایی. حروف بالا نویس متفاوت در هر ردیف جدول نشانده اند اختلاف آماری معنی دار می باشد ($p < 0.05$).

Table 1: Growth performance and feed utilization in Sobaity seabream with different feeding rate. A different superscript in the same row denotes statistically significant differences ($p < 0.05$).

غذای تر	غذای خشک					درصد غذادهی روزانه
	۲۰	۱۰	۸	۶	۴	
۹۲ ± ۲/۸	۹۷ ± ۰/۶	۹۴ ± ۲/۶	۹۷/۳ ± ۲/۷	۹۳/۸ ± ۰/۶	۹۵ ± ۰/۶	بازماندگی (%)
۱ ± ۰/۰	۱ ± ۰/۰	۱ ± ۰/۰	۱ ± ۰/۰	۱ ± ۰/۰	۱ ± ۰/۰	وزن اولیه (گرم)
۲/۱ ± ۰/۲ ^c	۳/۲ ± ۰/۲ ^a	۲/۸ ± ۰/۲ ^b	۲/۶ ± ۰/۲ ^b	۲ ± ۰/۱ ^{cd}	۱/۷ ± ۰/۱ ^d	وزن نهایی (گرم)
۲/۷ ± ۰/۰ ^c	۴/۱ ± ۰/۲ ^a	۳/۶ ± ۰/۲ ^{ab}	۳/۴ ± ۰/۲ ^b	۲/۵ ± ۰/۱ ^c	۱/۹ ± ۰/۲ ^d	نرخ رشد ویژه (%)
۰/۲۲ ± ۰/۰ ^c	۰/۷۶ ± ۰/۱ ^b	۰/۷۸ ± ۰/۱ ^b	۰/۹ ± ۰/۱ ^b	۰/۹۶ ± ۰/۱ ^b	۱/۲۳ ± ۰/۱ ^a	کارایی جیره غذایی
۲/۳ ± ۰/۱ ^c	۳/۲ ± ۰/۱ ^a	۲/۸ ± ۰/۰ ^{ab}	۲/۸ ± ۰/۲ ^{ab}	۲/۵ ± ۰/۲ ^b	۲ ± ۰/۱ ^c	شاخص کبدی (%)
۸/۸ ± ۱/۱	۹/۴ ± ۰/۳	۱۰/۶ ± ۱/۶	۹/۴ ± ۰/۸	۹/۶ ± ۰/۴	۹/۷ ± ۲/۳	شاخص احتشامی (%)
۱/۹ ± ۰/۱	۱/۸ ± ۰/۱	۱/۹ ± ۰/۱	۱/۹ ± ۰/۰	۲ ± ۰/۱	۱/۷ ± ۰/۱	ضریب چاقی (%)

سوی دیگر، تأخیر رشد در ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی ۲٪ نشان می دهد که ممکن است به این دلیل باشد که در ماهیان گوشت خوار معمولاً انرژی لازم برای متابولیسم بخش زیادی از انرژی دریافتی از جیره غذایی را مصرف می کند (Sun *et al.*, 2006). در این مطالعه ماهیان تغذیه شده با جیره ۲٪ و غذایی تر دارای کمترین شاخص کبدی بودند که نشان دهنده اختلال در وضعیت تغذیه ای ماهی، مصرف مواد پر انرژی نظیر گلیکوزن و چربی در کبد است، زیرا اندازه نسبی کبد با وضعیت تغذیه ای ماهی ارتباط دارد. نتایج مشابهی نیز در ماهی سیم سر طلا (Grigorakis and Alexis, 2005) و سیم قرمز (Rueda *et al.*, 1998) (*Pagrus major*) صبیتی دوره گرسنگی بودند، گزارش شده است. Mozanzadeh *et al.*, 2017b) که تحت تأثیر


ارتباط بین نرخ رشد ویژه و سطح غذاده‌ی به صورت منحنی مجانبی (ناهمساویک)^۱ بوده و رابطه آن به صورت $SGR = 0.2809X + 1.4191$ ($R^2 = 0.9062$) بود

(شکل ۱). همچنین کارایی جیره غذایی با افزایش سطح تغذیه نیز کاهش یافت و رابطه آن به صورت معکوس $FER = -0.0586X + 1.3184$ ($R^2 = 0.8066$) بود


(شکل ۲).

در مطالعه حاضر رشد بچه ماهی صبیتی با افزایش سطح تغذیه افزایش یافت، اما سرعت نرخ رشد ویژه افزایش تدریجی را در ماهیان تغذیه شده با جیره $\frac{3}{4}$ درصد (34%) تا جیره $\frac{1}{10}$ (10%) نشان داد. بعلاوه، نرخ رشد ویژه در ماهیان تغذیه شده با جیره ۸ درصد اختلاف معنی‌داری با ماهیان تغذیه شده با جیره $\frac{1}{10}$ نشان نداد که نشان دهنده‌ی کارایی، رشد مشابه این دو تیمار می‌باشد. از

¹⁰ Asymptotic curve



شکل ۱: ارتباط بین نرخ رشد و بیزه (SGR) و سطح تغذیه
Figure 1: Relationship between specific growth rate (SGR) and feeding rate.



شکل ۲: ارتباط بین کارایی جیره غذایی (FER) و سطح تغذیه
Figure 2: Relationship between feed efficiency ratio (FER) and feeding rate.

به دلیل کاهش کیفیت آب پورosh و احتمال انتقال بیماری‌ها، کیفیت متغیر ماهیان هرز، افزایش قیمت، کاهش فراوانی و ضریب تبدیل غذایی بسیار بالای آنها سبب شده است که این منابع به لحاظ اقتصادی به صرفه نباشند (Orachunwong *et al.*, 2005). در نهایت، نتایج مطالعه حاضر نشان داد تغذیه ماهیان صبیتی انگشت قد در سطح ۸٪ برای رشد این گونه مناسب است و استفاده از غذای تر در دوره‌ی نرسی این گونه پیشنهاد نمی‌شود.

از سوی دیگر، ثابت ماندن مقدار شاخص احشایی در ماهیان تغذیه شده با سطوح مختلف جیره غذایی نشان می‌دهد که چربی احشایی با سرعت کمتری برای تأمین انرژی متابولیک نسبت به گلیکوژن کبدی مصرف می‌شود و همچنین کبد منبع ذخیره انرژی حساس‌تری نسبت به احشاء در ماهی صبیتی می‌باشد (Mozanzadeh *et al.*, 2017b).

در این مطالعه استفاده از غذای تر (ماهیان هرز) منجر به کاهش رشد و کارایی تغذیه گردید. استفاده از ماهیان هرز

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از آقایان چراغعلی پژند و مجید عساکره که در اجرای پروژه کمک‌های شایانی نمودند، اعلام می‌دارند.

منابع

- Mozanzadeh, M., Marammazi, J., Yaghoubi, M., Yavari, V., Agh, N. and Gisbert, E., 2017b.** Somatic and physiological responses to cyclic fasting and re-feeding periods in sobaity sea bream (*Sparidentex hasta*, Valenciennes 1830). Aquaculture Nutrition, 23: 181–191. DOI: 10.1111/anu.12379
- NRC, 2011.** Nutrient Requirements of Fish and Shrimp. The National Academic Press, Washington, D.C.
- Orachunwong, C., Thammasart, S. and Lohawatanakul, C., 2005.** Cage culture of marine fin fish better returns with formulated feed. Info fish international, 4: 12–15.
- Rondan, M., Hernandez, M.D., Egea, M.A., Garcia, B. and Rueda, F.M., 2004.** Effect of feeding rate on fatty acid composition of sharpsnout seabream (*Diplodus puntazzo*). Aquaculture Nutrition, 10: 301–307. DOI: 10.1111/j.1365-2095.2004.00304.x
- Rueda, F.M., Martinez, F.J., Kentouri, M. and Divanach, P., 1998.** Effect of fasting and refeeding on growth and body composition of red porgy, *Pagrus pagrus* L. Aquaculture Research, 29: 447–452. DOI: 10.1046/j.1365-2109.1998.00228.x
- Sun, L., Chen, H., Huang, L., Wang, Z. and Yan, Y., 2006.** Growth and energy budget of juvenile cobia (*Rachycentron canadum*) relative to ration. Aquaculture 257: 214–220. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2006.02.074.
- Bureau, D.P., Hua, K. and Cho, C.Y., 2006.** Effect of feeding level on growth and nutrient deposition in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum) growing from 150 to 600 g. Aquaculture Reserch, 37: 1090–1098. DOI: 10.1111/j.1365-2109.2006.01532.x
- Duncan, D.B. و 1955.** Multiple range and multiple F tests. Biometrics, 11: 1–42.
- Grigorakis, K. and Alexis, M.N., 2005.** Effects of fasting on meat quality and fat deposition of commercial-size farmed gilthead sea bream (*Sparus aurata*, L) fed different dietary regimes. Aquaculture Nutrition, 11: 341–344. DOI: 10.1111/j.1365-2095.2005.00351.x
- Mihelakakis, A., Tsolkas, C. and Yoshimatsu, T., 2002.** Optimization of feeding rate of hatchery-produced juvenile gilthead sea bream *Sparus aurata*. Journal of World Aquaculture Society 33: 169–175. DOI: 10.1111/j.1749-7345.2002.tb00491.x
- Mozanzadeh, M.T., Marammazi, J.G., Yaghoubi, M., Agh, N., Pagheh, E. and Gisbert, E., 2017a.** Macronutrient Requirements of Silvery-Black Porgy (*Sparidentex hasta*): A Comparison with Other Farmed Sparid Species. Fishes 2(2): 5. DOI: 10.3390/fishes2020005

Effects of feeding rate on growth and feed efficiency of Sobaity seabream (*Sparidentex hasta*) fry in nursery phase

Zabayeh Najafabadi M.¹, Torfi Mozanzadeh M.^{1*}, Pagheh E.¹, Ghafleh Marammazi J.², Hosseini S.J.¹, Shapour Mehrjooyan¹, Osooli R.¹, Saghami H.¹, Monem J.¹, Nahavandi R.³

*Mansour.torfi@gmail.com

1- Imam Khomeini Marine Fish Research Station, Bandar Imam Khomeini, Iran

2- South Iran Aquaculture Research Centre, Ahvaz, Iran

3 -Animal Science Research, Isfahan Agricultural Research, Education and Extension Organization, Isfahan, Iran

Abstract

A 30-day research was conducted to evaluate the effects of different feeding rate (formulated diet) (2, 4, 6, 8 and 10% of wet body weight/day) and also fresh food (20% of wet body weight/day) on growth performance and feed utilization of *Sparidentex hasta* fry in nursery phase. Growth performance including final weight and specific growth rate (SGR) significantly increased with increasing feeding rate ($p<0.05$). The relationship between SGR (% per day) and ration level (% per day) was an asymptotic curve described as $SGR = 0.2809X + 1.4191$. Feed efficiency ratio (FER) decreased significantly with increasing ration levels, and the relationship between FER and ration level (% per day) described as $FER = -0.0586X + 1.3184$. Hepatosomatic index significantly increased with increasing feeding rate ($p<0.05$). Based on the above results, it may be concluded that a ration size of 8% of body weight per day is optimal for good growth and feed conversion efficiency of juvenile *S. hasta* in nursery phase.

Keywords: Feeding rate, Nursery phase, Growth indices, Sobaity seabream

*Corresponding author