

بهینه‌سازی برخی ویژگی‌های کاربردی، فیزیکی و حسی پنیر لاکتیکی کز میک

حامد اردشیر^{۱*}، یحیی مقصودلو^۲، مرتضی خمیری^۳، علیرضا صادقی ماهونک^۳ و مهدی کاشانی نژاد^۲

۱، ۲ و ۳ - به ترتیب دانش آموخته دکتری، استاد و دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
تاریخ دریافت: ۹۷/۱۱/۲۹؛ تاریخ پذیرش: ۹۷/۸/۱۶

چکیده

هدف از این پژوهش یافتن شرایط بهینه برای تولید پنیر لاکتیکی کز میک به کمک آغازگرها و با استفاده از سه متغیر مستقل میزان افزودن میکروارگانیزم آغازگر، دمای پخت لخته، و pH لخته در هنگام برش است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد عبارت خطی pH بیشترین اثر را بر ویژگی‌های راندمان پنیر و میزان کلسیم و عبارت نمای دوم دمای پخت لخته، بیشترین اثر را بر ویژگی‌های بافت و پذیرش کلی پنیر لاکتیکی داشته است. عبارت نمای دوم دمای پخت لخته بیشترین اثر را بر فعالیت‌های ممانعت‌کنندگی از فعالیت آنزیم مبدل آنزیم‌تانسین (ACE) و آنتی‌اکسیدانی و ویژگی‌های رنگ و طعم پنیر لاکتیکی داشته است. آغازگرهای مورد استفاده در پنیر لاکتیکی تولید شده باعث بهبود ویژگی‌های کاربردی، فیزیکی و حسی پنیر شده‌اند. نتایج این پژوهش بیانگر کارایی مفید روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی فرمولاسیون پنیر لاکتیکی است و تیمار حاوی ۱/۷۵ درصد آغازگر، دمای پخت لخته ۴۲ درجه سلسیوس، و pH برابر ۴/۷ به‌هنگام برش لخته تیمار بهینه برای تولید پنیر لاکتیکی انتخاب شد. در این شرایط مقادیر راندمان تولید پنیر ۱۹/۵ درصد، فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE (IC₅₀) ۱/۱۶۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر، فعالیت آنتی‌اکسیدانی ۳۶ درصد، میزان کلسیم ۴۲/۰ درصد، مطلوبیت بافت ۳/۹، مطلوبیت رنگ ۴، مطلوبیت طعم ۴/۲، و پذیرش کلی پنیر ۳/۹ بود.

واژه‌های کلیدی

فرمولاسیون، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE

مقدمه

کاملاً اتفاقی و غیر قابل کنترل صورت می‌گیرد که به دنبال خود آزادسازی پپتیدهای زیستی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که ارزش تغذیه‌ای بالایی دارند (Edalatian *et al.*, 2012). باکتری‌های اسیدلاکتیک که به‌عنوان کشت آغازگر به شیر اضافه می‌شوند به‌صورت ذاتی و طبیعی در شیر وجود دارند که نقشی مهم در طعم و عطر پنیر بازی می‌کنند. از سوی دیگر، برخی باکتری‌های اسیدلاکتیک مانند انتروکوکوس‌ها، به دلیل تولید باکتریوسین، می‌توانند از رشد باکتری‌های بیماری‌زا جلوگیری کنند. به همین دلیل این باکتری‌ها از دیدگاه تکنولوژیکی با اهمیت هستند (Navidghasemizad *et al.*, 2009). از نظر صنعتی، کاربرد کشت‌های آغازگر ویژه باعث ایجاد کیفیت ثابت در محصول می‌گردد ولی محصولی با محدودیت طعم ایجاد

در کشور ایران حجم مصرف پنیر لاکتیکی به‌ویژه در بین گروه‌های سنی کودک و نوجوان قابل توجه است و با توجه به اینکه این قشر از جامعه در حال رشد هستند، سلامت و تندرستی آنها اهمیت به‌سزایی دارد. از این رو پرداختن به هر گروه از مواد غذایی، از جمله پنیر لاکتیکی که بیشتر به این گروه از جامعه مربوط است، می‌تواند جایگاهی قابل توجه داشته باشد (Fathi-Achachlouei *et al.*, 2015). در تولید پنیرهای لخته اسیدی، از دمای بالا و افزودن اسید آلی یا معدنی استفاده می‌شود که می‌تواند داناتوراسیون (واسرشتی) شدیدی در پروتئین‌های شیر ایجاد کند و در عین حال خروج کلسیم و پروتئین‌های آب‌پنیر را به دنبال دارد. شکستن پروتئین‌ها به‌صورت

ژل دوباره محکم تر می شود و سینرسیس کمتری اتفاق می افتد (Van Vliet, 1988). در هنگام برش لخته، pH بالاتر احتمالاً منجر به حفظ بیشتر کلسیم به صورت فسفات کلسیم کلوئیدی در میسل های کازئین می شود دفع الکترواستاتیک بین مولکول های کازئین با حل شدن فسفات کلسیم کلوئید افزایش می یابد (Home, 1998). همان گونه که پژوهش های پیشین نشان می دهد، حرارت و pH تأثیر به سزایی بر کیفیت بافتی و تغذیه ای پنیر دارند. پنیر لاکتیکی، مانند پنیر ریکوتا و کاتیج، از پنیرهای لخته اسیدی است یعنی هم از دمای پخت بالاتر از ۹۰ درجه سلسیوس ممکن است استفاده شود و هم از اسیدهای مختلف، که می تواند به نوبه خود آلودگی های شیمیایی را به دنبال داشته باشد. از این رو، علاوه بر انتخاب دما و pH مناسب برای تولید پنیرها، کاهش استفاده از این اسیدهای شیمیایی در تولید این گونه پنیرها اهمیت دارد. هدف از این پژوهش یافتن شرایط بهینه برای تولید پنیر لاکتیکی به کمک آغازگرها (آغازگرها) و با استفاده از سه متغیر مستقل میزان افزودن میکروارگانیزم آغازگر، دمای پخت لخته، و pH لخته در هنگام برش است.

مواد و روش ها

تهیه پنیر

شیر تازه گاو از دامداری صنعتی مه دشت واقع در شهرستان ساری تهیه شد. پس از تنظیم میزان چربی شیر (۳ درصد)، و پیش از پاستوریزاسیون، ۲ گرم کلرید کلسیم به ازای هر کیلوگرم شیر به آن اضافه گردید (به منظور ایجاد بافتی فشرده تر). پس از پاستوریزاسیون، شیر تا دمای ۳۲ درجه سلسیوس برای گرم خانه گذاری خنک شد. پس از آن، شیر به داخل وت برای تزریق آغازگر و گرم خانه گذاری ارسال گردید، شیر در داخل وت به مدت ۱۴-۱۲ ساعت نگهداری شد تا به pH مناسب برای برش لخته برسد. لخته با سیم مشبک برش داده شد. پس از

می کند. از سوی دیگر، مصرف کنندگان معمولاً فرآورده های لبنی با طعم طبیعی و اصلی را ترجیح می دهند. به همین دلیل، جستجو و کاوش سویه های وحشی موجود در طبیعت و نیز در محصولات تخمیری سنتی برای تولید فرآورده های لبنی جدید با طعم اصیل و طبیعی مورد توجه بسیار است. پنیرهای حاصل از شیر خام که به صورت سنتی تولید می شوند، پتانسیل جداسازی نژادهای جدید را برای بهره برداری در صنعت لبنیات دارند (Navidghasemizad *et al.*, 2009). حرارت و pH دو عامل مؤثر بر ویژگی های پنیر لخته اسیدی هستند. گرما در پنیر کاتیج منجر به کاهش سینرسیس^۱ (آب انداختن، دوفاز شدن) می شود اما می تواند منجر به نقص بافت، نرمی، و شکنندگی لخته پنیر شود. گرما پیوند بین پروتئین های آب پنیر و کازئین را ایجاد می کند که نتیجه آن حفظ پروتئین های آب پنیر و به دنبال آن افزایش راندمان پنیر است (Mulvihill & Grufferty, 1995). گزارش ها نشان می دهد که استحکام و گرانیروی لخته اسیدی با میزان دناتوراسیون (واسرشتی) پروتئین های آب پنیر به هنگام عمل آوری حرارتی ارتباط دارد (Dannenberg & Kessler, 1988). در لخته پیش حرارت دهی شده، تشکیل لخته در pH بالاتری آغاز می شود؛ به طور مثال، در پنیر کاتیج pH تشکیل لخته در شیر حرارت دیده ۵/۴ - ۵/۲ و در شیر حرارت ندیده ۵ است. pH بالاتر شروع تشکیل لخته می تواند به pH ایزوالکتریک بالاتر (۵/۲) پروتئین های اصلی آب پنیر (بتالاکتوگلوبولین) نسبت داده شود که موجبات تراکم یا ته نشینی ایزوالکتریک کازئین هایی را فراهم آورد که pH ایزوالکتریک برابر ۴/۶ دارند (Lucey *et al.*, 1998). در لخته تولید شده از شیر حرارت دیده، حل شدن فسفات کلسیم کلوئید^۲ ناشی از کاهش pH در ذرات کازئین که بخشی از شبکه لخته است می تواند منجر به سست شدن ساختار لخته و در نتیجه سینرسیس محصول شود.

در pH پایین تر، دفع الکترواستاتیک ضعیف تر می شود اما واکنش های آب گریز بیشتری را تسهیل می کند در نتیجه

برش دادن، به‌منظور جداسازی بهتر آب‌پنیر و ایجاد تغییرات فیزیکوشیمیایی مناسب، لخته به مدت ۲۰ دقیقه در دماهای مختلف به‌صورت کاملاً آرام هم زده شد. سپس لخته همراه با آب به داخل ترولی‌هایی فرستاده شد که بر آن‌ها تنظیم قرار دارد. قالب‌های پنیر پس از برش زدن در ظرف‌های ۴۰۰ گرمی پلی‌پروپیلن همراه با آب‌نمک (۱۲ درصد) بسته‌بندی و در سردخانه در دمای ۴-۵ درجه سلسیوس به مدت ۲ ماه نگهداری گردید (Madadlou *et al.*, 2006). آغازگرهای مورد استفاده جزء خانواده پنیر کاتیج تحت عنوان Fresco و شامل باکتری‌های *Lactococcus lactis* subsp. *lactis* و *Streptococcus thermophilus* subsp. *cremoris* بود.

اندازه‌گیری میزان پپتید زیستی با استفاده از روش ممانعت‌کنندگی از فعالیت آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE¹)

$$I\% = (A_{Blank} \div A_{Sample}) \times 100 \quad (1)$$

اندازه‌گیری کلسیم

اندازه‌گیری کلسیم به روش اسپکترومتری جذب اتمی انجام شد این روش تأیید شده ISO /IDF در سال ۱۹۹۲ است.

اصول کلی آن بدین صورت است که نمونه پنیر پس از وزن کردن در داخل کوره ۵۵۰ درجه سلسیوس قرار گرفته و پس از سوختن مواد آلی، مواد معدنی آن توسط اسید نیتریک حل گردید سپس با آب مقطر رقیق شده و محلول‌های استاندارد آن تهیه و با استفاده از شعله اسپکترومتر جذب اتمی، تمیزه و جذب عنصر کلسیم با استفاده از طول موج مناسب اندازه‌گیری شد (Mekmene & Gaucheron, 2011).

راندمان پنیر

راندمان پنیر بر اساس وزن پنیر قبل از آب‌نمک گذاری تقسیم بر کل شیر به‌دست آمد (پس از ۱۹ تا ۲۰ ساعت از زمان ذخیره‌سازی در دمای ۲۳ تا ۲۵ درجه سلسیوس) (Buritti *et al.*, 2005).

۱۲۵ میلی‌لیتر معرف ACE (۰/۵ میلی‌مول /لیتر ۳-۲-N فوریل آکرلیل L-فنیل آلانین-گلاسیل گلیسین همراه با استابیلایزر و بافر در pH برابر ۸/۲) همراه با ۱۲۵ میلی‌لیتر نمونه کاملاً ترکیب و در ۳۷ درجه سلسیوس به مدت ۲ دقیقه پیش گرم‌خانه گذاری شد، سپس ۲۵ میکرولیتر معرف ACE دوباره به آن اضافه و این ترکیب به مدت ۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سلسیوس گرم‌خانه گذاری گردید و در طول موج ۳۴۰ نانومتر در دستگاه اسپکتروفتومتر در مقابل نمونه کنترل با فاصله زمانی ۱۰ دقیقه ارزیابی گردید و به‌صورت IC50 گزارش شد (Vermeirssen *et al.*, 2002).

تخمین فعالیت آنتی‌اکسیدانی

فعالیت آنتی‌اکسیدانی با بررسی فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد (DPPH) ارزیابی شد. ماده ۲ و ۲ دی فنیل ۱- پیکریل هیدرازیل یا (DPPH) یک ترکیب رادیکالی پایدار با رنگ بنفش است که با احیا شدن توسط عناصر دهنده الکترون یا هیدروژن (ترکیبات آنتی‌اکسیدانی) به

آزمون حسی

به‌طور جداگانه ارزیابی شد (Di Piero *et al.*, 2011).

طراحی آزمایش و تجزیه و تحلیل آماری

در این پژوهش اثر متغیرهای مستقل شامل pH لخته در هنگام برش، دمای پخت لخته، و میزان میکروارگانیزم آغازگر هر یک در سه سطح ارزیابی شد. در جدول ۱ متغیرهای مستقل فرایند و مقادیر آنها نشان داده شده است. مدل مورد استفاده در روش سطح پاسخ (RSM) معمولاً معادله درجه دوم است. در روش RSM، برای هر متغیر وابسته مدلی تعریف شده که آثار اصلی و متقابل عوامل را بر هر متغیر جداگانه بیان می‌کند. مدل چند متغیره به‌صورت زیر است (Khuri & Mukhopadhyay, 2010).

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_{11} X_1^2 + \beta_{22} X_2^2 + \beta_{33} X_3^2 + \beta_{12} X_1 X_2 + \beta_{13} X_1 X_3 + \beta_{23} X_2 X_3 \quad (2)$$

در این پژوهش، ۱۰ نفر داور انتخاب شدند. پس از بیان هدف از آزمون حسی و نیز تعریف ویژگی‌های مورد ارزیابی و نواقص احتمالی هر یک از ویژگی‌ها، نمونه‌های موردنظر در چند نوبت به آنها داده شد؛ ۸ نفر از ۱۰ داور که بیشترین دقت در ارزیابی را داشتند برای آزمون نهایی انتخاب شدند. نمونه‌های پنیر تولیدی بر اساس الگوی آماری مورد استفاده در ارزیابی در اختیار داوران قرار داده شد. برای افزایش دقت آزمون، از هر نمونه پنیر تولیدی ۳ تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. داوران در این آزمون به روش هدونیک ۵ امتیازی، نمره‌ای بین ۰ تا ۵ به هر یک از ویژگی‌های طعم، بافت، رنگ، و پذیرش کلی پنیرهای تولید شده اختصاص دادند. هر یک از پارامترهای فوق

جدول ۱- متغیرهای مستقل و مقادیر آنها

سطوح متغیر			نماد ریاضی	متغیر مستقل
-۱	۰	+۱		
۴/۶۰	۴/۶۵	۴/۹۰	X _۱	pH
۲۴	۴۴	۶۰	X _۲	دمای پخت لخته (درصد)
۰/۵	۱/۷۵	۳	X _۳	میزان آغازگر (درصد)

درصد، بررسی گردید. مرحله آخر، بهینه‌سازی شرایط است؛ هدف از این بهینه‌سازی بهبود ویژگی‌های کاربردی، فیزیکی، و حسی پنیر لاکتیکی است. با مقدار مطلوبیت، بین ۰ تا ۱، اعتبار شرایط بهینه سنجیده شد.

نتایج و بحث

گزینش مدل مناسب و تجزیه مدل برازش یافته

نتایج حاصل از تیمارها در جدول ۲ قابل مشاهده است. در این جدول دیده می‌شود بیشترین راندمان پنیر، فعالیت ممانعت کنندگی ACE، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، میزان کلسیم و امتیاز حاصل از ارزیابی حسی به ترتیب مربوط به فرمولاسیون‌های ۲، ۷، ۷، ۲ و ۱۴ بود.

در این معادله: Y پاسخ پیش‌بینی شده، β_0 ضریب ثابت و $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ اثرهای خطی، $\beta_{11}, \beta_{22}, \beta_{33}, \beta_{44}$ اثر مربعی و $\beta_{12}, \beta_{13}, \beta_{14}, \beta_{23}, \beta_{24}, \beta_{34}$ اثرهای متقابل است. از نرم‌افزار Minitab 17 برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده و نمودارها به روش سطح پاسخ رسم شد. چهار مدل خطی، خطی-مربعی، خطی-برهم‌کنش، و درجه دوم کامل بر نتایج به‌دست آمده اعمال و مدل‌های مختلف بر اساس R^2 ، R^2 اصلاح شده، R^2 پیش‌بینی شونده مقایسه شد به‌صورتی که مدل دارای بیشترین مقادیر این سه عامل دارای قدرت پیش‌بینی بالا و دقت بیشتری خواهد بود (Khuri & Mukhopadhyay, 2010).

پس از انتخاب مدل مناسب، به کمک جدول آنالیز واریانس معنی‌دار بودن عبارات مختلف، در سطح ۰/۰۵

جدول ۲- تیمارهای هر یک از فرمولاسیون‌های پنیر لاکتیکی تولیدشده

تیمار	X ₁	X ₂	X ₃	راندمان پنیر (گرم)	فعالیت مانعت کنندگی ACE (IC ₅₀)	فعالیت آنتی‌اکسیدانی (درصد)	کلسیم (درصد)	بافت	رنگ	طعم	پذیرش کلی
۱	۴/۷۵	۶۰	۳/۰۰	۱۹/۷۵	۰/۳۱	۲۰/۳	۰/۴۰	۲/۶	۲/۵	۲/۵	۲/۸
۲	۴/۹۰	۶۰	۱/۷۵	۲۲/۸۰	۰/۲۸	۲۴/۰	۰/۷۰	۲/۵	۲/۳	۲/۸	۲/۳
۳	۴/۶۰	۲۸	۱/۷۵	۱۷/۹۵	۰/۲۳	۳۰/۲	۰/۱۶	۴/۳	۴/۵	۳/۵	۴/۵
۴	۴/۹۰	۴۴	۰/۵۰	۲۰/۹۸	۰/۳۰	۲۱/۵	۰/۵۵	۳/۹	۳/۳	۲/۸	۳/۱
۵	۴/۹۰	۲۸	۱/۷۵	۱۸/۹۵	۰/۲۴	۳۰/۰	۰/۳۰	۳/۴	۲/۵	۲/۸	۳/۰
۶	۴/۷۵	۴۴	۱/۷۵	۲۰/۲۵	۰/۱۳	۳۹/۰	۰/۴۸	۴/۴	۳/۶	۴/۶	۴/۵
۷	۴/۶۰	۴۴	۳/۰۰	۱۸/۱۸	۰/۱۲	۴۱/۵	۰/۱۹	۴/۲	۴/۵	۴/۳	۴/۴
۸	۴/۶۰	۴۴	۰/۵۰	۱۸/۶۱	۰/۲۱	۳۳/۰	۰/۲۵	۳/۷	۳/۹	۳/۹	۳/۸
۹	۴/۷۵	۳۰	۰/۵۰	۲۰/۲۸	۰/۳۴	۱۸/۵	۰/۴۸	۲/۶	۲/۸	۳/۱	۲/۷
۱۰	۴/۷۵	۴۴	۱/۷۵	۲۰/۲۱	۰/۱۶	۳۷/۸	۰/۴۶	۳/۹	۴/۵	۴/۷	۴/۲
۱۱	۴/۶۰	۳۰	۱/۷۵	۱۸/۸۸	۰/۲۸	۲۵/۷	۰/۲۹	۲/۶	۳/۲	۳/۶	۲/۹
۱۲	۴/۷۵	۲۸	۰/۵۰	۱۹/۱۰	۰/۲۷	۲۶/۸	۰/۳۲	۴/۰	۴/۴	۳/۰	۳/۸
۱۳	۴/۹۰	۴۴	۳/۰۰	۲۱/۲۰	۰/۲۴	۲۹/۰	۰/۵۷	۲/۸	۳/۱	۳/۶	۳/۳
۱۴	۴/۷۵	۲۸	۳/۰۰	۱۸/۴۰	۰/۲۰	۳۲/۵	۰/۲۱	۴/۶	۴/۵	۴/۲	۴/۸
۱۵	۴/۷۵	۴۴	۱/۷۵	۱۹/۹۰	۰/۱۷	۳۷/۶	۰/۴۳	۳/۵	۴/۱	۴/۶	۴/۱

پس از مقایسه R²های مدل‌های مختلف که در جدول ۳ مشخص شده است، مدل خطی-برهمکنش برای پاسخ‌های راندمان پنیر و میزان کلسیم، مدل خطی-مربعی برای پاسخ‌های فعالیت مانعت کنندگی ACE، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، طعم، و رنگ و مدل درجه دوم کامل برای پاسخ‌های بافت و پذیرش کلی به‌عنوان مدل‌های مناسب انتخاب شدند. جدول ۴، مدل‌های انتخاب شده را برای هر یک از پاسخ‌ها نشان می‌دهد.

پس از مقایسه R²های مدل‌های مختلف که در جدول ۳ مشخص شده است، مدل خطی-برهمکنش برای پاسخ‌های راندمان پنیر و میزان کلسیم، مدل خطی-مربعی برای پاسخ‌های فعالیت مانعت کنندگی

جدول ۳- مقایسه ضریب تعیین مدل‌های مختلف برای هر یک از پاسخ‌ها

مدل	راندمان پنیر	فعالیت مانعت کنندگی ACE	فعالیت آنتی‌اکسیدانی	کلسیم	بافت	رنگ	طعم	پذیرش کلی
R ² درصد	۸۴/۳۶	۳۷/۰۳	۳۸/۴۰	۸۴/۸۹	۶۶/۶۰	۸۱/۴۸	۲۸/۱۷	۶۸/۷۹
خطی	۷۸/۷۳	۱۹/۸۸	۲۱/۸۸	۸۰/۷۹	۵۷/۴۷	۷۶/۴۲	۸/۵۴	۶۰/۳۰
پیش‌بینی شده R ² درصد	۶۶/۷۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۲/۳۲	۳۹/۸۰	۷۱/۵۰	۰/۰۰	۴۸/۷۷
R ² درصد	۸۷/۲۰	۸۷/۳۶	۸۷/۵۵	۹۱/۲۰	۷۹/۶۵	۹۲/۳۱	۸۴/۲۷	۹۲/۷۳
خطی-مربعی	۷۷/۶۱	۷۷/۸۸	۷۸/۲۶	۸۴/۶۳	۶۴/۳۸	۸۶/۵۴	۷۲/۳۰	۸۷/۲۵
پیش‌بینی شده R ² درصد	۴۹/۳۳	۵۱/۸۹	۵۰/۶۰	۶۵/۴۶	۲۷/۸۶	۷۸/۰۷	۵۰/۸۱	۷۲/۶۵
R ² درصد	۹۲/۵۴	۳۸/۰۸	۳۹/۰۵	۹۰/۷۱	۷۸/۱۱	۸۲/۲۳	۳۸/۱۵	۷۳/۹۰
خطی-برهمکنش	۸۷/۰۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۳/۷۵	۶۱/۷۲	۶۸/۹۷	۰/۰۰	۵۴/۳۳
پیش‌بینی شده R ² درصد	۷۰/۷۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۴/۲۷	۳۱/۷۷	۵۲/۵۴	۰/۰۰	۲۶/۵۵
R ² درصد	۹۶/۴۴	۸۸/۶۴	۸۸/۷۵	۹۷/۳۲	۹۱/۲۵	۹۳/۰۸	۹۴/۱۷	۹۷/۷۹
درجه دوم کامل	۹۰/۰۱	۶۷/۶۸	۶۷/۶۳	۹۱/۸۱	۷۵/۴۶	۸۰/۷۲	۸۳/۶۷	۹۳/۹۲
پیش‌بینی شده R ² درصد	۴۷/۴۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۷/۵۲	۶۲/۴۳	۵۸/۰۹	۷/۷۳	۷۸/۹۵

جدول ۴- مدل‌های انتخاب شده برای هر یک از ویژگی‌های پنیر

ویژگی	مدل
راندمان پنیر (گرم)	$4756 - 631 \text{ pH} - 139.1 \text{ temp (C)} - 435 \text{ Starter dosage (\%)} + 30.42 \text{ pH*temp (C)} + 87 \text{ pH*Starter dosage (\%)} + 0.21 \text{ temp (C)*Starter dosage (\%)}$
فعالیت ممانعت کنندگی ACE (IC ₅₀)	$20.8 - 8.61 \text{ pH} - 0.02654 \text{ temp (C)} - 0.1221 \text{ Starter dosage (\%)} + 0.926 \text{ pH*pH} + 0.000326 \text{ temp (C)*temp (C)} + 0.0277 \text{ Starter dosage (\%)*Starter dosage (\%)}$
فعالیت آنتی‌اکسیدانی (درصد)	$-1900 + 809 \text{ pH} + 2.746 \text{ temp (C)} + 13.36 \text{ Starter dosage (\%)} - 87.4 \text{ pH*pH} - 0.03395 \text{ temp (C)*temp (C)} - 3.15 \text{ Starter dosage (\%)*Starter dosage (\%)}$
رنگ	$-240 + 105.7 \text{ pH} + 0.1013 \text{ temp (C)} + 0.157 \text{ Starter dosage (\%)} - 11.48 \text{ pH*pH} - 0.001693 \text{ temp (C)*temp (C)} - 0.0533 \text{ Starter dosage (\%)*Starter dosage (\%)}$
کلسیم (درصد)	$2.05 - 0.399 \text{ pH} - 0.1274 \text{ temp (C)} - 0.546 \text{ Starter dosage (\%)} + 0.0281 \text{ pH*temp (C)} + 0.107 \text{ pH*Starter dosage (\%)} + 0.00037 \text{ temp (C)*Starter dosage (\%)}$
طعم	$-470 + 199.4 \text{ pH} + 0.3249 \text{ temp (C)} + 1.217 \text{ Starter dosage (\%)} - 21.30 \text{ pH*pH} - 0.003825 \text{ temp (C)*temp (C)} - 0.291 \text{ Starter dosage (\%)*Starter dosage (\%)}$
بافت	$-257 + 110.8 \text{ pH} - 0.269 \text{ temp (C)} + 10.50 \text{ Starter dosage (\%)} - 11.85 \text{ pH*pH} - 0.001823 \text{ temp (C)*temp (C)} - 0.011 \text{ Starter dosage (\%)*Starter dosage (\%)} + 0.0833 \text{ pH*temp (C)} - 2.133 \text{ pH*Starter dosage (\%)} - 0.00750 \text{ temp (C)*Starter dosage (\%)}$
پذیرش کلی	$-454 + 197.6 \text{ pH} - 0.259 \text{ temp (C)} + 3.52 \text{ Starter dosage (\%)} - 21.48 \text{ pH*pH} - 0.002376 \text{ temp (C)*temp (C)} - 0.0853 \text{ Starter dosage (\%)*Starter dosage (\%)} + 0.0938 \text{ pH*temp (C)} - 0.533 \text{ pH*Starter dosage (\%)} - 0.01125 \text{ temp (C)*Starter dosage (\%)}$

عبارت‌های خطی و عبارت‌های نمای دوم دمای پخت و میزان آغازگر اثر معنی‌داری بر فعالیت‌های ممانعت کنندگی ACE و آنتی‌اکسیدانی پنیر لاکتیکی تولیدی دارند ($p < 0.05$). تنها عبارت خطی دمای پخت اثر معنی‌داری بر مطلوبیت بافت پنیر لاکتیکی تولیدی دارد ($p < 0.05$). عبارت خطی pH و عبارت‌های نمای دوم pH و دمای پخت لخته اثر معنی‌داری بر مطلوبیت طعم پنیر لاکتیکی تولیدی دارند ($p < 0.05$). عبارت خطی pH و عبارت‌های نمای دوم دمای پخت اثر معنی‌داری بر مطلوبیت رنگ پنیر لاکتیکی تولیدی دارند ($p < 0.05$).

کلیه عبارت‌های خطی و عبارت‌های نمای دوم دمای پخت و میزان آغازگر اثر معنی‌داری بر پذیرش کلی پنیر لاکتیکی تولیدی دارند ($p < 0.05$). عدم برازش مدل‌های انتخاب شده برای همه پاسخ‌ها معنی‌دار نیست ($p > 0.05$) که نشان دهنده دقت مناسب مدل‌هایی است که انتخاب شده‌اند (جدول ۵).

از جدول آنالیز واریانس برای ارزیابی معنی‌داری عبارت‌ها استفاده شد. برای هر یک از عبارت‌های مدل یک مقدار F و یک مقدار P مشخص شده که هر چه میزان F بیشتر و میزان P کمتر باشد عبارت مورد نظر تأثیر بیشتری در میزان پاسخ و در واقع میزان معنی‌داری بیشتری خواهد داشت (Yolmeh & Jafari, 2017). از این رو، عبارت خطی pH بیشترین اثر را بر ویژگی‌های راندمان پنیر و میزان کلسیم و عبارت خطی دوم دمای پخت لخته بیشترین اثر را بر ویژگی‌های بافت و پذیرش کلی پنیر لاکتیکی دارد. عبارت نمای دوم دمای پخت لخته بیشترین اثر را بر فعالیت‌های ممانعت‌کنندگی ACE و آنتی‌اکسیدانی و ویژگی‌های رنگ و طعم پنیر لاکتیکی دارد (جدول ۵). با توجه به جدول آنالیز واریانس مدل برای راندمان پنیر (جدول ۴) عبارت‌های خطی pH و دمای پخت لخته و برهمکنش بین آنها اثر معنی‌داری بر راندمان پنیر لاکتیکی تولیدی دارد ($p < 0.05$). همه

جدول ۵- نتایج آنالیز واریانس برای هر یک از پاسخ‌ها

	راندمان پنیر				فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE				فعالیت آنتی‌اکسیدانی				کلسیم				بافت		منبع	
	درجه آزادی (DF)	میانگین مربعات (MS)	P	F	DF	MS	F	P	DF	MS	F	P	DF	MS	F	P	DF			
رگرسیون	۶	۳۷۴۵۰	۰/۰۰۰	۱۶/۵۰	۶	۰/۰۰۹	۹/۲۲	۰/۰۰۳	۶	۱۰۳/۷	۹/۴۰	۰/۰۰۳	۶	۰/۰۵۲	۱۳/۰۳	۰/۰۰۱	۹	۰/۷۷۸	۵/۷۹	۰/۰۳۴
خطی	۳	۶۷۴۱۹	۰/۰۰۰	۲۹/۷۱	۳	۰/۰۰۷	۷/۸۱	۰/۰۰۹	۳	۹۱/۰	۸/۲۴	۰/۰۰۸	۳	۰/۰۹۷	۲۴/۳۹	۰/۰۰۰	۳	۱/۷۰۱	۱۲/۶۷	۰/۰۰۹
(X ₁) pH	۱	۱۳۲۸۷۰	۰/۰۰۰	۵۸/۵۵	۱	۰/۰۰۶	۶/۱۷	۰/۰۰۳	۱	۸۳/۸	۷/۵۹	۰/۰۲۵	۱	۰/۱۸۹	۴۷/۳۰	۰/۰۰۰	۱	۰/۶۰۵	۴/۵۰	۰/۰۸۷
(X ₂) دمای پخت	۱	۶۶۷۹۵	۰/۰۰۱	۲۹/۴۴	۱	۰/۰۰۹	۹/۳۰	۰/۰۱۷	۱	۱۲۰/۱	۱۰/۸۸	۰/۰۱۱	۱	۰/۰۹۷	۲۴/۲۱	۰/۰۰۱	۱	۴/۵۰۰	۳۳/۵۰	۰/۰۰۲
(X ₃) میزان آغازگر	۱	۲۵۹۲	۰/۳۱۶	۱/۱۴	۱	۰/۰۰۷	۷/۹۸	۰/۰۲۲	۱	۶۹/۰	۶/۲۵	۰/۰۳۷	۱	۰/۰۰۶	۱/۶۵	۰/۲۳۴	۱	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۱/۰۰۰
نمای دوم	-	-	-	-	۳	۰/۰۱۰	۱۰/۶۲	۰/۰۰۴	۳	۱۱۶/۵	۱۰/۵۵	۰/۰۰۴	-	-	-	-	-	۰/۲۶۲	۲/۵۰	۰/۱۷۴
X ₁ ²	-	-	-	-	۱	۰/۰۰۲	۱/۶۳	۰/۲۳۷	۱	۱۴/۳	۱/۲۹	۰/۲۸۸	-	-	-	-	-	۰/۸۰۴	۱/۹۵	۰/۲۲۱
X ₂ ²	-	-	-	-	۱	۰/۰۲۵	۲۶/۱۳	۰/۰۰۱	۱	۲۷۹/۱	۲۵/۲۶	۰/۰۰۱	-	-	-	-	-	۰/۰۰۱	۵/۹۹	۰/۰۵۸
X ₃ ²	-	-	-	-	۱	۰/۰۰۷	۷/۰۷	۰/۰۲۷	۱	۸۹/۲	۸/۰۸	۰/۰۲۴	-	-	-	-	-	۰/۲۹۶	۰/۰۱	۰/۹۳۴
برهمکنش	۳	۷۴۸۱	۰/۰۷۹	۳/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۲۴۹	۲/۲۱	۰/۲۰۵
X ₁ X ₂	۱	۲۱۳۱۶	۰/۰۱۵	۹/۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۶۸	۱/۱۹	۰/۳۲۵
X ₁ X ₃	۱	۱۰۵۶	۰/۵۱۴	۰/۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۵۴۳	۴/۷۶	۰/۰۸۱
X ₂ X ₃	۱	۷۲	۰/۸۶۳	۰/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۶	۰/۱۳۴	۰/۴۵۰
خطای باقیمانده	۸	۲۲۶۹	-	-	۸	۰/۰۰۱	-	-	۱۶	۱۱/۱	-	-	۱۳	۰/۰۰۴	-	-	-	۰/۰۸۸	-	-
عدم برازش	۶	۲۹۰۳	۰/۱۱۶	۷/۹۱	۶	۰/۰۰۱	۲/۶۸	۰/۲۹۳	۱۱	۱۴/۵	۲۵/۲۷	۰/۰۵۸	۸	۰/۰۰۵	۸/۰۸	۰/۱۱۴	۳	۰/۰۸۸	۰/۴۳	۰/۷۵۲
خطای خالص	۲	۳۶۷	-	-	۲	۰/۰۰۰	-	-	۵	۰/۵۷	-	-	۵	۰/۰۰۱	-	-	-	۰/۲۰۳	-	-

جدول ۵- نتایج آنالیز واریانس برای هر یک از پاسخ‌ها (ادامه)


پذیرش کلی				طعم				رنگ				منبع
P	F	MS	DF	P	F	MS	DF	P	F	MS	DF	
۰/۰۰۱	۲۵/۰۵	۰/۹۴۷	۹	۰/۰۰۷	۷/۰۸	۱/۱۵۲	۶	۰/۰۰۷	۷/۰۸	۱/۱۵۲	۶	رگرسیون
۰/۰۰۰	۵۲/۸۴	۱/۹۹۹	۳	۰/۰۳۵	۴/۷۴	۰/۷۷۱	۳	۰/۰۳۵	۴/۷۴	۰/۷۷۰	۳	خطی
۰/۰۰۱	۵۰/۳۵	۱/۹۰۱	۱	۰/۰۱۵	۹/۴۱	۱/۵۳۱	۱	۰/۰۱۵	۹/۴۱	۱/۵۳۱	۱	(X ₁) pH
۰/۰۰۰	۹۶/۳۴	۳/۶۴۵	۱	۰/۲۲۵	۱/۷۳	۰/۲۸۱	۱	۰/۲۲۵	۱/۷۳	۰/۲۸۱	۱	(X ₂) دمای پخت
۰/۰۱۸	۱۱/۹۳	۰/۴۵۱	۱	۰/۱۱۸	۳/۰۷	۰/۵۰۰	۱	۰/۱۱۸	۳/۰۷	۰/۵۰۰	۱	(X ₃) میزان آغازگر
۰/۰۰۴	۱۸/۳۸	۰/۶۹۵	۳	۰/۰۰۵	۹/۴۳	۱/۵۳۴	۳	۰/۰۰۵	۹/۴۳	۱/۵۳۴	۳	نمای دوم
۰/۰۰۵	۲۲/۸۰	۰/۸۶۴	۱	۰/۰۵۰	۵/۲۱	۰/۸۴۷	۱	۰/۰۵۲	۵/۲۱	۰/۸۴۷	۱	X ₁ ²
۰/۰۰۲	۳۶/۱۲	۱/۳۳۶	۱	۰/۰۰۲	۲۱/۷۶	۳/۵۴۰	۱	۰/۰۰۲	۲۱/۷۵	۳/۵۴۰	۱	X ₂ ²
۰/۲۴۵	۱/۷۴	۰/۰۶۵	۱	۰/۰۶۲	۴/۶۸	۰/۷۶۱	۱	۰/۰۶۲	۴/۶۸	۰/۷۶۱	۱	X ₃ ²
۰/۰۸۸	۳/۹۲	۰/۱۴۸	۳	-	-	-	-	-	-	-	-	برهمکنش
۰/۰۶۹	۵/۳۵	۰/۲۰۲	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	X ₁ X ₂
۰/۳۵۱	۱/۰۶	۰/۰۴۰	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	X ₁ X ₃
۰/۰۶۹	۵/۳۵	۰/۲۰۲	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	X ₂ X ₃
-	-	۰/۰۳۸	۵	-	-	۰/۱۶۳	۱۶	-	-	۰/۱۶۳	۸	خطای باقیمانده
۰/۶۰۱	۰/۷۹	۰/۰۳۴	۳	۰/۰۶۵	۴/۸۴	۰/۲۱۶	۱۱	۰/۱۱۲	۳/۱۴	۰/۲۱۶	۶	عدم برازش
-	-	۰/۰۴۳	۲	-	-	۰/۰۰۳	۵	-	-	۰/۰۰۳	۲	خطای خالص

>


لخته به‌طور محسوسی افزایش یافته که می‌تواند به دلیل باقی ماندن بیشتر کلسیم در لخته باشد. گزارش شده است که با افزایش دمای پخت لخته میزان از دست رفتن کلسیم از لخته به آب‌پنیر کاهش می‌یابد. اعتقاد بر این است میزان کلسیم اثر مستقیمی بر تشکیل لخته پنیر و در واقع راندمان پنیر دارد (Wolfschoon-Pombo, 1997).

اثر متغیرهای مستقل بر میزان ویژگی‌های پنیر لاکتیکی تولید شده راندمان پنیر

شکل ۱ (آ) اثر بر همکنش دما و میزان آغازگر را بر میزان راندمان پنیر لاکتیکی نشان می‌دهد. در این شکل دیده می‌شود که میزان راندمان با افزایش دمای پخت



شکل ۱ (آ) - اثر متقابل مقدار آغازگر و دمای پخت بر راندمان پنیر لاکتیکی



شکل ۱ (ب) - اثر متقابل میزان pH و دمای پخت بر راندمان پنیر لاکتیکی

این دو نوع پنیر است. همان‌طور که در شکل ۱ (ب) مشخص است با کاهش pH راندمان پنیر لاکتیکی کاهش یافته است که با پایین بودن کلسیم در لخته به علت انحلال زیاد آن در آب‌پنیر در این شرایط (pH پایین) مرتبط است.

فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE


ACE با برش انتهای کربوکسیل، آنژیوتانسین I را به آنژیوتانسین II تبدیل می‌کند و می‌تواند از این طریق در افزایش فشار خون نقش داشته باشد. پپتیدهای ضد فشارخون با مهار این آنزیم از افزایش فشارخون جلوگیری می‌کنند. اکثر پپتیدهای ضد فشارخون شناخته‌شده از کازئین شیر گاو جدا شده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد اجزای

از سوی دیگر با افزایش میزان آغازگر، راندمان تولید پنیر به‌آرامی کاهش می‌یابد که احتمالاً به علت کاهش زیاد pH ناشی از بالا بودن میزان آغازگر است که با مشاهدات بوریتی و همکاران (Buriti *et al.*, 2005) در خصوص راندمان پنیر میناس در مقادیر بالای آغازگر مطابقت دارد. اصولاً pH لخته از عوامل مهم تأثیرگذار بر میزان حضور کلسیم در لخته است (Gunasekaran & AK, 2002). بوریتی و همکاران (Buriti *et al.*, 2005) گزارش داده‌اند که راندمان پنیر میناس که با افزودن مستقیم اسیدلاکتیک تولید می‌شود، نسبت به این پنیر که به کمک آغازگر *Lactobacillus paracasei* تولید می‌شود، بیشتر است و دلیل آن متفاوت بودن فرایند تولید اسید در


در نتیجه کاهش تولید پپتیدهای زیست‌فعال باشد. شه و اونگ (Ong & Shah, 2008) گزارش داده‌اند که در شرایط نامناسب دمایی (دمای بالا)، فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE پنیر چدار پروبیوتیکی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، با افزایش مقدار آغازگر، فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE افزایش ولی در مقادیر بالای آغازگر میزان فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE کاهش می‌یابد که احتمالاً به علت پایین بودن pH ناشی از تخمیر اضافی (وجود مقادیر بالای آغازگر) است.

مطابق شکل ۲ (ب)، با کاهش pH از ۴/۹ تا حدود ۴/۷، میزان فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE پنیر لاکتیکی تولیدشده افزایش می‌یابد ولی در ادامه در pHهای پایین‌تر به علت نامناسب بودن شرایط برای تخمیر توسط آغازگرها میزان فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE به آرامی کاهش می‌یابد. گزارش شده است که pH مناسب برای فعالیت این باکتری‌ها حدود ۴/۷ است (Guinee & O'Callaghan, 2010).

پپتیدی کوچک‌تر از ۳ و ۵-۳ کیلودالتون حاصل از هیدرولیز پروتئین‌های مخمر کلاورومایسس مارکسیانوس به‌وسیله آنزیم‌های تریپسین و کیموتریپسین دارای بیشترین فعالیت بازدارندگی ACE هستند. گرچه اطلاعات دقیقی در مورد ارتباط ساختار و عملکرد این گروه از پپتیدها در دسترس نیست، اما پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد اتصال پپتیدها به آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین وابسته به انتهای کربوکسیل پپتید است و پپتیدهای دارای اسیدآمینوهای آب‌گریز در این بخش مهارکننده‌های قوی‌تری هستند. این اسیدآمینوها در حقیقت با جایگاه فعال آنزیم برهمکنش می‌دهند. شکل ۲ (آ) اثر متقابل مقدار آغازگر و دمای پخت را بر فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE پنیر لاکتیکی تولیدشده نشان می‌دهد. در این شکل مشخص است با افزایش دمای پخت لخته، میزان فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE پنیر لاکتیکی ابتدا افزایش ولی در ادامه به‌طور محسوس کاهش می‌یابد که احتمالاً به علت نامساعد شدن شرایط برای تخمیر در دماهای بالا و



شکل ۲ (آ) - اثر متقابل مقدار آغازگر و دمای پخت بر فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE (IC₅₀) پنیر لاکتیکی



شکل ۲ (ب) - اثر متقابل pH و دمای پخت بر فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE (IC₅₀) پنیر لاکتیکی


فعالیت آنتی‌اکسیدانی

شکل ۳ (آ) اثر متقابل pH و دمای پخت بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی پنیر لاکتیکی را نشان می‌دهد. در این شکل مشخص است که فعالیت آنتی‌اکسیدانی با افزایش دما تا حدود ۴۰ درجه سلسیوس، ابتدا افزایش ولی در دماهای بالاتر از ۴۰ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد که دلیل آن نامساعد بودن شرایط برای رشد آغازگرها است. فعالیت آنتی‌اکسیدانی با کاهش pH افزایش می‌یابد.


مطابق شکل ۳ (ب) فعالیت آنتی‌اکسیدانی پنیر لاکتیکی با افزایش میزان آغازگر ابتدا افزایش ولی در مقادیر بالای آغازگر کاهش می‌یابد که می‌تواند به علت کاهش تولید پپتید در مقادیر بالای آغازگر باشد که در قسمت فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE به آن اشاره گردید.

کلسیم


شکل ۴ (آ) اثر متقابل مقدار آغازگر و دمای پخت بر میزان کلسیم پنیر لاکتیکی را نشان می‌دهد. مطابق این شکل، با افزایش دمای پخت میزان کلسیم لخته افزایش می‌یابد. گزارش شده است که دمای پخت بالا می‌تواند در حفظ کلسیم و بهبود تشکیل لخته و بافت آن نقش داشته باشد (Guinee *et al.*, 2001). میزان کلسیم پنیر در مقادیر بالای آغازگر کاهش می‌یابد که می‌تواند به دلیل افت pH ناشی از تخمیر زیاد و تولید اسیدهای آلی باشد. انحلال‌پذیری کلسیم در pH های پایین افزایش می‌یابد و در نتیجه در این شرایط مقادیر بالایی از آن وارد آب‌پنیر می‌شود (Gunasekaran & AK, 2002). همان‌طور که در بالا اشاره شد، با کاهش pH، به علت افزایش انحلال‌پذیری کلسیم، میزان کلسیم در لخته کاهش می‌یابد (شکل ۴ (ب)).




شکل ۳ (آ) - اثر متقابل pH و دمای پخت بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی (درصد) پنیر لاکتیکی



شکل ۳ (ب) - اثر متقابل مقدار آغازگر و pH بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی (درصد) پنیر لاکتیکی



شکل ۴ (آ) - اثر متقابل مقدار آغازگر و دمای پخت بر میزان کلسیم (درصد) پنیر لاکتیکی




شکل ۴ (ب) - اثر متقابل مقدار pH و دمای پخت بر میزان کلسیم (درصد) پنیر لاکتیکی

بافت


شکل ۵ اثر متقابل مقدار pH و دمای پخت را بر میزان مطلوبیت بافت پنیر لاکتیکی نشان می‌دهد. مطلوبیت بافت پنیر لاکتیکی همان‌طور که در شکل مشخص است در مقادیر پایین دمای پخت، با کاهش pH افزایش و در مقادیر بالای دمای پخت، با کاهش pH ابتدا افزایش می‌یابد ولی در ادامه در مقادیر پایین‌تر pH کاهش پیدا می‌کند. مطلوبیت بافت را می‌توان مرتبط با فعالیت تخمیری آغازگرها دانست به طوری که در pH حدود ۴/۷ و دمای حدود ۴۰ درجه سلسیوس مطلوبیت بافت بالا است که شرایطی مناسب برای فعالیت آغازگرهاست.

طعم

شکل ۶ اثر متقابل مقدار آغازگر و pH را بر میزان مطلوبیت طعم پنیر لاکتیکی نشان می‌دهد. مطابق شکل، مطلوبیت طعم پنیر لاکتیکی تولیدی با افزایش مقدار آغازگر و نیز pH، ابتدا افزایش ولی در مقادیر بالای این دو متغیر کاهش می‌یابد. مطلوبیت طعم پنیر لاکتیکی در شرایط اشاره شده را می‌توان به مساعد بودن شرایط تخمیر برای آغازگرها دانست. گزارش شده است که استفاده از مخلوط پروبیوتیک‌ها به واسطه متابولیت‌های خود می‌تواند باعث بهبود ویژگی‌های طعمی و بافتی پنیر میناس شود (Buriti et al., 2007).



شکل ۵ - اثر متقابل مقدار آغازگر و دمای پخت بر میزان مطلوبیت بافت پنیر لاکتیکی



شکل ۶- اثر متقابل مقدار آغازگر و pH بر میزان مطلوبیت طعم پنیر لاکتیکی


پخت لخته به آرامی افزایش ولی در ادامه در مقادیر بالای دمای پخت به شدت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، میزان پذیرش کلی با کاهش pH برش لخته تا حدود ۴/۷، افزایش ولی در مقادیر پایین pH کاهش می‌یابد. کاهش پذیرش کلی در مقادیر بالای pH و دمای پخت می‌تواند به علت نامناسب بودن شرایط برای فرایند تخمیر آغازگرها (به علت پایین بودن pH و بالا بودن دما) و در نتیجه تولید پایین ترکیبات پپتیدی و آروما توسط آغازگرها باشد (Lortal & Chapot-Chartier, 2005).

رنگ


شکل ۷ اثر متقابل مقدار آغازگر و pH را بر میزان مطلوبیت رنگ پنیر لاکتیکی نشان می‌دهد. با کاهش pH، میزان مطلوبیت رنگ افزایش می‌یابد. با کاهش دمای پخت لخته نیز مطلوبیت رنگ افزایش پیدا می‌کند.

پذیرش کلی

شکل ۸ (آ) اثر متقابل میزان pH و دمای پخت را بر میزان پذیرش کلی پنیر لاکتیکی نشان می‌دهد. در اینجا دیده می‌شود که میزان پذیرش نهایی با افزایش دمای




شکل ۷ - اثر متقابل مقدار آغازگر و pH بر میزان مطلوبیت رنگ پنیر لاکتیکی



شکل ۸ (آ) - اثر متقابل میزان pH و دمای پخت بر میزان پذیرش کلی پنیر لاکتیکی

شکل ۸ (ب) اثر متقابل مقدار آغازگر و pH را بر میزان پذیرش کلی پنیر لاکتیکی نشان می‌دهد. در شکل مشخص است که با افزایش میزان آغازگر، میزان پذیرش کلی پنیر لاکتیکی به آرامی افزایش می‌یابد.



شکل ۸ (ب) - اثر متقابل مقدار آغازگر و pH بر میزان پذیرش کلی پنیر لاکتیکی

آنتی‌اکسیدانی ۳۶ درصد، میزان کلسیم ۰/۴۲ درصد، مطلوبیت بافت ۳/۹، مطلوبیت رنگ ۴، مطلوبیت طعم ۴/۲، و پذیرش کلی پنیر ۳/۹ اندازه‌گیری شد که اختلاف کمی با مقادیر پیش‌بینی شده توسط مدل دارد که نشان‌دهنده دقت مناسب مدل است.

نتیجه‌گیری

آغازگرهای مورد استفاده در پنیر لاکتیکی تولید شده باعث بهبود ویژگی‌های کاربردی، فیزیکی، و حسی پنیر شده‌اند. نتایج پژوهش، بیانگر کارایی مفید روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی فرمولاسیون پنیر لاکتیکی است و تیمار حاوی ۱/۷۵ درصد آغازگر، دمای پخت لخته ۴۲ درجه سلسیوس و pH برش لخته ۴/۷ به‌عنوان تیمار بهینه برای تولید پنیر لاکتیکی انتخاب شد. در این شرایط بهینه مقادیر راندمان تولید پنیر، فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، میزان کلسیم، بافت، رنگ، طعم و پذیرش کلی پنیر به ترتیب ۱۹۴۸، ۰/۱۶۰، ۳۶/۱۵ درصد، ۰/۴۲ درصد، ۳/۹، ۴، ۴/۲ و ۳/۹ اندازه‌گیری شده است.

بهینه‌سازی

شرایط عملیاتی بهینه برای فرمولاسیون پنیر لاکتیکی باهدف بهینه‌سازی و فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE با هدف کمینه‌سازی و با یکسان در نظر گرفتن اهمیت پاسخ‌ها و با استفاده از تکنیک بهینه‌سازی عددی به کمک نرم‌افزار Minitab جستجو شد. تیمار حاوی ۱/۷۵ درصد آغازگر، دمای پخت لخته ۴۲ درجه سلسیوس و pH برش لخته ۴/۷ به‌عنوان تیمار بهینه برای تولید پنیر لاکتیکی به‌دست آمده است که در این شرایط مقادیر راندمان تولید پنیر ۱۹/۶۴ درصد، فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE ۰/۱۴۸ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر، فعالیت آنتی‌اکسیدانی ۳۸/۶۲ درصد، میزان کلسیم ۰/۴۵ درصد، مطلوبیت بافت ۴/۲۲، مطلوبیت رنگ ۴/۱، مطلوبیت طعم ۴/۶۵ و پذیرش کلی پنیر لاکتیکی تولید شده ۴/۳۳ مطلوبیت کلی ۷۵ درصد مشاهده شد. نتایج تجربی حاصل از اعمال شرایط بهینه تولید پنیر لاکتیکی در این شرایط مقادیر راندمان تولید پنیر ۱۹/۵ درصد (۱۹۴۸ گرم)، فعالیت ممانعت‌کنندگی ACE (IC₅₀) ۰/۱۶۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر، فعالیت

مراجع

Buriti, F. C., Alegro, J. H., and Saad, S. M. 2007. Effect of a probiotic mixed culture on texture profile and sensory performance of Minas fresh cheese in comparison with the traditional products. *Archivos Latinoamericanos De Nutricion*. 57(2): 179-185.

- Buriti, F. C., da Rocha, J. S., Assis, E. G., and Saad, S. M. 2005. Probiotic potential of Minas fresh cheese prepared with the addition of *Lactobacillus paracasei*. LWT-Food Science and Technology. 38(2): 173-180.
- Dannenbergh, E., and Kessler, H. G. 1988. Effect of denaturation of 3-lactoglobulin on texture properties of set-style nonfat yoghurt 2 firmness and flow properties. Milchwissenschaft. 43, 700-704.
- Di Pierro, P., Sorrentino, A., Mariniello, L., Giosafatto, C. V. L., and Porta, R. 2011. Chitosan/whey protein film as active coating to extend Ricotta cheese shelf-life. LWT-Food Science and Technology. 44(10): 2324-2327.
- Edalatian, M.R., Habibi Najafi, M.B., Mortazavi, S.A., Nasiri M.R., Basami, M.R., Hashemi, S.M. 2012. Isolation and identification of the indigenous lactic acid bacteria from Lighvan cheese. Iranian Journal of Food Science Technology. 37(9): 9-21.
- Fathi-Achachlouei, B., Hesari, J., and Azadmard-Damirchi, S. 2015. Physicochemical, sensory properties and proteolysis index of produced cheese by replacement of milk fat with hazelnut oils. Electronic Journal of Food Processing and Preservation. 7(1): 77-90. (in persian)
- Guinee, T. P., and O'Callaghan, D. J. 2010. Control and prediction of quality characteristics in the manufacture and ripening of cheese. Technology of Cheese Making, Second Edition. 260-329.
- Guinee, T. P., Feeney, E. P., and Fox, P. F. 2001. Effect of ripening temperature on low moisture Mozzarella cheese: 2. Texture and functionality. Le Lait. 81(4): 475-485.
- Gunasekaran, S., and Ak, M. M. 2002. Cheese Rheology and Texture. CRC Press.
- Home, D. S. 1998. Casein interactions: casting light on the black boxes, the structure in dairy products. International Dairy Journal. 8(30): 171-177.
- Khuri, A. I., and Mukhopadhyay, S. 2010. Response surface methodology. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics. 2(2): 128-149.
- Lortal, S., and Chapot-Chartier, M. P. 2005. Role, mechanisms and control of lactic acid bacteria lysis in cheese. International Dairy Journal. 15(6): 857-871.
- Lucey, J. A., Munro, P.A., and Singh, H. 1998. Whey separation in acid skim milk gels made with gluconogalactone: effects of heat treatment and gelation temperature. Journal of Texture Studies. 29(4):413-426.
- Madadlou, A., Khosrowshahi, A., Ebrahimzadeh Mousavi, M., and Emam-Djomeh, Z. 2006. Microstructure and rheological properties of Iranian white cheese coagulated at various temperatures. Journal of Dairy Science. 89(7): 2359-2364.
- Mekmene, O., and Gaucheron, F. 2011. Determination of calcium-binding constants of caseins, phosphoserine, citrate and pyrophosphate: A modelling approach using free calcium measurement. Food Chemistry. 127(2): 676-682.
- Mulvihill, D. M., and Grufferty, M. B. 1995. Effect of thermal processing on the cuagulability of milk by acid. Internatinal Dairy Federation, Brussele. 85(4): 188 – 205.
- Navidghasemizad, S., Hesari, J., Saris, P. E. R., and Nahaei, M. R. 2009. Isolation of lactic acid bacteria from Lighvan cheese, a semihard cheese made from raw sheep milk in Iran. International Journal of Dairy Technology. 62(2): 260-264.
- Pritchard, S. R., Phillips, M., and Kailasapathy, K. 2010. Identification of bioactive peptides in commercial Cheddar cheese. Food Research International. 43(5): 1545-1548.
- Van Vliet, T. 1988. Rheological properties of filled gels: Influence of filler matrix interaction. Colloid and Polymer Science. 266(6): 518-524.
- Vermeirssen, V., Van Camp, J., and Verstraete, W. 2002. Optimisation and validation of an angiotensin-converting enzyme inhibition assay for the screening of bioactive peptides. Journal of Biochemical and Biophysical Methods. 51(1): 75-87.
- Wolfschoon-Pombo, A. F. 1997. Influence of calcium chloride addition to milk on the cheese yield. International Dairy Journal. 7(4): 249-254.
- Yolmeh, M., and Jafari, S. M. 2017. Applications of response surface methodology in the food industry processes. Food and Bioprocess Technology. 10(3): 413-433.

Optimization of Some Functional, Physical and Sensory Properties of Kezmic Lactic Cheese

H. Ardeshir^{*}, Y. Maghsoudlou, M. Khomeiri, A. Sadeghi Mahoonak and M. Kashaninejad

^{*} Corresponding Author: Ph. D. Candidate at University of Gorgan, Agricultural Sciences and Natural Resources, Department of Food Science and Technology, Gorgan. Iran. Email: H.ardeshir123@gmail.com

Received: 18 April 2018, Accepted: 7 November 2018

The aim of this study was to find an optimal condition to produce lactic cheese using three independent variables: amount of microorganisms as starter, baking temperature of curds, and pH of curd during cutting. Results indicated that the linear term of pH had the greatest effects on the cheese efficiency and calcium content, and the square term of the baking temperature had the greatest effect on the texture and the overall acceptance of lactic cheese. The square term of baking temperature of curd had the greatest effect on ACE inhibitory and antioxidant activities, and the color and flavor properties of lactic cheese. The starter used in lactic cheese improved the functional, physical and sensory characteristics of the cheese. It has been found that the performance of the response surface methodology in optimizing the lactic cheese formulation was reasonable. The treatment containing 1.75% starter with curd baking temperature of 42 °C and curd cutting pH equal to 4.7 has been found as the optimum treatment for lactic cheese. In this situation, we came to the following conclusions: the level of cheese production efficiency = 19.48%; ACE inhibitory activity= 0.16 m/ml; antioxidant activity = 36.15%; calcium content = 0.42%; texture acceptance = 3.9, color acceptance =4.2, taste acceptance =4.2; and total acceptance =3.9.

Keywords: ACE Inhibitory Activity, Antioxidant Activity, Formulation, Lactic Cheese