

مقایسه رشد و عملکرد برخی ارقام تجاری گلابی روی دو پایه پاکوتاه و لیک (*Crataegus atrosanguinea*) و کوئینس

Comparison of Growth and Yield of some Commercial Pear Cultivars on Two Dwarf Hawthorn (*Crataegus atrosanguinea*) and Quince A Rootstocks

حمید عبدالله^۱، مصطفی محمدی^۲، داریوش آتشکار^۳ و اسدالله علیزاده^۴

۱، ۲ و ۳- به ترتیب دانشیار، تکنیسین و استادیار، پژوهشکده میوه‌های معتدل و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
۴- استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۹

چکیده

عبداللهی، ح.، محمدی، م.، آتشکار، د.، و علیزاده، ا.، ۱۳۹۷. مقایسه رشد و عملکرد برخی ارقام تجاری گلابی روی دو پایه پاکوتاه و لیک کوئینس A، پایه و لیک قرمز (*Crataegus atrosanguinea*) نیز با برخی ارقام گلابی سازگاری داشته و ضمن ایجاد پاکوتاهی، دارای تحمل بالائی به تنش خشکی است. در این پژوهش رشد و باردهی پنج رقم تجاری گلابی (شاه میوه، درگزی، هاروسوئیت، اسپادونا و بارلت) روی پایه‌های و لیک قرمز، کوئینس A و بذری درگزی (به عنوان شاهد) طی سال‌های ۱۳۹۲-۹۴ بررسی شد. نتایج یافتنی بیشترین پاکوتاهی نسبت به پایه بذری به میزان ۶۴/۲ درصد برای رقم درگزی و ۲۴/۴ درصد برای رقم بارلت روی پایه و لیک بود. در میان ارقام بررسی شده، رقم اسپادونا با میانگین ۳/۲۹۶، ۰/۲۲۰ و ۰/۱۸۹ سانتی‌متر بیشترین ارتفاع را به ترتیب روی پایه بذری، کوئینس A و لیک داشت. نوع پایه، تأثیر قابل توجهی بر اندازه میوه، اسیدیته قابل تیتر (TA) و میزان مواد جامد محلول (TSS) در ارقام مختلف نداشت. با توجه به بیشترین میزان پاکوتاهی ارقام روی پایه و لیک، کمترین میزان عملکرد در درخت روی این پایه مشاهده شد. بر اساس شاخص عملکرد به سطح مقطع تن (TCA)، بیشترین کارایی عملکرد در ترکیبات پیوندی رقم درگزی/کوئینس A و سپس درگزی/ولیک به دست آمد. در مناطق فاقد بیماری آتشک، ترکیب پیوندی رقم اسپادونا/ولیک با توجه به کارایی بالا و سال آوری پایین می‌تواند به عنوان مناسب ترین ترکیب در نظر گرفته شود.

واژه‌های کلیدی: گلابی، پایه بذری، کارایی عملکرد، ارتفاع درخت، مواد جامد محلول

مقدمه

الدهم و بن لويز د آورانچ-ز (Bonne Louise d'Avranches) است (Jacob, 1998)، به دليل خصوصيات مختلف از جمله سهولت تکثیر، استقرار مطلوب در خاک و زود بارده، به عنوان مورد توجه ترین پایه در بین تولید کنندگان نهال و باغداران بوده است. اما به نظر می‌رسد با توجه به گستره و همچنین توسعه اخیر باغ‌های گلابی کشور از استان‌های شمالی نظیر مازندران تا استان‌های جنوبی تری نظیر استان‌های فارس و اصفهان، استفاده از دیگر پایه‌ها نیز نظیر پایه‌های کوئینس برای خاک‌های حاصلخیز و فاقد شرایط تنفس (Tukey, 1964)، پایه‌های مختلف و لیک متعدد به جنس *Crataegus* برای خاک‌های مناطق پرتنش و همچنین گزینه‌ای برای انتقال از باغ‌های نیمه متراکم به باغ‌های بسیار متراکم گلابی (Abdollahi *et al.*, 2012) بتواند مدنظر قرار گیرد.

پایه‌های رویشی متعلق به گونه به کوئینس A، کوئینس B، کوئینس C، کوئینس آدامز (Adams) و کوئینس BA29 هستند (Abdollahi, 2010). در بررسی قاسمی و همکاران (Ghasemi *et al.*, 2010) روی چهار پایه کوئینس A، B، C و کوئینس BA29 در شرایط باغی، نشان داده شد که دو پایه کوئینس A و BA29 توانایی تحمل مقادیر بالاتر بی کربنات را دارند و عملکرد معنی‌دار و قابل قبولی را تحت چنین شرایطی به وجود

پایه‌های بذری گلابی حاصل از بذر استحصال شده از رقم درگزی (Pyrus communis L.) همچنان به عنوان اصلی ترین و فراگیرترین پایه گلابی در کشور به منظور تولید نهال و احداث باغ این محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد (Abdollahi, 2010). با توجه به عدم توجیه اقتصادی پایه‌های پابلند گلابی در شرایط باغداری حاضر ایران، طی سال‌های اخیر، تلاش‌هایی در سطح اولیه و مقدماتی برای ایجاد یک سیستم استاندارد و اقتصادی کشت نیمه متراکم و یا کاملاً متراکم گلابی انجام شده است. بر این اساس، پایه‌های مختلفی مشتمل بر پیرودوارف (Pyrodwarf)، Fox11 و شماری از دورگهای الدهم × فارمنینگ‌دال (Oldhome × Farmingdale) شامل OHxF87، OHxF69، OHxF40 و OHxF333؛ Abdollahi, 2010) OHxF333 از گونه (Nourmohamadi *et al.*, 2015) گلابی (P. communis L.)، پایه‌های BA29 و کوئینس A (Ghasemi *et al.*, 2010) از گونه به کوئینس A و کوئینس 29 (Cydonia oblonga Mill.) (Abdollahi *et al.*, 2012) (*Crataegus* sp.) از دیگر ارزیابی مقدماتی شدند.

در بین پایه‌های جدید وارد شده به ایران، شاید بتوان گفت که پایه نیمه پاکوتاه کننده پیرودوارف که دورگ گزینش شده بین دو رقم

مشخص شد که ارقام گلابی روی این گونه از ولیک دارای سازگاری نسبی و ارقام به فقد سازگاری پیوند بودند. این در حالی است که پایه‌های بذری ولیک گونه *C. atrosanguinea* به طور معمول برای تولید نهال به در استان اصفهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین در بررسی اکبری بیشه (Akbari Bisheh, 2014) روی تنوع ژنتیکی گونه‌های ولیک جمع‌آوری شده از استان‌های مختلف کشور با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و ISSR، مشخص شد که فاصله ژنتیکی بسیار زیادی بین گونه‌های مختلف موجود در این جنس مشاهده می‌شود، که حداقل بخشی از آن می‌تواند به دلیل سطوح پلوئیدی متعدد مشاهده شده در گونه‌های مختلف باشد. همچنین به طور معمول گونه‌های ولیک موجود در طبیعت، تحمل مطلوبی به خشکی و شوری داشته که پتانسیل فوق می‌تواند در کنار پاکوتاه‌کنندگی آن روی ارقام گونه‌های نزدیک به‌ویژه گلابی و به، در صورت وجود خصوصیات باردهی مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس بررسی‌های مقدماتی صورت گرفته روی امکان کاربرد پایه ولیک برای برخی از ارقام تجاری گلابی موجود در کشور، این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات باردهی، کیفیت میوه و پتانسیل عملکرد درختان وارد فاز باردهی اقتصادی شده روی پایه‌های ولیک *C. atrosanguinea* در کنار پایه کوئینس A همراه با پایه شاهد بذری گلابی انجام شد.

می‌آورند. در بررسی مقایسه تحمل پایه‌های مختلف گلابی به کلروز آهن توسط بانی‌نسب و همکاران (Baninasab *et al.*, 2015) گزارش شد که پایه‌های بذری به، گلابی و ولیک و پایه رویشی کوئینس A، به کمبود آهن پاسخ‌های متفاوتی داشته به صورتی که پایه‌های گلابی و ولیک، کمترین شدت زردبرگی را در بین پایه‌های مورد مطالعه در شرایط تنفس کمبود آهن نشان دادند. همچنین در این تحقیق، پایه کوئینس A، در مقایسه با پایه بذری به، تحمل بیشتری در برابر کمبود آهن نشان داد. از سوی دیگر از مشکلات استفاده از پایه‌های به نظری کوئینس A برای گلابی، ناسازگاری آن با برخی از ارقام است که در این موارد، استفاده از میانه‌پایه می‌تواند به رفع و یا کاهش آن منجر شود (Hassanpour *et al.*, 2007).

در بررسی مقدماتی اثر پایه‌های ولیک قرمز از گونه *Crataegus atrosanguinea* کوئینس A روی گیرائی پیوند، ساختار رشد و گسترش تاج ارقام تجاری گلابی توسط عبداللهی و همکاران (Abdollahi *et al.*, 2012)، بالاترین میزان تلفات نهالستانی در ترکیب پیوندی رقم در گزی با پایه ولیک مشاهده شد، در حالی که رقم اسپادونا (Spadona) گیرائی پیوند بیشتری روی پایه ولیک نشان داد. در بررسی دیگری توسط وستوود (Westwood, 1966) روی سازگاری ارقام گلابی و به روی پایه‌های گلابی سری OHxF و گونه ولیک *C. oxyacanthus*

احداث باغ فاقد هرگونه لایه غیرقابل نفوذ و آهکی بود. درختان در کلیه ترکیبات پیوندی موردنرسی، به صورت محور مرکزی تغییر یافته (Modified leader) هرس فرم شده بودند. صفات رویشی مورد ارزیابی شامل قطر پایه در ده سانتی‌متری پائین محل پیوند و قطر رقم در ده سانتی‌متری بالای محل پیوند، میزان رشد سالیانه شاخصاره‌ها از محل باز شدن جوانه تا انتهای رشد آن سال، ارتفاع درخت، تعداد شاخه فرعی درخت، تراکم اسپور روی بازوها و طول متوسط شاخه‌های فرعی بود. ارزیابی‌های خصوصیات رویشی روی تمامی درختان هر کرت آزمایش به تفکیک در پائین هر سال انجام شد. ارزیابی‌های خصوصیات مرتبط با باردهی و عملکرد و همچنین کیفیت میوه، مشتمل بر عملکرد درخت به صورت تعداد میوه روی درخت ضربدر متوسط وزن بیست میوه، متوسط طول و قطر میوه روی ده میوه، شاخص میزان اسیدیته کل و میزان کل مواد محلول میوه‌ها در زمان رسیدن کامل میوه انجام شد. بر اساس زمان رسیدن میوه ارقام مختلف موردنرسی، زمان برداشت میوه رقم شاه میوه ۱۵ تا ۳۰ مرداد، بر اساس شاخص سفتی بافت ۲/۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، برای رقم ویلیامز و اسپادونا بین ۱۵ تا ۲۵ شهریور به ترتیب بر اساس شاخص سفتی بافت ۵/۷ و ۴/۷ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، برای رقم هاروسوئیت بین اول تا ۱۰ مهرماه بر اساس شاخص سفتی بافت ۴/۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع و برای رقم

مواد و روش‌ها

در این مطالعه، خصوصیات رشدی و باردهی ارقام گلابی شامل دو رقم بومی شاه میوه و در گزی و سه رقم وارداتی هاروسوئیت (Spadona) و Harrow Sweet (Bartlett) (نام معادل ویلیامز، Williams)، پیوند شده بر روی پایه‌های ولیک قرمز (*C. atrosanguinea*) و پایه هم‌گروه کوئینس A همراه با پایه‌های بذری گلابی معمول نهالستان‌ها که از بذر میوه رقم در گزی حاصل می‌شود، ارزیابی شد. بررسی‌ها طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ در حالی که درختان در سال ۱۳۹۲ دارای شش سال سن بودند، آغاز شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل (نوع پایه در سه سطح و رقم گلابی در پنج سطح) و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و شش درخت در هر کرت آزمایشی با مساحت تقریبی ۳۰۰۰ مترمربع در ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال شهر کرج اجرا شد. درختان همگی با فواصل شش مترین ردیف و پنج متر روی ردیف کشت شده بودند و آبیاری درختان به صورت قطره‌ای با چهار قطره‌چکان هشت لیتر بر ساعت با دور آبیاری دو روز در میان به مدت هشت ساعت انجام گرفت. محل کشت درختان با بیل مکانیکی به عرض و عمق یک متر به صورت کanal کنده شده و با افزودن کود دامی پوسیده و کلش نسبت به اصلاح خاک ناحیه دربرگیرنده ریشه قبل از کاشت نهال‌ها اقدام شده بود. بر این اساس خاک محل

کرت آزمایشی انجام شد. نتایج حاصله به صورت میانگین هر درخت در هر کرت آزمایش میانگین گیری و با استفاده از نرم افزار Excel مرتب سازی شدند. برای تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها از نرم افزار سیگمایپلات (SigmaPlot, Sigma Co., USA) با آزمون چند دامنه‌ای دانکن استفاده شد.

نتایج و بحث

رشد و باردهی

بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول ۱ و ۲)، اثر سال بر تمامی صفات رویشی مورد بررسی (به غیراز تراکم اسپور) و بر صفات عملکردی و کیفی میوه (به غیر از قطر میوه، میزان اسیدیته و میزان مواد جامد محلول) معنی‌دار بود و این موضوع، بیانگر تأثیر قابل توجه تر اثر سال روی خصوصیات رشدی درختان است. مقایسه میانگین نتایج حاصله، بیانگر افزایش پیوسته صفات رشدی طی سه سال آزمایش بود، بنابراین در اغلب صفات رویشی موردنظری، تفاوت مشاهده شده بین دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کمتر بود (جدول ۳).

نتایج تجربه واریانس نشان داد که اثر نوع پایه روی کلیه خصوصیات رویشی، عملکردی و کیفی میوه (به غیر از میزان اسیدیته و مواد جامد محلول) معنی‌دار بود. اثر متقابل پایه و رقم بر میزان اسیدیته و مواد جامد در میوه معنی‌دار بود ولی دامنه تغییرات میزان مواد جامد در ترکیبات پیوندی مختلف بیشتر بود (جدول ۴).

در گزی بین ۱۰ تا ۲۰ مهرماه بر اساس شاخص سفتی بافت ۵/۷ کیلو گرم بر سانتی متر مربع انجام شد. کلیه اعداد در نظر گرفته شده برای سفتی بافت ارقام، بر اساس بررسی های قبلی نگارنده در منطقه کرج و با در نظر گرفتن زمان مناسب برای مصرف تازه خوری ارقام در نظر گرفته شد. همچنین شاخص عملکرد در سطح مقطع تنها (TCA)، از تقسیم میزان عملکرد بر سطح مقطع تنها به صورت کیلو گرم بر سانتی متر مربع محاسبه شد. شاخص سال آوری (Biennial Bearing Index) درصد کسر تفاوت میزان باردهی دو سال متوالی (با حفظ ترتیب سال) تقسیم بر مجموع عملکرد دو سال محاسبه شد (Hoblyn *et al.*, 1936). بر این اساس، سال آوری درمجموع دو سال با کاهش میزان محصول در سال دوم به صورت مثبت و درمجموع دو سال با افزایش میزان محصول در سال دوم به صورت منفی به دست آمد. میزان پاکوتاه کنندگی نسبت به یک پایه، به صورت کسر ارتفاع درخت روی پایه اول به پایه دوم ضربیدر عدد صد حاصل شد.

میزان اسید قابل تitrer (Titratable Acid: TA) با استفاده از فل فتالین و سود NaOH ۰/۱ نرمال اندازه گیری شد (Mostofi and Najafi, 2005). همچنین میزان کل مواد جامد محلول (Total Soluble Solids: TSS) با استفاده از رفراکтомتر (مدل Atago-Japan) اندازه گیری شد. کلیه اندازه گیری ها روی ده میوه از هر

جدول ۱- تجزیه واریانس خصوصیات روسی ارقام گلابی روی پایه‌های بذری گلابی، کوئینس A و ولیک (Crataegus atrosanguinea)

Table 1. Analysis of variance of growth characteristics of pear cultivars on pear seedling, Quince A and hawthorn (*Crataegus atrosanguinea*) rootstocks

S.O.V.	منابع تغییرات	درجه آزادی df.	میانگین مربوط							
			قطر پایه Rootstock diameter	قطر رقم Cultivar diameter	ارتفاع درخت Tree height	رشد سالیانه Annual growth	تعداد شاخه فرعی Lateral shoot number	طول شاخه فرعی Lateral shoot length	تراکم اسپور Spur density	
Year	سال	2	173.6**	131.1**	1261501**	3119276**	3299**	119069**	951ns	
Replication	تکرار	2	50.7ns	29.5ns	219638ns	13254ns	7.86ns	58222ns	370ns	
Rootstock (R)	پایه	2	376.6**	281.6**	977024**	38693**	1987**	303048**	1739**	
Cultivar (C)	رقم	4	409.8**	424.6**	514189**	157904**	995**	279910**	1723**	
Y × R	سال × پایه	4	23.3**	12.5**	46050**	58278**	226**	2763ns	27ns	
Y × C	سال × رقم	8	9.5**	10.4**	76931**	111545**	192**	4838ns	64ns	
R × C	پایه × رقم	8	68.7**	59.1**	72121**	230062**	397**	40590**	1538**	
Y × R × C	سال × پایه × رقم	16	8.1**	7.4**	13381**	36637**	229**	7827**	248ns	
Error	خطا	88	6.6	1.9	5107	4013	36	1773	161	

و **: به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال یک درصد.

ns and **: Not significant and significant at 1% probability levels, respectively.

جدول ۲- تجزیه واریانس خصوصیات میوه و باردهی ارقام گلابی روی پایه‌های بذری گلابی، کوئینس A و ولیک (Crataegus atrosanguinea)

Table 2. Analysis of variance of bearing characteristics of pear cultivars on pear seedling, Quince A and hawthorn (Crataegus atrosanguinea) rootstocks

S.O.V.	منابع تغییرات	درجه آزادی df.	MS میانگین مرتعات							
			وزن میوه	طول میوه	قطر میوه	عملکرد درخت	اسیدیته قابل تیتر	مواد جامد محلول	عملکرد در سطح مقطع تن	
			Fruit weight	Fruit length	Fruit diameter	Tree yield	Titratable acidity (TA)	Total soluble solids (TSS)	Yield per unit trunk cross-sectional area (TCA)	
Year	سال	2	265013**	22.6**	3.43 ^{ns}	47800080**	0.1 ^{ns}	0.2 ^{ns}	118.5**	
Replication	تکرار	2	33870**	9.9 ^{ns}	13.8 ^{ns}	40036039**	0.6 ^{ns}	3.7 ^{ns}	104.0**	
Rootstock (R)	پایه	2	43452**	24.6**	35.7**	30686169**	0.3 ^{ns}	0.1 ^{ns}	40.9 ^{ns}	
Cultivar (C)	رقم	4	79454**	1758**	926.5**	81773068**	138**	85**	177.9**	
Y × R	سال × پایه	4	2766 ^{ns}	7.9 ^{ns}	8.2 ^{ns}	13320574**	0.8 ^{ns}	1.7 ^{ns}	33.3**	
Y × C	سال × رقم	8	1781 ^{ns}	33.5**	17.8**	10220220**	0.4 ^{ns}	1.2 ^{ns}	27.3**	
R × C	پایه × رقم	8	8406 ^{ns}	41.5**	70.9**	13638251**	1.4**	10.3**	5.6 ^{ns}	
Y × R × C	سال × پایه × رقم	16	9280**	11.4**	2.4 ^{ns}	4718737**	0.3 ^{ns}	3.6 ^{ns}	12.3 ^{ns}	
Error	خطا	88	2977	2.7	2.0	2145415	0.2	1.7	6.9	

ns و **: به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال یک درصد.

ns and **: Not significant and significant at 1% probability levels, respectively.

جدول ۳- مقایسه میانگین خصوصیات روشی ارقام گلابی روی پایه‌های بذری گلابی، کوئینس A و ولیک (Crataegus atrosanguinea) طی سال‌های ۱۳۹۲-۹۴

Table 3. Mean comparison of the growth characteristics of pear cultivars on pear seedling, Quince A and hawthorn (*Crataegus atrosanguinea*) rootstocks during 2013-15

Years/ Rootstocks/ Cultivars/ Interactions	سال‌ها/ پایه‌ها/ ارقام اثرات متقابل	قطر پایه (سانتی متر)	قطر رقم (سانتی متر)	ارتفاع درخت (سانتی متر)	رشد سالیانه (سانتی متر)	تعداد شاخه فرعی	طول شاخه فرعی (سانتی متر)	تراکم اسپور Spur density (spur/m)
Rootstock diameter (cm)	Cultivar diameter (cm)	Tree height (cm)	Annual growth (cm)	Lateral shoot number	Lateral shoot length (cm)			
2013	۱۳۹۲	3.39b	3.14c	155.9b	23.0b	4.0b	82.1b	22.7a
2014	۱۳۹۳	4.39a	4.06b	160.9b	15.9b	4.5b	71.9c	22.6a
2015	۱۳۹۴	4.96a	4.51a	193.6a	60.8a	10.3a	112.3a	25.3a
Hawthorn	ولیک	3.12c	2.81c	74.9c	69.9c	3.5c	53.6c	20.4b
Quince A	A کوئینس	4.25b	4.07b	140.4b	93.8a	6.5b	92.3b	25.0a
Seedling	بذری	5.48a	4.84a	195.0a	80.9b	8.9a	120.3a	26.4a
Bartlett	بارلت	3.12c	2.65c	96.1d	53.8c	4.1c	55.7d	26.1a
Dargazi	درگزی	3.81b	3.30b	125.9b	74.6b	5.1b	90.9b	27.9a
Harrow Sweet	هاروسوئیت	3.76bc	3.33b	110.2c	66.3b	5.1b	69.8c	21.9b
Shah Miveh	شاه میوه	3.64bc	3.51b	116.0bc	78.3b	6.6b	67.8c	17.9c
Spadona	اسپادونا	7.09a	6.74a	235.7a	134.8a	10.4a	159.6a	25.8a

در هر ستون، میانگین‌های دارای حروف مشابه، بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف معنی‌دارند.

In each column, the means with similar letters are not significantly different at the 5% probability level, according to Duncan's multiple range test.

ادامه جدول ۳

Table 3. Continued

پیشگیری از قم نجاری گلخانه‌ی ...

Rootstocks/cultivars	پایه‌ها/ارقام	قطر پایه (سانتی‌متر) Rootstock diameter (cm)	قطر رقم (سانتی‌متر) Cultivar diameter (cm)	ارتفاع درخت (سانتی‌متر) Tree height (cm)	رشد سالیانه (سانتی‌متر) Annual growth (cm)	تعداد شاخه فرعی Lateral shoot number	طول شاخه فرعی (سانتی‌متر) Lateral shoot length (cm)	تراکم اسپور Spur Density (Spur/m)
Hawthorn-Bartlett	ولیک-بارلت	3.64e	2.94f	73.3e	68.6de	4.4e	53.1g	28.1ab
Hawthorn-Dargazi	ولیک-درگزی	2.73fg	2.38fg	75.6e	47.9f	3.0f	52.6g	27.9b
Hawthorn-Harrow Sweet	ولیک-هرو سوئیت	1.79g	1.51g	82.1e	41.6f	1.2g	22.6i	8.9f
Hawthorn-Shah Miveh	ولیک-شاه میوه	1.53g	1.27h	87.5e	62.0e	0.4h	9.1j	9.1f
Hawthorn-Spadona	ولیک-اسپادونا	5.89c	5.97c	189.9c	69.6de	8.3c	130.7c	28.2ab
Quince A-Bartlett	کوئینس A-بارلت	3.29ef	3.04ef	121.8d	60.4e	4.9e	71.9ef	27.8b
Quince A-Dargazi	کوئینس A-درگزی	2.95f	2.62f	98.0e	68.9de	4.3e	68.1f	25.2c
Quince A-Harrow Sweet	کوئینس A-هارو سوئیت	4.00de	3.69e	127.6d	89.4c	6.4d	78.3e	26.9bc
Quince A-Shah Miveh	کوئینس A-شاه میوه	4.16d	4.35de	133.9d	97.2c	5.7de	86.9e	19.7e
Quince A-Spadona	کوئینس A-اسپادونا	6.85b	6.63b	220.9b	153.2a	10.9b	156.4b	25.6c
Seedling-Bartlett	بذری-بارلت	2.42g	1.97g	93.2e	32.4g	3.2f	42.0h	22.4de
Seedling-Dargazi	بذری-درگزی	5.75c	4.89d	214.2b	107.1bc	8.0c	152.1b	30.8a
Seedling-Harrow Sweet	بذری-هرو سوئیت	5.50c	4.78d	184.7c	67.7de	7.6cd	108.6d	29.9a
Seedling-Shah Miveh	بذری-شاه میوه	5.22c	4.92d	186.7c	75.7d	13.6a	107.4d	25.2c
Seedling-Spadona	بذری-اسپادونا	8.51a	7.62a	296.3a	121.6b	12.0ab	191.6a	23.5d

در هر ستون، میانگین‌های دارای حروف مشابه، بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف معنی‌داری ندارند.

In each column, the means with similar letters are not significantly different at the 5% probability level, according to Duncan's multiple range test.

جدول ۴- مقایسه میانگین خصوصیات عملکردی و کیفی میوه ارقام گلابی روی پایه‌های بذری گلابی، کوئینس A و ولیک
طی سال‌های ۱۳۹۲-۹۴

Table 4. Mean comparison of the yield and fruit quality of pear cultivars on pear seedling, Quince A and hawthorn
(*Crataegus atrosanguinea*) rootstocks during 2013-15

Years/ Rootstocks/ cultivars/ Interactions	سالها/ پایه‌ها/ ارقام اثرات متقابل	وزن میوه (گرم)	طول میوه (میلی‌متر)	قطر میوه (میلی‌متر)	عملکرد درخت	اسیدیته قابل تیتر (درصد)	مواد جامد محلول میوه	عملکرد در سطح قطعه (کیلو‌گرم بر سانتی‌متر مربع)
		Fruit weight (g)	Fruit length (mm)	Fruit diameter (mm)	Tree yield (kg tree ⁻¹)	Titratable acidity (TA) (%)	Total soluble solids (TSS) (°Brix)	Yield per unit trunk cross- sectional area (kg cm ⁻²)
2013	۱۳۹۲	76.7b	84.9b	65.5a	23.7a	5.93a	13.7a	1.4b
2014	۱۳۹۳	50.7c	86.2a	65.0a	9.8b	5.86a	13.8a	0.6c
2015	۱۳۹۴	169.9a	86.2a	65.0a	24.9a	5.86a	13.8a	1.9a
Hawthorn	ولیک	70.2b	86.5a	65.8a	11.7b	5.79a	13.7a	1.0a
Quince A	A کوئینس	117.9a	85.9a	64.1b	23.7a	5.93a	13.8a	1.7a
Seedling	بذری	109.2a	84.9a	65.4a	23.0a	5.92a	13.8a	1.2a
Bartlett	بارتلت	79.6c	85.4c	62.6b	12.9c	6.65b	14.7b	1.4b
Dargazi	درگزی	102.7b	89.7b	68.9a	27.6b	5.18c	13.4c	3.2a
Harrow Sweet	هاروسوئیت	72.7c	90.1b	69.2a	9.2d	4.69c	11.1d	0.5c
Shah Miveh	شاه‌میوه	66.0c	70.5c	55.9c	7.2d	3.50d	13.8c	0.3c
Spadona	اسپادونا	174.4a	93.1a	69.0a	40.5a	9.39a	15.9a	1.1b

در هر ستون، میانگین‌های دارای حروف مشابه، بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف معنی‌داری ندارند.

In each column, the means with similar letters are not significantly different at the 5% probability level, according to Duncan's multiple range test.

ادامه جدول ۴

Table 4. Continued

Rootstocks/cultivars	پایه‌ها/ارقام	وزن میوه (گرم) Fruit weight (g)	طول میوه (میلی‌متر) Fruit length (mm)	قطر میوه (میلی‌متر) Fruit diameter (mm)	عملکرد درخت Tree yield (kgtree ⁻¹)	اسیدیته قابل تیتر (درصد) Titratable acidity (TA) (%)	مواد جامد محلول میوه Total soluble solids (TSS) (°Brix)	عملکرد در سطح قطعه تنه (کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع) Yield per unit trunk cross- sectional area (kg cm ⁻²)
Hawthorn-Bartlett	ولیک-بارلت	76.5f	86.2b	63.2c	8.9ef	6.71c	14.6c	1.0c
Hawthorn-Dargazi	ولیک-درگزی	76.3f	88.0ab	66.5bc	10.3e	5.17d	13.2cd	2.8b
Hawthorn-Harrow Sweet	ولیک-هرو سوئیت	84.4e	87.9ab	64.2c	1.1g	5.10d	10.0e	0.1e
Hawthorn-Shah Miveh	ولیک-شاه میوه	97.1d	72.1c	56.8d	2.7g	3.32e	13.8c	0.3d
Hawthorn-Spadona	ولیک-اسپادونا	166.9b	95.1a	70.0b	20.5cd	9.37b	17.3a	1.1c
Quince A-Bartlett	کوئینس-A-بارلت	103.2cd	85.7b	62.6c	24.7c	6.79c	14.7c	2.3b
Quince A-Dargazi	کوئینس-A-درگزی	113.0cd	91.8ab	70.4b	23.1c	5.03d	14.2c	3.7a
Quince A-Harrow Sweet	کوئینس-A-هاروسوئیت	86.8e	89.1ab	69.2b	10.4e	4.96d	12.4d	0.8cd
Quince A-Shah Miveh	کوئینس-A-شاه میوه	94.6d	68.0d	57.3d	11.5e	3.83e	13.4cd	0.5d
Quince A-Spadona	کوئینس-A-اسپادونا	191.7a	89.8ab	67.7bc	48.9a	8.97ab	14.2c	1.5c
Seedling-Bartlett	بذری-بارلت	76.2f	84.3b	62.0c	5.2f	6.43c	14.7c	1.2c
Seedling-Dargazi	بذری-درگزی	118.8c	89.1ab	69.9b	49.3a	5.33d	12.7d	2.6b
Seedling-Harrow Sweet	بذری-هرو سوئیت	107.0cd	93.4a	74.3a	16.1d	4.01de	10.8e	0.9cd
Seedling-Shah Miveh	بذری-شاه میوه	96.4d	71.4c	53.7e	7.4f	3.33e	14.1c	0.3d
Seedling-Spadona	بذری-اسپادونا	164.5b	94.5a	69.3b	37.2b	9.84a	16.1b	0.9cd

در هر ستون، میانگین‌های دارای حروف مشابه، بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف معنی داری ندارند.

In each column, the means with similar letters are not significantly different at the 5% probability level, according to Duncan's multiple range test.

هاروسوئیت، تأمین نهال موردنیاز این بررسی را دچار مشکل جدی نمود. بر اساس نتایج این تحقیق و گزارش عبداللهی و همکاران (Abdollahi *et al.*, 2012)، به نظر می‌رسد پس از گیرائی پیوند روی پایه و لیک، ناسازگاری قابل توجهی از نظر تفاوت رشد مشاهده نمی‌شود. همچنین ارقام مختلف، بیشترین درصد پاکوتاهی نسبت به پایه بذری را به میزان ۲۱/۴ درصد در رقم بارتلت روی پایه کوئینس A تا میزان ۶۴/۷ درصد در رقم بارتلت روی پایه و لیک نشان دادند. کاهش قابل توجه رشد رقم بارتلت روی این دو پایه می‌تواند ناشی از ناسازگاری نسبی برخی ارقام گلابی با پایه‌های برگرفته از گونه به نظیر پایه کوئینس A ناشی شده باشد (Hassanpour *et al.*, 2007)؛ اگرچه این ناسازگاری به صورت تفاوت رشد شدید و شکستگی محل پیوند مشاهده نشد. همچنین این کاهش رشد روی پایه کوئینس A بین ۲۵/۴ درصد در رقم اسپادونا و ۵۴/۲ درصد در رقم درگزی بود (جدول ۳). بر اساس گزارش داوری نژاد و داوری نژاد (Davarynejad and Davarynejad, 2007) رقم بارتلت روی پایه کوئینس A رشد بیشتری نسبت به پایه بذری نشان داد که دلیل این امر می‌تواند حساسیت زیاد این رقم به بیماری آتشک و قطع شاخه‌های خسارت دیده طی سال‌های متوالی در این رقم باشد. در رابطه با متوسط رشد سالیانه، برخلاف انتظار، میانگین

در رقم اسپادونا، بیشترین میزان مواد جامد محلول روی پایه و لیک و در رقم‌های هاروسوئیت و درگزی روی پایه کوئینس A مشاهده شد و در دیگر ارقام تفاوت قابل توجهی از نظر این صفت وجود نداشت. تأثیر بیشتر پایه روی میزان مواد جامد محلول میوه در مقایسه با میزان اسیدیته میوه، با نتایج آیوت و همکاران (Autio *et al.*, 1996) در رابطه با میزان مواد جامد محلول میوه و سانساوینی و همکاران (Sansavini *et al.*, 1986) در رابطه با میزان اسیدیته میوه درخت سیب منطبق است.

به طور مشابهی اثر رقم نیز در کلیه صفات فوق معنی‌دار بود، با این تفاوت که اثر رقم روی دو خصوصیت میزان اسیدیته و میزان مواد جامد محلول نیز معنی‌دار بود (جدول‌های ۱ و ۲). بر همین اساس، چنانچه انتظار می‌رفت، بیشترین قطر پایه، قطر رقم و ارتفاع درخت روی پایه بذری، پس از آن روی پایه نیمه پاکوتاه کننده کوئینس A و سپس روی پایه و لیک مشاهده شد. همچنین هیچ‌کدام از ترکیبات پیوندی مختلف، تفاوت قابل توجهی به صورت رشد زیاد رقم در مقایسه با پایه و یا بر عکس، رشد بیش از حد کم رقم در مقایسه با پایه بروز ندادند (جدول ۳). نتایج مقدماتی عبداللهی و همکاران (Abdollahi *et al.*, 2012) روی ارزیابی پایه‌های فوق، بیانگر عدم گیرائی مطلوب کلیه ارقام گلابی موردنبررسی روی پایه و لیک در مرحله نهالستانی بود، به صورتی که گیرائی پیوند بسیار کم ارقام درگزی، شاه میوه و

(Ghahremani *et al.*, 2009) دارای خصوصیت پیشرفت بسیار سریع بیماری در برخی از شاخه‌ها از قسمت فوقانی شاخه تا بازوهای چندساله بوده (Abdollahi, 2010) و به همین دلیل در باغ‌های استان‌های قزوین، زنجان، البرز و تهران که طغیان شدید بیماری آتشک در بهار با تناوب بیشتری اتفاق می‌افتد، در حال حاضر کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد. برخلاف این خصوصیت، این رقم سازگاری مطلوبی با بسیاری از پایه‌ها نظیر پایه کوئینس A دارد (Davarynejad and Davarynejad, 2007) شاید به همین دلیل در صورت لزوم استفاده به صورت میان‌پایه برای رفع ناسازگاری بین گلابی و به (Hassanpour *et al.*, 2007) به عنوان یک میان‌پایه مطلوب قابل استفاده باشد.

زودباردهی و تناوب باردهی

زودباردهی (Precocity) از خصوصیات مهم درخت است که تحت تأثیر پایه، رقم و سایر خصوصیات نظیر سیستم هرس قرار می‌گیرد (Jackson, 2003). در این تحقیق، مقایسه عملکرد میانگین کلیه ارقام روى پایه‌ها بیانگر باردهی نسبتاً بیشتر ارقام روى پایه کوئینس A با میانگین ۲۳/۷ کیلوگرم در مقایسه با پایه بذری با میانگین ۲۳ کیلوگرم با وجود اندازه کوچک‌تر ارقام روى پایه کوئینس A بود. مقایسه عملکرد تک‌تک ارقام روى دو پایه بذری و کوئینس A نیز بیانگر بالا بودن عملکرد کلیه ارقام به غیراز رقم در گزی روى پایه

رشدی سالیانه عمومی روی پایه کوئینس A، از میانگین رشدی سالیانه عمومی روی پایه بذری بیشتر بود که این امر می‌تواند به دلیل خصوصیت رشد خاص ایجاد شده رقم اسپادونا روی پایه کوئینس A به صورت شاخه‌های دارای زاویه بسته و رشد قابل توجه این رقم روی این پایه باشد. برخلاف این، رقم بارتلت، روی پایه بذری میانگین رشدی بسیار کمی داشت (جدول ۳). همچنین پایین‌ترین میزان وزن متوسط میوه و عملکرد در درخت، روی پایه ولیک بود.

در بین ارقام موردبررسی، همان‌گونه که در باغ‌ها نیز مشاهده می‌شود، رقم اسپادونا و سپس رقم در گزی دارای بالاترین میزان صفات رشدی و رقم بارتلت دارای کمترین آن‌ها بود (جدول ۳). در رابطه با صفت تراکم اسپور، کمترین میزان تراکم اسپور در رقم شاه‌میوه مشاهده شد که می‌تواند یکی از دلایل اصلی پائین بودن عملکرد این رقم در باغ‌های تجاری باشد (Abdollahi, 2010). همچنین در رابطه با صفات عملکردی و کیفی میوه، رقم اسپادونا در همه صفات، به عنوان برترین رقم و دو رقم بارتلت و شاه‌میوه ضعیف‌ترین ارقام بودند. این امر می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل این باشد که رقم اسپادونا، برای دهه‌ها تا قبل از ظهور ییماری آتشک در کشور در سال ۱۳۶۸ (Zakeri and Sharifnabi, 1991)، به عنوان یکی از بهترین ارقام تجاری، مورداستفاده قرار گرفته است. این رقم علی‌رغم حساسیت متوسط به ییماری آتشک

تجاری آن برای دهه‌ها در کشور باشد. همچنین ارزیابی تناوب باردهی یکايك ترکیب‌های پیوندی مختلف بر اساس شاخص سال‌آوری (Biennial Bearing Index)، بیانگر مثبت بودن این شاخص تقریباً برای اکثر ترکیب‌های پیوندی طی دو سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ که حاکی از افت میزان محصول در سال دوم و منفی بودن این شاخص نیز برای اکثر ترکیبات پیوندی طی دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که حاکی از افزایش میزان محصول در سال دوم است (شکل ۱).

بر اساس این نتایج، در کلیه ترکیبات پیوندی با رقم اسپادونا، کمترین میزان شاخص سال‌آوری مشاهده شد که این نشانگر حداقل وجود اختلاف بین سه سال متولی این تحقیق در میزان باردهی این رقم روی پایه‌های مختلف مورد ارزیابی بود. در بین ارقام گلابی، معمولاً دو رقم درگزی و اسپادونا، همراه با ارقام لوئیزبون و ویلیامز دوشس (William's Duchess) از ارقام پرمحصول محسوب شده و سه رقم لوئیزبون، ویلیامز دوشس و درگزی در حال حاضر، سه رقم غالب بسیاری از باغ‌های گلابی را در استان‌های گلابی خیز نیمه شمالی کشور را تشکیل می‌دهد (Abdollahi, 2010). مقایسه آمار عملکرد، دو رقم تجاری تراستفاده شده در این تحقیق، مشتمل بر ارقام اسپادونا و درگزی و مقایسه آن با دیگر ارقام نظیر شاهمیوه، که به تدریج موقعیت تجاری خود را طی یک دهه اخیر به‌ویژه در


کوئینس A بود. عملکرد بالاتر رقم درگزی روی پایه بذری در مقایسه با پایه کوئینس A می‌تواند از خصوصیت زودباردهی این رقم، صرف‌نظر از پایه پیوندی آن ناشی شود (Abdollahi, 2010)، به صورتی که این رقم به عنوان یکی از زودبازده‌ترین ارقام تجاری گلابی حتی روی پایه‌های بذری قابل رده‌بندی است.

بررسی تناوب باردهی ارقام مختلف گلابی روی سه پایه مختلف مورد ارزیابی نشان‌دهنده وجود بالاترین میزان تناوب باردهی در پایه‌های بذری و کوئینس A بود (جدول ۵). این در حالی است که در رابطه با پایه ولیک، به دلیل پائین بودن میزان عملکرد به درخت، میزان افت محصول و یا شدت تناوب باردهی در سال بعد نیز حداقل مقدار بود. چنین وضعیتی در رابطه با تناوب باردهی ارقام نیز در جدول ۵ مشاهده می‌شود، به صورتی که رقم بارتلت به‌طور معمول پایین‌ترین عملکرد را طی سال‌های تحقیق داشت، در سال ۱۳۹۲ نیز که سال کمباردۀی ارقام گلابی بود، کمترین افت عملکرد را نسبت به دیگر ارقام به‌غیراز رقم اسپادونا نشان داد. نکته حائز اهمیت در رابطه با تناوب باردهی رقم اسپادونا، عدم افت قابل توجه میزان عملکرد در درخت این رقم در سال ۱۳۹۳، پس از باردهی نسبتاً قابل توجه آن در سال ۱۳۹۲ بود. این خصوصیت مطلوب رقم اسپادونا، در کنار دیگر خصوصیات مطلوب این رقم می‌تواند به عنوان یکی از دلایل استفاده

جدول ۵- مقایسه میانگین تأثیر پایه و رقم بر میزان عملکرد ارقام گلابی طی سال‌های ۱۳۹۲-۹۴
 Table 5. Mean comparison of the effect of rootstock and cultivar on yield of pear cultivars during 2013-15

پایه‌ها و ارقام Rootstocks and Cultivars	عملکرد (کیلو گرم در درخت) Yield (kg tree^{-1})			
	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	
	2013	2014	2015	
Hawthorn	ولیک	11.0c	9.0a	16.2c
Quince A	کوئینس	25.2b	11.1a	35.6a
Seedling	بذری	36.1a	10.5a	24.7b
Bartlett	بارلت	19.6c	3.2b	15.9b
Dar Gazi	درگزی	45.2b	3.7b	33.7a
Harrow Sweet	هاروسوئیت	11.8c	2.8b	13.1b
Shah Miveh	شاهمیوه	6.7c	1.8b	13.1b
Spadona	اسپادونا	49.3a	37.4a	34.8a

در هر ستون، میانگین‌های دارای حروف مشابه، بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانک در سطح احتمال ۱٪ اختلاف معنی‌داری ندارند.
 In each column, the means with similar letters are not significantly different at the 1% probability level, according to Duncan's multiple range test.



شکل ۱- روند تغیرات شاخص سال‌آوری ارقام گلابی روی پایه‌های بذری گلابی، کوئینس A و ولیک ۱۳۹۲-۹۴ (Crataegus atrosanguinea) طی سال‌های ۱۳۹۲-۹۴

Fig. 1. Variations of biennial bearing index of pear cultivars on pear seedling, Quince A and hawthorn (*Crataegus atrosanguinea*) rootstocks during 2013-15

عملکرد بر سطح مقطع تنه، دارای رابطه خطی و مستقیم با رقم بوده، بنابراین گرچه میزان رشد رقم توسط پایه تعیین می‌شود، ولی رابطه مستقیمی بین این شاخص و نوع پایه در همه موارد قابل مشاهده نیست.

نتایج این تحقیق نشان داد که در بین ترکیب‌های مختلف ارزیابی شده، علاوه بر پایه‌های بذری حاصل از رقم درگزی که به عنوان اصلی ترین پایه مورد استفاده در کشور همچنان در نهالستان‌ها تکثیر می‌شود، هر دو پایه کوئنس A و ولیک حاصل از گونه C. *atrosanguinea* از نظر سهولت تکثیر در نهالستان و گیرانی پیوند و همچنین دارا بودن عادت رشد مطلوب و باردهی مناسب، می‌توانند دارای کاربرد تجاری در تولید میوه گلابی باشند. با توجه به عملکرد حاصل از ترکیبات پیوندی مختلف، مشخص شد که رقم اسپادونا به عنوان تنها رقم از میان ارقام مورد ارزیابی در این تحقیق برای پایه ولیک قابل استفاده است، که با توجه به سال‌آوری نسبتاً کم این رقم در ترکیب‌های پیوندی مختلف، عملکرد در متوسط ۲۰ کیلوگرم در درخت برای این ترکیب محدود این رقم روی پایه ولیک، مشاهده شد که قطر تاج روی این پایه حداقل ۰/۸ تا ۱ متر بوده و بر این اساس و با توجه به در نظر گرفتن امکان عبور تراکتور از بین ردیف‌های این پایه، امکان افزایش تراکم این ترکیب پیوندی تا بیش

bagهای مدرن‌تر گلابی از دست داده و همچنین رقم هاروسوئیت و بارتلت که علی‌رغم وجود تحمل به آتشک زیاد در رقم اول و کیفیت بالای میوه در رقم دوم، هیچ گاه موقعیت مطلوبی کسب نکردن، می‌تواند به دلیل همین خصوصیت مشاهده شده، یعنی پائین بودن عملکرد، در کنار دیگر کاستی‌های این ارقام باشد.


کارایی عملکرد

شاخص عملکرد در سطح مقطع تنه (TCA) به عنوان شاخصی کاربردی و با کارایی بسیار بالا در ارزیابی کارایی عملکرد درختان مورد استفاده قرار می‌گیرد (Westwood and Roberts, 1970) مطالعه اثر سال و رقم بر شاخص عملکرد در سطح مقطع تنه درخت معنی دار بود (جدول ۲). چنانچه انتظار می‌رفت، با کاهش باردهی به دلیل تناوب باردهی در سال ۱۳۹۳، این شاخص نیز در این سال به میزان قابل توجهی کاهش یافت و در سال ۱۳۹۴ با افزایش عملکرد، بیشترین میزان خود را نشان داد. برخلاف اثر رقم، پایه اثر معنی‌داری روی شاخص عملکرد در سطح مقطع تنه نداشت (جدول ۴)، در حالی که انتظار می‌رفت به دلیل میزان رشد القائی توسط پایه، این شاخص توسط اثر پایه معنی دار شود. پری و روجرز (Parry and Rogers, 1972) به تناقض‌هایی در رابطه با اثر پایه روی این شاخص اشاره و گزارش کردند که شاخص

کوئینس C تا کنون در کشور کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین پایه‌های کوئینس به‌ویژه انواع پاکوتاه‌کننده‌تر دارای توقعات بالاتری نسبت به دیگر پایه‌ها از نظر کیفیت خاک و آب و همچنین مراقبت‌های به باغی می‌باشند، لذا استفاده از پایه و لیک می‌تواند حداقل به صورت مقدماتی به عنوان گزینه‌ای جهت بررسی بیشتر مورد ارزیابی قرار گیرد. از طرفی لازم به ذکر است که گونه و لیک به عنوان یک گونه متحمل به خشکی با تنوع گونه‌ای و تنوع ژنتیکی درون گونه‌ای بسیار زیاد در کشور (Sabeti, 1994) بوده که از سطح تحمل به خشکی و شوری بالاتری نیز در مقایسه با دیگر درختان زیرخانواده دانه‌دارها (Pomoideae) در خانواده گلسرخیان برخوردار است. متأسفانه علی‌رغم این سرمایه گستردده، به دلیل تنوع ژنتیکی بسیار گستردده و سخت جوانه‌زنی بذر و مشکلات تکثیر، تحقیقات منسجم و کافی روی گونه‌های این جنس (*Crataegus spp.*) صورت نگرفته است. در این تحقیق ضمن استفاده از پایه معمول و لیک گونه نهالستان‌های استان اصفهان به عنوان یک پایه متحمل به تنش‌ها برای درخت به مورد استفاده قرار می‌گیرد، به صورت مقدماتی پتانسیل این پایه در ترکیب پیوندی با رقم اسپادونا مثبت ارزیابی شد. بر این اساس، در کنار پایه کوئینس A که امروزه همراه با پایه پیروودوارف (Pyrodwarf) به عنوان گزینه‌های موجود در

از ۵ هزار درخت در هکتار وجود دارد. بر اساس همین نتایج، میزان افزایش تراکم باع روی پایه کوئینس A در حدود ۱۱۰۰ تا حداقل ۱۶۰۰ درخت در هکتار وجود دارد. این در حالی است که بر اساس روش معمول احداث باع گلابی در کشور، تراکم کشت باع‌های گلابی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ درخت در هکتار در نظر گرفته می‌شود (شکل ۲).

بر اساس عملکرد در درخت مشاهده شده در ترکیب‌های پیوندی گزینش شده، انتظار می‌رود در ترکیب پیوندی رقم اسپادونا روی پایه و لیک، امکان دستیابی به بالاترین میزان عملکرد در واحد سطح باع وجود داشته باشد. داده‌های حاصل از این تحقیق همچنین بیانگر دلیل پائین بودن میزان عملکرد در باع‌های سنتی احداث شده با استفاده از پایه‌های بذری و به‌ویژه با استفاده از رقم شاهمیوه است. به صورتی که عملکرد متوسط باع‌های سنتی کشور کمتر از ده تن در هکتار گزارش شده است (Anonymous, 2013). همچنین، بررسی‌ها نشان داده است که با توجه به رقابت اقتصادی جهانی در تولید محصولات مختلف، از جمله گلابی، امکان تداوم تولید اقتصادی در کشورهای اروپائی نظیر هلند، انتقال از پایه‌های نیمه‌پاکوتاه کننده کوئینس A که در این کشور برای دهه‌ها مورد استفاده بوده است، به سمت باع‌های بسیار متراکم با استفاده از پایه کوئینس C، با تراکم بالای ۵ هزار اصله درخت در هکتار است (Abdollahi, 2010). با توجه به اینکه پایه



شکل ۲- امکان افزایش تعداد درختان در هکتار بر اساس رشد رویشی ترکیب‌های پیوندی مختلف
Fig. 2. The possibility of intensification of tree number per hectare, according to the vegetative growth of the scion/rootstock combinations

۲۸۰۰ درخت در هکتار سبب کاهش ۵۰ درصدی زمان هرس و برداشت میوه و حجم محلول‌پاشی‌ها و سم‌پاشی‌های موردنیاز در هکتار می‌شود (Werth, 1981). به نظر می‌رسد، استفاده از پایه‌های بسیار پاکوتاه‌کننده در صنعت تولید میوه، به عنوان یک گزینه اجتناب ناپذیر لازم است مدنظر قرار داده شود. در این راستا، در ادامه این تحقیق پیشنهاد می‌شود نسبت به ارزیابی، ایجاد کلکسیون و گزینش گونه‌های برتر جنس ولیک (*Crataegus*) در کشور اهتمام ورزیده شود. علاوه بر این، از مشکلات جنس ولیک، سختی تکثیر گونه‌های مختلف آن از طریق بذر است. خوشبختانه در حال حاضر، گسترش نهالستانهای کشت بافتی، مشکل دشواری تکثیر بسیاری از گونه‌ها و پایه‌ها را در کشور برطرف کرده، بنابراین شناسایی مشکلات جوانه‌زنی بذر این جنس و رفع آن

کشور برای انتقال از باغهای گلابی روی پایه‌های بذری به باغهای نیمه متراکم، همراه با افزایش تراکم کشت و عملکرد در هکتار و همچنین فرار از مشکلات عدیده باغهای سنتی گلابی نظیر هرس، برداشت و درنهایت هزینه‌های بالای تولید، مطرح است، پایه ولیک نیز می‌تواند مورد ارزیابی بیشتر قرار گیرد. بدون شک در این‌ین، مشکل تکثیر و همچنین ناسازگاری پیوند شمار زیادی از ارقام گلابی و یا رشد بسیار کم آن‌ها روی این پایه از مشکلاتی است که باستی در این‌ین ملاک ارزیابی‌های بعدی واقع شود.

مطالعات روی استفاده از پایه‌های بسیار پاکوتاه‌کننده سیب نظیر M9، با کاربرد سیستم تربیت اسپیندل نشان داده است که در بین سیستم‌های کشت تجاری و مرسوم در تولید سیب، استفاده از پایه M9 تنها در تراکم حدود

کمتر شود، لیکن این امر نیاز به بررسی‌های بیشتر و تکمیلی دارد.

سپاسگزاری

بدین وسیله از همکاری مسئولین نهالستان جانثاری که ما را در تهیه پایه‌های موردنیاز در این تحقیق یاری نمودند و جناب آقای مهندس ایوبعلی قاسمی عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به خاطر همکاری و راهنمایی‌های انجام گرفته در رابطه با انجام این تحقیق، تشکر و قدردانی می‌شود.

می‌تواند به تولید اقتصادی‌تر نهال به و یا گلابی روی این پایه کمک کند. علاوه بر این، لازم است نتایج این تحقیق به صورت الگویی در سطح محدود در استان‌های گلابی خیز کشور و همچنین با طیف گسترده‌تری از ارقام گلابی که دارای قدرت رشد زیاد می‌باشند مورد بررسی و سپس مورد توصیه قرار گیرد. درنهایت، همچنان حساسیت نسبی رقم اسپادونا به بیماری آتشک، به عنوان عامل محدود کننده استفاده از این رقم روی دو پایه کوئینس A و ولیک مطرح است. اگرچه انتظار می‌رود شدت خسارت بیماری در شرایط محدود بودن رشد درختان تا حدی

References

- Abdollahi, H. 2010.** Pear: Botany, Cultivars and Rootstocks. Iranian Agricultural Ministry Publications, Tehran, Iran. 210pp. (in Persian).
- Abdollahi, H., Atashkar, D., and Alizadeh, A. 2012.** Comparison of dwarfing effects of two hawthorn and quince rootstocks on several commercial pear cultivars. Iranian Journal of Horticultural Science 43: 53-63 (in Persian).
- Akbari Bisheh, H. 2014.** Investigation of genetic diversity in some Iranian genotypes of hawthorn (*Crataegus* spp.) by morphological and microsatellite markers (ISSR). Ph.D. Thesis, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 152pp. (in Persian).
- Anonymous. 2013.** The Results of Sampling Statistics from Iranian Orchards. Office of Statistics and Information Technology, Ministry of Agriculture-Jahad, Tehran, Iran. 114pp. (in Persian).
- Autio, W. R., Hayden, R. A., Micke, W. C., and Brown, G. R. 1996.** Rootstock affects ripening, colour and shape of Stark Spur Supreme Delicious apples in the 1986 NC-140 co-operative planting. Fruit Varieties Journal 50: 45-53.
- Baninasab, B., Mohammadi, S., Khoshgoftarmanesh, A. H., and Ghasemi, A. 2015.** Responses of quince (*Cydonia oblonga* Mill.), pear and crataegus rootstocks to

- Fe-deficiency stress in soilless culture. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture 5: 127-137 (in Persain).
- Davarynejad, G. H., and Davarynejad, E. 2007.** Comparative performance of graft incompatibility in pear/quince (*Pyrus communis/Cydonia oblonga*) combinations. Acta Horticulturae 732: 221-225.
- Ghahremani, Z., Abdollahi, H., Majidi Heravan, E., and Salehi Jozani, G. R. 2009.** Efficiency of application of salicylic acid on induction of systemic acquired resistance in host plant fire blight in apple and pear. Seed and Plant Improvement Journal 25-2: 153-168 (in Persian).
- Ghasemi, A., Nassiri, J., and Yahyaabadi, M. 2010.** Study of the relative tolerance of quince (*Cydonia oblonga* Mill.) rootstocks to different bicarbonate concentrations Seed and Plant Improvement Journal 31-1: 265-278 (in Persian).
- Hassanpour, H., Davarynejad, G. H., Azizi, M., and Shahriaree, F. 2007.** Investigation on the possibility of reducing graft incompatibility in some Iranian pear cultivars on Quince A by inters-tocks. Agricultural Science and Technology 21: 45-56 (in Persian).
- Hoblyn, T. N., Grubb, N. H., Painter, A. C., and Wates, B. L. 1936.** Studies in biennial bearing. Journal of Pomology 14: 39-76.
- Jackson, J. E. 2003.** Biology of Apples and Pears. Cambridge University Press, New York, USA. 501pp.
- Jacob, H. B. 1998.** Pyrodwarf, a new clonal rootstock for high density pear orchards. Acta Horticulturae 475: 169-178.
- Mostofi, Y., and Najafi, F. 2005.** Laboratory Manual of Analytical Techniques in Horticulture. Tehran University Publication, Tehran, Iran. 136pp. (in Persian).
- Nourmohamadi, N., Abdollahi, H., Moeini, A., and Roohalamin, E. 2015.** Effects of growth media and Fe sources on micropropagation and rooting of semi-dwarf pear rootstocks, Pyrodwarf and OH×F87. Seed and Plant Improvement Journal 31-1: 265-278 (in Persian).
- Parry, M. S., and Rogers, W. S. 1972.** Effects of interstock length and vigor on the field performance of Cox's Orange Pippin apples. Journal of Horticultural Science 47: 97-105.
- Sabeti, H. 1994.** Trees and Shrubs of Iran (2nd ed). Yazd University Publication, Yazd,

Iran. 810pp (in Persian).

- Sansavini, S., Marangoni, B., Buscaroli, C., Corelli, L., and Tazzari, G. 1986.** The relationship between spacing and rootstock effects in an intensive planting trial of two apple cultivars. *Acta Horticulturae* 160: 23-37.
- Tukey, H. B. 1964.** Dwarfed Fruit Trees. Cornell University Press, Ithaca, USA, 562 pp.
- Westwood, M. N. 1966.** Compatibility of pear on hawthorn, MT Ash tested. *Ornamental and Nursery Digest* 10(2): 3-4.
- Westwood, M. N. and Roberts, A. N. 1970.** The relationship between trunk cross-sectional area and weight of apple trees. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 95: 28-30.
- Werth, K. 1981.** Development and current achievement of high density plantings in Italy, Switzerland, Austria and Yugoslavia. *Acta Horticulturae* 114: 295-299.
- Zakeri, Z., and Sharifnabi, B. 1991.** Fire blight of pear in Karaj. Proceedings of the 10th Iranian Plant Protection Congress, Kerman, Iran. 157 p. (in Persian).