

ارزیابی برخی از پاسخ‌های مورفو- فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مرکبات به تنش شوری

Evaluation of Some Morpho- Physiological Responses of Citrus Genotypes to Salinity Stress

مرضیه اتحادپور^۱، محمدرضا فتاحی مقدم^۲، ذبیح‌اله زمانی^۳، بهروز گلعین^۴
و محمدرضا نقوی^۴

- ۱- دانشجوی سابق دکتری، گروه علوم باگبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
- ۲- استاد، گروه علوم باگبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
- ۳- دانشیار، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرم‌سیری، مؤسسه تحقیقات علوم باگبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران
- ۴- استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۲/۹ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۲۹

چکیده

اتحادپور، م، فتاحی مقدم، م، ر، زمانی، ذ، گلعین، ب، و نقوی، م. ر. ۱۳۹۸. ارزیابی برخی از پاسخ‌های مورفو- فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مرکبات به تنش شوری. مجله بهزیارتی نهال و بذر ۳۵-۲: ۱۰۲-۱۲۰.

به منظور ارزیابی و شناسایی ژنوتیپ‌های متتحمل به شوری، برخی از دانهال‌های مرکبات غربال شده نسبت به شوری موجود در کلکسیون مرکز تحقیقات مرکبات رامسر و استکاه تحقیقاتی داراب و ژنوتیپ‌های تجاری متتحمل (کلنوپاترا ماندارین) و حساس (تروبر سیترنچ) در سه سطح، صفر (شاهد)، ۴۰ و ۹۰ میلی‌مولار سدیم کلراید در شرایط گلخانه بررسی شدند. در هفته دوزادهم پس از شروع تش صفات سطح برگ، سطح ویژه برگ، رشد طولی و قطری ساقه، ضخامت برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، میزان تکروزه شدن و ریزش برگ‌ها، مقدار آب نسی برگ، میزان عناصر سدیم، پتانسیم و نسبت پتانسیم به سدیم مورد مطالعه قرار گرفتند. ژنوتیپ‌های مورد بررسی از نظر کلیه صفات به جز سطح ویژه برگ پاسخ متفاوت نشان دادند. تنش شوری کاهش معنی‌داری در سطح برگ، میزان رشد طولی و قطری ساقه، ضخامت برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی و مقدار آب نسبی برگ و نیز افزایش معنی‌دار میزان تکروزه شدن و ریزش برگ‌ها و میزان عناصر سدیم و پتانسیم در ژنوتیپ‌های غربال شده ایجاد کرد. بررسی نمره تحمل به تنش (STS) نشان داد دو ژنوتیپ بومی ایران شامل G25 و G8 در کنار ژنوتیپ متتحمل کلنوپاترا ماندارین مقاومت به شوری بالایی داشتند. با درنظر گرفتن هم زمان خصوصیات فیزیولوژیک و STS ژنوتیپ‌های G8 و کلنوپاترا ماندارین به عنوان بهترین ژنوتیپ‌ها گزینش شدند. بنابراین این ژنوتیپ‌ها پس از بررسی خصوصیات باغی برای استفاده به عنوان پایه در مناطق دارای خاک یا آب شور توصیه می‌شوند.

واژه‌های کلیدی: مرکبات، کلروور سدیم، کلنوپاترا ماندارین، ژنوتیپ متتحمل، نمره تحمل به تنش.

مقدمه

شوری یکی از تنفس‌های مهم در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است که تولید محصولات کشاورزی را محدود می‌کند (Amini *et al.*, 2010). به استثنای مناطق مرطوب، شوری یک مشکل اساسی برای تولید مرکبات است. محدوده تحمل مرکبات به شوری کم و در حدود $1/5$ دسی‌زیمنس‌برمتر است. در مقایسه با سایر گیاهان زراعی و باغی، درختان مرکبات به شوری حساس می‌باشند و تحت این شرایط رشد و عملکرد آن‌ها کم می‌شود و اختلالات فیزیولوژی زیادی در گیاه بروز می‌نماید. تنفس شوری باعث آسیب‌های متعددی از قبیل سوزاندن بافت، کاهش عملکرد، ریزش برگ و در نهایت مرگ گیاه در مرکبات می‌شود (Romero-Aranda *et al.*, 1998). شوری از طریق سمیت یونطهای خاص و اثر اسمزی نیز به مرکبات آسیب وارد می‌کند. صدمه به صورت کل‌روز و نک‌روز برگی قابل مشاهده است و اگر خیلی شدید باشد عملکرد باغ را تحت تأثیر قرار می‌دهد (Ferguson and Gratten, 2005).

اثر شوری بر صفات مورفولوژی و فیزیولوژی مرکبات در پایه‌های مختلف مرکبات بررسی شده است و پایه‌های مختلف تحمل به شوری متفاوتی از نظر این صفات نشان دادند (Fadli *et al.*, 2012).

(Anjum *et al.*, 2001) در همین راستا نیوهوس و همکاران (Nieves *et al.*, 1991) تحمل به شوری دو پیوندک لمون روی دو پایه را با اندازه‌گیری تجمع کلرید و سدیم بررسی کردند. درختان با محلول‌های غذایی ۲ (شاهد)، ۴۰ و ۸۰ مولار در مترمکعب کلریدسدیم به مدت ۷۵ روز تغذیه شدند. رشد تمام ترکیبات پیوندی با افزایش شوری کاهش یافت اما این اثر برای هر دو پیوندک روی پایه ماکروفیلا بیشتر بود در حالی که غلظت کلر و سدیم برگی در هر دو پیوندک روی پایه نارنج کمتر بود.

ذکری (Zekri, 1991) اثر تنفس شوری را با اضافه کردن کلریدسدیم به محلول نیم غلظت هوگلنند جهت به دست آوردن پتانسیل اسمزی نهایی $-0/10$ ، $-0/20$ و $-0/35$ مگاپاسکال کلرید سدیم بر رشد و فیزیولوژی پایه‌های نارنج و کلثوپاترا ماندارین مطالعه نمود. شش ماه پس از اعمال تنفس شوری، تفاوت معنی‌داری در میزان رشد، هدایت الکتروولیت ریشه، هدایت روزنهای و تعرق بین نارنج و کلثوپاترا مشاهده نشد. اما همه این خصوصیات به طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمار کلریدسدیم کاهش یافت.

(Banuls و همکاران (Banuls *et al.*, 1997) در ارزیابی اثر خاص نمک‌های کلرید پتانسیم، کلرید و نیترات سدیم (۶۰ میلی‌مولار) بر شاخص‌های رشد و تبادل گازی پیوندک‌های پرتقال والنسیا روی پایه‌های کلثوپاترا ماندارین و نارنج سه برگ گزارش کردند که نمک‌های کلر به طور قابل توجهی رشد گیاه را در هر دو

شوری یکی از تنفس‌های مهم در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است که تولید محصولات کشاورزی را محدود می‌کند (Amini *et al.*, 2010). به استثنای مناطق مرطوب، شوری یک مشکل اساسی برای تولید مرکبات است. محدوده تحمل مرکبات به شوری کم و در حدود $1/5$ دسی‌زیمنس‌برمتر است.

در مقایسه با سایر گیاهان زراعی و باغی، درختان مرکبات به شوری حساس می‌باشند و تحت این شرایط رشد و عملکرد آن‌ها کم می‌شود و اختلالات فیزیولوژی زیادی در گیاه بروز می‌نماید. تنفس شوری باعث آسیب‌های متعددی از قبیل سوزاندن بافت، کاهش عملکرد، ریزش برگ و در نهایت مرگ گیاه در مرکبات می‌شود (Romero-Aranda *et al.*, 1998). شوری از طریق سمیت یونطهای خاص و اثر اسمزی نیز به مرکبات آسیب وارد می‌کند. صدمه به صورت کل‌روز و نک‌روز برگی قابل مشاهده است و اگر خیلی شدید باشد عملکرد باغ را تحت تأثیر قرار می‌دهد (Ferguson and Gratten, 2005).

اثر شوری بر صفات مورفولوژی و فیزیولوژی مرکبات در پایه‌های مختلف مرکبات بررسی شده است و پایه‌های مختلف تحمل به شوری متفاوتی از نظر این صفات نشان دادند (Fadli *et al.*, 2012).

(Nasir khan *et al.*, 2007)

برای ادامه و بقای تولید اقتصادی در کشاورزی و به خصوص کشت و تولید مرکبات، باید روش‌هایی برای مقابله با شرایط نامساعد محیطی و کیفیت پایین آب و خاک و نهال ایجاد شود که مهم‌ترین آنها، استفاده از گیاهان مقاوم و شناسایی عوامل و سازکار مقاومت در آن‌ها برای کاربرد در اصلاح نبات و مهندسی ژنتیک برای ایجاد گیاهانی مقاوم است.

با وجود گستردگی دامنه تحمل به شوری و قابلیت بالای دورگ‌گیری در مرکبات و همچنین جهش‌هایی که می‌تواند منجر به ایجاد صفاتی مطلوب در گیاه شود، می‌توان انتظار داشت در میان ژنوتیپ‌ها گیاهانی با تحمل بالای شوری وجود داشته باشد و با شناسایی و اصلاح آن‌ها و همچنین سازکارهای دخیل در تحمل به شوری آن‌ها بتوان مشکل شوری و زیان‌های اقتصادی ناشی از آن را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

بنابراین، هدف این ارزیابی شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شوری، از میان ژنوتیپ‌های ناشناخته ایستگاه تحقیقات کترا، در مرکز تحقیقات مرکبات کشور در رامسر، برخی از ژنوتیپ‌های ایستگاه تحقیقاتی داراب (فارس) و برخی از ژنوتیپ‌های تجاری بود.

مواد و روش‌ها

مواد گیاهی در این تحقیق شامل برخی از

ترکیب پایه و پیوندک کاهش دادن در حالی که نیترات سدیم اثر خیلی کمی داشت. صالح و همکاران (Saleh *et al.*, 2008) تحمل به تنش شوری سه پایه تراپلولئید در مقایسه با پایه‌های دیپلولئید مربوطه (پونسیروس، کاریزو سیترنج و کلثوپاترا ماندارین) را بررسی کردند. در پایان آزمایش ریزش برگی فقط در گیاهان پونسیروس مشاهده شد و همچنین نشانه‌های کلروز در گیاهان دیپلولئید پونسیروس و کاریزو سیترنج مشاهده گردید. نرخ رشد گیاهان دیپلولئید کلثوپاترا ماندارین تحت تأثیر تنش شوری قرار نگرفت.

گارسیا-سانچز و همکاران (Garcia-Sanchez *et al.*, 2002) کردند که شوری رشد، تبادل گازی، کلروفیل‌ها و غلظت عناصر غذایی را در نارنج دیپلولئید و هیبریدهای سوماتیک آلوتراپلولئید مربوطه کاهش داد. در مرکبات شوری میزان خالص فتوستتر و تجمع کربوهیدرات را کاهش می‌دهد که احتمالاً مربوط به کاهش انتشار گاز کربنیک به روزنه‌ها می‌باشد (Climent *et al.*, 2008).

تنش شوری باعث کاهش پارامترهای سطح برگ، وزن‌های تر و خشک شاخه و برگ، رشد طولی و قطری ساقه، محتوای کلروفیل‌های برگ‌ها، میزان فلورسانس کلروفیل‌ها، محتوای آب نسبی و افزایش محتوای پرولین و قدها، افزایش میزان پراکسید شدن لیپیدها در ژنوتیپ‌های مرکبات شده است (Balal *et al.*, 2011; Hussain *et al.*, 2012;

مخالف نمک کلرید سدیم (مرک آلمان) با توجه به نیاز گیاه صورت گرفت. در هر دور آبیاری، محلول‌های نمک، به صورت تازه و با غلظت‌های فوق تهیه شد و pH محلول‌ها ۵/۷-۵/۸ تنظیم شد. برای تنظیم هدایت الکتریکی هر یک از محلول‌ها، از دستگاه EC استفاده شد.

برای جلوگیری از ایجاد شوک اسمزی، تیمارهای تنش با آب دارای ۳۰ میلی‌مولار کلرید سدیم آغاز و به تدریج افزایش یافت. بدین صورت که در هر دور آبیاری ۳۰ میلی‌مولار تا رسیدن به غلظت نهایی افزوده شد. میزان محلول هر دور آبیاری با توجه به بافت خاک شنی لومی و اندازه گیری ظرفیت زراعی با توجه به فرمول زیر به دست آمد. برای جلوگیری از تجمع نمک در خاک و ثابت نگه داشتن EC این میزان محلول در ۳۰ درصد میزان آبشویی ضرب شد و میزان محلول جهت آبیاری هر گلدان بدست آمد.

данهال‌های مرکبات موجود در کلکسیون مؤسسه تحقیقات مرکبات رامسر و داراب که حاصل از گرددهافشانی آزاد و جهش هستند و بعضی دانهال‌های ژنوتیپ‌های تجاری متحمل به تنش شوری بودند (Rafat, 2005) (جدول ۱).

هشت ماه پس از جوانه‌زنی جنین‌های نوسالار دانهال‌های مرکبات موجود در کلکسیون مؤسسه تحقیقات مرکبات رامسر و ایستگاه تحقیقاتی داراب و ژنوتیپ‌های تجاری متحمل به تنش شوری، دانهال‌ها به مدت ۱۲ هفته در معرض تنش شوری قرار گرفتند.

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با فاکتور شوری در سه سطح صفر (شاهد)، ۴۰ و ۹۰ میلی‌مولار نمک کلرور سدیم و ژنوتیپ مرکبات در ۴۲ سطح و در سه تکرار در شرایط گلخانه دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اجرا شد.

آبیاری با استفاده از آب دارای غلظت‌های

$$d = \text{میزان محلول} = (FC - PWP) \times 0.5 \times A$$

مرکبات با توجه به میزان کلر، میزان نکروزه شدن و ریزش برگ‌ها و میزان عملکرد کلروفیل فلورسانس غربال شدند (Etehadpour *et al.*, 2019). دوازده هفته پس از اعمال تنش شوری، نمونه‌برداری جهت ارزیابی صفات مورفولوژیک شامل سطح برگ، سطح ویژه برگ

d = عمق خاک گلدان؛ A = سطح گلدان؛ PWP = نقطه پژمردگی دائم؛ FC = ظرفیت زراعی خاک؛ $MAD = ۰/۵$ Management Allowable Deficit، کمبود رطوبت مجاز، اصطلاحاً ضریب مدیریتی آبیاری گفته می‌شود. سه هفته بعد از اعمال تنش ژنوتیپ‌های

جدول ۱- فهرست ژنوتیپ‌های مرکبات مورد استفاده در این پژوهش برای ارزیابی تحمل به شوری

Table 1. List of citrus genotypes used in this research for evaluating salinity tolerance

| محل
ژنوتیپ غربال شده
Screened genotype |
|--|--|--|--|--|--|
| G1 | Ramsar | G19 | Ramsar | G42 (Bergamot) | Ramsar |
| G5 | Ramsar | G20 | Ramsar | G43 (Citrumejo) | Ramsar |
| G6 | Ramsar | G22 | Ramsar | G44 (Sour Orange) | Ramsar |
| G7 | Ramsar | G25 | Ramsar | G45 (Citrange) | Ramsar |
| G8 | Ramsar | G26 | Ramsar | G46 (Bakraei) | Ramsar |
| G10 | Ramsar | G29 | Ramsar | G47 (Eureka lemon × Unknown) | Ramsar |
| G15 | Ramsar | G30 | Ramsar | G35 (Rough lemon) | Darab |
| G16 | Ramsar | G32 | Ramsar | G36 (Volkameriana) | Darab |
| G18 | Ramsar | G41 | Darab | G39 (Rangpur lime)
G34 (Cleopatra) | Darab |

اختلاف آن‌ها در ابتدا و انتهای آزمایش مورد آنالیز قرار گرفت.

پس از پایان دوره تنش، برگ‌ها و ساقه نمونه‌های مورد بررسی از محل طوقه قطع گردید سپس وزن هر قسمت بر حسب گرم با استفاده از ترازوی دیجیتال اندازه‌گیری شد. پس از اندازه‌گیری وزن تر اندام هوایی گیاه، هر یک از قسمت‌ها شامل برگ‌ها و ساقه به صورت جداگانه درون پاکت‌های کاغذی و سپس درون آون قرار داده شد. نمونه‌ها پس از خشک شدن در دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد و مدت ۷۲ ساعت، از آون خارج شده و وزن خشک آن‌ها اندازه‌گیری شد.

نموده تنش به تنش شوری ژنوتیپ‌ها نیز بر اساس فرمول ارائه شده توسط عبدالشاهی و همکاران (Abdolshahi *et al.*, 2013) محاسبه شد.

(Specific Leaf Area = SLA)، طول قطر ساقه، ضخامت برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، نمره تنش (Stress Tolerance Score = STS)، برگ‌های نکروزه و ریزش کرده، میزان کاتیون‌های سدیم و پتاسیم و میزان نسبی آب برگ از ۲۸ ژنوتیپ غربال شده انجام شد.

پس از جدا کردن برگ‌های دانه‌آل‌های مورد آزمایش، سطح برگ‌ها (چهار برگ سالم) با استفاده از دستگاه مساحت سنج تصویربردار مدل دلتا تی ساخت انگلستان اندازه‌گیری شد. سطح برگ ویژه یا SLA با تقسیم سطح برگ بر وزن خشک برگ محاسبه گردید (Arias, 2007). همچنین اندازه‌گیری طول ساقه با استفاده از نوار متر و قطر ساقه با استفاده از کولیس دیجیتال انجام شد. طول و قطر ساقه در ابتدا و انتهای آزمایش اندازه‌گیری شد و

$STS = MP \text{ (Mean Productivity)} + STI \text{ (Stress Tolerance Index)} + GMP \text{ (Geometric mean productivity)} + YI \text{ (Yield Index)} + DRI \text{ (Drought Response Index)} + YSI \text{ (Yield Stability Index)} - SSI \text{ (Stress Susceptibility Index)} - TOL \text{ (Tolerance)}$

مورد بررسی از نظر کلیه صفات بجز سطح ویژه برگ پاسخ متفاوتی نشان دادند. همچنین تنش شوری بر کلیه صفات بجز سطح ویژه برگ اثر معنی‌داری داشت.

سطح برگ: در سطح شوری صفر، بیشترین مقدار سطح برگ در ژنوتیپ G8 و کمترین آن در ژنوتیپ G45 مشاهده شد. در سطح شوری

برای محاسبه این فرمول Y_s به عنوان میانگین وزن خشک ساقه و برگ‌ها در شرایط تنش و Y_p به عنوان میانگین وزن خشک ساقه و برگ‌ها در شرایط بهینه در نظر گرفته شد.

نتایج و بحث

تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد ژنوتیپ‌های

ضخامت برگ (نسبت وزن تر به سطح

برگ): شوری باعث کاهش معنی دار (در سطح ۵ درصد) ضخامت برگ‌ها در ژنوتیپ‌های مرکبات مورد بررسی شد. بیشترین ضخامت برگ در سطح صفر مربوط به ژنوتیپ G42 و در سطوح ۴۰ و ۹۰ میلی‌مولا ر مربوط به ژنوتیپ G8 بود. همچنین کمترین ضخامت برگ در سطح صفر مربوط به ژنوتیپ G45 (سیترنج) و در سطوح ۴۰ و ۹۰ میلی‌مولا به ترتیب مربوط به ژنوتیپ‌های G43 و G2 بود (جدول ۲).

وزن اندام هوایی: شوری باعث کاهش وزن اندام هوایی در ژنوتیپ‌های مورد بررسی شد. در سطح بدون تنفس ژنوتیپ G8 بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی را نشان داد. کمترین وزن تر و خشک در این سطح به ترتیب متعلق به ژنوتیپ‌های G45 (سیترنج) و G25 بودند.

در تحقیقات ذکری و پارسونز (Zekri and Parsons, 1992) در مورد اثر تنفس شوری بر مرکبات مشخص گردید که بین دانهالهای مورد بررسی پایه‌های کلئوپاترا و نارنج کمترین و پایه‌های راف‌لمون و پونسیروس بیشترین کاهش در وزن خشک اندام‌های هوائی را نشان دادند. تشکیل و افزایش کندتر سطح برگ، فتوستتر کندته منجر به کاهش جریان مواد ساخته شده به مریستم‌ها و بافت‌های در حال رشد می‌شود. تجمع یونها با غلظت‌های بالا در برگ‌های پیر (مسن) نیز از جریان ترکیبات کربن‌دار به مریستم‌ها می‌کاهد (Munns, 2010).

۹۰ میلی‌مولا ر ژنوتیپ G44 بیشترین و G43 کمترین مقدار سطح برگ را به خود اختصاص دادند (جدول ۲). ژنوتیپ‌های G8، G16، G19، G44 (نارنج) و G42 میانگین سطح برگ بالاتری نسبت به بقیه ژنوتیپ‌ها نشان دادند.

کاهش رشد برگ پس از افزایش شوری خاک در مرحله اول به دلیل اثر اسمزی نمک اطراف ریشه است. طی چند ساعت سلول‌ها دوباره اندازه نهایی و تورژسانس اصلی را به دلیل تنظیم اسمزی بدست می‌آورند، اما علی‌رغم آن، سرعت طوبیل شدن سلولی کاهش می‌یابد. طی چند روز کاهش در توسعه سلولی و همچنین تقسیم سلولی منجر به کاهش تشکیل برگ و کوچک‌تر شدن اندازه نهایی آن می‌شود (Munns and Tester, 2008). دژمپور و همکاران (Dejampour *et al.*, 2012) نیز در ارزیابی تحمل به شوری چند دورگه بین گونه‌ای جنس Prunus دریافتند که تنفس شوری اثر منفی بر سطح برگ داشت.

طول و قطر ساقه: ژنوتیپ‌های G43، G34 (کلئوپاترا) و G34 بیشترین افزایش و ژنوتیپ G45 (سیترنج) کمترین طول ساقه را به ترتیب به خود اختصاص دادند (جدول ۲). کاهش طول ساقه همچنین توسط سیمپسون و همکاران (Simpson *et al.*, 2014) و بالال (Balal, 2012) و کاهش قطر ساقه توسط (Hussain *et al.*, 2012) حسین و همکاران (Hussain *et al.*, 2012) تحت تأثیر تنفس شوری در مرکبات گزارش شده است.

جدول ۲- مقایسه میانگین برای خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مرکبات تحت تأثیر سطوح مختلف تنش شوری با کلرور سدیم
Table 4. Mean comparison for morpho- physiological characteristics of citrus genotypes as affected by different levels of salinity stress using NaCl

نوعیت Genotype	مقدار شوری Salinity	مقدار برگ (سانتی‌متر مربع) leaf area (m ⁻²)	مقدار وزن خشک برگ (سانتی‌متر مربع) Dry weight of leaf (g DW cm ⁻²)	ارتفاع گاهه (سانتی‌متر) Plant height (cm)	قطر گاهه (میلی‌متر) Plant diameter (mm)	ضخامت برگ (گرم در گرم وزن تربه سانتی‌متر مربع) Leaf thickness (gFW cm ⁻²)	وزن تازه گاهه (گرم) Shoot fresh weight (g)	وزن خشک آدامه گاهه (گرم) Shoot dry weight (g)	درصد برگ‌های نکروزه دار Necrotic leaves (%)	درصد آب سسی برگ RWC (%)	درصد سدیم Na ⁺ content (%)	درصد پتاسیم K ⁺ content (%)	نسبت پتاسیم به سدیم K: Na ratio
G1	0	76.31d-l	12.279ab	md	1.245b-j	0.2222a-c	105.11a-n	39.03c-n	5.56n-p	74.09a-i	0.41g-m	1.62k-n	3.99
	40	72.39d-l	14.519ab	9.167h-q	0.440h-j	0.2189a-d	63.45c-n	23.41e-n	23.51j-p	64.88a-k	0.49f-m	1.66g-n	3.40
	90	74.26d-l	19.175ab	12.167d-q	1.041b-j	0.1015h	74.64c-n	23.54e-n	30.46f-p	66.573a-j	md	1.83b-l	md
G5	0	100.00b-1	15.003ab	25.000bc	2.121a-c	0.1802a-h	87.51b-n	53.19a-h	0.00p	md	0.30j-r	1.61mn	5.35g-n
	40	50.13j-1	12.361ab	8.000h-q	0.495h-j	0.2141a-f	56.11e-n	21.93f-n	13.48l-p	59.01d-k	0.53f-r	1.69g-n	3.22e-n
	90	58.32g-l	15.504ab	1.933pq	0.457h-j	0.1711a-h	31.89j-n	12.25i-n	56.34a-i	65.68a-j	0.56e-r	1.77b-m	3.15f-n
G6	0	94.71b-1	13.303ab	14.850c-o	md	0.1695a-h	98.75a-n	35.52c-n	0.00p	88.53a	0.39i-r	1.87b-h	4.81b-k
	40	84.44b-1	12.736ab	15.100c-o	md	0.2227a-c	123.22a-l	46.09c-k	0.00p	76.27a-i	0.41i-r	1.66g-n	4.07j-n
	90	67.52e-l	15.097ab	8.900h-q	md	0.2197a-d	57.38d-n	16.65f-n	23.68j-p	70.58a-j	1.43ab	1.74c-n	1.22mn
G7	0	91.98b-1	14.535ab	19.667b-h	0.923b-j	0.1786a-h	115.85a-n	45.12c-l	0.00p	68.40a-j	0.39i-r	1.97ab	5.07ab
	40	107.53b-k	16.849ab	10.7005f-q	1.181b-j	0.1833a-g	90.27b-n	29.73c-n	0.00p	78.09a-h	0.33j-r	1.67g-n	5.02g-n
	90	59.11f-1	15.936ab	7.000i-q	1.905a-g	0.1305gh	16.88i-n	9.52k-n	45.30a-l	55.32f-k	0.40i-r	1.96a-c	4.85ab
G8	0	210.30a	19.842ab	md	0.889b-j	0.2184a-e	197.90ab	85.00ab	0.00p	73.94a-i	0.25l-r	1.67g-n	6.79b-1
	40	128.71b-g	17.503ab	13.333c-p	1.175b-j	0.2394a	162.67a-e	68.03a-c	4.44op	67.69a-j	0.29k-r	1.67g-n	5.79c-n
	90	126.24b-h	16.180ab	15.167c-o	0.952b-j	0.2190a-d	109.18a-n	55.40a-f	6.02n-p	70.22a-j	0.49f-r	1.66h-n	3.34h-n
G10	0	83.79b-1	13.540ab	10.333g-q	0.622g-j	0.2031a-g	89.86b-n	32.21c-n	0.00p	67.32a-j	0.16p-r	1.63j-n	10.17a-i
	40	99.77b-1	15.293ab	5.500j-q	0.343j	0.2033a-g	78.95c-n	25.95d-n	9.82m-p	73.06a-i	0.66d-r	1.62j-n	2.46mn
	90	64.99e-l	13.506ab	1.575pq	0.394h-j	0.1724a-h	88.03b-n	30.35c-n	43.48b-l	59.63c-k	0.99a-h	1.75b-n	1.76k-n
G15	0	102.90b-1	15.136ab	15.500c-n	md	0.1792a-h	92.61b-n	34.48c-n	0.00p	62.92b-k	0.28k-r	1.59mn	5.72e-n
	40	69.12e-l	13.583ab	4.250n-q	md	0.2079a-g	173.25a-c	34.91c-n	12.93l-p	78.61a-h	0.56e-r	1.76b-m	3.16k-n
	90	63.71e-l	16.760ab	5.333j-q	md	0.1861a-g	55.82e-n	11.11j-n	59.86a-g	52.83i-k	1.27a-c	1.83b-l	6.88j-n
G16	0	128.89b-g	14.047ab	23.000b-e	1.320b-j	0.1917a-g	169.40a-d	65.04a-d	0.00p	76.62a-i	0.18n-r	1.63i-n	8.94a-g
	40	122.27b-i	16.388ab	15.625c-n	2.794a	0.1936a-g	121.30a-m	50.66b-j	7.07n-p	72.17a-j	0.39i-r	1.69g-n	4.35c-m
	90	114.72b-j	14.035ab	6.333j-q	1.054b-j	0.2024a-g	90.68b-n	46.33c-k	0.00p	59.74c-k	1.13a-e	1.72d-n	13.53mn

میانگین‌هایی، در هر ستون، که دارای حداقل یک حرف مشترک می‌باشد براساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۱٪ تفاوت معنی دار ندارند.

Mean, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 1% probability level- using Duncan's Multiple Range Test.

Note: md: Missing data

توجه: md: داده‌های از دست رفته

Table 2. Continued

ادامه جدول ۲

ژنوتیپ Genotype	سطح شوری Salinity	سطع برگ (سانتی‌متر مربع) leaf area (m^2)	سطع و زیو برگ (سانتی‌متر) مرع برگ در وزن خشکی Specific leaf area ($cm^2 gDW^{-1}$)	ارتفاع گیاه (سانتی‌متر) Plant height (cm)	قطر گیاه (میلی‌متر) Plant diameter (mm)	ضخامت برگ (گرم وزن تربه سانتی‌مترمربع) Leaf thickness (gFW cm^{-2})	وزن تراشام هولانی (گرم) Shoot fresh weight (g)	وزن جذک اندام هولانی (گرم) Shoot dry weight (g)	درصد برگ‌های نکرده و رنوش پانه Leaf necrosis and loss (%)	درصد آب نسبی برگ RWC (%)	Na + content (%)	K + content (%)	درصد پاسخ‌نمایی سبت سیمیند K: Na ratio
G18	0	153.56ab	11.330b	29.500b	1.422b-j	0.2292ab	150.00a-h	90a	0.0p	74.00a-i	0.12r	1.60mn	12.66 a-h
	40	83.48b-l	18.258ab	18.750b-i	md	0.1924a-g	130.00a-l	41.25c-n	0.0p	71.52a-j	0.30j-r	1.65h-n	5.54e-n
	90	87.24b-l	15.960ab	5.300j-q	1.029b-j	0.1635a-h	28.72k-n	11.40j-n	64.4a-e	55.30g-k	0.85c-k	1.84b-k	2.17g-n
G19	0	127.49b-h	14.262ab	10.350g-q	1.270b-j	0.2186a-e	144.84a-j	48.82b-k	0.0p	71.14a-j	0.17o-r	1.61mn	9.31f-n
	40	142.84b-b	19.946a	14.250c-o	1.465b-j	0.1836a-g	129.74a-l	44.39c-m	2.3op	72.82a-i	0.28k-r	1.73d-n	6.13a-j
	90	55.64h-l	19.028ab	4.667m-q	0.728e-j	0.1770a-h	37.28g-n	11.40j-n	35.2e-o	69.71a-j	0.26k-r	1.61l-n	6.10f-n
G20	0	74.89d-l	md	md	0.838c-j	md	98.75v	32.10c-n	0.0p	85.83ab	0.34j-r	1.69g-n	4.98d-n
	40	79.11c-l	19.995a	13.975c-o	1.045b-j	0.1761a-h	69.44c-n	25.09d-n	3.7op	80.48a-f	0.25l-r	1.67g-n	6.76c-m
	90	76.31d-l	17.913ab	10.600f-q	0.643f-j	0.1789a-h	75.38c-n	24.22e-n	37.6d-n	60.93b-k	0.62d-r	1.65h-n	2.65e-n
G22	0	131.07b-f	16.852ab	16.500c-m	2.007a-e	0.1540b-h	118.88a-m	46.94b-k	25.0i-p	76.43a-i	md	md	md
	40	94.64b-l	16.800ab	13.000d-q	1.058b-j	0.1759a-h	73.89c-n	27.25d-n	23.9j-p	68.54a-j	0.25b-n	1.75b-n	6.97j-n
	90	98.98b-l	18.206ab	9.333h-q	md	0.1493b-h	66.99c-n	23.08e-n	8.3m-p	63.62a-k	0.29b-m	1.79b-m	6.11k-n
G25	0	101.38b-l	13.787ab	12.750d-q	0.847c-j	0.2054a-g	64.67c-n	4.97l-n	0.0p	73.16a-i	0.17g-n	1.67g-n	10.03d-n
	40	96.35b-l	14.980ab	11.567e-q	1.007b-j	0.1903a-g	54.44e-n	19.38f-n	13.0-p	77.05a-i	0.13i-n	1.63i-n	12.39d-n
	90	90.94b-l	15.601ab	10.333g-q	0.825c-j	0.1630a-h	37.02h-n	17.89f-n	76.2a	70.85a-j	0.21e-n	1.71e-n	8.01h-n
G26	0	50.20i-l	14.054ab	10.933f-q	1.236b-j	0.1837a-g	53.82e-n	19.87f-n	0.0p	71.32a-j	0.19g-n	1.69g-n	8.88d-n
	40	57.11g-l	13.642ab	8.667h-q	0.957b-j	0.1667a-h	60.23c-n	24.88d-n	0.0p	68.40a-j	0.21e-n	1.71e-n	8.18b-l
	90	87.26b-l	16.950ab	8.500h-q	0.584b-h	0.1598a-h	70.05c-n	23.36e-n	8.7m-p	57.01d-k	0.34b-k	1.84b-k	5.45g-n
G29	0	84.81b-l	17.309ab	md	0.788d-j	0.1883a-g	95.09a-n	29.84c-n	3.6op	84.42a-c	0.21e-n	1.71e-n	8.05a-e
	40	128.34b-g	14.106ab	18.500b-i	1.053b-j	0.2254ab	195.56ab	62.50a-e	40.0c-m	71.09a-j	md	md	md
	90	73.43d-l	15.919ab	md	0.286j	0.1404d-h	9.89mn	4.47mn	71.1a-c	53.79h-k	0.25b-m	1.75b-m	6.87i-n
G30	0	42.71j-l	14.015ab	4.000n-q	0.762d-j	0.2126a-f	150.49a-g	32.91c-n	2.5op	60.25c-k	0.14i-n	1.64i-n	11.66a-d
	40	82.76b-l	14.100ab	10.1670g-q	0.701f-j	0.1862a-g	48.38f-n	18.51f-n	3.3op	68.06a-j	0.22d-n	1.72d-n	7.69f-n
	90	md	md	3.333o-q	0.445h-j	md	3.11n	md	75.0ab	56.65e-k	0.35b-i	1.86b-i	5.20j-n

میانگین‌هایی، در هر ستون، که دارای حداقل یک حرف مشترک می‌باشند براساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال 1٪ تفاوت معنی دار ندارند.

Mean, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 1% probability level- using Duncan's Multiple Range Test.

Note: md: Missing data

توجه: md: داده‌های از دست رفته

ادامه جدول ۲

Table 2. Continued

نوعی Genotype	مقدار Saltinity	مسطح برگ leaf area (m ⁻²)	مسطح برگ (سانتی متر) Specific leaf area (cm ² gDW ⁻¹)	ارتفاع گیاه (سانتی متر) Plant height (cm)	قطر گیاه (میلی متر) Plant diameter (mm)	ضخامت برگ (گرم وزن تبر سانتی مترمربع) Leaf thickness (gFW cm ⁻²)	وزن تازه اندام هوایی (گرم) Shoot fresh weight (g)	وزن تازه اندام هوایی (گرم) Shoot dry weight (g)	درصد گیاهی کوزه و ریشه یافته Leaf necrosis and loss (%)	درصد آب نسی برج RWC (%)	درصد مذاب Na + content (%)	درصد پلی‌پیپ K + content (%)	نسبت پلی‌پیپ / مذاب K: Na ratio
G32	0	110.59b-k	14.776ab	11.000f-q	md	0.1947a-g	110.56a-n	40.69c-n	0.00p	81.35a-e	0.09mn	1.59mn	17.36g-n
	40	83.50b-l	14.505ab	5.167l-q	0.457h-j	0.2014a-g	76.27c-n	26.49d-n	68.06a-d	67.63a-j	0.19g-n	1.70g-n	8.55g-n
	90	87.94b-l	16.072ab	3.667n-q	0.381ij	0.1393d-h	42.00f-n	19.2f-n	76.19a	62.06b-k	0.26b-m	1.76b-m	6.81k-n
G34	0	91.66b-l	15.249ab	md	1.118b-j	0.1898a-g	135.55a-k	48.19b-k	0.00p	76.43a-i	0.607a	2.10a	3.49a
	40	65.40e-l	16.615ab	23.500b-d	0.597h-j	0.1784a-h	74.64c-n	27.03d-n	0.00p	80.19a-g	0.16g-n	1.66g-n	10.12f-n
	90	69.22e-l	15.892ab	22.367b-f	md	0.1915a-g	99.71a-n	42.64c-n	0.00p	84.72a-c	0.21g-n	1.71g-n	8.28k-n
G35	0	124.97b-h	16.689ab	17.200c-l	1.930a-f	0.1788a-h	152.47a-f	52.20b-i	0.00p	77.95a-i	0.17g-n	1.67g-n	9.59ab
	40	110.80b-k	17.218ab	17.250c-k	2.032a-d	0.1926a-g	92.41b-n	44.41c-m	1.52p	82.12a-d	0.22d-n	1.72d-n	7.69f-n
	90	89.66b-l	15.813ab	11.000f-q	0.724e-j	0.1979a-g	90.00b-n	38.75c-n	27.75h-p	66.02a-j	0.46ab	1.96ab	4.22j-n
G36	0	67.33e-l	16.123ab	md	1.113b-j	mdp	66.45c-n	30.22c-n	0.00p	72.11a-j	md	md	md
	40	73.43d-l	16.087ab	11.133e-q	0.843d-j	0.1656a-h	62.16c-n	23.72e-n	14.77k-p	88.32a	0.24c-n	1.74c-n	7.19f-n
	90	57.11g-l	md	13.500c-p	0.991b-j	md	68.43c-n	25.15d-n	63.24a-e	47.32j-k	0.29b-m	1.79b-m	6.16g-n
G39	0	49.25j-l	13.002ab	md	md	0.1934a-g	29.59k-n	11.80i-n	51.00a-j	40.35k	0.03n	1.53n	5.764n
	40	63.18e-l	15.354ab	16.900c-l	md	0.1895a-g	37.50g-n	13.46h-n	0.00p	78.25a-h	0.22e-n	1.72e-n	7.81d-n
	90	50.00j-l	md	5.250k-q	0.6223g-j	md	4.72n	2.45n	61.67a-f	62.77b-k	0.44a-d	1.94a-d	4.37f-n
G41	0	128.49b-g	14.363ab	17.333c-j	0.779d-j	0.1846a-g	145.52a-i	55.74a-f	0.00p	72.00a-j	md	md	md
	40	101.38b-l	13.746ab	8.767h-q	1.058b-j	0.1903a-g	110.75a-n	42.91c-n	0.00p	80.62a-e	0.43a-f	1.93a-f	4.48b-k
	90	69.63e-l	15.465ab	6.000j-q	0.288j	0.2032a-g	67.98c-n	22.37e-n	58.52a-h	73.75a-i	0.35b-j	1.85b-j	5.305e-n
G42	0	61.01f-l	12.319ab	19.333b-h	0.914b-j	0.22734ab	107.53a-n	24.01e-n	0.00p	76.64a-i	0.12k-n	1.62k-n	13.50b-1
	40	133.72b-e	14.461ab	18.667b-i	1.490b-j	0.1809a-h	114.89a-n	44.64c-m	0.00p	58.53d-k	0.21e-n	1.71e-n	8.020g-n
	90	113.94b-j	17.358ab	9.667h-q	1.118b-j	0.1715a-h	87.50b-n	31.48c-n	28.86h-p	66.94-j	0.24c-n	1.74c-n	7.29h-n

میانگین هایی، در هر ستون، که دارای حداقل یک حرف مشترک می باشند براساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۱٪ تفاوت معنی دار ندارند.

Mean, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 1% probability level- using Duncan's Multiple Range Test.

Note: md: Missing data

توجه: md: داده های از دست رفته

ادامه جدول ۲

Table 2. Continued

نژتپ	Genotype	میزان شوری Salinity	میزان برگ leaf area (m ²)	ارتفاع گیاه (سانتی‌متر) Plant height (cm)	قطر گیاه (میلی‌متر) Plant diameter (mm)	مساحت برگ (گرم زدن تراو) Leaf thickness (gFW cm ⁻²)	وزن تراو ادامه‌های shoot fresh weight (گرم) Shoot dry weight (g)	درصد برگ‌های نکروزه و رزش یافته Leaf necrosis and loss (%)	درصد آب نسبتی برگ RWC (%)	درصد میانگین Na + content (%)	درصد میانگین K + content (%)	درصد میانگین K : Na ratio	
G43	0	96.02b-l	17.631ab	41.50a	1.105b-j	0.1852a-g	144.08a-j	md	2.56op	76.22a-i	0.45a-c	1.95a-c	4.33a-c
	40	63.49e-l	16.444ab	12.00d-q	0.686f-j	0.14216c-h	65.82c-n	33.06c-n	26.76h-p	88.27a	0.16h-n	1.66h-n	10.30-n
	90	39.36kl	17.439ab	5.625j-q	0.296j	0.1330f-h	36.12i-n	13.8h-n	46.06a-k	73.16a-i	0.27b-m	1.77b-m	6.52g-n
G44	0	89.45b-l	14.143ab	md	0.737d-j	0.1376e-h	65.64c-n	32.94c-n	0.00p	70.60a-j	0.16h-n	1.66h-n	10.42b-k
	40	85.46b-l	16.979ab	12.67d-q	1.693a-h	0.1777a-h	80.68c-n	27.69c-n	0.00p	73.43a-i	0.19g-n	1.69g-n	8.80d-n
	90	148.35bc	15.861ab	21.70b-g	0.952b-j	0.2122a-f	204.69a	55.11a-g	0.00p	78.18a-h	0.22e-n	1.72e-n	7.89d-n
G45	0	35.25l	16.255ab	8.833h-q	0.749d-j	0.1525b-h	25.57k-n	8.61k-n	0.00p	75.14a-i	0.12k-n	1.62k-n	13.27g-n
	40	33.12l	13.009ab	1.17q	0.703f-j	0.1412d-h	22.71k-n	9.35k-n	16.42k-p	70.80a-j	0.22d-n	1.72d-n	7.71g-n
	90	44.09j-l	13.293ab	1.00q	0.483h-j	0.1842a-g	23.06k-n	14.68g-n	13.33l-p	67.91a-j	0.39b-g	1.89b-g	4.86e-n
G46	0	47.68j-l	16.600ab	md	1.143b-j	0.1963a-g	54.05e-n	17.42f-n	0.00p	79.38a-g	md	md	md
	40	68.11e-l	14.904ab	9.75g-q	0.819d-j	0.18894a-g	56.46d-n	18.5f-n	29.14g-p	77.91a-i	0.21f-n	1.71f-n	8.24h-n
	90	64.69e-l	17.169ab	8.00h-q	1.067b-j	0.19937a-g	51.69e-n	15.62f-n	26.67h-p	75.54a-i	0.43a-e	1.93a-e	4.47g-n
G47	0	76.59c-l	12.808ab	11.5e-q	1.676a-i	0.1823a-h	70.72c-n	30.64c-n	0.00p	62.54b-k	md	md	md
	40	99.2b-l	16.598ab	7.00i-q	1.206b-j	0.1895a-g	66.83c-n	29.3c-n	3.85op	80.25a-g	0.28b-m	1.79b-m	6.29e-n
	90	51.55i-l	13.460ab	9.00h-q	2.172ab	0.1694a-h	33.58i-n	14.89g-n	69.52a-d	55.33f-k	0.29b-m	1.79b-m	6.13i-n

میانگین‌هایی، در هر ستون، که دارای حداقل یک حرف مشترک می‌باشند براساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۱٪ تفاوت معنی دار ندارند.

Mean, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 1% probability level- using Duncan's Multiple Range Test.

Note: md: Missing data

توجه: md: داده‌های از دست رفته

صدمات در کلثوپاترا مشاهده نشد.

مقدار نسبی آب برگ (RWC): تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد اثر ژنوتیپ و سطوح مختلف شوری در سطح احتمال یک درصد بر مقدار نسبی آب برگ معنی‌داری بود. با افزایش سطح شوری در کلیه ژنوتیپ‌ها از میزان آب نسبی برگ کاسته شد. میانگین ژنوتیپ‌های G34 (کلثوپاترا)، G6، G43 (سیتروملو) و G46 (بکرایی) در هر سه سطح نسبت به بقیه ژنوتیپ‌ها در این صفت بالاتر بود در مقابل ژنوتیپ‌های G5، G18، G30 و G10 میانگین پایین‌تری نسبت به بقیه ژنوتیپ‌ها نشان دادند (جدول ۲).

مقدار نسبی آب (RWC) نشان‌دهنده حالت تعادل آبی در یک گیاه است و مقدار آبی که گیاه برای رسیدن به اشباع کامل (به صورت مصنوعی) نیاز دارد را ییان می‌کند (Gonzalez and Gonzalez-Vilar, 2001). کاهش در مقدار نسبی آب برگ می‌تواند به علت کاهش پتانسیل آب در محلول خاک در اثر افزایش نمک‌ها به ویژه کلرید‌سدیم باشد. پتانسیل پایین‌تر محلول خاک باعث کاهش جذب آب توسط گیاه می‌شود و در نتیجه‌ی کاهش آب گیاه، مقدار نسبی آب در برگ‌ها کاهش می‌یابد.

مقدار عناصر سدیم و پتاسیم گیاه: در اثر اعمال تنفس شوری افزایش معنی‌دار میزان سدیم و پتاسیم و همچنین کاهش نسبت پتاسیم به سدیم در برگ ژنوتیپ‌های مورد آزمایش

نکروزه شدن و ریزش برگ‌ها: تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد اثر اصلی ژنوتیپ و سطوح شوری و اثر متقابل آن‌ها بر میزان نکروزه شدن و ریزش برگ‌ها در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود (تجزیه واریانس ارائه نشده است). با افزایش میزان شوری میزان نکروزه شدن و ریزش برگ افزایش یافت. در سطح شوری صفر در کلیه ژنوتیپ‌ها به استثنای ژنوتیپ‌های G1، G22، G29، G30، G39 (رانگپورلام) و G43 (سیتروملو) نکروزه شدن و ریزش برگ صفر بود. در سطح شوری ۴۰ میلی‌مولار کلرید سدیم ژنوتیپ‌های G6، G18، G26، G34 (کلثوپاترا)، G7 (رانگپورلام)، G41 (اترج) و G42 (نارنج) و در سطح شوری ۹۰ میلی‌مولار ژنوتیپ‌های G16، G34 (کلثوپاترا) و G44 (نارنج) اثری از نکروزه شدن و ریزش برگ‌ها مشاهده نشد (جدول ۲).

با در نظر گرفتن میانگین سه سطح شوری، ژنوتیپ‌های G34 (کلثوپاترا)، G44 (نارنج)، G29، G16، G8 و G26 کمترین و ژنوتیپ‌های G32، G18 و G47 (اورکالمون × ناشناخته) بیشترین درصد برگ‌های نکروزه و ریزش برگ را به خود اختصاص دادند. ریزش برگ در بازداری از رشد گیاه در اثر شوری در مركبات نقش دارد (Gomez-Cadenas, 1998). بار و همکاران (Bar et al., 1997) گزارش کردند که غلظت بالای کلر در برگ‌ها و شاخه‌های ترویر سیترنیج باعث صدمه به برگ‌ها شد اما این

پتاسیم و وزن خشک شاخه مشاهده شد.
شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شوری:
شاخص حساسیت به تنش (SSI)، میانگین محصول دهی (MP)، تحمل (TOL)، شاخص تحمل به تنش (STI)، میانگین هندسی محصول دهی (GMP)، شاخص عملکرد (YI)، شاخص پایداری عملکرد (YSI)، شیب خط رگرسیون (β) و شاخص پاسخ به خشکی (DRI) به طور گستره در مطالعه تحمل به تنش‌های محیطی استفاده می‌شود. مشکل استفاده از این شاخص‌ها این است که رتبه‌بندی ژنوتیپ‌ها تحت تأثیر شاخص قرار می‌گیرد و این شاخص‌ها رتبه‌بندی‌های متفاوتی را ارائه می‌نمایند.

برای رفع این مشکل از نمره تحمل به تنش (STS) که ترکیبی از این شاخص‌ها است استفاده می‌شود (Abdolshahi *et al.*, 2013). مقدار بالای این شاخص نشان‌دهنده تحمل بهتر ژنوتیپ به تنش می‌باشد. بر اساس این نمره ژنوتیپ‌های دارای اعداد مثبت متحمل و ژنوتیپ‌های دارای اعداد منفی حساس هستند. نتایج شاخص STS برای ژنوتیپ‌های مورد مطالعه در این آزمایش در جدول ۳ آورده شده است. در این آزمایش ژنوتیپ‌های G25، G8، G44 (کلثوپاترا)، G42 (برگاموت) و G34 (نارنج) در سطح شوری ۹۰ بهترین نمره STS را به خود اختصاص دادند که نشان‌دهنده تحمل بالاتر آن‌ها به تنش شوری بود.

مشاهده شد. از نظر غلظت سدیم برگی، ژنوتیپ‌های G39 (رانگپورلام)، G46 (بکرایی)، G22 و G47 (اورکالمون \times ناشناخته) بیشترین و ژنوتیپ‌های G19، G8، G17، G20 و G34 (کلثوپاترا) کمترین میانگین را نشان دادند (جدول ۲). در خصوص میزان پتاسیم برگی، بیشترین میانگین مربوط به ژنوتیپ‌های G41، G34 (رافلمون)، G46 (بکرایی)، G7 و G35 (کلثوپاترا) و کمترین میانگین مربوط به ژنوتیپ‌های G19، G8، G20 و G25 بود.

اثر سمی تجمع سدیم و کلر در برگ‌های گیاهان می‌تواند منجر به مرگ زود هنگام برگ و پیری گیاه شود (Garcia – Sanchez *et al.*, 2003)

گزارش شده برای سمیت سدیم در منابع دارای تفاوت زیادی هست. سالس (Sauls, 2008) عدم مشاهده آثار سمیت را تا سطح ۰/۵ درصد وزن خشک گزارش کرد. در حالی که بسیاری از محققان ۰/۲۵ درصد سدیم در وزن خشک را به عنوان آستانه سمیت گزارش کردند (Chapman, 1949; Smith, 1962)

ییسلوگلو و همکاران (Yesiloglu *et al.*, 2012) با بررسی نارنج 'Swingle'، سیتروملو 'Tuzcu' ۸۹۱، Volkameriana'، 'Citremont' و 'Rubidoux' شوری اعلام کردند اگرچه وزن خشک ریشه در بین پایه‌ها تغییری نکرد اما تفاوت‌های معنی داری در غلظت‌های سدیم، کلر، کلسیم و

جدول ۳- نمره تحمل به تنش (STS) برای دانهال‌های ژنوتیپ‌های مرکبات
Table 3. Stress tolerance score (STS) for seedlings of citrus genotypes

ژنوتیپ Genotype	نمره تحمل به تنش STS	ژنوتیپ Genotype	نمره تحمل به تنش STS
G25	12.446	G45 (Citrangle)	-4.263
G8	10.004	G22	-4.372
G34 (Cleopatra)	10.002	G30	-4.8380
G42 (Beragamot)	7.222	G39 (Rangpour lime)	-4.908
G44 (Sour orange)	5.362	G32	-5.721
G16	4.800	G47 (Eureka lemon × Unknown)	-6.726
G41	4.770	G6	-8.911
G10	2.785	G15	-9.763
G26	0.719	G43 (Citrumelo)	-10.223
G20	-1.0436	G5	-10.767
G36 (Volkameriana)	-1.307	G19	-10.928
G49 (Bakraei)	-1.689	G7	-11.720
G35 (Rough lemon)	-2.376	G18	-13.489
G1	-2.957	G29	-13.678

$$STS = -24.64 + 0.41RWC - 0.35LNL$$

این نتایج نشان‌دهنده اهمیت دو صفت محتوی نسبی آب برگ و نکروزه شدن و ریزش برگ‌ها بود. ژنوتیپ‌هایی که محتوای نسبی آب برگ بالا و درصد نکروزه شدن و ریزش برگ کمتری داشتند تحمل به شوری بالاتر نشان دادند. ژنوتیپ‌های متحمل به شوری G25، G8 و G34 (کلئوپاترا) از لحاظ محتوای نسبی آب برگ وضعیت بالاترین مقدار را داشتند. اگرچه هر سه ژنوتیپ متحمل درصد نکروزه شدن و ریزش برگ کمی داشتند ولی ژنوتیپ G34 (کلئوپاترا) کمترین میزان را به خود اختصاص داد.

بررسی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های پایه مرکبات ایرانی نشان داد ژنوتیپ‌های بومی ایران (G25 و G8) تحمل در حد ژنوتیپ متحمل به شوری (کلئوپاترا) از خود نشان دادند. این ژنوتیپ‌ها برای استفاده به عنوان پایه در مناطق دارای خاک یا آب شور قابل استفاده می‌باشند.

نمره تحمل به شوری (STS) به عنوان متغیر وابسته در رگرسیون گام به گام در نظر گرفته شد و خصوصیات محتوای نسبی آب برگ (RWC) و نکروزه شدن و ریزش برگ‌ها (LNL) وارد مدل شدند: شدن:

داراب به خاطر دردسترس قرار دادن مواد	سپاسگزاری
گیاهی و از دانشگاه تهران برای حمایت مالی	نگارندگان این مقاله از مرکز تحقیقات
این پژوهش سپاسگزاری می‌کنند.	مرکبات رامسر و ایستگاه تحقیقات کشاورزی

References

- Abdolshahi, R., Safarian, A., Nazari, M., Pourseyedi, Sh., and Mohamadi-Nejad, Gh. 2013.** Screening drought-tolerant genotypes in bread wheat (*Triticum aestivum* L.) using different multivariate methods. Archives of Agronomy and Soil Science 59: 685-704.
- Amini, A., Vahabzadeh, M., Majidi Heravan, E., Afiuni, D., Tabatabaei, M. T., Saberi, M. H., Lotfali Aineh, G., and Ravari, S. Z. 2010.** Grain yield stability and adaptability of bread wheat genotypes using different stability indices under salinity stress conditions. Seed and Plant Improvement Journal 26: 397-411.
- Anjum, M. A., Abid, M., and Naveed, F. 2001.** Evaluation of citrus rootstocks for salinity tolerance at seedling stage. International Journal of Agriculture and Biology 3: 1-4.
- Arias, D. 2007.** Calibration of LAI -2000 to estimate leaf area index and assessment of its relationship with stand productivity in six native and introduced tree species in Costa Rica. Forest Ecology and Management 247: 85-193.
- Balal, R. M. 2012.** Comparative studies on the physiobiochemical, enzymatic, and ionic modifications in salt-tolerant and salt-sensitive citrus rootstocks under NaCl stress. Journal of the American Society for Horticultural Science 137: 86-95.
- Balal, R. M., Ashraf, M. Y., Khan, M. M., Jaskani, M. J., and Ashfaq, M. 2011.** Influence of salt stress on growth and biochemical parameters of citrus rootstocks. Pakistan Journal of Botany 43: 2135-2141.
- Banuls, J., Serna, M. D., Legaz, M., and Primo- Millo, E. 1997.** Growth and gas exchange parameters of citrus plants stressed with different salts. Journal of Plant Physiology 150: 194-199.

- Bar, Y., Apelbaum, A., Kafkafi, U., and Goren, R.** 1997. Relationship between chloride and nitrate and its effect on growth and mineral composition of avocado and citrus plants. *Journal of Plant Nutrition* 20: 715–31.
- Chapman, H.** 1949. Citrus leaf analysis. *California Agriculture* 3: 10-14.
- Climent, M., Arbona, V., Perez-Clemente, R. M., and Gomez-Cadenas, A.** 2008. Relationship between salt tolerance and photosynthetic machinery performance in citrus. *Environmental and Experimental Botany* 62: 176-184.
- Dejampour, J., Aliasgarzadeh, N., Grigorian, V., and Majidi Heravan, E.** 2012. Evaluation of salinity tolerance in some interspecific hybrids of prunus. *Seed and Plant Improvement Journal* 28: 339-351.
- Etehadpour, M., Fattahi Moghaddam, M., R., Zamani. Z., Golein, B., and Naghavi, M. R.** 2019. Effect of salinity stress on physiological traits of citrus seedlings and identification of superior genotypes. *Iranian Journal of Horticultural Science In press*.
- Fadli, A., Chetto, O., Talha, A., Beniken, L., Benkirane, R., and Benyahla, H.** 2012. Screening of ten citrus rootstocks for salt tolerance at seedling stage. Pp. 123. In: Proceedings of the XII International Citrus Congress.
- Ferguson, L., and Gratten, S. R.** 2005. How salinity damages citrus: osmotic effects and specific ion toxicities. *HortTechnology* 15: 95-99.
- Garcia – Sanchez, F., Carvajal, M., Porras, I., Botina, P., and Martinez, V.** 2003. Effects of salinity and rate of irrigation on yield, fruit quality and mineral composition of ‘Fino 49’ Lemon. *European Journal of Agronomy* 19: 427-437.
- Garcia-Sanchez, F., Martinez, V., Jifon, J. L., Syvertsen, J. P., and Grosser, J. W.** 2002b. Salinity reduces growth, gas exchange, chlorophyll and nutrient concentrations in diploid sour orange and related allotetraploid somatic hybrids. *Journal of Horticultural Science and Biotechnology* 77: 379-386.
- Gomez-Cadenas, A., Tadeo, F. R., Primo-Millo, E., and Talon, M.** 1998. Involvement of abscisic acid and ethylene in the response of citrus seedlings to salt shock. *Physiologia Plantarum* 103: 475-484.

- Gonzalez, L., and Gonzalez- Vilar, M. 2001.** Determination of relative water content. Pp. 207-212. In: Reigosa Roger, M. J. (ed.) *Handbook of Plant Ecophysiology Techniques*. Kluwer Academic Publishing. 452 pp.
- Hussain, S., Luro, F., Costantino, G., Ollitrault, P., and Morillon, R. 2012.** Physiological analysis of salt stress behaviour of citrus species and genera: low chloride accumulation as an indicator of salt tolerance. *South African Journal of Botany* 81: 103–112.
- Munns, R. 2010.** Approaches to identifying genes for salinity tolerance and the importance of timescale. Pp. 25-39. In: Sunkar, R. (ed.) *Plant Stress Tolerance, Methods and Protocols*. Springer Science & Business Media (Hummann Press).
- Munns, R., and Tester, M. 2008.** Mechanisms of salinity tolerance. *Annual Review of Plant Biology* 59: 651-681.
- Nasir Khan, M., Siddiqui, M. H., Mohammad, F., Masroor, M., Khan, A., and Naeem, M. 2007.** Salinity induced changes in growth, enzyme activities, photosynthesis, proline accumulation and yield in linseed genotypes. *World Journal of Agricultural Sciences* 3: 685-695.
- Nieves, M., Garcia, A., and Cerdá, A. 1991.** Effect of salinity and rootstock on lemon fruit quality. *The Journal of Horticultural Science and Biotechnology* 66: 27-30.
- Rafat, T. F. 2005.** Identification and evaluation of citrus trees with significant genetic variation in the northern and southern gardens. Final report of the research project. Registered no. 84/487 dated 20 August 2005. Citrus and Subtropical Fruits Research Center.
- Romero-Aranda, R., Moya, J. L., Tadeo, F. R., Legaz, F., Primo-Millo, E., and Talon, M. 1998.** Physiological and anatomical disturbances induced by chloride salts in sensitive and tolerant citrus: beneficial and detrimental effects of cations. *Plant, Cell and Environment* 21: 1243–1253.
- Saleh, B., Allario, T., Dambier, D., Ollitrault, P., and Morillon, R. 2008.** Tetraploid citrus rootstocks are more tolerant to salt stress than diploid. *Comptes Rendus Biologies* 331: 703-710.

- Sauls, J. P. 2008.** Citrus nursery production, Texas citrus and subtropical fruits. Texas AgriLife Extension. Available at: <http://aggiehorticulture.tamu.edu/citrus/nutrition/L2288.htm>.
- Simpson, C. R., Nelson, S. D., Melgar, J. C., Jifon, J., King, S. R., Schuster, G., and Voldera, A. 2014.** Growth response of grafted and ungrafted citrus trees to saline irrigation. *Scientia Horticulturae* 169: 199-205.
- Smith, P. F. 1962.** A case of sodium toxicity in citrus. Proceedings of the Florida State Horticultural Society 75: 120-124.
- Yesiloglu, T., Incesu, M., Yilmaz, B., Tuzeu, O., Uysal, M., and Cimen, B. 2012.** Effect of salinity on some citrus rootstocks. Pp. 120-121. In: Proceedings of the XII International Citrus Congress.
- Zekri, M. 1991.** Effect of NaCl on growth and physiology of sour orange and Cleopatra mandarin seedlings. *Scientia Horticulturae* 47: 303-15.
- Zekri, M., and Parsons, L. R. 1992.** Salinity tolerance of citrus rootstocks: effect of salt on root and leaf mineral concentrations. *Plant Soil* 147: 171-181.