

تأثیر پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک در استان سمنان

محمود گودرزی^۱ و محمد حسن شریعتی^۲

چکیده

در این پژوهش سعی شده است تا اثرات پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک عرصه پخش مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور سه نوار اولیه از شبکه پخش سیلاب انتخاب و هر یک از نوارها به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم گردید. نمونه برداری از حدود ۱/۳ عرض نوار و در پائین هر یک از قطعات ایجاد شده از عمق‌های ۰-۱۵، ۱۵-۳۰ و ۳۰-۴۵ سانتیمتری برداشته و در کنار هر نوار انتخابی قطعاتی که سیلاب پخش نشده به عنوان شاهد در نظر گرفته شده است از مناطق شاهد نیز مانند منطقه پخش نمونه خاک برداشته شده و همراه سایر نمونه‌ها جهت انجام و آزمایشات به آزمایشگاه ارسال شده‌اند.

جدول تجزیه واریانس اثر پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک بر پایه طرح آماری کرتهای خرد شده (Split plots) انجام پذیرفت که پخش سیلاب و عدم پخش به عنوان تیمارهای اصلی و تغییرات خاک در سه عمق مذکور به عنوان تیمارهای فرعی و نوارهای پخش سیلاب به عنوان تکرارهای طرح در طی ۳ سال می‌باشند.

جدول تجزیه واریانس نشان دهنده این است که تأثیر پخش سیلاب بر افزایش میزان سیلت (Slit)، مواد آلی (OM)، درصد اشباع (sp)، آنیون کلر (Cl)، ازت کل خاک (N) و فسفر خاک (P) با احتمال ۹۹٪ معنی دار بوده و بر افزایش میزان رس (Clay)، قابلیت هدایت الکتریکی خاک (Ec)، کاتیونهای کلسیم (Ca^{++})، منزیم (Mg^{++}), سدیم

۱- کارشناس ارشد پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
۲- کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان سمنان

(Na⁺) و پتاسیم (K⁺) با احتمال ۹۵٪ معنی دار است. همچنین اثر پخش سیلاب بر کاهش میزان نسبی شن (Sand)، اسیدیته (pH) با احتمال ۹۹٪ معنی دار می باشد. ولی در مقدار آهک (CaCO₃)، ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) و پتاسیم قابل جذب خاک (K) تغییر معنی داری مشاهده نگردیده است.

واژه های کلیدی: پخش سیلاب، غلام در گردشی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، حاصلخیزی

مقدمه

یکی از ویژگیهای اقلیمی مناطق خشک و نیمه خشک، علاوه بر کمی نزولات جوی و محدود بودن منابع آب، نزول بارشهايی با شدت نسبتاً زیاد در مدت زمان کوتاه می باشد که منجر به وقوع سیلابهای مخرب می گردد. ضمن اینکه اغلب این سیلابها بدون استفاده از دسترس خارج شده همچنین باعث فرسایش خاکهای حاصلخیز و بروز خسارات فراوانی برای دامداران و کشاورزان نیز می گردد. لذا محدود بودن منابع آب و خسارات سیلاب در این مناطق سبب توجه به استفاده از سیلابهای زودگذر شده است. در این راستا احداث شبکه های پخش سیلاب بر روی مخروط افکنه ها، دشتها و اراضی شنی یکی از روشهايی است که برای بهره برداری از سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک توصیه می شود. ورود حجم زیادی از سیلاب حاوی املاح و بار معلق فراوان با منشاءهای مختلف با بر جای گذاردن رسوبات فراوان به مرور زمان سبب تغییرات قابل ملاحظه ای در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اولیه می شود. اهمیت پخش سیلاب در ارتباط با منابع خاکی از آن جهت است که ته نشینی مواد معلق دارای کیفیتی خوب بر روی خاکهای جوان زمینهای فرسوده باعث بارور نمودن خاک آن مناطق می شود (کوثر ۷۴). مهار سیلاب و نفوذ آن در مخروط افکنه علاوه بر افزایش حاصلخیزی خاک و بالا آمدن سطح آب زیر زمینی از پیشروی کویر جلوگیری می نماید.

(غفاری ۱۳۷۴). همچنین از رسوبات انباشته شده در شبکه‌های پخش سیلاب می‌توان به عنوان ماده اصلاح کننده خاک اراضی شنی و نامرغوب استفاده کرد. لذا اطلاع از کمیت و کیفیت رسوبات انباشته شده در محل پخش سیلاب می‌تواند نقش مهمی در بهره برداری از اراضی و توسعه آینده منطقه داشته باشد. تحقیق حاضر به منظور شناسایی اثر پخش سیلاب و تأثیر آن بر حاصلخیزی خاک در ایستگاه پخش سیلاب قوشه انجام پذیرفته است.

مواد و روشها:

تشریح اجمالی منطقه

منطقه مورد مطالعه (پخش سیلاب قوشه) در ۷۵ کیلومتری شرق سمنان (جاده اصلی تهران - مشهد)، در ۷ کیلومتری جنوب روستای قوشه با طول جغرافیایی '۰۴ و '۵۴ شرقی و عرض جغرافیایی '۴۵ و '۳۵ شمالی با مساحت حدود ۱۲۰ هکتار و در خروجی حوزه آبخیز دریان و بر روی دشت قوشه احداث گردیده است. که حوزه آبخیز آن (حوزه دریان) از ارتفاعات کوه نیزوا در شمال شرقی سمنان سرچشمه گرفته و با آبراهه اصلی به طول ۶۲ کیلومتر به سمت جنوب شرقی (شهر دامغان) ادامه پیدا کرده است موقعیت جغرافیایی حوزه بین '۱۹ و '۵۳ تا '۱۰ و '۵۴ طول شرقی و '۴۳ و '۳۵ تا '۵۸ و '۳۵ عرض شمالی و مساحت ۸۱۹ کیلومتر مربع می‌باشد. میزان بارندگی سالیانه حوزه بین ۱۲۰ میلیمتر در جنوب منطقه تا ۴۵۰ میلیمتر در ارتفاعات حوزه دریان متغیر می‌باشد که مجموعاً متوسط بارندگی سالیانه حوزه حدود ۲۸۱ میلیمتر می‌باشد. این منطقه از نظر پوشش گیاهی ضعیف بوده و دارای گونه‌های گیاهی از جنس درمنه (*Zygophyllum eurypperum*), قیچ (*Artemisia herba-alba*), سور (*Peganum harmala*) و کاروانکش (*Salsola sp.*)، اسفندر (*Atraphaxis spinosa*) و چرخک (*Launaea acanthodes*) می‌باشد.

این منطقه از لحاظ زمین شناسی متنوع بوده و دارای سازندهای مختلفی از دوران پالئوزوئیک تا کواترنر می‌باشد. منطقه پخش سیلاب از نظر فیزیوگرافی شامل آبرفت‌های بادبزنی شکل سنگریزه‌دار بوده که دارای خاک عمیق، سنگریزه‌دار همراه با بافت سبک می‌باشد خاکهای منطقه عموماً دارای ساختمان توده‌ای، مواد آلی بسیار کم، کربنات کلسیم (CaCO_3) زیاد، شوری کم (بدون شوری)، واکنش (pH) قلیایی و قادر تکامل پروفیلی هستند.

معرفی سیستم پخش سیلاب:

حوزه آبخیز دریان از ارتفاعات کوه نیزوا در شمال شرقی شهرستان سمنان سرچشمه گرفته، و با جهت جنوب شرقی به سمت شهرستان دامغان ادامه پیدا می‌کند. رواناب خروجی این حوزه پس از گذر از جاده اصلی سمنان دامغان وارد دشت قوشه شده و پس از طی مسافتی وارد کویر حاج علیقلی در جنوب شهرستان دامغان می‌گردد. در سال ۱۳۷۰ اداره کل امور آب استان در جنوب روستای قوشه به منظور افزایش طول مسیر رودخانه، تأخیر در حرکت سیلاب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی اقدام به اجرای سیستم پخش سیلاب به روش غلام در گردشی نمود. این سیستم شامل تعداد ۴ خاکریز (پشته) بوده که جمعاً طول پشتنهای حدود ۶ کیلومتر بوده است. بدلیل اینکه حجم زیاد سیلاب مسیل دریان زیاد بوده و پس از طی مسیر احتمالی و تخریب زمینهای کشاورزی پائین دست، وارد کویر حاج علیقلی می‌شده است، مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد سازندگی استان به سفارش و هماهنگی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان در سال ۱۳۷۲ اقدام به احداث سیستم پخش سیلاب در ادامه سیستم قبلی به مساحت ۷۵ هکتار با تعداد ۱۲ خاکریز (پشته) با طول ۳۵۰ تا ۴۰۰ متر و فاصله حدود ۱۴۰ متر نمود.

دبی طراحی شده برای این سیستم ۴ متر مکعب در ثانیه می‌باشد. هر پشته توسط ۲ دروازه در ابتدا و انتهای خود، سیلاب را به کanal بعدی منتقل می‌نماید. سیلاب از طریق لبه کanal در عرصه پخش شده و پس از تجمع در پشت خاکریز یا پشته بعدی توسط دروازه‌ها وارد کanal بعدی می‌شود.

روش تحقیق

در این مطالعه ابتدا سه نوار اولیه از شبکه پخش سیلاب انتخاب گردیده و طول پشتنهای خاکی بین نوارهای پخش سیلاب بوسیله متر اندازه‌گیری شد و هر یک از نوارها به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم گردید. سپس در هر یک از قطعات ایجاد شده قطر آنها را رسم نموده و روی دو قطر ۱۴ نمونه از اعمق ۱۵-۰، ۳۰-۴۵ و ۳۰-۳۰ سانتیمتری برداشت گردید. نمونه‌های ۱۴ گانه فوق مربوط به هر عمقی را روی هم ریخته و از مخلوط کردن آنها حدود ۲ کیلوگرم خاک (یک نمونه) برای هر عمقی به عنوان قطعه مورد نظر انتخاب گردید. بدین ترتیب هر یک از قطعات دارای سه نمونه مربوط به اعمق فوق خواهد بود.

در هر سه نوار پخش بعنوان تکرار عملیات فوق انجام گردید. برای شاهد از قطعاتی که پخش سیلاب بر روی آنها انجام نشده بود نیز نمونه برداری به روش فوق به عمل آمد. با این ترتیب برای هر نوار ۳۶ نمونه در پخش سیلاب، ۳ نمونه از سه عمق‌های مختلف به عنوان شاهد انتخاب گردید که در کل حدود ۱۱۷ نمونه تهیه گردید. قابل ذکر است با توجه به کمبود هزینه و با مشورت مراکز علمی و مجری ملی طرح از نمونه‌ها متوسط‌گیری به عمل آمد بدین شرح که ۱۲ نمونه خاک مربوط به هر عمقی با هم مخلوط گردیده و یک نمونه تهیه شد. به این ترتیب تعداد نمونه‌های هر نوار از ۳۶ به ۳ نمونه تقلیل یافت. در سالهای دوم و سوم طرح نیز علمیات فوق تکرار گردید.

و در پایان نمونه‌های خاک تهیه شده برای انجام آزمایشات به آزمایشگاه ارسال گردیدند.

پس از اتمام آزمایشات و آماده شدن نتایج (ضمیمه ۱)، برای آنالیز و تجزیه و تحلیل نتایج از طرح آماری کرتهاخای خرد شده زمانی مکانی (Split plot) استفاده گردید که در این طرح عامل «A» پخت سیلاب و عدم پختش (شاهد) آن به عنوان تیمارهای اصلی، عامل «B» سه عمق نمونه برداری به عنوان تیمارهای فرعی، عامل «R» سه پختش به عنوان تکرارهای طرح و عامل «C» سالهای اجرای طرح به عنوان تیمار در نظر گرفته شده‌اند. آنالیز آماری با استفاده از رایانه و نرم افزار MSTAT- C انجام گرفته شده است. لازم به ذکر است بدلیل اینکه در این طرح اندازه‌گیری فاکتورهای اصلی مهم بوده، که در همان تجزیه و تحلیل اولیه (جدول تجزیه واریانس) جواب لازم گرفته شده است. بنابراین نیازی به مقایسه میانگین‌ها نبوده است.

تغییرات هر یک از عوامل مورد اندازه‌گیری که از جداول تجزیه واریانس (ضمیمه ۲) بدست آمده، برای به طور جداگانه در جدول ذیل بیان شده است.

ردیف	عامل مورد اندازه‌گیری	شرح
۱	سیلت، مواد آلی، درصد اشباع، آتبیون کلر، ازت کل خاک و فسفر خاک	افزایش با احتمال ۹۹٪ معنی دار
۲	رس خاک، قابلیت هدایت الکتریکی خاک، کاتیونهای کلسیم، منزیم، سدیم و پتاسیم	افزایش با احتمال ۹۵٪ معنی دار
۳	کاهش شن، اسیدیته	کاهش با احتمال ۹۹٪ معنی دار
۴	آهک، ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد سدیم تبادلی و پتاسیم قابل جذب خاک	تغییر معنی دار وجود نداشته است

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج حاصله از جدول تجزیه واریانس نشان می‌دهد که بافت خاک عرصه پخش در اثر پخش سیلاپ تغییر نموده است از بافت سبک (Very gravelly loamy sand) به طرف خاکهای متوسط بافت (Loam, Loamy sand) تغییر یافته است همچنین نتایج مطالعات سررشته‌داری (۷) در پخش سیلاپ کرمان نشان می‌دهد که بافت خاک در اثر پخش سیلاپ بهبود یافته است. که تغییرات عوامل تشکیل دهنده بافت (شن، سیلت و رس) به تفکیک در ذیل آورده شده است.

- نتایج حاصله از تجزیه واریانس نمونه‌های شن نشان می‌دهد که مقدار شن در سیستمهای پخش سیلاپ کاهش یافته است که علت اصلی آن مربوط به جنس تشکیلات زمین شناسی، بافت خاک و حوزه بالادست که دارای فاصله سیستم پخش با منابع برداشت رسوبات می‌باشد. این نتیجه با نتایج رهبر (۱) نیز همخوانی دارد.

- نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس همچنین نشان دهنده این است که مقدار سیلت (silt) عرصه پخش افزایش یافته است که این افزایش بیشتر در عمق ۰-۱۵ سانتیمتر مشاهده شده و مربوط به جنس تشکیلات زمین شناسی و بافت خاک حوزه بالادست می‌باشد که به عرصه‌های پخش حمل شده‌اند این موضوع با نتایج رهبر (۱) نیز همخوانی دارد.

- همچنین مقدار رس (clay) خاک عرصه در اثر پخش سیلاپ افزایش یافته است که این افزایش نیز به دلایل فوق می‌باشد با نتایج رهبر (۱) و نادری (۳) مطابقت دارد. نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان دهنده افزایش درصد اشباع خاک می‌باشد و نظر به اینکه درصد اشباع خاک با بافت خاک رابطه معنی‌داری دارد. لذا در این نتایج با عنایت به افزایش ذرات ریز دانه و کاهش ذرات درشت دانه، افزایش میزان درصد اشباع خاک منطقی نشان می‌دهد.

- مقدار مواد آلی در عرصه پخش سیلاب افزایش یافته است که این افزایش نتیجه حمل خاکهای سطحی از منابع با مواد آلی (خاکهای مرتعی و اراضی کشاورزی حوزه بالادست) بیشتر بوده است. این موضوع با نتایج سرنشسته‌داری (۲) نیز همخوانی دارد. همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نادری (۳) در سالهای متولی که بر روی پخش سیلاب گریبایگان نموده‌اند نشان می‌دهد که افزایش مواد آلی در آن منطقه نتیجه توسعه پوشش گیاهی در سیستم پخش سیلاب بوده است.
- مقدار آهک نسبت به شاهد افزایش معنی‌داری نشان نمی‌دهد. که علت اصلی آن را می‌توان قلت بارندگی منطقه و عدم توانانی شستشوی آهک از نیمرخ خاک دانست. لذا آنچه از طریق سیلاب حمل می‌گردد با آنچه که در خاک وجود دارد تقریباً برابر است.
- نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان می‌دهد که مقدار PH خاک در اثر پخش سیلاب کاهش یافته است که علت اصلی آن را می‌توان وجود مواد آلی در سیلاب بر شمرد.
- مقدار هدایت الکتریکی (EC) خاک در اثر پخش سیلاب به مقدار اندکی افزایش یافته است که به نظر می‌رسد از جنس تشکیلات حوزه آبخیز بالاست و یا با توجه به دمای منطقه در اثر تبخیر آبها و ماندن نمکها در سطح خاک باشد. در پی افزایش - هدایت الکتریکی، میزان کاتیونهای موجود در خاک که شامل سدیم، منیزیم، کلسیم و پتانسیم می‌باشند نیز به مقدار اندکی افزایش یافته است. این موضوع با نتایج رهبر (۱) نیز مطابقت دارد.
- مقدار یون کلر بخصوص در عمق ۰-۱۵ سانتیمتری افزایش معنی‌داری نشان می‌دهد که با نتایج رهبر (۱) نیز مطابقت دارد.

مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی خاک تغییرات زیادی نداشته است. با عنایت به اینکه مقدار رس و مواد آلی افزایش یافته نکته حائز توجه می‌باشد و نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.

- میزان ازت خاک در اثر پخش سیلاپ افزایش معنی‌داری نشان می‌دهد که علت اصلی آن را می‌توان حمل خاکهای غنی از مواد آلی اراضی بالا دست بوسیله سیلاپ دانست. این موضوع با نتایج سررشه‌داری (۲) نیز همخوانی دارد.

- مقدار پتانسیم قابل جذب در اثر پخش سیلاپ نیز تفاوت معنی‌داری نشان نمی‌دهد.

- مقدار فسفر خاک در اثر پخش سیلاپ افزایش معنی‌داری نشان می‌دهد که این موضوع با نتایج رهبر (۱) و سررشه‌داری (۲) نیز همخوانی دارد.

سپاسگزاری

در پایان لازم به یادآوری است که این تحقیق در مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان انجام شده که بدینوسیله از زحمات همکاران محترم آن مرکز از جمله بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، آقای مهندس بیژن مزدارانی و آقای مهندس علی محمد عمومی تشكر و قدردانی می‌شود.

پاورقی‌ها

Floodwater spreadin

Gallery manner

Physical and chemical properties of soli

Soil fertility

منابع مورد استفاده

- رهبر، غلامرضا، ۱۳۷۶، بررسی تأثیر پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک در استان فارس (گزارش نهایی طرح تحقیقاتی)
- غفاری، حمید رضا، ۱۳۷۴، بررسی پخش سیلاب بر روی رسوبات آبرفتی و تأثیر آن در تغذیه آبهای زیر زمینی در استان خراسان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
- نادری، علی اصغر، ۱۳۷۶، اثر پخش سیلاب بر پاره ای از خواص فیزیکی و شیمیایی خاک شنی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
- گزارش مطالعات زمین شناسی حوزه آبخیز دریان شرکت خدمت مهندسی جهاد - دفتر سمنان ۱۳۷۶.
- گزارش مطالعات خاک و قابلیت اراضی حوزه آبخیز دریان شرکت خدمات مهندسی جهاد - دفتر سمنان ۱۳۷۶.
- گزارش مطالعات پوشش گاهی حوزه آبخیز دریان شرکت خدمات مهندسی جهاد - دفتر سمنان ۱۳۷۶.
- گزارش عملکرد ایستگاههای تحقیقاتی آموزشی و ترویجی پخش سیلاب در آبخوان، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان - ۱۳۷۷.
- Sarreshtehdari, Amir, 2002, The impact of a floodspreading project on soil properties, Kerman province, MSc Thesis, ITC, Enschede, The Netherlands.

خواص آزمایشات تابعی - جدول شماره ۱

No	Description	pH	Cations megl						Cl ⁻ Meq/l	%O M	%N	Pp.p. m	Kp.p. m	CECme q/100g soil	%sp	Mechanical analyze		
			Ec *10 ³	Ca ⁺⁺ Mg ⁺⁺	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺	K ⁺								Sand %	Silt %	Clay %
1	a1 t1 b1	7.5	1.35	10.2	6.4	3.8	3	0.62	3.6	28.7	0.48	0.031	10.2	6.4	12	32.9	52	30
2	a1 t1 b2	7.5	1.1	7.6	4.2	3.4	3	0.5	4.4	30	0.33	0.02	5.6	5.2	10	29.7	70	14
3	a1 t1 b3	7.48	1.1	7.8	4.2	3.6	3	0.35	4.1	33.5	0.25	0.01	3.4	4	8	29.3	74	12
4	a1 t2 b1	7.46	1.6	10.5	6.6	3.6	5	0.74	4.0	30.2	0.42	0.025	10.8	6.4	10	33.4	56	16
5	a1 t2 b2	7.53	1.25	9.4	5.4	4.0	3	0.26	4.0	30.9	0.13	0.011	5.2	5.4	8	26	74	12
6	a1 t2 b3	7.56	1.4	8.8	5	3.9	5	0.42	2.8	33.6	0.34	0.21	3.0	3.6	8	28.4	78	10
7	a1 t3 b1	7.5	1.25	8.2	4.8	3.4	4	0.6	3.2	30	0.33	0.21	9.6	12.4	10	33.9	54	26
8	a1 t3 b2	7.57	0.9	4.9	2.8	2.1	4	0.36	2.4	30.8	0.27	0.017	8.6	5.2	8	26.5	72	12
9	a1 t3 b3	7.51	0.91	7.0	4.1	2.9	2	0.3	2.4	32.0	0.21	0.13	2.2	4.0	8	23.2	78	12
10	Cs b1	8.2	1.1	7.2	4	3.2	1	0.29	1.6	35	0.05	0.01	2.4	4	6	26.1	80	8
11	Cs b2	8	0.97	3.8	2.1	1.7	5	0.56	1.2	31.2	0.14	0.02	3.6	5.2	8	24	84	6
12	Cs b3	8	2.1	4.8	1.9	3	0.2	2.4	34.6	0.1	0.01	3.2	5.2	8	26.6	82	10	
																		8

منطقه شاهد: CS: عمق: b: سال پیشین: t: نوار پیشین

a:

ضمیمه شماره ۲: نمونه جداول تعزیه واریانس همراه با علامت بکار رفته علامت بکار رفته
در جدول تعزیه واریانس به شرح ذیل می باشد.

علامت	شرح
<i>Replication</i>	تفاوت بین نوارهای پخش (۳ تکرار)
<i>Factor A</i>	تفاوت بین پخش و عدم پخش
<i>Factor B</i>	تفاوت بین اعماق مختلف (۳ عمق)
<i>AB</i>	اثر متقابل بین سیستم پخش و عدم پخش و اعماق مختلف
<i>C</i>	تفاوت در زمانهای مختلف (۳ سال)
<i>AC</i>	اثر زمان (سالها) در سیستم پخش و عدم پخش
<i>BC</i>	اثر زمان (سالها) در عمق
<i>ABC</i>	اثر ۳ عامل بر هم (زمان - عمق - سیستم پخش و عدم پخش)
n.S	عدم وجود تفاوت معنی دار
*	با احتمال ۹۵٪ معنی دار
**	با احتمال ۹۹٪ معنی دار

آنالیز واریانس مقادیر شن (Sand)

K value	Source	Degrees of freedom	Sum of Squares	Mean Square	F value	Prob.
1	Replication	2	57.333	28.667	6.7895 ^{n.s}	0.1284
2	Factor A	1	1176.000	1176.000	278.5263 **	0.0036
3	Error (a)	2	8.444	4.222		
4	Factor B	2	3073.778	1536.889	53.8210 **	0.0013
5	Error (b)	4	114.222	28.556		
6	AB	2	263.111	131.556	91.0769 **	0.0005
7	Error (c)	4	5.778	1.444		
8	Factor c	2	67.111	33.556	4.4195 **	0.0232
10	AC	2	21.778	10.889	1.4341 ^{n.s}	0.2580
12	BC	4	39.111	9.778	1.2878 ^{n.s}	0.3026
14	ABC	4	60.444	15.111	1.9902 ^{n.s}	0.1282
15	Error (d)	24	182.222	7.593		
	Total	53	5069.333			

آنالیز واریانس مقادیررس (Clay)

K value	Source	Degrees of freedom	Sum of Squares	Mean Square	F value	Prob.
1	Replication	2	4.000	2.000	0.6932 n.s	
2	Factor A	1	96.000	96.000	33.2308 *	0.0288
3	Error (a)	2	5.778	2.889		
4	Factor B	2	529.333	264.667	66.1667 **	0.0009
5	Error (b)	4	16.000	4.000		
6	AB	2	3.111	1.556	0.2188 n.s	
7	Error (c)	4	28.444	7.111		
8	Factor c	2	59.111	29.556	12.8710 **	0.0002
10	AC	2	9.333	4.667	2.0323 n.s	0.1530
12	BC	4	27.556	6.889	3.0000 *	0.0385
14	ABC	4	11.556	2.889	1.2581 n.s	0.3137
15	Error (d)	24	55.111	2.296		
	Total	53	845.333			



Effect of flood water spreading on soil fertility in Semnan province

M. goudarzi¹, M. H. Shariati

Abstract

Dameghan floodwater spreading system in Semnan province, is located on Daryan temporary river Ghoosheh plain. The system was established in 1992 by local organization of Ministry of Jahade – Keshavarzi in sake of soil conservation and as a consequence strengthening of water tables. The system has 12 channels of 350 m width and 2 km length.

The effect of flood water spreading on soil fertility was examined in this study. Three primary stripes were selected, and each divided in to 12 equal parts. Soil samples were collected from 0-15, 15-30 and 30-45 cm depths. Control site were selected from the strips adjacent areas. Soil samples were taken to the lab and analyzed.

Analysis of variation showed that the effect of floodwater spreading on increasing of silt, organic matter(Om), saturation percent(Sp), chlorine(Cl) Nitrogen(N) and phosphorous(P) at probability of %99 is significant while on increasing of clay, electrical conductivity(EC), soil cations (Ca^{++}), (Mg^{++}), (Na^+) and (K^+) at probability of %95. The negative effect of flood water spreading on sand and (pH) at probability of %99 significant. No significant effect on calcium carbonate (CaCO_3), capacity of cation exchange(CEC), percent of exchangeable sodium(ESP) and absorbing potassium (K) was observed.