

مقاله علمی - پژوهشی:**خواص آنتیاکسیدانی و میزان بازدارندگی آنزیم پلیفنول اکسیداز میگوی وانامی (*Litopenaeus vannamei*) در عصاره‌های مختلف جلبک‌های قهوه‌ای**سلیم شریفیان^{۱*}، بهاره شعبان‌پور^۲^{*}sharifian.salim@hotmail.com

- ۱- گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوری و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 ۲- گروه فراوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط‌بزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

تاریخ پذیرش: آبان ۱۳۹۹ تاریخ دریافت: مرداد ۱۳۹۹

چکیده

در مطالعه حاضر میزان فلوروتابین، خواص آنتیاکسیدانی (بازدارندگی رادیکال آزاد DPPH و قدرت احیاء یون آهن) و میزان بازدارندگی آنزیم پلیفنول اکسیداز میگوی وانامی (*Litopenaeus vannamei*) در عصاره‌های مختلف (اولیه و اتیل استاتی) *Sargassum Nizimuddinia zanardinii* استخراج شده با حللهای مтанول ۱۰۰٪ و ۷۰٪ از جلبک‌های قهوه‌ای قهوه‌ای گرم فلورو گلوسینول / گرم)، بازدارندگی DPPH گونه‌های مختلف جلبک‌های قهوه‌ای بالاترین میزان فلوروتابین (۱۳/۲۱ میلی گرم فلورو گلوسینول / گرم)، بازدارندگی DPPH (۷۲/۶۴٪) و قدرت احیاء یون آهن (۰/۹۶٪) در عصاره اتیل استاتی جلبک *N. zanardinii* با حللهای مtanول ۱۰۰٪ وجود داشت. با استفاده از TLC، در عصاره اتیل استاتی جلبک ترکیبات فلوروتابینی شامل فلورو گلوسینول، اکول، دی اکول و بی اکول شناسایی گردید. نتایج نشان داد که میزان فلوروتابین و فعالیت آنتیاکسیدانی در گونه‌های مختلف بسته به نوع جلبک، نوع عصاره و نوع حلله استخراجی متفاوت می‌باشد. میزان بازدارندگی آنزیم پلیفنول اکسیداز میگوی وانامی در میان عصاره‌ها و گونه‌های مختلف جلبک، متفاوت بود و بالاترین میزان بازدارندگی (۷۱/۱۱٪) در عصاره اتیل استاتی جلبک *N. zanardinii* اندازه‌گیری گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره‌های جلبکی با میزان فلوروتابین بالا دارای خاصیت آنتیاکسیدانی بالای هستند و می‌توانند به عنوان بازدارنده‌های طبیعی و سالم آنزیم پلیفنول اکسیداز مطرح باشند.

لغات کلیدی: جلبک قهوه‌ای، خواص آنتیاکسیدانی، بازدارندگی آنزیم پلیفنول اکسیداز، میگوی وانامی (*Litopenaeus vannamei*)^۳ نویسنده مسئول

مقدمه

هيدروليزي و غير قابل هيدروليزي (متراكم) و فلوروتانيين ها مي باشد. فنول ها نقش اصلی به عنوان اجزاء ساختاري ديواره سلول بازي می کنند و ممکن است نقش ثانويه در ارسال سيگنال های دفاعي يا در پاسخ به استرس های محيطي داشته باشند. فلوروتانيين ها در بسياري از جلبک های قهوهای به طريق متابوليسم ثانويه توليد می گردد. اما تاکنون در گياهان خشكى زی یافت نشده است (Kang *et al.*, 2004).

طی سال های گذشته به شكل گستره از ترکيبات سولفيتي، بهويه متا بي سولفيت سديم به عنوان مهارکننده های ملانوزيس استفاده شده است. به رغم قابليت زياد اين ترکيبات در کنترل لکه سياه ميگو، تشدید بروز حساسيت و ايجاد مشكل در افراد مبتلا به آسم منجر به ايجاد محدوديت در استفاده آنها در بسياري از کشورها شده است (Nirmal and Benjakul, 2009a). در نتيجه، يافتن جايگزين های طبیعی و مؤثر برای اين ترکيبات ضروري است و همواره از دغدغه های محققين صنایع غذایي بوده است. امروزه خاصیت مهارکننده گی آنزيم پلی فنول اكسيداز در بسياري از ترکيبات فنولی طبیعی همچون کاتكين، فروليک اسيد، عصاره چای سيز و چای مالبری، عصاره رزماری، عصاره هسته انگور و انسانس آويشن شيرازی به اثبات رسيده است (نصيری و همكاران، Nirmal and Benjakul, 2009a, b; Zakipour Rahimabadi *et al.*, 2016). با اين وجود، تاکنون تحقيقات اندکی در زمينه استخراج ترکيبات طبیعی با قابليت بازدارندگی آنزيمی بهخصوص در زمينه آبزیان انجام شده است. از اين رو، هدف تحقيق حاضر اندازه گيري و استخراج ترکيبات فلوروتانيين از جلبک های قهوهای و پتانسيل استفاده از آنها به عنوان بازدارنده های طبیعی آنزيم پلی فنول اكسيداز بوده است.

مواد و روش کار**جمع آوري جلبک و عصاره گيري**

گونه های مختلف جلبک های قهوهای از محدوده جزر و مدي ساحل چابهار در فصل زمستان جمع آوري و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. نمونه های جلبک در آزمایشگاه،

آبزیان از تولیدات اقتصادي مهم بسياري از کشورها از جمله ايران می باشند. ميگو از جمله آبزیانی است که ارزش تغذيه ای زيادي دارد. اين آبزی منبع خوبی از پروتين، اسيدهای چرب غيراشباع، آهن، سلنیوم، ویتامین B_{12} و D است و در عین حال مقدار کالري اندکی دارد. با اين وجود، اين محصول پس از برداشت بهشت در معرض ملانوزيس قرار دارد و به سرعت فاسد می شود. ملانوزيس در ميگو در اثر فعالیت آنزيم پلی فنول اكسيداز می باشد. اين آنزيم عمدتاً در کاراپاس سفالوتوراکس ميگو وجود دارد و فعال شدن آن پس از مرگ منجر به تشکيل رنگدانه تيره رنگ و نامحلول در آب ملانين و بروز ملانوزيس (لکه های سياه) در ميگو می شود. اين لکه های سياه تغييری در طعم ميگو ايجاد نمي کنند و هیچ گزارشي مبتنی بر بيماري زا بودن آنها وجود ندارد، اما به دليل ايجاد تغييرات رنگی نامطلوب سطحي، مشتری پسندی محصول را کاهش می دهدند (Nirmal and Benjakul, 2009a).

ماکروجلبك های دريائي معمولاً بر اساس رنگدانه های موجود در آنها به سه گروه جلبک های قهوهای¹، قرمز² و سبز³ طبقه بندی می گردد. جلبک های قهوهای تقريباً به طور كامل در تمام زیستگاه های دريائي یافت می شوند. اين جلبک ها غني از ویتامين، مواد معدنی و پروتين هستند. علاوه بر اين ترکيبات، تحقيقات نشان داده است که جلبک ها قادر به توليد نوعی از متابوليسم های ثانويه با نام فلوروتانيين ها هستند که در گياهان خشكى یافت نمي شود. اين ترکيبات زيسنی فعال دارای خواص دارويي، بهداشتی و غذائي می باشند. تحقيقات متعددی بر جلبک های دريائي قهوهای به واسطه دارا بودن ترکيبات زيسنی فعال سودمند برای سلامتی انسان از قبيل فلوروتانيين ها و پلی ساکاريد های از قبيل اسيد گاليك، فوكوئidan، پيروفثوفيتين، تري پپتيدها و ... انجام شده است (Kang *et al.*, 2004). فنول ها ترکيباتی با حلقه آروماتيك دارای يك يا چند استخلاف هيدروكسيل (OH-) و شامل فنول های ساده، كومارين، فلاونويد، تانن های قابل

¹ Phaeophyceae² Rhodophyceae³ Chlorophyceae

سنچش خواص آنتی اکسیدانی
 میزان فلوروتانین بر اساس استاندارد فلوروگلوسینول (Phloroglucinol, PHG) و با استفاده از شناساگر فولین-سیوکالتو (Folin-Ciocalteu) به روش Chakraborty و همکاران (۲۰۱۳) با اندکی تغییرات اندازه‌گیری گردید. سنچش فعالیت مهار رادیکال آزاد DPPH و قدرت احیاء یون آهن (Fe^{+3}) بر اساس روش Taheri (۲۰۱۶) انجام گرفت.

استخراج و سنچش فعالیت آنزیم پلی‌فنول اکسیداز سفالوتراکس ۲۰ عدد میگوی تازه به صورت دستی از بدن میگو جدا و همراه با نیتروژن مایع در خردکن تجاری وارینگ (Waring Co., USA) پودر گردید. به مخلوط حاصله، ۱۵۰ میلی‌لیتر بافر استخراج کننده (بافر فسفات سدیم، pH ۲/۷، Mحتوى NaCl ۱٪ و٪ ۰/۲ بربج). اضافه و در ادامه سانتریفیوژ گردید. محلول رویی جدا و پس از اشباع نمودن با سولفات آمونیوم وارد کیسه دیالیز شد. پس از دیالیز و سانتریفیوژ، فاز شفاف بالایی به عنوان عصاره آنزیم پلی‌فنول اکسیداز جمع‌آوری گردید. میزان فعالیت آنزیم با استفاده از روش Benjakul و Nirmal (۲۰۰۹ الف) به صورت رنگ‌سنجدی پیوسته با استفاده از ترکیب^۱ L-DOPA به عنوان سوبسترا با اندکی تغییرات اندازه‌گیری گردید.

روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها
 تمامی آزمایش‌ها در سه تکرار انجام گرفت. برای بررسی طبیعی بودن داده‌ها از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف و برای بررسی همگنی از آزمون Leven استفاده شد. برای بررسی اثرهای معنی‌دار شاخص بین گونه‌ها از آنالیز چند متغیره و مقایسه میانگین داده‌ها و آزمون دانکن (در سطح ۵ درصد) از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۷) استفاده شد.

نتایج

میزان فلوروتانین استخراج شده توسط حلال‌های متانول ۱۰۰٪ و٪ ۷۰ در عصاره‌های اولیه و اتیل استاتی


تعیین گونه شده و سپس در سایه خشک گردیدند. *Nizimuddinia*, *Sargassum ilicifolium zanardinii*, *Stoechospermum marginatum*, *cristaeolium* بودند. جلبک‌های خشک شده با استفاده خردکن خانگی تا حد ممکن پودر و تا هنگام عصاره‌گیری در کیسه‌های پلاستیکی زیپ‌دار در فریزر (۱۸- درجه سانتی‌گراد) نگهداری شدند. عصاره‌گیری از جلبک‌ها با حلال‌های متانول ۱۰۰٪ و متانول ٪ ۷۰ (با آب) انجام شد. ۱۰۰ گرم پودر جلبک با نسبت ۱ به ۴ (وزنی/حجمی) با حلال مخلوط و به مدت ۲۴ ساعت در تاریکی بهم زده و با استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره ۱ صاف گردید. عصاره به دست آمده از این مرحله "عصاره اولیه" نامیده شد. در ادامه، عصاره اولیه به ترتیب با حلال کلروفرم و اتیل استات با نسبت ۱ به ۲ (حجمی/حجمی) شستشو داده شد. محلول حاصل از شستشوی عصاره اولیه با اتیل استات، پس از جداسازی و جمع‌آوری به عنوان "عصاره اتیل استاتی" در نظر گرفته شد (Liu, 2015).

استخراج و شناسایی ترکیبات فلوروتانین
 ترکیبات فلوروتانین عصاره اتیل استاتی به دست آمده از جلبک *N. zanardinii* در ابتدا با استفاده از ستون سیلیکاژل خالص‌سازی و سپس روی کاغذهای TLC بارگذاری گردیدند. ۱۰۰ گرم سیلیکا با متانول مخلوط و به دقت وارد ستون شیشه‌ای (۶۰×۲/۵ cm) گردید. ۵ گرم عصاره روی ستون بارگذاری و شستشو با این-هگران ۱۰۰٪ و در ادامه با نسبت‌های مختلف اتیل استات/متانول (۱:۱۰، ۱:۹، ۱:۸، ۱:۷، ۱:۶، ۱:۵، ۱:۴، ۱:۳، ۱:۲، ۱:۱ و ۰:۱) انجام گرفت. پس از جمع‌آوری فراکشن‌ها، برای شناسایی ترکیبات مشابه در هر فراکشن از TLC (Merck Co, Germany) بر اساس روش توسعه داده شده Nakamura و همکاران (۱۹۹۶) استفاده گردید. آشکارسازی لکه‌ها با استفاده از کابینت UV و زیر نور ماوراء بنفش انجام گرفت.

^۱ L-3, 4-dihydroxyphenyl alanine (L-DOPA)

N. zanardinii به طور معنی‌داری نسبت به سایر گونه‌ها بالاتر بود ($p < 0.05$). در مقایسه دو حلال متانول ۱۰۰٪ و ۷۰٪، در تمامی موارد، بهجز عصاره اتیل استاتی جلبک‌های *S. marginatum* و *S. illicifolium* میزان فلوروتانین در حلول متانول ۱۰۰٪ نسبت به ۷۰٪ بالاتر بود ($p < 0.05$). در هر دو حلال، در تمامی جلبک‌ها میزان فلوروتانین‌ها در عصاره‌های اتیل استاتی نسبت به عصاره‌های اولیه بالاتر بود ($p < 0.05$).

جلبک‌های قهوه‌ای *S. marginatum* و *S. cristae folium* در شکل ۱ نشان داده شده است. بالاترین میزان فلوروتانین (میلی‌گرم فلوروگلوسینول در گرم عصاره، mg PHG/g) در میان تیمارهای مختلف در عصاره اتیل استاتی جلبک *S. zanardinii* به میزان ۱۳/۲۱ mg PHG/g داشت. در مقایسه گونه‌های مختلف جلبکی، در هر دو تیمار متانول ۱۰۰٪ و ۷۰٪، میزان فلوروتانین در




شکل ۱: ترکیبات فلوروتانین‌های مختلف موجود در فراکشن اتیل استاتی جلبک *N. zanardinii* (PHG: فلوروگلوسینول)
Figure 1: The various phlorotannins compounds present in the ethyl-acetate fraction of *N. zanardinii* (PHG: Phloroglucinol)

اتیل استاتی جلبک‌های *S. marginatum* و *S. illicifolium* میزان مهار رادیکال آزاد در عصاره‌های حلال ۱۰۰٪ نسبت به ۷۰٪ به طور معنی‌داری بالاتر بود ($p < 0.05$). در مقایسه گونه‌های مختلف جلبکی، توانایی مهار DPPH تقریباً در تمامی موارد (بهجز عصاره اولیه متانول ۱۰۰٪) در *N. zanardinii* نسبت به سایر گونه‌ها به طور معنی‌داری بالاتر بود ($p < 0.05$). در مقایسه دو عصاره اولیه و اتیل استاتی، در تمامی گونه‌ها میزان بالاتری از مهار در عصاره اتیل استاتی نسبت به عصاره اولیه مشاهده گردید.


ترکیبات فلوروتانین‌های موجود در عصاره اتیل استاتی و *N. zanardinii* در شکل ۲ نشان داده شده است. ترکیبات جداسازی شده از این جلبک شامل فلوروگلوسینول، ایکول، دیایکول و بیایکول بود.

توانایی مهار رادیکال آزاد DPPH در عصاره‌های مختلف گونه‌های قهوه‌ای جلبک‌های *S. marginatum* در شکل ۳ نشان داده شده است. بالاترین میزان مهار DPPH به میزان ۰.۷۲/۶۴٪ در عصاره اتیل استاتی بدست آمده از حلول متانول ۱۰۰٪ در جلبک *N. zanardinii* وجود داشت. از نظر نوع حلال، در بیشتر موارد (بهجز عصاره



شکل ۲: میزان فلوروتانین در عصاره‌های اولیه و اتیل استاتی جلبک‌های قهوه‌ای (حروف متفاوت انگلیسی کوچک بیانگر تفاوت معنی‌دار شاخص بین گونه‌های مختلف جلبکی می‌باشد. حروف متفاوت انگلیسی بزرگ بیانگر تفاوت معنی‌دار شاخص در هر عصاره بین دو نوع حلال متانول ۱۰۰٪ و ۷۰٪ می‌باشد)

Figure 2: Phlorotannins content of first and ethyl-acetate extracts of brown seaweeds (Different small English letters show significant difference of index between various seaweeds. Different large English letters shows significant difference of index between two solvents i.e. methanol 100% and 70%)




شکل ۳: میزان مهار رادیکال آزاد DPPH در عصاره‌های اولیه و اتیل استاتی (۱ میلی‌گرم/میلی‌لیتر) جلبک‌های قهوه‌ای (توضیحات حروف معنی‌داری در شکل ۱ ذکر شده است)

Figure 3: DPPH free-radical scavenging of first and ethyl-acetate extracts (1 mg/ ml) of brown seaweeds (more explanation about significant letters are listed in the caption of Figure 1)

بود. در مقایسه دو حلال، در تمامی موارد به جز عصاره اتیل استاتی *S. illicifolium* و *S. marginatum* میزان احیاء در متانول ۱۰۰٪ نسبت به متانول ۷۰٪ بالاتر بود. مقایسه عصاره‌های نشان داد که در تمامی موارد قدرت احیاء در عصاره‌های اتیل استاتی نسبت به عصاره اولیه به طور معنی‌داری بالاتر بوده است ($p < 0.05$).

میزان قدرت احیاء یون آهن در عصاره‌های اولیه و اتیل استاتی جلبک‌های مختلف در شکل ۴ نشان داده شده است. بالاترین میزان احیاء در عصاره اتیل استاتی حلال متانول ۱۰۰٪ جلبک *N. zanardinii* و برابر با ۰/۹۶ بود. در مقایسه گونه‌های مختلف جلبکی در بیشتر موارد *N. zanardinii* $>$ *S. cristaefolium* $>$ *S. illicifolium* $>$ *S. marginatum*




شکل ۴: میزان قدرت احیاء یون آهن (جذب در ۷۰۰ نانومتر) در عصاره‌های اولیه و اتیل استاتی (۱ میلی‌گرم/میلی‌لیتر) جلبک‌های قهوه‌ای (توضیحات در شکل ۱ ذکر شده است)

Figure 4: Ferric reducing power (Abs at 700 nm) of first and ethyl-acetate extracts (1 mg/ml) of brown seaweeds (more explanation about significant letters are listed in the caption of Figure 1)

عصاره‌های حلال مтанول ۱۰۰٪ به طور معنی‌داری نسبت به مтанول ۷۰٪ بالاتر بود ($p < 0.05$). در مقایسه گونه‌های مختلف جلبکی، میزان بازدارندگی در تمامی موارد به *N. zanardinii* $>$ *S. illicifolium* $>$ *S. marginatum* $>$ *S. cristaefolium* بود. در مقایسه دو عصاره، در تمامی جلبک‌ها میزان بازدارندگی در عصاره اتیل استاتی نسبت عصاره اولیه به طور معنی‌داری بالاتر بود ($p < 0.05$).

تأثیر عصاره‌های مختلف به دست آمده از جلبک‌های قهوه‌ای در بازدارندگی آنزیم پلیفنول اکسیداز استخراجی از میگوی وانامی در شکل ۵ نشان داده شده است. بالاترین میزان بازدارندگی در عصاره اتیل استاتی حلال مtanول ۱۰۰٪ جلبک *N. zanardinii* و برابر با ۷۱/۱٪ به دست آمد که قابل مقایسه با اسید آسکوربیک با بازدارندگی برابر با ۷۲/۵٪ بود. در مقایسه دو حلال، در تمامی موارد به جز عصاره اتیل استاتی جلبک *S. marginatum* میزان بازدارندگی آنزیمی در تمامی گونه‌های جلبکی در



شکل ۵: میزان بازدارندگی آنزیم پلیفنول اکسیداز در عصاره‌های اولیه و اتیل استاتی (۱ میلی‌گرم/میلی‌لیتر) جلبک‌های قهوه‌ای (توضیحات معنی‌داری در شکل ۱ ذکر شده است)

Figure 5: Polyphenol oxidase inhibition of first and ethyl-acetate extracts of brown seaweeds (more explanation about significant letters are listed in the caption of Figure 1)

بحث

نتایج پژوهش‌های گذشته نشان می‌دهد که میزان فنل کل در فراکشن‌های مختلف با افزایش قطبیت حلال، افزایش می‌یابد (Chakraborty *et al.*, 2013; Taheri, 2016) و عموماً فراکشن اتیل استاتی دارای میزان فلوروتانین بالاتری نسبت به دیگر فراکشن‌ها در بیشتر جلبک‌های قهقهه‌ای می‌باشد (Chakraborty *et al.*, 2013).

مقایسه میزان فلوروتانین در گونه‌های مختلف جلبک‌های قهقهه‌ای در این مطالعه نشان داد که بین گونه‌های مختلف تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین بالاترین میزان فلوروتانین در جلبک قهقهه‌ای *N. zanardinii* (۱۳/۲۱٪) می‌گرم فلوروگلوسینول در گرم عصاره وجود داشت. میلی گرم Taheri (۲۰۱۶) میزان فنول کل در عصاره اولیه متابولی این جلبک را ۲/۱۴٪ (میلی گرم/ گرم عصاره) اندازه گیری نمود که پایین‌تر از عصاره اولیه در تیمار متابولی مطالعه حاضر (۶/۷۵٪) میلی گرم/ گرم عصاره) می‌باشد. مقایسه میزان فنل کل در عصاره‌های جلبکی مشابه بین مطالعات مختلف، به دلیل تفاوت در فاکتورهای متغیر استخراج عصاره، سنجش آن و تنوع بیولوژیک، حتی در گونه‌های مشابه مشکل است، زیرا متغیرهای فرایند استخراج از قبیل نوع حلال و قطبیت آن، درجه حرارت و زمان استخراج، نسبت نمونه به حلال و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه‌ها، بر میزان استخراج فلوروتانین و ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی عصاره تأثیرگذار است. از سوی دیگر، چنین تفاوت‌هایی ممکن است به دلایل فصول، Taheri, 2016.

در مطالعه حاضر، بررسی لکه‌های عصاره‌های اتیل استاتی روی کاغذ TLC و مقایسه آن با ترکیب استاندارد (فلوروگلوسینول) نشان داد که عصاره فلوروتانینی جلبک (فلوروگلوسینول) از *N. zanardinii* عمده‌تر از فلوروگلوسینول، I^{k} کول، $\text{D}^{\text{i}}\text{I}^{\text{k}}$ کول و $\text{B}^{\text{i}}\text{I}^{\text{k}}$ کول تشکیل شده است. با توجه به اطلاع مؤلفین و جستجو در مقالات منتشره، در هیچ پژوهشی تاکنون ترکیبات فلوروتانین‌های جلبک *N. zanardinii* شناسایی نشده است و داده حاضر اولین گزارش از نوع ترکیبات فلوروتانین در این جلبک می‌باشد. با این وجود در دهه اخیر انواع مختلفی از فلوروتانین در گونه‌های مختلفی از

میزان فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی جلبک‌های دریایی به میزان زیادی در ارتباط با روش استخراج می‌باشد. به طور مرسوم از حلال‌های آلی متابول یا اتانول برای استخراج پلی‌فنول‌ها در جلبک‌های دریایی استفاده می‌گردد، زیرا کارایی بهتری نسبت به آب در استخراج ترکیبات فنولی، به ویژه فلوروتانین‌ها دارند (Shibata *et al.*, 2008). مقایسه میزان فنول استخراج شده در ۴ گونه جلبکی با استفاده از دو حلال متابول ۱۰۰٪ و متابول ۷۰٪ در مطالعه حاضر نشان داد که متابول ۱۰۰٪ کارایی بالاتری در استخراج این گروه از ترکیبات در مقایسه با ترکیب متابول و آب داشته است (شکل ۱). از آنجایی که فلوروتانین‌ها بخش اعظمی از ترکیبات فنولی موجود در جلبک‌های قهقهه‌ای را تشکیل می‌دهند، بهنظر می‌رسد که دلیل کارایی بالاتر متابول ۱۰۰٪ نیز قابلیت بالای حل شدن فلوروتانین‌ها در این حلal در مقایسه با سایر حلال‌ها باشد. Cho و همکاران (۲۰۰۷) در مقایسه کارایی حلال‌های اتانول، آب و کلروفرم در استخراج ترکیبات فنولی از جلبک قهقهه‌ای *Sargassum siliqueastrum* ذکر نمودند که میزان فنول در عصاره اتانولی نسبت به عصاره آبی و کلروفرمی به طور معنی‌داری بالاتر بوده است. به طور کلی، هنگام استفاده از حلال‌های غیرقطبی، ترکیبات فنولی، ترپن‌وئیدها و آلکالوئیدهایی که قطبیت پایینی دارند، استخراج می‌گردد در حالی که در حلال‌های قطبی، بیش‌تر ترکیبات قطبی متصل به قندها یا پروتئین‌ها، گلیکوزیدها، تانن‌ها و نمک‌ها در عصاره می‌آید (Cho *et al.*, 2007). در مطالعه حاضر میزان فلوروتانین در فراکشن اتیل استاتی در تمامی جلبک‌ها در مقایسه با عصاره اولیه به طور معنی‌داری بالاتر بود. عموماً فلوروتانین‌ها را می‌توان با متابول، آب یا اتانول و در ادامه با هگزان، کلروفرم، بوتانول، اتیل استات یا استون از پودر جلبکی استخراج نمود. فراکشن اتیل استات و استون محتوى فلوروتانین و سایر فراکشن‌ها برای حذف ترکیبات غیرفنولیک می‌باشد (Liu, 2015) و همکاران (Liu, 2004) نشان دادند که ۸۲٪ از عصاره خام فنولی موجود در فراکشن با میزان فنول کل بالا، فلوروتانین‌ها هستند.

برای غیرفعال سازی رادیکال های آزاد به اشتراک بگذارند (Liu, 2015). در مقایسه حلال های مختلف در این پژوهش، نتایج نشان داد که حلال های آلی به تنها بی کارایی بهتری در جذب مهار رادیکال آزاد در مقایسه با حلال در ترکیب با آب دارند. نتایج سایر محققین نیز نشان می دهد که تغییر در قطبیت حلال، کارایی آن را در استخراج گروه خاصی از ترکیبات آنتی اکسیدانی کاهش می دهد و بر ویژگی های آنتی اکسیدانی عصاره تأثیر می گذارد (Zhou and Yu, 2004).

احیاء آهن (III) اغلب به عنوان معیاری برای قابلیت الکترون دهی به کار می رود. این مسئله مکانیسم مهمی را در فرایند اکسیداسیون ترکیب های فنولی تشکیل می دهد (Ganesan et al., 2008). در مطالعه حاضر، بالاترین قدرت احیاء کنندگی در عصاره های اتیل استاتی تیمار مтанول ۱۰۰٪ جلبک *N. zanardinii* مشاهده گردید که منطبق با میزان فلوروتانین در این گونه بود. نتایج این مطالعه با نتایج Wang و همکاران (2009) قبل مقایسه است که میزان بالایی قدرت احیاء کنندگی (معادل اسید آسکوربیک mg/g ۴۲۶) در فرآکشن اتیل استاتی جلبک *Rhodomela confervoides* را در مقایسه با سایر فرآکشن های عصاره گزارش نمودند. Chakraborty و همکاران (2013) گزارش نمودند که قدرت احیاء عصاره اتیل استاتی در جلبک های قرمز نسبت به عصاره های ان- هگزانی و دی کلرو متانی بالاتر بوده است. توانایی احیاء یک عصاره به میزان زیادی ناشی از وجود احیاء کننده ها در آن می باشد. از این رو، به نظر می رسد که بالاتر بودن قابلیت احیاء در فرآکشن اتیل استاتی نسبت به عصاره اولیه به دلیل وجود مقادیر بالاتر ترکیبات فنولی در این فرآکشن بوده است (Ganesan et al., 2008). ارتباط خطی بین میزان ترکیبات فنولی و خاصیت آنتی اکسیدانی در بسیاری از عصاره های جلبکی به اثبات رسیده است (Wang et al., 2009; Taheri, 2016).

نتایج میزان بازدارندگی آنزیم پلی فنول اکسیداز در عصاره های اولیه و اتیل استاتی جلبک های قهقهه ای نشان داد که بالاترین میزان بازدارندگی در عصاره فرآکشن اتیل استاتی جلبک *N. zanardinii* وجود داشته است. تطابق شکل ۵ (میزان بازدارندگی آنزیم PPO) با

جلبک قهقهه ای استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. Shibata و همکاران (۲۰۰۸) ترکیبات فلورو گلوسینول، اکول، فلوروفوکوفوراکول ای، دی اکول و ۸، ۸- بی اکول را از عصاره اتیل استاتی جلبک قهقهه ای *Ecklonia cava* جداسازی نمودند. Nakamura و همکاران (۱۹۹۶) فرآکشن پلی فنولی جلبک قهقهه ای *Eisenia bicyclis* را خالص سازی و ترکیبات فلوروتانینی از قبیل فلورو گلوسینول و پلیمرهای آن شامل اکول، استخراج و شناسایی کردند. Kang و همکاران (۲۰۰۴) عصاره اتیل استاتی بدست آمده از جلبک قهقهه ای *Ecklonia stolonifera* فلورو گلوسینول، اکول، فلوروفوکوفوراکول ای، دی اکول و ۸، ۸- بی اکول را ای استولونول با استفاده از TLC شناسایی گردید. نوع و میزان فلوروتانین موجود در هر جلبک قهقهه ای با توجه به نوع گونه، زیستگاه، بلوغ، شرایط استخراج، روش های شناسایی و سایر فاکتورها می تواند متغیر باشد (Kang et al., 2004; Chowdhury et al., 2014).

سنجهش میزان مهار رادیکال های آزاد DPPH یکی از پر کاربرد ترین روش های اندازه گیری خاصیت آنتی اکسیدانی در ترکیبات فنولی و ترکیبات آروماتیک آمیزی می باشد (Cho et al., 2007). در مطالعه حاضر، بالاترین میزان تغییر رنگ یا خاصیت آنتی اکسیدانی (۷۲/۶۴٪) در عصاره های اتیل استاتی تیمار مтанول ۱۰۰٪ جلبک *N. zanardinii* مشاهده گردید (شکل ۱). همچنین فرآکشن های اتیل استات در این تمامی گونه ها در مقایسه با عصاره های اولیه میزان بالاتری را از مهار رادیکال آزاد DPPH نشان دادند. از سوی دیگر، فرآکشن های اتیل استاتی دارای میزان بالاتری از فنول نیز بودند. از این رو، به نظر می رسد که جذب رادیکال آزاد به دلیل وجود فنول ها بوده است. Wang و همکاران (2009) نیز ارتباط مشابهی بین میزان بالای فلوروتانین ها و میزان باردارندگی در فرآکشن های اتیل استاتی گزارش نمودند. ترکیبات فنولی دارای گروه های هیدور کسیل هستند که با اتصالی ضعیف به حلقه های آروماتیک فنول متصل می باشد. از این رو، به راحتی می توانند یک اتم هیدروژن یا الکترون را

فلوروتانینی می‌تواند وجود استخلاف‌های رزورسینول در ساختار آنهاست. به علاوه، نتایج بخش قبلی مطالعه حاضر نشان داد که فراکشن اتیل‌استاتی جلبک‌های *N. zanardinii* دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی بالایی می‌باشند (شکل‌های ۳ و ۴). از این‌رو، به نظر می‌رسد که بخشی از خاصیت بازدارندگی بالای این جلبک به دلیل توانایی آنتی‌اکسیدانی بالای آن است.

جلبک‌های دریایی یکی از منابع غنی ترکیبات زیست‌فعال طبیعی می‌باشند. پژوهش حاضر نشان داد که میزان این ترکیبات در گونه‌های مختلف جلبک‌های قهقهه‌ای با توجه به نوع گونه و حلال استخراجی متفاوت است و متانول و در ادامه اتیل‌استات حلال‌های مناسبی جهت استخراج فلوروتانین‌ها از جلبک‌های قهقهه‌ای بهویژه در جلبک *N. zanardinii* می‌باشند. فلوروتانین‌های موجود در جلبک *N. zanardinii* شامل گسترده‌ای از ترکیبات فنولی شامل فلوروگلوسینول، اکول، دی‌اکول و بی‌اکول با خصوصیات آنتی‌اکسیدانی و توانایی بازدارندگی آنزیم پلی‌فنول اکسیداز می‌باشند. با توجه به پراکنش بالای این جلبک در سواحل جنوبی ایران، استخراج و خالص‌سازی فلوروتانین‌ها و استفاده از این ترکیبات در محصولات مختلف می‌تواند به عنوان راهکاری در جهت افزایش بهره‌وری از جلبک‌های سواحل جنوبی کشور و ایجاد ارزش افزوده مطرح باشد.

تشکر و قدردانی

از کارشناسان آزمایشگاه کروماتوگرافی دانشگاه هرمزگان و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار تقدیر و تشکر می‌گردد.

منابع

نصیری، ا.، موسوی نسب، م.، شکر فروش، س.ش. و گلمکانی، م.ت.، ۱۳۹۳. بررسی اثر انسانس آویشن شیرازی (*Zataria multiflora* Boiss) بر مهار آنزیم پلی‌فنول اکسیداز و روند ملانوزیس در میگو پا سفید غربی (*Litopenaeus vannamei*). مجله علمی شیلات ایران. ۱۰۹-۱۱۸. ۲۳(۳):

شکل‌های ۱، ۳ و ۴ (میزان فلوروتانین و خاصیت آنتی‌اکسیدانی) نشان داد که در فراکشن اتیل‌استاتی *N. zanardinii* که میزان بالاتری از فلوروتانین و مهار رادیکال DPPH وجود داشته است، میزان بازدارندگی آنزیمی نیز بالاتر بوده است. به عبارت دیگر، بین میزان بازدارندگی آنزیمی با میزان فلوروتانین و خاصیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ها رابطه‌ای خطی وجود دارد. این نتیجه‌گیری با پژوهش Kang و همکاران (۲۰۰۴) در تطابق است که عصاره‌های ۱۷ گونه مختلف جلبک را بررسی نمودند و نشان دادند که فلوروتانین‌های جداسازی شده از جلبک قهقهه‌ای *Ecklonia stolonifera* دارای توانایی مهار آنزیم پلی‌فنول اکسیداز قارچ با استفاده از سوبستراتی ۱-تیروزین می‌باشند. آنها نتیجه‌گیری نمودند که برخی از مشتقات فلوروتانین از قبیل اکول و دی‌اکول بازدارندگه‌های غیر رقابتی آنزیم پلی‌فنول اکسیداز هستند در حالی که سایر فلوروتانین‌ها مانند فلوروگلوسینول و اکستولونول^۱ بازدارندگه‌های رقابتی می‌باشند. Cha و همکاران (۲۰۱۱) با بررسی فعالیت بازدارندگی آنزیم تیروزیناز با استفاده از عصاره‌های ۴۳ گونه مختلف از جلبک‌های دریایی، نشان دادند که عصاره آبی جلبک *Sargassum silquastrum* و *Ecklonia cava* بالاترین میزان بازدارندگی و قابل مقایسه با کوجیک اسید می‌باشند. آنها نتیجه‌گیری نمودند که میزان بالای بازدارندگی در این دو گونه جلبک احتمالاً به دلیل وجود میزان بالای ترکیبات پیچیده پلی‌فنولی در آنهاست. Li و همکاران (۲۰۱۷) گزارش نمودند که عصاره پلی‌فنولی به دست آمده از جلبک *Porphyra yezoensis* توانایی مهار آنزیم پلی‌فنول اکسیداز در میگوی وانمی را طی نگهداری در یخچال دارد. پژوهش‌ها نشان داده است که وجود استخلاف رزورسینول در ساختار مولکولی ترکیب بازدارندگه، یکی از پیش شرط‌های اصلی در مکانیسم بازدارندگی آنزیم پلی‌فنول اکسیداز می‌باشد (Loizzo et al., 2012). از سوی دیگر، اغلب فلوروتانین‌های جداسازی شده از جلبک‌های قهقهه‌ای دارای استخلاف‌های متعدد رزورسینول در ساختار خود می‌باشند (Shibata et al., 2008). از این‌رو، دلیل بازدارندگی آنزیمی ترکیبات

^۱ Eckstolonol

- Cha, S.H., Ko, S.C., Kim, D. and Jeon, Y.J., 2011.** Screening of marine algae for potential tyrosinase inhibitor: Those inhibitors reduced tyrosinase activity and melanin synthesis in zebrafish. *The Journal of Dermatology*, 38(4): 354-363. DOI:10.1111/j.1346-8138.2010.00983.x
- Chakraborty, K., Joseph, D. and Praveen, N.K., 2013.** Antioxidant activities and phenolic contents of three red seaweeds (Division: Rhodophyta) harvested from the Gulf of Mannar of Peninsular India. *Journal of Food Science and Technology*, 52(4): 1924-1935. DOI: 10.1007/s13197-013-1189-2
- Chowdhury, M.T.H., Bangoura, I., Kang, J.Y., Park, N.G., Ahn, D.H. and Hong, Y.K., 2011.** Distribution of phlorotannins in the brown alga *Ecklonia cava* and comparison of pretreatments for extraction. *Fisheries and Aquatic Science*, 14(3): 198-204. DOI:10.5657/FAS.2011.0198
- Cho, S.H., Kang, S.E., Cho, J.Y., Kim, A.R., Park, S.M., Hong, Y.K. and Ahn, D.H., 2007.** The antioxidant properties of brown seaweed (*Sargassum siliquastrum*) extracts. *Journal of Medicinal Food*, 10(3): 479–85. DOI: 10.1089/jmf.2006.099
- Ganesan, P., Kumar, C.S. and Bhaskar, N., 2008.** Antioxidant properties of methanol extract and its solvent fractions obtained from selected Indian red seaweeds. *Bioresource Technology*, 99(8): 2717-2723. DOI: 10.1016/j.biortech.2007.07.005
- Kang, H.S., Kim, H.R., Byun, D.S., Son, B.W., Nam, T.J. and Choi, J.S., 2004.** Tyrosinase Inhibitors Isolated from the Edible Brown Alga *Ecklonia stolonifera*. *Archives of Pharmacal Research*, 27(12): 1226-1232. DOI: 10.1007/BF02975886
- Li, Y., Yang, Z. and Li, J., 2017.** Shelf-life extension of Pacific white shrimp using algae extracts during refrigerated storage. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 97(1): 291-298. DOI:10.1002/jsfa.7730
- Liu, X., 2015.** Extraction and Antioxidant Activity of Phlorotannins from Edible Brown Algae. Master thesis, North Carolina State University. 127 P.
- Loizzo, M. R., Tundis, R. and Menichini, F., 2012.** Natural and Synthetic Tyrosinase Inhibitors as Antibrowning Agents: An Update. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 11(4): 378-398. DOI:10.1111/j.1541-4337.2012.00191.x
- Nakamura, T., Nagavama, K., Uchida, K. and Tanaka, R., 1996.** Antioxidant Activity of Phlorotannins Isolated from the Brown Alga *Eisenia bicyclis*. *Fisheries Science*, 62(6): 923-926. DOI: 10.2331/fishsci.62.923
- Nirmal, N.P. and Benjakul, S., 2011.** Use of tea extracts for inhibition of polyphenoloxidase and retardation of quality loss of Pacific white shrimp during iced storage. *LWT - Food Science and Technology*, 44(4): 924-932. DOI: 10.1016/j.lwt.2010.12.007
- Nirmal, N.P. and Benjakul, S., 2009a.** Effect of ferulic acid on inhibition of polyphenoloxidase and quality changes of

- Pacific white shrimp (*Litopenaeus vannamei*) during iced storage. *Food Chemistry*, 116: 323–331. DOI: 10.1016/j.foodchem.2009.02.054
- Nirmal, N.P. and Benjakul, S., 2009b.** Melanosis and quality changes of Pacific white shrimp (*Litopenaeus vannamei*) treated with catechin during iced storage. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 57(9): 3578-3586. DOI:10.1021/jf900051e
- Nirmal, N.P. and Benjakul, S., 2012.** Effect of Green Tea Extract in Combination with Ascorbic Acid on the Retardation of Melanosis and Quality Changes of Pacific White Shrimp during Iced Storage. *Food and Bioprocess Technology*, 5(8): 2941–2951. DOI: 10.1007/s11947-010-0483-5
- Shibata, T., Kawaguchi, S., Hama, Y., Inagaki, M., Yamaguchi, K. and Nakamura, T., 2004.** Local and chemical distribution of phlorotannins in brown algae. *Journal of Applied Phycology*, 16(4): 291–296. DOI: 10.1023/B:JAPH.0000047781.24993.0a
- Shibata, T., Ishimaru, K., Kawaguchi, S., Yoshikawa, H. and Hama, Y., 2008.** Antioxidant activities of phlorotannins isolated from Japanese Laminariaceae. *Journal of Applied Phycology*, 20: 705-711. DOI: 10.1007/s10811-007-9254-8
- Taheri, A., 2016.** Antioxidant activity in some Iranian seaweed species from Chabahar. *Iranian Journal of Fisheries Sciences*, 15(2): 802-817. DOI: 20.1001.1.15622916.2016.15.2.14.0
- Wang, T., Jonsdottir, R. and Olafsdottir, G., 2009.** Total phenolic compounds, radical scavenging and metal chelation of extracts from Icelandic seaweeds. *Food Chemistry*, 116: 240–248. DOI: 10.1016/j.foodchem.2009.02.041
- Zakipour Rahimabadi, E., Zarrin, K., Zarei, M., Gaffari, M. and Rahnama, M., 2016.** Effects of genistein on melanosis and microbial quality of *Litopenaeus vannamei* during ice storage. *Iranian Journal of Fisheries Sciences*, 15(1): 436-445. DOI: 20.1001.1.15622916.2016.15.1.34.8
- Zhou, K. and Yu, L., 2004.** Effects of extraction solvent on wheat bran antioxidant activity estimation. *Food Science and Technology (LWT)*, 37: 717-721. DOI:10.1016/j.lwt.2004.02.008

Antioxidant properties and Vannamei shrimp (*Litopenaeus vannamei*) polyphenoloxidase inhibitory activity of different brown seaweeds extracts

Sharifian S.^{1*}; Shahbanpour B.²

* sharifian.salim@hotmail.com

1- Fisheries Department, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran

2- Seafood Processing Group, Department of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

Abstract

At the present study, phlorotannin content, antioxidant properties (DPPH free-radical scavenging and ferric reducing power) and inhibitory of polyphenoloxidase enzyme from Vannamei shrimp (*Litopenaeus vannamei*) in different extracts (first and ethyl-acetate) extracted from brown seaweeds *Nizimuddinia zanardinii*, *Sargassum ilicifolium*, *Sargassum cristaefolium* and *Stoechospermum marginatum* with methanol 100% and 70% were investigated. Among different seaweeds species, the highest amount of phlorotannin (13.21 mg PHG/g), DPPH scavenging (72.64%) and reducing power (0.96) were measured in the ethyl-acetate extract of *N. zanardinii* in methanol 100% treatment. Phlorotannin compounds including Eckol, Dieckol, Bieckol were identified by using of TLC in the ethyl acetate extract of *N. zanardinii*. The results showed that phlorotannin content and antioxidant activity varies in different species depending on seaweed specie, type of extract and type of extraction solvent. The amount of Vannamei shrimp polyphenoloxidase inhibition was different between various extract and seaweeds; and the highest amount of inhibition (71.11%) was measured in the ethyl-acetate extract of *N. zanardinii*. The results of present study showed that seaweed extracts with high amount of phlorotannins content could be considered as natural and safe polyphenoloxidase enzyme inhibitor.

Keywords: Brown seaweed, Antioxidant properties, Polyphenoloxidase inhibition, Vannamei shrimp (*Litopenaeus vannamei*)

*Corresponding author