

مقاله علمی - پژوهشی:**تأثیر نانوذره سلنیوم، ویتامین‌های C و E ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد،
شاخص‌های ایمنی و آنزیم‌های کبدی فیل‌ماهی (*Huso huso*) پرورشی جوان**علی حسین پورزلتی^۱، میر حامد سید حسنی^{*}^۱، حسین آدینه^۲، تورج سهرابی^۱^{*}mirhamedhassani@yahoo.com۱-انستیتو تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. رشت
ایران. صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۳۴۶۴۲-دانشگاه گنبد کاووس، گروه شیلات- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گنبدکاووس، ایران. صندوق پستی:
۴۹۷۱۷۹۹۱۵۱

تاریخ پذیرش: دی ۱۴۰۰

تاریخ دریافت: شهریور ۱۴۰۰

چکیده

در آزمایش حاضر، تأثیر مخلوطی از مکمل‌های ریزپوشانی شده نانوذره سلنیوم (اندازه ذره ۳۰ نانومتر) (شرکت پیشگامان نانو مواد، خراسان)، ویتامین‌های C و E (۰/۱، ۰/۰ و ۰/۳۰ میلی‌گرم در کیلوگرم؛ جیره A)، (۰/۲، ۰/۰ و ۰/۳۰ میلی‌گرم در کیلوگرم؛ جیره B)، (۰/۳، ۰/۰ و ۰/۹۰ میلی‌گرم در کیلوگرم؛ جیره C) و جیره شاهد (فاقد مکمل؛ جیره D) بر شاخص‌های رشد، کارایی غذا، سیستم ایمنی و آنزیم‌های کبدی ۱۲۰ عدد فیل ماهی با میانگین وزن اولیه $77/34 \pm 1/38$ گرم پرورش یافته در تانک‌های فایبرگلاس نیم‌تنی (آبرسانی شده با مخلوطی از آب چاه و رودخانه) در قالب ۴ تیمار (هربیک با ۳ تکرار) به مدت ۱۰ هفت‌هه مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان ۲ درصد وزن بدن و ۳ بار در روز تغذیه شدند. در انتهای آزمایش، وزن نهایی (۵ درصد)، درصد افزایش وزن بدن (۳/۸۴ درصد)، نرخ رشد ویژه (۱/۸۹ درصد در روز) و رشد روزانه (۶/۲۳ درصد) در ماهیان تغذیه شده با جیره B به طور معنی‌داری بیشتر از جیره شاهد بود ($P<0.05$). فعالیت آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز (SGOT) و آلانین آمینوترانسفراز (SGPT) سرم نسبت به ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد بیشتر بود ($P<0.05$). اختلاف معنی‌داری در سطح ایمونوگلوبولین کل (Ig) سرم ماهیان تغذیه شده با جیره‌های B، C و شاهد مشاهده نشد ($P>0.05$ ، میزان کمپلمان سرم در ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد به طور معنی‌داری بیشتر از جیره‌های A و B بود ($P<0.05$) و اختلاف معنی‌داری در میزان لیزوژیم سرم ماهیان تیمار شاهد، A و B ثبت نگردید ($P>0.05$). نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن مقادیر ۰/۲، ۰/۰ و ۰/۳ میلی‌گرم در کیلوگرم نانوذره سلنیوم، ویتامین‌های C و E ریزپوشانی شده به جیره تجاری می‌تواند موجب افزایش معنی‌دار وزن نهایی و شاخص‌های رشد گردد، اما باید مطالعات بیشتری در مورد تأثیر نانوذره سلنیوم ریزپوشانی شده بر عملکرد کبد و شاخص‌های بیوشیمیایی این گونه صورت گیرد.

لغات کلیدی: *Huso huso*، نانوسلنیوم، ویتامین‌های C و E، شاخص‌های رشد، ضریب تبدیل غذا، سیستم ایمنی، آنزیم‌های کبدی^{*}نویسنده مسئول

مقدمه

پک به عنوان یک مکانیسم ذخیره‌ای عمل می‌کنند. ویتامین E بیشتر در محافظت علیه پراکسیداسیون لپید و سلنیوم بر علیه رادیکال‌های آزاد عمل می‌کند و کمبود هر یک با دیگری قابل جبران است. بنابراین، حتی در شرایط نامساعد محیطی انبارداری خوارک و پرورش، ترکیب نانوسلنیوم، ویتامین C و E در دامنه‌های خاص از طریق جلوگیری از انتشار رادیکال‌های آزاد یا رادیکال‌های آزاد Dabrowski and Ciereszko (ROS)^۱) (Khan et al., 2017) ممانعت از اکسیدشدن اسیدهای چرب غیراشبع بافت، افزایش ظرفیت ضد آنتی اکسیدانی و در نهایت افزایش متابولیسم و بازده خوارک (Taveekijakarn et al., 1996) و در نهایت رشد آبزی (Rojas, 2014) گردند. مطالعات نشان داده است که مکمل ترکیبی ویتامین E (۵۰ میلی‌گرم در کیلوگرم) و سلنیوم (۱۵۰ میلی‌گرم در کیلوگرم) موجب افزایش وزن و نسبت تبدیل خوارک در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Paralichthys Moniruzzaman et al., 2015; Lee et al., 2016)، ترکیب ویتامین C (۳۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم) و نانو ذره سلنیوم (۰/۶۸ میلی‌گرم در کیلوگرم) موجب ارتقاء عملکرد رشد، شاخص‌های خون، بیوشیمیابی و سیستم ایمنی گونه T. putitora (Khan et al., 2017) و الحاق ۱۵۰ میلی‌گرم کیلوگرم ویتامین C، ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم ویتامین E و ۰/۲ میلی‌گرم کیلوگرم سلنیوم موجب بقاء ۱۰۰ درصدی لارو تیلاپیای نیل (*Oreochromis niloticus*) در مقابل چالنج با انگل (Kim et al., 2003) Edwardsiella tarda در سال‌های اخیر شکل نانوی سلنیوم به بازار عرضه شده است (Khan et al., 2016) که دارای اثرات منحصر به‌فردی نظیر سطوح جذب بالا در دستگاه گوارش و زیست فراهمی می‌باشد (Albrecht et al., 2006) و نسبت به فرم‌های معدنی و آلی اثرات بهتری بر شاخص‌های رشد و فیزیولوژیک ماهی دارند (Khan et al., 2016). همچنین روش‌های مختلفی برای محصورسازی اسید اسکوربیک و آلفا-توکوفرول به منظور

در سالیان اخیر با وجود افزایش مزارع پرورش ماهیان خاویاری (عبدالحی و کرمی‌راد، ۱۳۹۷)، ضررها اقتصادی سنگین به دلیل شیوع بیماری‌های عفونی و تلفات به خصوص در مرحله لارو و بچه ماهی در تراکم بالا گزارش شده است. اغلب روش‌های درمانی شامل آنتی‌بیوتیک‌های و درمان‌های شیمیابی اغلب مؤثر نبوده و امروزه استفاده از روش‌های ارتقاء مکانیسم سیستم دفاع غیراختصاصی با استفاده از تحریک کننده‌ها و افزایش دهنده‌های سیستم ایمنی غیراختصاصی تغذیه‌ای و محرک‌های رشد (Wang et al., 2013) موجب کاهش حساسیت آبزیان به عوامل بیماری‌زا، بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش استفاده از مواد شیمیابی و داروها در آبزی‌پروری شده است (Nayak, 2010).

در ماهیان عنصر سلنیوم در سنتز پروتئین (Jamil, 2013; Khan et al., 2016) تولید هورمون رشد (Ewan, 1976; Jamil, 2013; Khan et al., 2016) و بیان چندین نوع سلنوپروتئین (Rotruck et al., 1973) نقش دارد. ماهیانی که مقدادر کافی سلنیوم دریافت نمی‌کنند، دچار نقص سیستم ایمنی شده و به انواع عفونت‌ها و بیماری‌ها حساس و در نهایت دچار کاهش رشد می‌گردند (Sritunyalucksana et al., 2011). از آنجایی که در جیره ماهیان پرورشی و بهخصوص پودر ماهی سلنیوم به حد کافی وجود ندارد (Rider et al., 2009)، افزودن سلنیوم در اشکال مختلف به جیره غذایی ماهیان توصیه می‌شود (Lorentzen et al., 1994؛ Wang and Lovell, 1997) اما در سال‌های اخیر توجه برخاستی هم‌افزایی و سینرژیک این ماده با عناصر معدنی و آلی معطوف شده است (Khan et al., 2017). چون اگرچه این ترکیب با برخی عناصر مانند آرسنیک، جیوه، کادمیوم، بیسموت، آنتیموان، نقره، مس، تنگستن و ژرمانیوم (Diplock and Hoekstra, 1976; Whanger, 1981؛ Levander, 1986) موجب افزایش سمیت در ماهیان می‌شود، اما فعل و انفعال تغذیه‌ای مثبت و قوی با ویتامین‌های E و C دارند (NRC, 2011؛ Khan et al., 2017) و از قابلیت قابل تعویض با یکدیگر برخوردارند و هر

^۱ Radical free oxygen (RFO)

با ۶۰ میلی لیتر آب مقطر در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد مخلوط و مخلوط ژله مانند به مدت سه دقیقه به وسیله هوموژنайزر با سرعت ۱۰۰۰ دور در دقیقه همگن و به مدت ۲۴ ساعت در بن ماری با دمای ۶۰ درجه سانتی گراد برای هیدراته شدن نگهداری شد. سپس مخلوط نانوسلنیوم، ویتامین های E و C به نسبت ۱:۳ با مواد پوشاننده به مدت ۳۰ دقیقه برای هر تیمار به صورت مجرا در قالب تیمارهای A (۰/۱)، ۳۰ و ۱۰۰ میلی گرم در کیلو گرم)، B (۰/۰۲)، ۲۰۰ و ۶۰ میلی گرم در کیلو گرم) و C (۰/۰۳)، ۹۰ و ۳۰۰ میلی گرم در کیلو گرم) مخلوط شدند (آدینه و همکاران، ۱۳۹۸). برای تیمار شاهد فقط از مواد پوشاننده بدون مکمل آنتی اکسیدانی استفاده شد. جهت خشک کردن انجمادی مکمل های ریز پوشانی شده همه تیمارها به مدت ۲۴ ساعت در دستگاه فریز درایر قرار داده شد. در ادامه ماده جامد متخلخل به دست آمده برای هر یک از تیمارها در هاون چینی به صورت مجرا خرد شد. از جیره (GFS1) شرکت فرادانه به عنوان جیره پایه استفاده شد. (جدول ۱). ۰/۵ گرم از مکمل آنتی اکسیدانی (نانوسلنیوم، ویتامین های E و C) ریز پوشانی شده به یک کیلو گرم غذای پودرشده اضافه و با آن مخلوط گردید. در مرحله بعد به جیره پودر شده آب اضافه شد و خمیر تهیه Pars Esfahan، GM₃₂ از چرخ گوشت صنعتی (Isfahan, Iran) با قطر صفحه ۳ میلی متر عبور داده شد و به صورت رشته های ماکارونی بیرون آمد پلت های خارج شده از چرخ گوشت روی سینی های توری گسترده و با یک فن با دمای ۴۵ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت خشک (Hardy and Barrows, 2002)، بسته بندی، شماره گذاری و در فریزر -۲۰ درجه سانتی گراد تا زمان مصرف، نگهداری شد.

کاهش اثر آب شویی و حفظ خواص ویتامینی آن نظری خشک کن پاششی، سرد کردن پاششی و خنک کردن پاششی، اکستروژن، بستر سیال، پوشاندن به وسیله لیپوزوم، متراکم کردن، میکرو امولسیون ها (آب در روغن یا روغن در آب) و کریستال های مایع (بازلی محبوب و همکاران، ۱۳۹۴) وجود دارد. چنین مواردی موجب کاهش آب شویی و خواص آنتی اکسیدانی این ویتامین ها می شوند. تحقیقات آدینه و همکاران (۱۳۹۸) نشان داد که سطوح مختلف مکمل آنتی اکسیدان ریز پوشانی شده نانوسلنیوم، ویتامین های E و C بر عملکرد رشد، ترکیبات بدن و برخی شاخص های بیوشیمیایی خون ماهی قزل الای رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*) تأثیر مثبت دارد. با این حال، اثرات سینرژیک این ریز مغذی ها بر بسیاری از فرآیندهای بیولوژیک مانند رشد، سیستم دفاعی آنتی اکسیدان (مانند SOD و CAT) و اینمی سایر ماهیان Fonseca *et al.*, 2013; Naderi *et al.*, 2017 به خوبی توصیف نشده (Fonseca *et al.*, 2013; Naderi *et al.*, 2017).

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر مخلوطی از ریز مغذی های نانوسلنیوم، ویتامین های C و E ریز پوشانی شده بر شاخص های رشد، آنزیم های کبدی و سیستم ایمنی فیلماهی در دوران رشد صورت گرفت.

مواد و روش کار

تهیه جیره و نحوه افروختن ریز مغذی ها به آن نانوسلنیوم با خلوص ۹۹/۹۹ درصد، اندازه ذره ۳۰ نانومتر از شرکت پیشگامان نانو مواد، خراسان، ایران، ویتامین E (آلfa- توکوفرول) با خلوص ۹۹ درصد از شرکت (لایدیس، انگلستان) و ویتامین C (اسکوربات پلی فسفات) از شرکت امید پارسا دماوند (تهران، ایران) تهیه شدند. مواد پوشاننده شامل میزان ۳۰ گرم مالتود کسترن و ۱۰ گرم صمغ عربی

جدول ۱: ترکیب شیمیایی جیره (GFS1، شرکت فرادانه)

Table 1: Chemical composition of diet (GFS1, Faradaneh Company)

سایز غذا (میلی متر)	پروتئین (%)	چربی (%)	فibre خام (%)	خاکستر (%)	رطوبت (%)	فسفر (%)	۱/۲
۳	۴۵	۱۶	۳/۵	۱۰	۱۰	۱۰	۱/۲

در پلیت ۹۶ خانهای الیزا ریخته شد و در طول موج ۵۹۰ نانومتر جذب نوری قرائت شد. جهت تهیه نمودار استاندارد میزان کلی ایمونوگلوبولین نمونه‌های سرم با حجم مساوی (هر نمونه ۲۰ میکرولیتر) با هم مخلوط و پس از تهیه رقت‌های دو برابر مطابق روش مذکور و به صورت همزمان بررسی شدند. میزان ایمونوگلوبولین در نمونه اولیه ۲۵ میلی‌گرم در هر میلی‌لیتر در نظر گرفته شد (Affonso *et al.*, 2004).

فعالیت فرعی کمپلمن با پروتکل Yano (۱۹۹۲) و بر اساس روش همولیز گلبول قرمز خرگوش (RaRBC) به شرح ذیل انجام شد. نمونه‌های ریقیک شده سرم خون ماهی در رقت‌های ۰/۱ تا ۰/۲۵ میلی‌لیتر تهیه و در لوله‌های آزمایشگاهی توزیع شد. سپس با محلول بافر باربیتورات حاوی EGTA (اتیلن گلیکول بیس-β-آمینو اتیل اتر - ان - ان تترا استیک اسید) به ۲۵ میلی‌لیتر رسید. در مرحله بعد ۰/۱ میلی‌لیتر گلبول قرمز خرگوش (RaRBC) به هر لوله آزمایش اضافه شد. بعد از انکوباسیون به مدت ۲ ساعت در دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد ۳/۱ میکرومول کلرید سدیم ۰/۹ درصد اضافه شد. بعد از این مرحله نمونه در دستگاه سانتریفیوژ در دور ۸۳۶ به مدت ۵ دقیقه در چهار درجه سانتی‌گراد قرار گرفت: ۱۱۱ ACH₅₀ (un / %) = ۱/k × (عکس سرم ریقیک شده) × ۰/۵

K = مقدار سرم (میلی‌لیتر) که بر حسب ۵۰ درصد گلبول قرمز لیز شده و عدد ۰/۵ ضریب اصلاح معادله است که به عنوان مقیاس روش اصلی به کار رفته است. فعالیت لیزوژیم با روش کدورت‌سنجدی بر اساس روش Ellis (۱۹۹۰) اندازه‌گیری شد. بدین‌منظور، غلظت یک میلی‌گرم در میلی‌لیتر سفیده تخم مرغ برای تخلیه استاندارد استفاده شد. ۲۵ میکرولیتر نمونه سرم ماهی در تکرارهای سه‌تایی در پلت‌های ۹۶ سوراخه ریخته و ۱۷۵

تغذیه و پرورش ماهیان

۱۲۰ عدد بچه ماهی فیلماهی با وزن متوسط $\pm 1/۳۸$ ۷۷/۳۴ گرم در بخش آبزی‌پروری انتستیتو تحقیقات بین‌الملی تاسماهیان دریای خزر (رسوتای شاقاجی، رشت، استان گیلان) در مخازن فایبرگلاس ۵۰۰ لیتری با قطر ۱۰۵ سانتی‌متر، ۵۱ سانتی‌متر ارتفاع و حجم آب ۵۰۰ لیتر که با آب رودخانه سفیدرود و آب چاه نیمه عمیق با ۱/۷۵ لیتر در دقیقه آبرسانی می‌گردید، به تعداد ۱۰ دبی عدد ماهی در هر مخزن بدون اختلاف معنی‌دار در شاخص وزن ($P > 0.05$) توزیع و از جیره‌های آزمایشی به میزان ۲ درصد وزن بدن در ساعت ۸/۰۰ صبح، ۲۱/۰۰ و ۱۵/۰۰ به مدت ۷۰ روز هفت‌هه تغذیه شدند. دوره نوری به صورت ۱۴ ساعت روشنایی و ۱۰ ساعت تاریکی بود. جهت ارزیابی میزان رشد و تعیین زیتدوه هر مخزن، بیومتری در فواصل ۱۵ روزه انجام گرفت (Luo *et al.*, 2006). در پایان دوره تغذیه ماهیان با جیره‌های آزمایشی، از ۳۰ درصد جمعیت ماهیان (۳ ماهی از هر مخزن) با استفاده از سرنگ ۲ میلی‌لیتر آغازته به هپارین از ساقه دمی خون‌گیری به عمل آمد. به منظور تهیه پلاسمای نمونه‌های خون با دور ۳۰۰۰ g و به مدت ۱۰ دقیقه بهوسیله دستگاه Labfuge 200, (Frankfort, Germany) سانتریفیوژ (کاظمی و همکاران، ۱۳۸۹) و سپس به آزمایشگاه منتقل شدند.

روش‌های آزمایشگاهی

آلکالین فسفاتاز با استفاده از روش اسپکتوفوتومتری و با استفاده از کیت‌های پارس آزمون براساس روش ارائه شده در کاتالوگ ارائه شده مورد اندازه‌گیری قرار گرفت (Koyama *et al.*, 1987)

جهت ارزیابی میزان کلی ایمونوگلوبولین سرم از روش رسوب با سولفات روی استفاده شد. ابتدا بافر ۰/۷ میلی‌مول سولفات روی تهیه شد و pH آن به ۵/۸ رسانده شد. سپس در میکروتیوب‌های استریل ۱۲/۵ میکرولیتر از سرم‌های زمان‌های صفر، ۳۰ و ۶۰ به صورت جداگانه ریخته شد و ۸۵۰ میکرولیتر از سولفات روی به هر میکروتیوب اضافه و به خوبی مخلوط شدند. بعد از ۲ ساعت قرار گرفتن در دمای اتاق، ۱۰۰ میکرولیتر از محلول فوق

انکوبه گردید و سپس به این محلول، ۲۵۰ میکرولیتر معرف شماره ۲ (۱۵ میکرومول در لیتر-2 Oxoglutarate NADH)، ۰/۱۸ میکرومول در لیتر (NADH) اضافه و مراحل جذب نوری در زمان‌های ۱، ۲ و ۳ دقیقه در دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ۳۴۰ نانومتر، قطر کووت یک سانتی‌متر و دما ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرائت گردید. در مرحله بعد مقدار اختلاف جذب نوری پس از دقایق ۱، ۲ و ۳ جمع و بر عدد ۳ تقسیم و میانگین به دست آمده بر اساس پروتکل ارائه شده از شرکت مزبور در ضربی جذب (۱۹۸۵) ضرب و براساس جدول ضرایب خطا، غلظت ALT محاسبه گردید (Thomas, 1998).

محاسبه شاخص‌های رشد

با انجام زیست‌سنگی‌های یکماهه و با توجه به اطلاعات بهدست آمده از طول و وزن ماهیان و تشکیل بانک اطلاعاتی، محاسبات آماری شاخص‌های رشد، تغذیه، بر اساس فرمول‌های ذیل محاسبه گردید:

$$\text{ضریب چاقی} = \frac{100 \times (\text{وزن ماهی})}{(\text{طول کل یا چنگالی})}$$

$$\text{افزایش وزن} = \frac{\text{وزن نهایی}}{\text{وزن اولیه}} - 1$$

$$\text{افزایش وزن بدن} = \frac{\text{وزن ابتدایی}}{\text{وزن ابتدایی}} - 1$$

$$\text{ضریب رشد ویژه} = \frac{100 \times (\log_{10} \text{وزن نهایی} - \log_{10} \text{وزن اولیه})}{\text{تعداد روز (زمان)}} \quad (\text{al., 1990})$$

$$\begin{aligned} \text{نرخ تبدیل غذایی} &= \frac{\text{غذای خشک مصرفی شده}}{\text{غذای خشک مصرفی شده}} \quad (\text{FCR}) \\ \text{nrx کارابی پروتئین} &= \frac{\text{وزن ترااضافه شده}}{\text{وزن ترااضافه شده}} \quad (\text{PER}) \end{aligned} \quad (\text{Abdelghany and Ahmad, 2002})$$

Moore et al., 1988) انجام شد. سطح معنی‌دار بودن برای همه موارد ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

نتایج

پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره پرورش مورد بررسی قرار گرفت (جدول ۲). فاکتورهای کیفی آب بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی‌دار آماری نداشت به‌طوری‌که میانگین معیارها در بین تیمارهای آزمایشی تا حدودی یکسان بود. مقادیر درجه حرارت آب، اکسیژن

میکرولیتر سوسپانسیون *Micrococcus luteus* در غلظت ۰/۰۲ میلی‌گرم بافر فسفات ۰/۵ مولار در pH ۶/۲ اضافه شد. در تیمار کنترل منفی بافر فسفات نمکی جایگزین سرم گردید. کاهش در مقدار OD در طول موج ۳۵۰ نانومتر بعد از یک ساعت و پنج دقیقه در ۲۲ درجه سانتی‌گراد ثبت گردید. یک واحد فعالیت آنزیم لیزوژیم، بر مبنای کاهش جذب ۰/۰۱ در دقیقه تعريف گردید.

-SGOT فعالیت آنزیم‌های آسپارتات آمینو‌ترانسفراز (AST-SGPT) و آلانین آمینو‌ترانسفراز (ALT) با استفاده از کیت‌های شرکت پارس آزمون و با روش IRMA، Tokyo, Japan) مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. جهت اندازه‌گیری غلظت ALT سرم خون ابتدا ۱۰۰ میکرولیتر از سرم خون ماهی با ۱۰۰۰ میکرولیتر معرف شماره یک (۱۰۰ میکرومول در لیتر TRIS در pH ۷/۵ میکرومول در لیتر آل آلانین و ۱۲۰۰ واحد در لیتر لاکتات دی‌هیدروژناز) مخلوط و در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد

$$\text{ضریب چاقی} = \frac{100 \times (\text{وزن ماهی})}{(\text{طول کل یا چنگالی})}$$

$$\text{افزایش وزن} = \frac{\text{وزن نهایی}}{\text{وزن اولیه}} - 1$$

$$\text{افزایش وزن بدن} = \frac{\text{وزن ابتدایی}}{\text{وزن ابتدایی}} - 1$$

$$\text{ضریب رشد ویژه} = \frac{100 \times (\log_{10} \text{وزن نهایی} - \log_{10} \text{وزن اولیه})}{\text{تعداد روز (زمان)}} \quad (\text{al., 1990})$$

روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها

داده‌های کسب شده در نرم‌افزار Excel ثبت و مورد پردازش قرار گرفت. سپس نرمال‌بودن داده‌ها از طریق آزمون Kolmogorov-Smirnov و معنی‌دار بودن داده‌ها از طریق آنالیز واریانس یک‌طرفه مورد سنجش قرار گرفت و در صورت مشاهده اختلاف، تست Tukey برای مقایسه میانگین‌ها به عنوان Post-hoc اعمال شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS, IBM Corp Version 24.0.

در لیتر، 0.30 ± 0.16 و 0.45 ± 0.06 میلی‌گرم در لیتر ثبت شد.

pH و آمونیاک کل به ترتیب در محدوده‌های درجه سانتی‌گراد، 17.85 ± 0.45 درجه سانتی‌گراد، 7.22 ± 0.36 میلی‌گرم

جدول ۲: شرایط فیزیکوشیمیایی آب تانک‌های پرورش طی دوره تغذیه ماهیان با جبره‌های فرموله شده (میانگین \pm انحراف معیار)Table 2: Physicochemical water conditions of rearing tanks during feeding period of fish with formulated diets (mean \pm SD)

میانگین کل	بیست روز سوم	بیست و پنجم روز دوم	بیست و پنجم روز اول	پارامترها
17.85 ± 0.45	18.3 ± 0.46	17.2 ± 0.5	17.1 ± 0.4	درجه حرارت (سانتی‌گراد)
7.22 ± 0.36	7.14 ± 0.4	7.1 ± 0.2	7.5 ± 0.51	اکسیژن محلول (میلی‌گرم در لیتر)
6.8 ± 0.30	6.857 ± 0.3	6.96 ± 0.5	7.1 ± 0.1	پ.ا.ج
0.4 ± 0.16	0.43 ± 0.22	0.42 ± 0.15	0.38 ± 0.21	آمونیاک کل (میلی‌گرم در لیتر)

جیره A (0.100 و 0.300 میلی‌گرم در کیلوگرم)، B (0.200 و 0.600 میلی‌گرم در کیلوگرم) و C (0.300 و 0.900 میلی‌گرم در کیلوگرم) در جدول ۳ ارائه شده است.

شاخص‌های رشد و ضربیت تبدیل غذا شاخص‌های رشد و ضربیت تبدیل غذا ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد و جیره‌های مخلوط مکمل آنتی اکسیدانی ریزپوشانی شده نانوسلنیوم، ویتامین‌های C و E به ترتیب

جدول ۳: عملکرد رشد فیلماهی (Huso huso) تغذیه شده با مخلوط مکمل آنتی اکسیدانی ریزپوشانی شده نانوسلنیوم، ویتامین‌های C و E (n=3، میانگین \pm انحراف معیار)Table 3: Growth performance of *Huso huso* fed with microencapsulated antioxidant supplement mixture of nanoselenium, vitamins C and E (n = 3, mean \pm SD)

A: جیره شاهد	B: مکمل‌های (دارای دیواره بدون نانوسلنیوم، ویتامین‌های C و E)	C: مکمل‌های (ریزپوشانی شده نانوسلنیوم، ویتامین‌های C و E)	D: مکمل‌های (ریزپوشانی شده نانوسلنیوم، ویتامین‌های C و E)	شاخص‌ها / جیره
وزن اولیه (گرم)	وزن نهایی (گرم)	طول اولیه (سانتی‌متر)	طول نهایی (سانتی‌متر)	ضربیت چاقی
$78/11 \pm 1/78$	$78/50 \pm 1/56$	$78/16 \pm 0/17$	$78/3 \pm 0/03$	درصد افزایش وزن درصد در طول دوره
$286/1 \pm 11/50^c$	$311/05 \pm 25/24^{bc}$	$370/8 \pm 16/1^a$	$351/7 \pm 3/8^{ab}$	نرخ رشد ویژه (درصد در روز)
$28/15 \pm 0/31$	$27/92 \pm 0/59$	$27/99 \pm 0/05$	$27/93 \pm 0/65$	رشد روزانه (گرم در روز)
$39/5 \pm 0/41^b$	$41/82 \pm 0/68^{ab}$	$43/99 \pm 0/99^a$	$42/75 \pm 0/62^a$	مقدار غذای مصرفی به ازای هر ماهی (گرم)
$0.46 \pm 0/003$	$0.42 \pm 0/01$	$0.43 \pm 0/01$	$0.45 \pm 0/01$	ضریب تبدیل غذا
$289/65 \pm 6/33^c$	$306/27 \pm 14/07^{bc}$	$362/52 \pm 19/0^a$	$349/1 \pm 4/87^{ab}$	نسبت بازده پروتئین
				حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار آماری است (P<0.05).

به طوری که نسبت بازده پروتئین در ماهیان تغذیه شده با جیره های A و B در مقایسه با جیره های C و D افزایش معنی دار آماری داشت ($P<0.05$).

شاخص های سیستم ایمنی غیر اختصاصی و آنزیم های کبدی
 آنالیز برخی از فاکتورهای ایمنی غیراختصاصی و آنزیم های کبدی فیل ماهی تغذیه شده با سطوح مختلف ترکیب نانوسلنیوم، ویتامین E و Rizoposhani شده در جدول ۴ ارائه شده است. میزان آلکالین فسفاتاز سرم ماهیان از تیمارهای مختلف غذایی تأثیر پذیرفت و بیشترین مقدار آن در ماهیان تیمارهای A و B به مقادیر ۳۸۸/۲۵±۸/۶ (دارای ۴۴۴/۰۰±۱۲/۶ واحد در لیتر) مشاهده شد که به طور معنی داری بیشتر از ماهیانی بود که با جیره D (دارای دیواره و فاقد نانوسلنیوم، ویتامین C و E) تغذیه شده بودند ($P<0.05$).

شاخص وزن نهایی در ماهیان تغذیه شده با جیره B ($۳۷۰/۸±۱۶/۱$ گرم) در مقایسه با جیره شاهد ($۲۸۶/۱±۱۱/۵$ گرم) افزایش معنی دار آماری داشت ($P<0.05$). شاخص ضرب چاقی ماهیان تیمارهای مختلف فاقد اختلاف معنی دار آماری بود ($P>0.05$). بیشترین درصد افزایش وزن بدن ماهیان تغذیه شده با جیره B بود که به طور معنی داری بیشتر از ماهیان تغذیه شده با جیره های C و شاهد بود ($P<0.05$). ضرب چاقی رشد ویژه و رشد روزانه نیز از تیمارهای غذایی تأثیر پذیرفت. این شاخص ها در ماهیان تغذیه شده با جیره های A و B به طور معنی داری بیشتر از ماهیان تغذیه شده با جیره مکمل بود ($P<0.05$). کمترین ضرب چاقی تبدیل غذا متعلق به ماهیان تغذیه شده با جیره های A و B بود که به طور معنی داری بر ضرب چاقی ماهیان تغذیه شده از جیره های C و D برتری داشت ($P<0.05$). روند مشابهی در شاخص نسبت بازده پروتئین مشاهده شد

جدول ۴: تغییرات شاخص های سیستم ایمنی غیر اختصاصی و آنزیم های کبدی فیل ماهی (*Huso huso*) تغذیه شده با مخلوط مکمل آنتی اکسیدانی ریزوپوشانی شده نانوسلنیوم، ویتامین های C و E (n=3، میانگین ± انحراف معیار)

Table 4: Changes in nonspecific immune system parameters and hepatic film enzymes (*Huso huso*) fed with nanoselenium microencapsulated antioxidant supplementation, vitamins C and E (n = 3, mean ± SD)

شاخص ها / جیره	A: مکمل های ریزوپوشانی شده نانو	B: مکمل های ریزوپوشانی شده نانو	C: مکمل های سلنیوم، ویتامین های سلنیوم، ویتامین های	D: جیره شاهد (دارای دیواره بدون سلنیوم، ویتامین های
آلکالین فسفاتاز (واحد در لیتر)	$۳۸۸/۲۵±۸/۶^a$	$۴۴۴/۰۰±۱۲/۶^a$	$۳۱۸/۵±۲۴/۰۰^ab$	$۲۱۹/۰۰±۲۶/۰۱^b$
ایمونوگلوبولین (میلی گرم در لیتر)	$۳۷/۵±۵/۲۵^b$	$۴۶/۵±۲/۳۸^a$	$۴۶/۵±۰/۹۵^a$	$۴۵/۰۰±۱/۴۱^a$
(واحد / درصد) ACH_{50}	$۱۳۱/۵±۱/۲۹^c$	$۱۳۲/۷۵±۱/۱^bc$	$۱۳۴/۲۵±۰/۵۰^ab$	$۱۳۵/۵±۰/۵۷^a$
لیزozیم (واحد / میلی لیتر / دقیقه)	$۳۵/۰۰±۱/۶۳^b$	$۳۷/۰۰±۲/۱^ab$	$۳۴/۲۰±۳/۳۰^b$	$۳۹/۷۵±۲/۰۶^a$
(واحد / لیتر) AST ^۱	$۴۰/۴/۵±۲۳/۱۶^a$	$۵۴۷/۲۵±۶۸/۶۶^a$	$۳۴۸/۲۵±۵۱/۴^ab$	$۱۲۱/۵۲±۲۰/۸۲^b$
(واحد / لیتر) ALT ^۲	$۱۳/۵±۱/۷^ab$	$۱۶/۷۵±۱/۷^a$	$۱۳/۷±۱/۲۵^ab$	$۱۰/۰۰±۰/۰۰^b$

حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختلاف معنی دار آماری است ($P<0.05$)

۱- آسپارتات آمینو ترانسفراز، ۲- آلانین آمینو ترانسفراز

نداشت ($P>0.05$), ولی به مراتب بیشتر از مقدار لیزوزیم سرم خون ماهیان تغذیه شده با جیره C ($۳۴/۲±۳/۳۰$ واحد / میلی لیتر / دقیقه) بود ($P<0.05$). الحق مکمل های ریزوپوشانی شده نانوسلنیوم، ویتامین های C و E در سطوح

میزان لیزوزیم در ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد ($۳۹/۷۵±۲/۰۶$ واحد / میلی لیتر / دقیقه) اختلاف معنی داری با ماهیان تغذیه شده با جیره های A و B ($۳۵/۰۰±۱/۶۳$ و $۳۷/۰/۱±۲/۱$ واحد / میلی لیتر / دقیقه)

که حاکی از شاخص‌های رشد بهتر در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی نانوسلنیوم و ویتامین C در سطوح ۰/۶۸ و ۳۰۰ میلی‌گرم در مقایسه با ماهیان تغذیه شده با مکمل‌های انفرادی سلنیوم و ویتامین C و هماهنگ با مطالعات پیشین در مورد اثر همافزاپی سلنیوم و ویتامین‌های دیگر نظیر ویتامین E بر بهبود شاخص‌های رشد و فیزیولوژیک ماهیان است (Gatlin *et al.*, 1986; Fonseca *et al.*, 2013). همچنین مطالعات محمدی‌دوست و همکاران (۱۳۹۹) در ماهی سی‌باس آسیایی (*Lates calcarifer*), Harsij و همکاران (*Oncorhynchus mykiss*) و Adineh و همکاران (۲۰۲۰) در ماهی آمور (*Ctenopharyngodon Idella*) تغذیه شده با سطوح ترکیبی نانوسلنیوم و ویتامین‌های C و E دلالت بر افزایش معنی‌دار شاخص‌های رشد در مقایسه با جیره‌های فاقد این ریزمخذی‌ها داشت، احتمالاً به این دلیل که سلنیوم به عنوان یک جزو مهم آنزیم دی‌یدیناز، به طور غیرمستقیم در ترشح هورمون رشد از غده هیپوفیز در همه مهره‌داران (Muller *et al.*, 1999) از جمله ماهی نقش دارد (Cotter و همکاران ۲۰۰۸) افزایش فعالیت هورمون‌های *Morone chrysops* تیروئید را در هیبرید بأس مخطط (*M.saxatilis* ×) تغذیه شده از جیره حاوی سلنیوم را ثبت کردند و بر این نکته اذعان داشتند که این عامل موجب رشد بهتر و بازده خوراک در ماهی می‌شود. به همین ترتیب، ویتامین‌های E و C، در دامنه‌های خاص موجب رشد آبزیان (Taveekijakarn *et al.*, 1996) از طریق ممانعت از اکسیدشدن اسیدهای چرب غیراشباع در بافت، افزایش متابولیسم و در نهایت موجب افزایش وزن، بازده خوراک و ضریب رشد ویژه در ماهیان می‌شوند (Khan *et al.*, 2017). مطالعاتی نیز نشان داده است که احتمالاً تأثیر نانوذرات سلنیوم در بهبود رشد به دلیل تسريع در ساخت سلنوپروتئین‌ها در سلول‌های اپی‌تیلیال روده است که تسهیل در هضم مؤثر مواد مغذی را به دنبال دارد (Wang *et al.*, 2013). علاوه بر این، سلنیوم به عنوان یک کوانزیم در تولید و ساخت آنزیم‌های گوارشی عمل می‌کند و موجب افزایش فعالیت آنها می‌شود

(۰/۲ و ۰/۳ و ۰/۶ و ۰/۳۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم) موجب افزایش معنی‌دار Ig در مقایسه با جیره D (فاقد مکمل) نگردید ($P>0.05$)، اما مقدار Ig در ماهیان تغذیه شده با جیره A ($37/5 \pm 5/25$ میلی‌گرم در لیتر) به طور معنی‌داری کمتر از جیره D ($45/00 \pm 1/41$ میلی‌گرم در لیتر) بود ($P<0.05$). مقدار کمپلمان در ماهیان تغذیه شده با مکمل‌های ریزپوشانی شده نانوسلنیوم، ویتامین‌های C و E در سطوح ۰/۳، ۰/۶ و ۰/۳۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم (جیره C) فاقد اختلاف معنی‌دار با جیره D بود ($P>0.05$). ولی میزان کمپلمان ACH_{50} در ماهیان تغذیه شده با جیره‌های A و B به طور معنی‌داری کمتر از ۱۳۱/۵±۱/۲۹ و ۷۰/۷۵±۱/۱۲۲ در مقابل ۱۳۵/۵±۰/۵۷ واحد / درصد (P < ۰.۰۵). اگرچه تفاوت معنی‌داری در آنژیم آسپارتات آمینوترانسفراز (SGOT- AST) در ماهیان تغذیه شده با جیره C در مقایسه با جیره D مشاهده نشد ($P>0.05$)، اما مقدار این آنژیم در ماهیان تغذیه شده با جیره‌های A و B به طور معنی‌داری بیشتر از جیره مذکور بود (۴۰/۴±۲/۳ و ۶۶/۵۴۷±۴۸ در مقابل ۱۲۱/۵۲±۲۰/۸۲ واحد در لیتر) ($P<0.05$). در روندی مشابه اختلاف معنی‌داری در میزان آنژیم آلانین آمینوترانسفراز (SGPT-ALT) در پلاسمای خون ماهیان تیمارهای A و D مشاهده نشد در حالی که میزان این آنژیم در ماهیان تغذیه شده با جیره B به طور معنی‌داری بیشتر از ماهیان تیمار D بود ($16/75 \pm 1/7$ در مقابل ۱۰/۰۰±۰/۰۰ واحد در لیتر) ($P<0.05$).

بحث

در مطالعه حاضر، ماهیان تغذیه شده با ترکیب نانوسلنیوم، ویتامین‌های C و E ریزپوشانی شده، شاخص‌های رشد بهتری نسبت به ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد داشتند. بیشترین وزن نهایی، درصد افزایش وزن و نسبت بازده پروتئین متعلق به ماهیان تغذیه شده با جیره A (۰/۱) و ۱۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم) و همسو با مطالعه Khan و همکاران (۲۰۱۷ و ۲۰۱۶) در مورد تأثیر نانوسلنیوم و ویتامین C بر شاخص‌های رشد گونه *Tor putitora* است

دربافت‌کننده مکمل (نانوسلنیوم، ویتامین C و E) بالاتر بود. در این مطالعه میزان کمپلمن در ماهیان تغذیه شده از جیره A حاوی ۰/۱۰۰ و ۱۰۰ نانو سلنیوم، ویتامین C و E به طور معنی داری بالاتر از ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد بود. کمپلمن نقش اصلی را در اینمی ذاتی بدن بازی می‌کند و دارای نقش تسهیل‌کننده فرایند Chemotaxis (تاكتيسم شيميايي: مكانيزمي که به وسیله آن سلول‌ها در پاسخ به محرك شيميايي حرکت می‌کنند) و از بين برنده عوامل بيماري زا می‌باشد (Holland and Lambris, 2002). همچنین با سیستم اینمی اكتسابي مرتبط است. زیرا فعال‌سازی آن باعث تقویت تکثیر سلول‌های B می‌شود (Morgan *et al.*, 2005). احتمالاً به نظر می‌رسد، علاوه بر نقش در محافظت در برابر استرس اکسیداتیو نانوسلنیوم (Yu *et al.*, 2020)، ویتامین‌های C و E جیره نیز موجب تحريك پاسخ اینمی نظیر افزایش فعالیت‌های گلbulول‌های سفید بیگانه خوار، تکثیر سلولی می‌شود که در این مطالعه اثر خود را با افزایش فعالیت کمپلمن نشان داد (Khara *et al.*, 2016). میزان لیزوژیم، آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز و آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز در ماهیان تغذیه شده دارای اختلاف معنی دار آماری نبود، اما میزان فعالیت آنزیم‌های مذکور در ماهیان تغذیه شده با جیره C حاوی نانو سلنیوم و ویتامین‌های C و E ریزپوشانی شده به مقدار ۹۰٪ و ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم بیشتر از ماهیان تغذیه شده با جیره فاقد مکمل بود. آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمین ترانسفراز آنزیم‌های مهمی در ارزیابی وضعیت کبد هستند و افزایش آنها در پلاسمای ماهی ممکن است آسیب کبد یا عملکرد آن را نشان دهد (Coz-Rakovac *et al.*, 2005). مطالعاتی نشان داده است که سطوح بالای سلنیوم جیره می‌تواند در کبد و آبشش ماهیان انباشته شده و موجب تغییرات پاتولوژیک در کبد شامل احتقان سلول‌های آسینار، سینوزوئیدهای کبدی و واکوئل‌های مربوطه شود (Khalil *et al.*, 2019) که احتمال دارد با افزایش تراوش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) خود را نشان دهد (Mansour *et al.*, 2017). نتایج مطالعات Harsij و همکاران (2020).

(Shenkin, 2006). فعال شدن آنزیم‌های گوارشی قابلیت هضم مواد مغذی را افزایش داده و مواد مغذی بیشتری را برای جذب از طریق سلول‌های اپی‌تلیال روده آزاد می‌کند که در نهایت موجب افزایش رشد و کاهش ضریب تبدیل غذا می‌گردد. هرچند در مطالعه حاضر، اختلاف معنی‌داری در ضریب تبدیل غذا مشاهده نشد، اما شاخص‌های رشد مطلوب‌تر در تیمارهای تغذیه‌ای با مخلوط مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی ریزپوشانی شده در جیره فیل ماهی در مقایسه با تیمار شاهده شد. اما علت عدم ثبت اختلاف معنی‌دار را می‌توان به عواملی چون اندازه ماهی، شرایط محیط پرورش، درجه حرارت آب و طریقه افزودن Khan *et al.*, (2017).

سیستم دفاعی ماهیان شامل دو بخش: سیستم دفاعی ذاتی و سیستم دفاعی اكتسابي می‌باشد که از طریق سازگاری و انطباق با محیط اطراف و پاتوژن‌های مربوطه، فعال می‌شود. ایمونوگلوبولین‌ها دسته‌ای از مولکول‌های زیستی ذاتی هستند که در سیستم اینمی فعال بوده و به طور اختصاصی علیه آنتی‌ژن‌ها ترشح می‌شوند (Van Muiswinkel *et al.*, 2006). در آزمایش حاضر افزودن مخلوطی از نانوسلنیوم، ویتامین‌های C و E در جیره‌های B و C موجب افزایش معنی‌دار IgM در مقایسه با ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد گردید. مطالعاتی نشان داده است که مکمل نانوسلنیوم می‌تواند عملکرد رشد و سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانی کپور را بهبود بخشد (Ashouri *et al.*, 2015; Saffari *et al.*, 2017). مطالعات قبلی نیز نشان داده بود که ویتامین E و سلنیوم عناصر ریزمنغذی Gatlin *et al.*, (1986; Fonseca *et al.*, 2013) عمل کرده و بر بسیاری El-Shenawy *et al.*, (2015) از فرایندهای سیستم اینمی (Bernabucci *et al.*, 2002) تأثیر مثبت دارند که در مطالعه حاضر، خود را با افزایش و تحريك تولید Ig کل سرم خون نشان و همسو با مطالعات محمدی‌دوست و همکاران (۱۳۹۹) در ماهی سی‌باس آسیایی است که در آن میزان ایمونوگلوبولین کل ماهی تغذیه شده با تیمار

کاظمی، ره، پوردهقانی، مه، یوسفی، آر، یارمحمدی، م. و نصری‌تجن، م. ۱۳۸۹. فیزیولوژی دستگاه گردش خون آبزیان و فنون کاربردی خون شناسی ماهیان. انتشارات بازرگان، رشت، ۱۹۴ صفحه. محمدی دوست، مه، آهنگزاده، مه، هوشمند، ح. حکمت پور، ف، خسروی، مه، محمدیان، ت. و محسنی‌نژاد، ل. ۱۳۹۹. تأثیر ویتامین‌های C و E بر سلنیوم به عنوان محرك سیستم ایمنی بر فاکتورهای رشد و ایمنی سی‌باس آسیایی (*Lates calcarifer*). مجله تغذیه آبزیان، ۶(۲): ۷۴-۶۳.

Abdelghany, A.E. and Ahmad, M.H., 2002.

Effects of feeding rates on growth and production of Nile tilapia, common carp and silver carp polycultured in fertilized ponds. *Aquaculture Research*, 33(6): 415-423. Doi: 10.1046/j.1365-109. 2002. 00689.x.

Adineh, H., Naderi, M., Nazer, A., Yousefi, M. and Ahmadifar, E., 2020. Interactive effects of stocking density and dietary supplementation with Nano selenium and garlic extract on growth, feed utilization, digestive enzymes, stress responses, and antioxidant capacity of grass carp (*Ctenopharyngodon idella*). *Journal of the World Aquaculture Society*, 8(5): 417-432. Doi:10.1111/jwas.12747.

Affonso, C.M., Da Silva, L.C., Lima, F.G. and Soares, S., 2004. MW and MVar management on supply and demand side for meeting voltage stability margin criteria. *IEEE TRANSACTIONS on Power Systems*, 19 (3): 1538-1545. DOI: 10.1109/TPWRS.2004.831659.

در قزل‌آلای رنگین‌کمان تغذیه شده با جیره حاوی سطوح مشابه نانوسلنیوم، ویتامین‌های C و E بر این نکته اذعان داشت که کمترین فعالیت AST سرم در ماهیان تغذیه شده با جیره (۰/۳، ۹۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم) مشاهده شد که نشانگر حداقل آسیب به عملکرد طبیعی کبد و آسیب سلول‌های قرمز خون در این گروه است که هم‌سو با نتایج مطالعه حاضر و گونه فیلماهی نمی‌باشد. جهت اثبات این امر باید مطالعات بافت‌شناسی در کبد فیلماهیان صورت گیرد.

نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن مخلوطی از مکمل‌های ریزپوشانی شده نانوذره سلنیوم، ویتامین‌های C و E به میزان ۰/۲، ۶۰ و ۲۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم موجب افزایش معنی‌دار وزن نهایی (۵ درصد)، درصد افزایش وزن بدن (۳/۸۴ درصد)، نرخ رشد ویژه (۱/۸۹ درصد) و رشد روزانه (۶/۲۳ درصد) در مقایسه با تیمار شاهد می‌شود ($P<0.05$)، اما با توجه به افزایش معنی‌دار آنزیمهای کبدی (آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز) سرم نسبت به ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد توصیه می‌شود، مطالعات بعدی در خصوص بررسی تأثیر الحقن همین دوز بر بافت کبد و شاخص‌های بیوشیمیایی این گونه صورت گیرد.

منابع

- آدینه، ح، هرسیج، م، اسدی، م. و احمدی‌فر، ا. ۱۳۹۸. تأثیر سطوح مختلف مکمل‌های آنتی اکسیدانی ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد و تغذیه، ترکیبات بدن و برخی شاخص‌های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (*Oncorhynchus mykiss*). مجله تغذیه آبزیان، ۱۵(۱): ۱۰۹-۹۷.
- باذلی محبوب، ف، ایمان، م، عمو عابدینی، ق. و عطار، ح. ۱۳۹۴. انکپسوله کردن اسکوربیک اسید درون نانومیسل. مجله تازه‌های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی، ۲۰(۵): ۵۳-۴۷.
- عبدالحی، ح. و کرمی راد، ن. ۱۳۹۷. توسعه پرورش ماهیان خاویاری در ایران. دو فصلنامه ترویجی ماهیان ماهیان استروژن، ۱: ۳۲-۴۴.

- Albrecht, M.A., Evans, C.W. and Raston, C.L., 2006.** Green chemistry and the health implications of nanoparticles. *Green Chemistry*, 8(5): 417-432. DOI: 10.1039/b517131h.
- Ashouri, S., Keyvanshokooh, S., Salati, A.P., Johari, S.A. and Pasha-Zanoosi, H., 2015.** Effects of different levels of dietary selenium nanoparticles on growth performance, muscle composition, blood biochemical profiles and antioxidant status of common carp (*Cyprinus carpio*). *Aquaculture*, 446: 25-29. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2015.04.021.
- Bernabucci, U., Ronchi, B., Lacetera, N. and Nardone, A., 2002.** Markers of oxidative status in plasma and erythrocytes of transition dairy cows during hot season. *Journal of Dairy Science*, 85(9): 2173-2179. Doi: 10.3168/jds.S0022-0302(02)74296-3.
- Cotter, P.A., Craig, S. R. and McLean, E., 2008.** Hyperaccumulation of selenium in hybrid striped bass: a functional food for aquaculture?. *Aquaculture Nutrition*, 14(3): 215-222. DOI:10 .111.1365-2095. 2007 .00520 .x 1/j.
- Coz-Rakovac, R., Strunjak-Perovic, I., Hacmanjek, M., Lipej, Z. and Sostaric, B., 2005.** Blood chemistry and histological properties of wild and cultured sea bass (*Dicentrarchus labrax*) in the North Adriatic Sea. *Veterinary Research Communications*, 29(8): 677-687. DOI: 10.1007/s11259-005-3684-z.
- Dabrowski, K. and Ciereszko, A., 2001.** Ascorbic acid and reproduction in fish: endocrine regulation and gamete quality. *Aquaculture Research*, 32(8): 623-638. DOI:10.1046/j.1365-2109.2001.00598.x
- Diplock, A.T. and Hoekstra, W.G., 1976.** Metabolic aspects of selenium action and toxicity. *CRC Critical Reviews in Toxicology*, 4(3): 271-329. DOI:10. 1080/10408447609164016.
- Ellis, A.E., 1990.** Lysozyme assays. In: Stoka, J.S., Fletcher, T.C., Anderson, D.P., Roberton, B.S. Van Muiswisal, W.B. (Eds). *Techniques in Fish Immunology*. SOS Publications. USA, 101-103.
- El-Shenawy, N.S., AL-Harbi, M.S. and Hamza, R.Z., 2015.** Effect of vitamin E and selenium separately and in combination on biochemical, immunological and histological changes induced by sodium acid in male mice. *Experimental and Toxicologic Pathology*, 67(1): 65-76. DOI: 10.1016/j.etp.2014.10.005.
- Ewan, R.C., 1976.** Effect of selenium on rat growth, growth hormone and diet utilization. *The Journal of Nutrition*, 106: 702-709. DOI:10.1093/jn/106.5.702.
- Fonseca, S.B.D., Silva, J.H.V.D., Beltrão Filho, E.M., Mendes, P.D.P., Fernandez, J.B.K., Amancio, A.L.L. and Silva, F.R.P.D., 2013.** Influence of levels and forms of selenium associated with levels of vitamins C and E on the performance, yield and composition of tilapia fillet. *Food Science and Technology*, 33: 109-115. DOI:10.1590/S0101-20612013000500017.

- Fynn-Aikins, K., Hung, S.S.O and Hughes, S.G., 1993.** Effects of feeding a high level of D-glucose on liver function in juvenile white sturgeon (*Acipenser transmontanus*). *Fish Physiology and Biochemistry*, 12 (4): 317-325. DOI:org/10.1007/BF00004416.
- Gatlin, III, D.M., Poe, W.E., Wilson, R.P., Ainsworth, A.J. and Bowser, P.R., 1986.** Effects of stocking density and vitamin C status on vitamin E-adequate and vitamin E-deficient fingerling channel catfish. *Aquaculture*, 56(3-4): 187-195. DOI:10.1016/0044-8486(86)90334-0.
- Hardy, R.W. and Barrows, F.T., 2002.** Diet formulation and manufacture. In: Halver, J.E., Hardy, R.W (Eds). *Fish Nutrition*. Academic Press, London. pp. 505-600.
- Harsij, M., Kanani, H.G. and Adineh, H., 2020.** Effects of antioxidant supplementation (nano-selenium, vitamin C and E) on growth performance, blood biochemistry, immune status and body composition of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) under sub-lethal ammonia exposure. *Aquaculture*, 521: 734-942. DOI:10.1016/j.aquaculture.2020.734942.
- Holland, M.C.H. and Lambris, J.D., 2002.** The complement system in teleosts. *Fish and Shellfish Immunology*, 12: 399-420. DOI:10.1006/fsim.2001.0408.
- Hung, S.S.O. and Lutes, P.B., 1987.** Optimum feeding rate of hatchery-produced juvenile white sturgeon (*Acipenser transmontanus*): at 20 °C. *Aquaculture*, 65(3-4): 307-317. DOI:1016/0044-8486(87)90243-2.
- Jamil, Z., 2013.** Effects of inorganic and nanoform of selenium on growth performance and biochemical indices of mahseer (*Tor putitora*). M.Phil. Thesis, Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan. 260 P.
- Khalil, H.S., Mansour, A.T., Goda, A.M.A. and Omar, E.A., 2019.** Effect of selenium yeast supplementation on growth performance, feed utilization, lipid profile, liver and intestine histological changes, and economic benefit in meagre, (*Argyrosomus regius*), fingerlings. *Aquaculture*, 501: 135-143. DOI:10.1016/j.aquaculture.2018.11.018.
- Khan, K.U., Zuberi, A., Nazir, S., Fernandes, J.B.K., Jamil, Z. and Sarwar, H., 2016.** Effects of dietary selenium nanoparticles on physiological and biochemical aspects of juvenile *Tor putitora*. *Turkish Journal of Zoology*, 40 (5): 704-712. DOI:10.3906/zoo-1510-5.
- Khan, K.U., Zuberi, A., Fernandes, J.B.K., Ullah, I. and Sarwar, H., 2017.** An overview of the ongoing insights in selenium research and its role in fish nutrition and fish health. *Fish physiology and Biochemistry*, 43(6): 1689-1705. DOI:10.1007/s10695-017-0402-z.
- Khara, H., Sayyadborani, M. and Sayyad Borani, M., 2016.** Effects of α-Tocopherol (vitamin E) and ascorbic acid (vitamin c) and their combination on growth, survival and some hematological and

- immunological parameters of Caspian brown trout, *Salmo trutta caspius* juveniles. *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 16: 385-393. DOI:10.4194/1303-2712-v16_2_18.
- Kim, K., Wang, X., Choi, S., Park, G., Koo, J. and Bai, S. C., 2003.** No synergistic effects by the dietary supplementation of ascorbic acid, α-tocopheryl acetate and selenium on the growth performance and challenge test of *Edwardsiella tarda* in fingerling Nile tilapia (*Oreochromis niloticus* L). *Aquaculture Research*, 34: 1053–1058. DOI:10.4194/1303-2712-v17_3_09.
- Koyama, I., Miura, M., Matsuzaki, H., Sakagishi, Y. and Komoda, T., 1987.** Sugar-chain heterogeneity of human alkaline phosphatases: differences between normal and tumour-associated isozymes. *Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications*, 413: 65-78. DOI:10.1016/0378-4347(87)80214-1.
- Lee, S., Park, G., Moniruzzaman, M., Bae, J., Song, Y., Kim, K. and Bai, S.C., 2016.** Synergistic effects of dietary vitamin C and selenium on induced methylmercury toxicity in juvenile olive flounder (*Paralichthys olivaceus*). *Turkish Journal Fish Aquaculture Science*. 17: 527-533. DOI:10.4194/1303-2712-v17_3_09.
- Levander, O.A., 1986.** Selenium. In: Mertz W (ed) Trace elements in human and animal nutrition. Academic Press, London, pp. 139–197.
- Lorentzen, M., Maage, A. and Julshamn, K., 1994.** Effects of dietary selenite or selenomethionine on tissue selenium levels of Atlantic salmon (*Salmo salar*). *Aquaculture*, 121(4): 359-367. [https://doi.org/10.1016/0044-8486\(94\)90270-4](https://doi.org/10.1016/0044-8486(94)90270-4)
- Luo, L., Xue, M., Wu, X.F., Cai, X.F., Cao, H.N. and Liang, Y.M., 2006.** Partially or totally replacement of fish meal by solvent extracted cottonseed meal in diets for juvenile rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Aquaculture Nutrition*, 12: 418–424. DOI:10.1111/j.1365-2095.2006.00443.x.
- Mansour, A.T.E., Goda, A.A., Omar, E.A., Khalil, H.S. and Esteban, M.A., 2017.** Dietary supplementation of organic selenium improves growth, survival, antioxidant and immune status of meagre, (*Argyrosomus regius*), juveniles. *Fish & Shellfish Immunology*, 68: 516-524. DOI: 10.1016/j.fsi.2017.07.060.
- Moniruzzaman, M., Park, G., Yun, H., Lee, S., Park, Y. and Bai, S.C., 2015.** Synergistic effects of dietary vitamin E and selenomethionine on growth performance and tissue methyl mercury accumulation on mercury induced toxicity in juvenile olive flounder (*Paralichthys olivaceus*, Temminck et Schlegel). *Aquaculture Research*, 48 (2): 1–11 DOI: 10.1111/are.12904.
- Moore, B.J., Hung, S.S. and Medrano, J.F., 1988.** Protein requirement of hatchery-produced juvenile white sturgeon (*Acipenser transmontanus*). *Aquaculture*,

- 71(3): 235-245. DOI: 10.1016/0044 - 8486(88)90262-1
- Morgan, B.P., Marchbank, K.J., Longhi, M.P., Harris, C.L. and Gallimore, A.M., 2005.** Complement: central to innate immunity and bridging to adaptive responses. *Immunology Letter*, 97: 171-179. DOI:10.1016/j.imlet.2004.11.010.
- Muller, E.E., Locatelli, V. and Cocchi, D., 1999.** Neuroendocrine control of growth hormone secretion. *Physiological Reviews*, 79 (2): 511-607. DOI:10.1152/physrev.1999.79.2.511.
- Naderi, M., Keyvanshokooh, S., Salati, A. P. and Ghaedi, A., 2017.** Effects of dietary vitamin E and selenium nanoparticles supplementation on acute stress responses in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) previously subjected to chronic stress. *Aquaculture*, (473): 215-222. DOI: 10.1016/ j.aquaculture.2017.02.020.
- Nayak, S.K., 2010.** Probiotics and immunity: a fish perspective. *Fish & Shellfish Immunology*, 29(1): 2-14. DOI:10.1016/ j.fsi.2010.02.017.
- NRC (National Research Council), 2011.** Nutrient Requirements of Fish and Shrimp. The National Academy Press, Washington, D. C., 329 P.
- Rider, S. A., Davies, S.J., Jha, A.N., Fisher, A.A., Knight, J. and Sweetman, J.W., 2009.** Supra-nutritional dietary intake of selenite and selenium yeast in normal and stressed rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*): implications on selenium status and health responses. *Aquaculture*, 295(3-4): 282-291. DOI:10. 1016/j.aquaculture .2009.07.003.
- Rodríguez, H. and Rojas, S., 2014.** Efecto de dietas enriquecidas con vitamina ey selenio orgánico en el comportamiento productivo y calidad funcional del filete de trucha arco iris (*Oncorhynchus mykiss*). *Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú*, 25(2): 213-225.
- Rónyai, A., Ruttkay, A., Varadi, L. and Peteri, A., 1990.** Growth of Siberian sturgeon (*Acipenser baeri* B.) and that of its both hybrids with the sterlet (*Acipenser ruthenus* L.) in recycling system. In: Rónyai, A., (ed) *Acipenser Premier Colloque International Sur l'esturgeon*, Bordeaux, CEMAGREF. pp. 423-427.
- Rotruck, J.T., Pope, A.L., Ganther, H.E., Swanson, A.B., Hafeman, D.G. and Hoekstra, W.G., 1973.** Selenium: biochemical role as a component of glutathione peroxidase. *Science*, 179: 585– 590. DOI: 10.1126/science.179.4073.588.
- Saffari, S., Keyvanshokooh, S., Zakeri, M., Johari, S. A. and Pasha-Zanoosi, H. J. A. N., 2017.** Effects of different dietary selenium sources (sodium selenite, selenomethionine and nanoselenium) on growth performance, muscle composition, blood enzymes and antioxidant status of common carp (*Cyprinus carpio*). *Aquaculture Nutrition*, 23(3): 611- 617.DOI:10.1111/anu.12428.
- Shenkin, A., 2006.** Micronutrients in health and disease. *Postgraduate Medical Journal*, 82(971): 559-567.

- http://dx.doi.org/10.1136/pgmj.2006.04767
0.
- Sritunyalucksana, K., Intaraprasong, A., Sa-nguanrut, P., Filer, K. and Fegan, D.F., 2011.** Organic selenium supplementation promotes shrimp growth and disease resistance to Taura syndrome virus. *Science Asia*, 37: 24–30. DOI: 10.2306/scienceasia1513-1874.2011.37.02.
- Taveekijakarn, P., Miyazaki, T., Matsumoto, M. and Aral, S., 1996.** Histopathological and haematological changes in amago salmon, *Oncorhynchus rhodurus* (Jordan & McGregor), fed a vitamin-D-free diet. *Journal of Fish Diseases*, 19(4): 289-294. DOI:10.1046/j.1365-2761.1996.d01-85.x.
- Thomas, I., 1998.** Alanine aminotransferase (ALT), aspartate amino transferase (AST). In: Thomas, I (ed). Clinical Laboratory Diagnostic. 2 rd.edn. Frankfurt TH-Books Verlagsgesellsc, pp. 55-65.
- Van Muiswinkel, W. B. and Vervoorn-Van Der Wal, B., 2006.** The Immune System of Fish. In: Woo, P.T.K.,(ed) Fish Diseases and Disorders. CAB International, Netherlands, Wageningen, pp. 678-701.
- Wang, C. and Lovell, R. T., 1997.** Organic selenium sources, selenomethionine and selenoyeast, have higher bioavailability than an inorganic selenium source, sodium selenite, in diets for channel catfish (*Ictalurus punctatus*). *Aquaculture*, 152(1-4): 223-234. https:DOI:10.1016/S0044-8486(96)01523-2.
- Wang, Y., Yan, X. and Fu, L., 2013.** Effect of selenium nanoparticles with different sizes in primary cultured intestinal epithelial cells of crucian carp, (*Carassius auratus gibelio*). *International Journal of Nanomedicine*, 8: 4007-4013. DOI: 10.2147/IJN.S43691.
- Whanger, P.D., 1981.** Selenium and heavy metal toxicity. In: Spallholz J.E; Martin J. L; Ganther, H.E (ed) Selenium in biology and medicine. 2rd edn AVI Publishing, England, Westport CT, pp. 230–255.
- Yano, T., 1992.** Assays of hemolytic complement activity. In: Stolen, J.S., Fletcher, T.C., Anderson, D.P (ed).*Techniques in Fish Immunology*, 2rd.edn Fair Haven, USA, New Jersy, pp.150- 158.
- Yu, H., Zhang, C., Zhang, X., Wang, C., Li, P., Liu, G. and Ji, H., 2020.** Dietary nano-selenium enhances antioxidant capacity and hypoxia tolerance of grass carp *Ctenopharyngodon idella* fed with high-fat diet. *Aquaculture Nutrition*, 26(2): 545-557. DOI:.org/10.1111/anu.13016.

Effect of micro coated selenium, vitamins C and E on growth performance, immune indices and liver enzymes in juvenile beluga (*Huso huso*)

Pourzelti A.H.¹; Seyed Hassani M.H.*¹; Adineh H.²; Sohrabi T.¹

*mirhamedhassani@yahoo.com

1-International Caspian Sturgeon Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). Rasht, P.O.Box: 3464-41635.

2- Gonbad Kavous University, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, P.O.Box: 4971799151.

Abstract

In the present experiment, the effect of a mixture of microcoated supplements of selenium nanoparticles (particle size 30 nm) (Pishgaman Nanomavad Company, Khorasan), vitamins C and E (0.1, 30, and 100 mg/kg: A diet), (0.2, 60, and 200 mg/kg: B diet), (0.3, 90, and 300 mg/kg: C diet) and a control diet (no supplement: D diet) on growth indices, feed efficiency, immune system, and liver enzymes of 120 beluga with an average initial weight of 77.34 ± 1.38 g grown in fiberglass tanks (supplied with a mixture of well and river water) in the form of 4 treatments (each with 3 replications) for 10 weeks were investigated. The fish were fed at 2% of body weight 3 times a day. At the end of the experiment, final weight (5%), body weight gain percentage (3.84%), specific growth rate (1.89 %/day) and daily growth (6.23%) in the fish fed with B diet were significantly higher than the control diet ($P < 0.05$). The activity of aspartate aminotransferase (SGOT) and alanine aminotransferase (SGPT) serum enzymes was higher than the fish fed with the control diet. ($P < 0.05$). significant difference was not observed in serum total immunoglobulin (Ig) fish fed diets B, C and control ($P > 0.05$), but serum ACh_{50} in fish fed control was significantly higher than diets A and B ($P < 0.05$), also there was no significant difference in serum lysozyme in control, A and B treatments ($P > 0.05$). The results of this study showed that adding 0.2, 60, and 200 mg/kg selenium nanoparticles, vitamins C and E to the commercial diet could significantly increase of final weight and growth indices, but more studies should be done on the effect of microcoated selenium nanoparticles on liver performance and biochemical indices of this species.

Keywords: *Huso huso*, Nanoselenium, Vitamins C and E, Growth indices, Food conversion ratio, Immune system, Liver enzymes

*Corresponding author