

مقاله علمی - پژوهشی:

تجمع فلزات سنگین جیوه و روی در بافت آبشنش و ارتباط آنها با برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی خون ماهی سی‌باس آسیایی (*Lates calcarifer*)

سیامک یوسفی سیاه‌کلروودی^{*}، وحید مرشدی^۱، پرستو محبی‌درخش^۳، مهیار یوسفی سیاه‌کلروودی^۴،

شمیری اصیل قاسم محمد^۵

* siamak.yousefi1@gmail.com

۱- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوای، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوای، ایران

۲- گروه شیلات و زیست‌شناسی دریا، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

۳- موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

۴- دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

۵- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاریخ پذیرش: خرداد ۱۴۰۳


تاریخ دریافت: فروردین ۱۴۰۳

چکیده

این تحقیق با هدف اندازه‌گیری و بررسی ارتباط بین فلزات سنگین (جیوه و روی) با برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خونی و بافت آبشنش ماهی سی‌باس پرورش یافته در قفس در پاییز ۱۴۰۱ واقع در بندر کنگان انجام گرفته است. نمونه‌ها پس از تشییت با الکل، به آزمایشگاه منتقل شدند. شاخص‌های زیست‌سنجدی ماهیان شامل وزن (گرم) (به‌وسیله ترازو و طول کل (سانتی‌متر) (به‌وسیله تخته زیست‌سنجدی اندازه‌گیری شدند. سپس از آبشنش هر ماهی نمونه تهیه و به‌وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتری جذب اتمی شعله، میزان غلظت هر فلز به‌دست آمد. برای ارزیابی تجزیه و تحلیل بافتی، نمونه بافت آبشنش جداسازی و به‌وسیله دستگاه پاساژ بافت تهیه شده و به‌روش هموتوکسین اوزین رنگ آمیزی شدند. سنجش شاخص‌های بیوشیمیایی خون نیز براساس دستورالعمل کیت تجاری انجام گردید. نتایج این پژوهش نشان داد، میانگین فلز جیوه و روی به ترتیب ۰/۱ و ۷/۵ میکروگرم بر گرم در خون ماهی‌ها بود. میانگین غلظت کورتیزول، گلوکز، آلبومین، پروتئین کل، کلسترول و تری‌گلیسرید به ترتیب ۵۰/۵ نانوگرم بر میلی‌لیتر، ۱۵۴/۳۳ میلی‌گرم بر دسی لیتر، ۱/۱۹ گرم بر دسی لیتر، ۳/۳۶ گرم بر دسی لیتر، ۱۹۴ میلی‌گرم بر دسی لیتر و ۲۴۴ میلی‌گرم بر دسی لیتر به‌دست آمد. در بررسی نمونه بافت آبشنش ماهی سی‌باس آسیایی عوارضی مانند پرخونی، خونریزی، هیپرپلازی، نکروز سلولی و تخرب لایه اپیتلیوم رشته‌های اولیه و ثانویه آبشنش، مشاهده گردید. غلظت فلزات سنگین جیوه و روی در بافت آبشنش ماهی سی‌باس مورد مطالعه، پایین‌تر از حداستاندارد تعیین شده از سوی WHO و FAO بود.

لغات کلیدی: سی‌باس آسیایی، هیستوپاتولوژی، شاخص‌های بیوشیمیایی، جیوه، روی

نویسنده مسئول*



Copyright: © 2023 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

مقدمه

و پروتئین تام شاید به دلیل عدم حلالیت تری گلیسیریدها در آب و انتقال در پلاسمای باشد. از این‌رو، با برخی لیپوپروتئین‌ها و کلسترول مجموعه‌ای تشکیل می‌دهند که قابل انتقال در پلاسمای باشد و افزایش ساخت این لیپوپروتئین‌ها بر پروتئین تام تاثیرگذار است. گلوکز اصلی‌ترین ماده به دست آمده از سوخت‌وساز مواد کربوهیدراتی است (Ahmadifar *et al.*, 2010). مقدار گلوکز خون شاخص مناسبی برای پاسخ‌های ثانویه استرس ماهی به شرایط نامناسب محیطی است (Cicik and Engin, 2005; Yousefi *et al.*, 2011). تغییرات خصوصیات خون ماهیان در پاسخ به شرایط زیستمحیطی، پاسخی است بر استرس‌های محیطی که می‌تواند به عنوان یک شاخص مهم زیستی مد نظر قرار گیرد (Bridges *et al.*, 1976).

تغییرات هیستوپاتولوژی به عنوان نشانگر زیستی استفاده می‌شوند، زیرا پاسخ اولیه بیولوژیک قابل اندازه‌گیری ناشی از قرارگیری در معرض آلاینده‌ها را نشان می‌دهند. رویدادهای هیستوپاتولوژی می‌توانند به سرعت آلودگی آب، سلامت بافت ماهی را تشخیص دهند. هدف از مطالعه هیستوپاتولوژی، مشاهده تغییرات سلولی ایجاد شده در اندام‌های هدف ماهی است و ابزاری برای تعیین سلامت جمعیت و منعکس کننده سلامتی کل اکوسیستم آبی است (Varanasi and Markey, 1978).

جیوه آلی در مقایسه با جیوه غیرآلی به طور موثرتری از طریق جذب مستقیم از آب (تفلیظ زیستی) و در طول زنجیره غذایی (بزرگ‌نمایی زیستی) به اندام‌ها و بافت‌های مختلف ماهی انتقال می‌یابد (Weiner and Spry, 1996). ترکیبات جیوه در ضدعفونی کننده‌ها و داروها کاربرد دارد (Calvert, 2004). جیوه در تولید برخی از دماستجه‌ها، سوئیچ‌های جیوه، الکترودها، انواع الکتروولیزها، باتری‌ها، سلول‌های جیوه و کاتالیت‌های، علف‌کش‌ها حشره‌کش‌ها، تهییه آلیاژ دندان و در آینه تلسکوپ‌ها نیز به کار می‌رود. مطالعات مختلفی در رابطه با تأثیر انواع مختلفی از آلاینده‌های فلزات سنگین بر گونه‌های مختلف ماهیان و آبزیان انجام شده است که از جمله می‌توان به مقایسه تجمع برخی فلزات سنگین (جیوه، مس و روی) در بافت کبد و

ماهی سیباس آسیایی (*Lates calcarifer*) از اعضاء خانواده بزرگ Latidae است که در آسیا به نام بأس دریایی و در استرالیا بارموندی شناخته می‌شود. سیباس به دلیل رشد سریع، تکثیر آسان، تحمل شوری بالا و توانایی در پدیرش غذای فرموله، از بهترین ماهیان پرورشی دریایی دنیا محسوب می‌شود به طوری که طبق گزارش FAO از کل تولید ماهیان دریایی پرورشی در سال ۱۹۶/۹، ۲۰۲۰ هزار تن مربوط به ماهی سیباس آسیایی بوده که این نکته بیانگر بازارپسندی این ماهی در دنیاست (FAO, 2022). در ایران با توجه به اهمیت اقتصادی آن و تقاضا برای غذای سالم دریایی، اخیراً در قالب پرورش ماهی در قفس در خلیج فارس و دریای عمان پرورش می‌یابند (Mazej *et al.*, 2010).

فلزات سنگینی که به صورت ترکیب با آنزیم‌ها وارد بدن انسان می‌شوند، به وسیله پروتئین‌ها حمل می‌شوند یا در چربی‌های بدن تجمع می‌یابند، تأثیرات نامطلوب بیشتری دارند (Askary Sary, 2010). وجود فلزات سنگین تنش اضافی به ماهی تحمیل می‌کند که این تنش منجر به بروز سایر تغییرات فیزیولوژیک در ماهی می‌شود (Sweety *et al.*, 2007). مکانیسم ورود فلزات سنگین، جذب و دفع آنها در ماهیان گوناگون متفاوت است. اما مشخص شده است که تأثیر سمی فلزات بر ماهی ارتباط معنی‌داری با شکل حضور آنها در آب دارد (Askary Sary *et al.*, 2012). تغییرات شاخص‌های خونی اغلب به تغییرات فیزیولوژیک و محیطی وابسته هستند. در شرایطی که ماهیان در معرض آلاینده‌های فلزات قرار گیرند، برخی فراسنجه‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی خون آنها تغییر می‌کند (Cicik and Engin, 2005; Sweety *et al.*, 2007). کلسترول ماده پیش‌ساخت هورمون‌های استروئیدی است که تحت شرایط استرس، غلظت آن در خون افزایش می‌یابد و ممکن است باعث افزایش ساخت هورمون کورتیزول باشد. افزایش بیش از حد کلسترول بیانگر بی‌نظمی سوخت‌وساز چربی و لیپوپروتئین به‌ویژه تحریب کارایی فیزیولوژیک کبد است. سطوح غلظت تری گلیسیرید و کلسترول به عنوان شاخص‌های اصلی وضعیت سلامت ماهیان استخوانی عالی مطرح است (Zhou *et al.*, 2009; Gul *et al.*, 2011).

کامل از آن خارج گردید. نمونه بافت‌های بخش آبشش، بسته‌بندی و شماره‌گذاری شدند. به منظور اندازه‌گیری جیوه و روی، ۴ گرم از هر نمونه در آون در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت خشک شدند. از هر نمونه خشک شده، داخل ارلن مایرهای ۱۰۰ میلی‌لیتر ریخته شده و روی هر کدام ۵ میلی‌لیتر هیدروژن پراکسید و میلی‌لیتر نیتریک اسید غلیظ اضافه شد. هضم نمونه‌ها در ظروف داغ در دمای ۲۰۰-۲۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴ ساعت و زیر هود تا شفاف شدن نمونه‌ها انجام گردید. سپس با عبور محلول‌های به دست آمده از کاغذ صافی، محلول‌های آماده اندازه‌گیری داخل ارلن مایرهای کاملاً تمیز جمع‌آوری شدند (Oguzie and Izerbigie, 2009). محلول‌های استاندارد فلزات مذکور از نمک‌های نیترات خالص مربوطه ساخت شرکت مرک آلمان تهییه گردید و پس از رسم نمودار کالیبراسیون، به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتری جذب اتمی شعله (FAAS) ساخت شرکت Shimadzu، مدل AA670G ساخت کشور ژاپن میزان غلظت هر فلز به دست آمد. غلظت نهائی فلزات بر حسب میکروگرم بر گرم وزن خشک بیان شد.

برای ارزیابی تجزیه و تحلیل بافتی، پس از تشریح، نمونه بافت آبشش جداسازی و نمونه‌های بافتی در محلول تشییت کننده بوئن قرار داده شدند و پس از ۴۸ ساعت از محلول بوئن خارج و تا زمان انجام مراحل بعدی در الكل ۷۰٪ نگهداری خواهند شد (Velma and Tchounwou, 2010). کلیه مراحل پاساز بافتی شامل آبگیری، شفاف‌سازی و آغشتگی در دستگاه پاساز بافت یا هیستوکینت و تحت برنامه زمان‌بندی شده انجام شد. نمونه‌های بافتی با ضخامت ۵-۴ میکرون طبق روش‌های روتین بافت‌شناسی، تهیه شده و با استفاده از محلول‌های هماتوکسیلین و اوزین، رنگ‌آمیزی شدند (Liu et al., 2011). سپس لامهای بافتی آماده با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین عکس‌برداری دیجیتال پس از شدید.

سنجهش شاخص‌های بیوشیمیایی خون (آلومین، تری‌گلیسیرید، گلوکز، پروتئین کل، کلسیتروول) نیز با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر براساس دستورالعمل کیت پارس آزمون انجام شد. بدین منظور، نمونه‌ها به آزمایشگاه تخصصی،

عضله ماهی کپور پرورشی و کپور دریایی (*Cypinus carpio*) (Meshkiniy and Rasooli Aghdam, 2019) بررسی تجمع غلظت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و جیوه) در عضله ماهی گوازیم دمرشت‌های (*Nemipterus japonicus*) (Khandanisharahi et al., 2018) بررسی تجمع فلزات سنگین در عضله ماهی کفشک تیزدندان (*Psettodes erumei*) (Alinejad et al., 2014) آبهای بوشهر، میزان فلزات سنگین آهن، مس، روی، منیزیم، منگنز، جیوه، سرب و کادمیوم در بافت‌های خوراکی و غیرخوراکی ماهی کفال پشت سبز (*Liza dussumieri*) در سواحل بوشهر (Naseri et al., 2005) انباستگی برخی عناصر سنگین در بافت‌های عضله، کبد و آبشش ماهی هامور (*Epinephelus coioiedes*) (Alinejad et al., 2014) اشاره کرد در تحقیق حاضر ارتباط بین فلزات جیوه و روی با برخی از فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و تجمع این فلزات در آبشش ماهی سی‌باس آسیایی مورد بررسی قرار گرفته است تا با تعیین مقدار شاخص‌های بیوشیمیایی خونی و ارتباط آنها با فلزات سنگین جیوه و روی، بتوان درک صحیحی از شرایط فیزیولوژیک این ماهی ارزشمند پیدا کرد.

مواد و روش کار

تهیه و آماده‌سازی نمونه‌ها

برای انجام این پژوهش، تعداد ۱۵ قطعه ماهی سی‌باس آسیایی در فصل پاییز ۱۴۰۱ به صورت کاملاً تصادفی با میانگین وزنی ۲۶۰/۶۴ گرم و میانگین طولی ۲۶/۸۲ سانتی‌متر از قفس‌های پرورشی واقع در استان بوشهر- بندر کنگان با مختصات طول و عرض جغرافیایی ۲۷.۸۰۵۹۶۸, ۵۱.۹۶۹۹۱۱ (۱)، ۲۷.۸۰۴۸۸۸, ۵۱.۹۶۹۴۹۶ و ۲۷.۸۰۵۴۴۶, ۵۱.۹۶۹۷۴۴ (۲)، صید شده و به همراه پودر بخ به محل آزمایشگاه دانشگاه خلیج فارس منتقل شدند (شکل ۱).

ماهی‌ها ابتدا با آب مقطر شستشو شدند تا عوامل آلاینده، پوشش لزج و ذرات خارجی جذب کننده فلزات از لایه سطحی آنها رفع گردد و سپس مورد زیست‌سنگی قرار گرفتند. وزن و طول ماهی‌ها به وسیله ترازوی دیجیتال با دقیقیت 0.1 میلی‌گرم و تخته زیست‌سنگی مدرج اندازه‌گیری و نتایج، در جداول ثبت گردید. سپس بافت آیشیش به طور

اختلاف معنی دار بین نتایج بررسی نمونه ها، از آزمون پارامتریک و پس از تعیین نرمال بودن داده ها، از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) با سطح اطمینان ۹۵٪ ($P < 0.05$) استفاده شد. داده ها بر اساس واحد میکرو گرم بر گرم وزن خشک (میانگین \pm انحراف معیار) بیان گردیده است.

دامپزشکی پایش سلامت (ویرومد گیلان) منتقل شده و با استفاده از ضریب مندرج در کاتالوگ اندازه گیری شدند. جهت مقایسه آماری نمونه ها از نرم افزارهای EXCEL و SPSS نسخه ۲۰ و روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده گردید. به منظور تعیین وجود یا فقدان



شکل ۱: نقشه منطقه مورد مطالعه در استان بوشهر- بندرکنگان

Figure 1- Map of the studied area in Bushehr Province- Bandarkangan

میانگین و انحراف معیار آنها در ماهی سیباس آسیایی در جدول ۳ ارائه شده است.

نتایج بافت‌شناسی

نتایج حاصل از مطالعه بافت آبتشش ماهی سیباس آسیایی پرورش یافته در قفسه های مستقر در بندر کنگان از استان بوشهر واقع در خلیج فارس نشان داد که فلزات جیوه و روی منجر به عوارضی در بافت آبتشش مانند پرخونی، خونریزی، هیپرپلازی، نکروز سلولی و تخریب لایه اپیتلیوم رشته های اولیه و ثانویه آبتشش، شده است (شکل های ۲ و ۳).

نتایج

نتایج حاصل از زیست‌سنگی ماهی های صید شده در جدول ۱ ارائه شده است. براساس آن، نمونه ماهی های مورد مطالعه از میانگین طولی $26/82 \pm 2/61$ سانتی متر و میانگین وزنی $265/64 \pm 94/70$ گرم برخوردار بودند (جدول ۱). نتایج حاصل از سنجش جیوه و روی در بافت آبتشش ماهی سیباس آسیایی نشان داد که میانگین غلظت جیوه در بافت آبتشش ماهی سیباس $0/1$ میکرو گرم بر گرم و میانگین غلظت روی $7/1$ میکرو گرم بر گرم بود (جدول ۲). نتایج سنجش سطح شاخص های بیوشیمیایی خون به همراه

جدول ۱: زیست‌سنگی ماهیان سی‌باس آسیایی در قفس‌های بندر کنگان

Table 1: Biometric results of Asian seabass fish samples in Kangan port cages

maximum	minimal	standard error	Mean	number	Variable
437.18	107.69	94.70	265.64	15	weight (gram)
31	22.00	2.61	26.82	15	Length (cm)

جدول ۲: حداقل، حداکثر و میانگین ± انحراف معیار غلظت جیوه و روی در آبشش ماهی سی‌باس آسیایی


Table 2: The minimum and maximum concentrations of mercury and zinc investigated along with their mean and standard deviation in the gills of Asian seabass

Mean ± standard deviation	Maximum metal concentration(µg/g dry weight)	Minimum concentration(µg/g dry weight)	The name of the metal
0 ± 0.1	0.1	0.1	mercury
7.5 ± 0.52915	8.1	7.1	Zinc

جدول ۳: سطح شاخص‌های بیوشیمیایی خون ماهی سی‌باس آسیایی


Table 3: The level of biochemical factors in the blood of Asian seabass

Mean ± standard deviation	Maximum concentration	Minimum concentration	Matter
0.09±1.19	1.27g/dl	1.22g/dl	Albumin
12.83±244.33	263mg/dl	mg/dl 222	Triglyceride
13.08±154.33	172mg/dl	135 mg/dl	Glucose
15.08±194	215mg/dl	171mg/dl	Cholesterol
0.20±3.36	3.57g/dl	2.95g/dl	Total protein
4.78±50.53	57ng/ml	45ng/ml	Cortisol



شکل ۲: مشاهده خونریزی (He)، چسبندگی رشته‌های ثانویه (Lf)، تخریب لایه اپیتلیوم رشته‌های اولیه و ثانویه (ستاره) و نکروز سلولی (N) در آبشش ماهی (N) (H&E, 40X)

Figure 2: Observation of bleeding (He), adhesion of secondary filaments (Lf), destruction of the epithelium layer of primary and secondary filaments (star) and cell necrosis (N) in fish gills (H&E, 40X)



شکل ۳: مشاهده خونریزی (He)، چسبندگی رشته‌های ثانویه (Lf)، تخریب لایه اپیتلیوم رشته‌های اولیه و ثانویه (ستاره) و نکروز سلولی (N) در آبشش (H&E, 40X)

Figure 3: Observation of bleeding (He), adhesion of secondary filaments (Lf), destruction of the epithelium layer of primary and secondary filaments (star) and cell necrosis (N) in the gill (H&E, 40X)

اختلاف معنی‌داری بین متغیر مستقل جیوه با متغیرهای وابسته شاخص‌های بیوشیمیایی مشاهده نشد ($p > 0.05$). همچنین آزمون همبستگی بین متغیرهای وابسته (میزان شاخص‌های بیوشیمیایی) و مستقل (غلظت جیوه و روی) نشان داد که رابطه همبستگی معنی‌دار بین غلظت جیوه در آبشش ماهی سی‌باس آسیایی با شاخص‌های بیوشیمیایی (آلومین، گلوکز، تری‌گلسرید، کورتیزول، پروتئین کل و کلسترول) وجود ندارد. از سویی، همبستگی بین غلظت روی با پروتئین کل و آلومین، معنی‌دار نبود، اما همبستگی معنی‌دار با گلوکز، کورتیزول و تری‌گلسرید و کلسترول مشاهده شد (جداوی ۷ و ۸).

نتایج بررسی مقایسه آماری نمونه‌ها

ابتدا جهت تعیین نرمال بودن داده‌ها تست شپیرو-ولیک اجرا شد. نتایج نشان داد که داده‌های شاخص‌های بیوشیمیایی همگی به جز آلبومین نرمال بودند ($p > 0.05$) (جدول ۴). سپس جهت تعیین سطح تغییرات معنی‌دار سطوح شاخص‌های بیوشیمیایی و ارتباط آنها با میزان غلظت فلزات سنگین جیوه و روی، از آزمون One Way Anova استفاده شد ($p < 0.05$) (جداوی ۵ و ۶). نتایج نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین نمونه‌ها در میزان شاخص‌های بیوشیمیایی خون ماهی به جز آلبومین و توatal پروتئین در ارتباط با غلظت روی مشاهده شد ($p < 0.05$) (جدول ۶). اما

جدول ۴: نتایج آماری آزمون نرمال بودن داده‌ها

Table 4: Statistical results of Kolmogorov-Smirnov data normality test

Biochemical factors	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Total Protein	0.192	15	0.142	0.853	15	0.019
Albumin	0.407	15	0.000	0.656	15	0.000
Glucose	0.138	15	0.200*	0.935	15	0.328
Cortisol	0.186	15	0.171	0.890	15	0.068
Triglycerid	0.165	15	0.200*	0.938	15	0.353
Colesterol	0.166	15	0.200	0.938	15	0.359

*This is a lower bound of the true significance

جدول ۵: اختلاف بین نمونه‌ها در میزان شاخص‌های بیوشیمیایی خون در ارتباط با میزان جیوه

Table 5: The difference between the samples in the level of blood biochemical factors in relation to the level of mercury

Biochemical factors		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Colestrol	Between Groups	162.450	2	81.225	.375	.695
	Within Groups	2596.883	12	216.407		
	Total	2759.333	14			
Triglisrid	Between Groups	40.533	2	20.267	.124	.884
	Within Groups	1960.800	12	163.400		
	Total	2001.333	14			
Glucose	Between Groups	136.600	2	68.300	.413	.671
	Within Groups	1985.133	12	165.428		
	Total	2121.733	14			
Cortisol	Between Groups	14.600	2	7.300	.333	.723
	Within Groups	263.133	12	21.928		
	Total	277.733	14			
Albumin	Between Groups	0.023	2	0.011	.920	.425
	Within Groups	0.148	12	0.012		
	Total	0.171	14			
Total protien	Between Groups	0.041	2	0.021	.481	.630
	Within Groups	0.514	12	0.043		
	Total	0.555	14			

جدول ۶: نتایج آماری One Way Anova ارتباط بین روى و شاخص‌های بیوشیمیایی خون

Table 6: One Way Anova statistical results of the relationship between zinc and blood biochemical factors

Biochemical factors		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Colestrol	Between Groups	1840.133	2	920.067	12.011	.001
	Within Groups	919.200	12	76.600		
	Total	2759.333	14			
Triglisrid	Between Groups	1370.533	2	685.267	13.036	.001
	Within Groups	630.800	12	52.567		
	Total	2001.333	14			
Glucose	Between Groups	1400.933	2	700.467	11.661	.002
	Within Groups	720.800	12	60.067		
	Total	2121.733	14			
Cortisol	Between Groups	184.933	2	91.467	11.578	.002
	Within Groups	94.800	12	7.900		
	Total	277.733	14			
Albumin	Between Groups	0.001	2	0.000	.018	.982
	Within Groups	0.170	12	0.014		
	Total	0.171	14			
Total protein	Between Groups	0.020	2	0.01	.228	.799
	Within Groups	0.534	12	0.045		
	Total	0.555	14			

جدول ۷: نتایج تست همبستگی بین غلظت فلز جیوه با شاخص‌های بیوشیمیابی خون ماهی

Table 7: Correlation test results between mercury metal concentration and fish blood biochemical factors

Biochemical factors		Total protein	Albumin	Glucose	Cortisol	Triglisrid	Colestrol	Hg
Total protein	Pearson Correlation	1	0.421	0.118	-0.299	-0.088	0.338	-0.077
	Sig. (2-Tailed)		0.118	0.676	0.280	0.755	0.218	0.786
	N	15	15	15	15	15	15	15
Albumin	Pearson Correlation	0.421	1	-0.164	-0.170	-0.036	0.182	-0.356
	Sig. (2-Tailed)	0.118		0.559	0.545	0.898	0.516	0.192
	N	15	15	15	15	15	15	15
Glucose	Pearson Correlation	0.118	-0.164	1	0.852**	0.831**	-0.830**	-0.193
	Sig. (2-Tailed)	0.676	0.559		0.000	0.000	0.000	0.491
	N	15	15	15	15	15	15	15
Cortisol	Pearson Correlation	-0.299	-0.170	0.852**	1	0.895**	-0.947**	-0.011
	Sig. (2-Tailed)	0.280	0.545	0.000		0.000	0.000	0.970
	N	15	15	15	15	15	15	15
Triglisrid	Pearson Correlation	-0.088	-0.036	0.831**	0.895**	1	-0.782**	-0.100
	Sig. (2-Tailed)	0.755	0.898	0.000	0.000		0.001	0.724
	N	15	15	15	15	15	15	15
Colestrol	Pearson Correlation	0.338	0.182	-0.830**	-0.947**	-0.782**	1	0.085
	Sig. (2-Tailed)	0.218	0.516	0.000	0.000	0.001		0.763
	N	15	15	15	15	15	15	15
Hg	Pearson Correlation	-0.077	-0.356	-0.193	-0.011	-0.100	0.085	1
	Sig. (2-Tailed)	0.786	0.192	0.491	0.970	0.724	0.763	
	N	15	15	15	15	15	15	15

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

جدول ۸: نتایج تست همبستگی بین غلظت فلز روی با شاخص‌های بیوشیمیابی خون ماهی

Table 8: Correlation test results between zinc metal concentration and fish blood biochemical factors

Biochemical factors		Total protein	Albumin	Glucose	Cortisol	Triglisrid	Colestrol	Zn
Total protein	Pearson Correlation	1	0.421	0.118	-0.299	-0.088	0.338	-0.152
	Sig. (2-Tailed)		0.118	0.676	0.280	0.755	0.218	0.588
	N	15	15	15	15	15	15	15
Albumin	Pearson Correlation	0.421	1	-0.164	-0.170	-0.036	0.182	-0.023
	Sig. (2-Tailed)	0.118		0.559	0.545	0.898	0.516	0.935
	N	15	15	15	15	15	15	15
Glucose	Pearson Correlation	0.118	-0.164	1	0.852**	0.831**	-0.830**	0.719**
	Sig. (2-Tailed)	0.676	0.559		0.000	0.000	0.000	0.003
	N	15	15	15	15	15	15	15
Cortisol	Pearson Correlation	-0.299	-0.170	0.852**	1	0.895**	-0.947**	0.803**
	Sig. (2-Tailed)	0.280	0.545	0.000		0.000	0.000	0.000

Biochemical factors		Total protein	Albumin	Glucose	Cortisol	Triglisrid	Colestrol	Zn
	N	15	15	15	15	15	15	15
Triglisrid	Pearson Correlation	-0.088	-0.036	0.831**	0.895**	1	-0.782**	0.772**
	Sig. (2-Tailed)	0.755	0.898	0.000	0.000		0.001	0.001
Colestrol	Pearson Correlation	0.338	0.182	-0.830**	-0.947**	-0.782**	1	-0.794**
	Sig. (2-Tailed)	0.218	0.516	0.000	0.000	0.001		0.000
Zn	Pearson Correlation	-0.152	-0.023	0.719**	0.803**	0.772**	-0.794**	1
	Sig. (2-Tailed)	0.588	0.935	0.003	0.000	0.001	0.000	

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

آبهاهای خلیج فارس نشان داد که بیشترین تجمع زیستی فلزات مذکور در آبشش بود که در مقایسه با حد مجاز استانداردهای بینالمللی، نشان داد که در سه گونه، بالاتر از حد مجاز بود (Norouzi *et al.*, 2019). اختلاف در نتایج پژوهش‌های تجمع زیستی فلزات سنگین در بافت‌های ماهی می‌تواند وابسته به عواملی مانند محل زیست ماهی، نوع گونه و تغذیه آنها باشد (Romeo *et al.*, 1999; Cogun *et al.*, 2006).

بحث

نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد، میانگین غلظت جیوه و روی در بافت آبشش ماهی سی‌باس آسیایی به ترتیب ۰/۱ و ۷/۵ ppm بود که کمتر از استانداردهای WHO, FAO, NHMRC و UK (MAFF, 1995) است (جدول ۹). نتایج بررسی تجمع فلزات سنگین (Pb, Cd, Hg, As) در بافت‌های عضله و آبشش سه گونه ماهی *Alectis*, *Lutjanus* و *Epinephelus chlorostigma.indicus*

جدول ۹: مقایسه میانگین غلظت فلزات جیوه و روی در بافت آبشش ماهی سی‌باس آسیایی با استانداردهای بینالمللی (میکروگرم بر گرم وزن خشک)

Table 9: Comparison of the average concentration of mercury and zinc metals in the gill tissue of Asian seabass with international standards (micrograms per gram of dry weight)

Standard	mercury	zinc	Source
WHO	0.5	100	(WHO,1995)
FDA	1	-	(Chen and Chen, 2001)
FAO	0.5	20	(FAO,2016)
NHMRC	0.3	150	(MAFF,1995)
UK(MAFF)	1.5	50	(Chen and Chen, 2001)
existence Research	0.1	7.5	Present research

WHO: Word Health Organization, FDA: Food and Drug Administration, NHMRC: National Health and Medical Research Council, MAFF: Ministry of Agriculture Fisheries and Food

(جیوه، کادمیوم، سرب) در عضله ماهی شوریده در بنادر صیادی آبادان و بندرعباس، میزان تجمع فلزات سنگین WHO جیوه در عضله ماهی شوریده کمتر از استانداردهای MAFF و MAFF (۱۹۹۵) گزارش گردید که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد. بررسی غلظت جیوه در آب و ماهی‌های سواحل جنوبی دریای خزر نشان داد که بیشتر نمونه‌های

در بررسی تجمع فلزات سنگین در عضله ماهی کفشک تیزندان (*Psettodes erumei*) آبهاهای بوشهر، میزان تجمع فلز روی در عضله سینه‌ای این ماهی ۰/۲۰۸ میکروگرم بر کیلوگرم گزارش گردید که پایین‌تر از استانداردهای بینالمللی قرار داشت (Askary Alinejad *et al.*, 2014). Sary و همکاران (۲۰۱۲) طی بررسی میزان فلزات سنگین

شاخص آلدگی فلزات، میزان این شاخص در عضله ماهی ۴۹/۸۶، کلیه ۴۷/۶۸ و کبد ۴۵/۲۶ بالاتر از تجمع زیستی بود (Shahnavazkhan *et al.*, 2020). نتایج تحقیق اخیر نشان از میزان بالای گلوکز خون داشت (جدول ۱۰) که می‌تواند به دلیل استرس واردہ در اثر آلاینده‌های فلزات سنگین باشد. در مطالعه Dange (۲۰۱۰) بر ماهی تیلاپیا (*Oreochromis mossambicus*), میزان گلوکز خون در غلظت‌های بالا و کم به مدت ۱۲ روز مورد مطالعه قرار گرفت که تفاوتی با گروه شاهد نداشت. مشابه این تحقیق، بررسی اثر سمیت فلز سرب بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون بچه‌ماهی فیتوفاگ (*Hypophthalmichthys molitrix*) بود که نتایج آن نشان داد، گلوکز پلاسمای با افزایش غلظت فلز سرب افزایش یافته و سطوح تری‌گلسرید و آلبومین در مواجهه با فلز سرب تغییر معنی‌داری نداشته است.

بافت‌های ماهی (کبد و عضله) در سواحل غربی دریای خزر بالاتر از استاندارد US.EPA و از استانداردهای WHO و EPA پایین‌تر بود (Abadi *et al.*, 2017). دلیل بالاتر بودن غلظت برخی نمونه‌های و مغایرت نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق حاضر، به دلیل شرایط فیزیکوشیمیایی دریای خزر و Koshafar and Velayatzadeh, 2016 تفاوت در بافت‌های مورد آزمایش است (Acanthopagus latus) به مصرف ماهی شانک زردباله (Yamuna (هند) به نتیجه مشابه این تحقیق رسیدند و گزارش کردند که میانگین میزان جیوه موجود در عضله ماهی شانک از حد آستانه استانداردهای جهانی پایین‌تر بوده است. نتایج مغایر این تحقیق در مطالعه‌ای در رودخانه آلدود (هند) بر ماهی *Oreochromis niloticus* انجام شد، فلزات سنگین موجود نمونه آب رودخانه مذکور از حد استاندارد بالاتر بود و ترتیب غلظت این فلزات عبارتند از: Fe> Mn> Zn> Cu> Ni> Cr> Cd.

جدول ۱۰: مقایسه شاخص‌های بیوشیمیایی خون اندازه‌گیری شده در تحقیق اخیر با پژوهش‌های قبلی

Table 10: Comparison of blood biochemical factors measured in the recent research with previous researches

Other studies (control treatment)	The average of the current research	Matter	Source
5.3g/dl	1.19 g/dl	Albumin	Fatahi <i>et al.</i> , 2022
458 mg/dl	244.33mg/dl	Triglyceride	Fatahi <i>et al.</i> , 2022
81.71 mg/dl	154.33 mg/dl	Glucose	Bangi <i>et al.</i> , 2000
332 mg/dl	194mg/dl	Cholesterol	Fatahi <i>et al.</i> , 2022
5.7 g/dl	3.36 g/dl	Total protein	Bangi <i>et al.</i> , 2000
5.169-26.6ng/ml	50.53 ng/ml	Cortisol	Bangi <i>et al.</i> , 2000

باشد (Zhou *et al.*, 2009). تغییرات معنی‌داری در پروتئین کل و میزان آلبومین در یافته‌های این پژوهش مشاهده نشد. در تحقیقی مشابه، میزان پروتئین کل با گذشت زمان و افزایش غلظت سرب افزایش یافته است (Shakoori and Abdali, 2017). تغییرات سطوح آلبومین پلاسمای به دلیل کاهش میزان نفوذ سدیم است (Alkahemal *et al.*, 2011). از آن جایی که آلبومین یکی از پروتئین‌های خون بوده و مهم‌ترین وظیفه آن حفظ فشار اسمزی خون است، کاهش نفوذپذیری سدیم پلاسمای باعث افزایش فشار اسمزی شده و در نتیجه موجب به‌هم ریختن تنظیمات آلبومین می‌شود. کاهش میزان پروتئین کل به دنبال کاهش میزان آلبومین است، زیرا آلبومین ۱۲ درصد از پروتئین کل است (Yousefi Jourdehi, 2006).

میزان کلسترول ابتدا افزایش یافته و سپس کاهش یافته است. میزان کلسترول در مطالعه اخیر پایین‌تر از تیمار پژوهش مذکور است. ممکن است آسیب واردہ به سلول‌های کبدی، موجب نشت و آزادسازی کلسترول به خون شود و سطح آن را در خون افزایش دهد (Mohiseni *et al.*, 2016). در همین زمینه، مطالعات مختلف بر افزایش سطح کلسترول پلاسمای در مواجهه با آلاینده‌های محیطی تأکید کرده‌اند (Luskova, 1995; Rabitto *et al.*, 2005). عوامل استرس‌زای محیطی (فلزات سنگین)، باعث تغییر سطح شاخص‌های بیوشیمیایی (آنزیم‌ها)، در بدن جانوران می‌شوند (Metwally, 2009). غلظت کلسترول خون ماهیان در بین و درون گونه‌ها با توجه به نوع تغذیه، شدت فعالیت و مرحله رشد و نمو جنسی می‌تواند متفاوت و متغیر

اندامه است. نتایج مشابه این تحقیق در بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک فلزات سنگین بر بافت آبشنش با عوارضی مانند جدا شدن اپیتلیوم، هایپرتروفی، هایپرپلازی، پرخونی و موکوس فراوان مشاهده شده است (Kohkan and Shaybak, 2017). در تحقیقی مشابه، عوارض ناشی از فلزات سنگین بر بافت آبشنش شامل نکروز بافتی، ملانیزه شدن سلول و تخریب اپیتلیوم در ماهی کپور گزارش شد (Ghovati *et al.*, 2011). اثرات سرب بر بافت آبشنش همراه با پرخونی، ادم، افزایش سلول‌های موکوسی، نکروزسلول‌های پوششی و هایپرپلازی سلول‌های پوششی گزارش شده است (Shahsavani *et al.*, 2009).

نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان داد که میزان غلظت دو فلز جیوه و روی در بافت آبشنش ماهی سی‌باس آسیایی صید شده از قفس، پایین‌تر از حد استاندارد تعیین شده از FAO و WHO بود. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که شاخص‌های بیوشیمیایی گلوکز، کورتیزول، تری‌گلیسرید در ماهیان مورد مطالعه در حد بالای نرمال بوده و در مورد کلسترول این نتیجه معکوس بود. در بررسی نمونه بافت آبشنش ماهی سی‌باس آسیایی عوارضی مانند پرخونی، خونریزی، هایپرپلازی و چسبندگی رشته‌های رشته‌های اولیه و ثانویه آبشنش، چماقی شدن رشته‌های ثانویه مشاهده گردید.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از پرسنل آزمایشگاه دانشگاه خلیج فارس بوشهر و آزمایشگاه انسیستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری که در انجام آزمایش‌های مرتبط با این تحقیق یاری رساندند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌گردد.

منابع

- Abadi, M., Zamani, A., Parizanganeh, A., Khosravi, Y. and Badiee, H., 2017.** Mercury concentration in water and fish samples along south coast of The Caspian Sea. *Iranian Journal of Health and Environment*, 10(3):329-338. (In Persian)

پروتئین‌های پلاسمای به جز ایمونوگلوبولین‌ها، در کبد ساخته می‌شوند. با توجه به اثر تخریبی فلز روی بر بافت کبد، ساخت پروتئین‌های کبد کاهش می‌یابد. در ضمن، اثر استرس ناشی از مسمومیت و گرسنگی منجر به کاهش پروتئین‌تام خون در ماهی می‌شود (Gluth and Hanke, 1985). ولی در مطالعه Zhou و همکاران (۲۰۰۹) اثر سوموم مختلف در زمان‌های متفاوت بر خون ماهی کپور معمولی مورد مطالعه قرار گرفت و گزارش کردند که میزان پروتئین پلاسمای کلسترول تحت تأثیر سوموم مختلف دچار کاهش می‌گردد. در بررسی‌های علمی موجود، افزایش سطح پروتئین کل پلاسمای کلسترول تحت تأثیر فلزات سنگین گزارش شده است. برای مثال، افزایش معنی‌دار پروتئین پلاسمای خون در ماهیانی که در معرض کادمیوم و مس قرار گرفته‌اند، گزارش Soltani and Khoshbavar Rostami, (2005).

نتایج بافت‌شناسی نشان داد که تمامی نمونه آبشنش‌های ماهی مورد مطالعه بافتی ناسالم بوده‌اند و عوارضی همچون پرخونی، خونریزی، هایپرپلازی و چسبندگی رشته‌های ثانویه، نکروز سلولی، تخریب لایه اپیتلیوم رشته‌های اولیه و ثانویه آبشنش، چماقی شدن رشته‌های ثانویه مشاهده گردید. علل پرخونی می‌تواند به دلیل آسیب و عفونت باشد. پرخونی به دنبال اتساع سرخرگ یا انسداد مسیر خروج خون سیاهگی دیده می‌شود. نفوذ آلاینده‌ها، استرس و ... موجب القاء هایپرپلازی سلول‌های اپیتلیومی و بهم چسبیدن متعاقب لاملاهای ثانویه در بافت آبشنش می‌شود. جوش خوردن لاملاها به یکدیگر، با وجود کاهش کیفیت فعالیت آبشنش‌ها، موجب افزایش فاصله بین محیط خارج و خون می‌شود و یک سد دفاعی را جهت جلوگیری از نفوذ بیشتر آلاینده‌ها به بدن ماهی و کاهش عوارض آسیب زننده آنها ایجاد می‌کند. هایپرپلازی اغلب پاسخی اولیه به تحریک غیرطبیعی در روند تکثیر سلولی بوده و در آن شکل میکروسکوپی سلول طبیعی بوده اما میزان تکثیر بیش‌تر از حد نیاز است. پرخونی یک مکانیسم دفاعی است که موجب کاهش فضای بین لاملایی، اتصال لاملاهای مجاور، کاهش آسیب‌پذیری آبشنش در برابر نفوذ آلاینده‌ها از طریق اپیتلیوم می‌شود. پرخونی، افزایش خون به

- Ahmdifar, A., Akrami, R., Ghelichi, A. and Mohammadi Zarejabad, A., 2010.** Effects of different dietary prebiotic insulin levels on blood serum enzymes, hematologic and biochemical parameters of great sturgeon (*Huso huso*) juveniles. *Comparative Clinical Pathology Journal*, 20: 447-451. DOI:10.org/10.1007/s00580-010-1017-2
- Alinejad, S., Shoaibi Omrani, B., Shokrzadeh, M., Ghaem Maghami, S., Yasemi, M. and Amini Fard, A., 2014.** Heavy metals accumulation in muscles of *Psettodes erumei* in Boushehr waters. *Journal of Aquatic Animals Nutrition*, 1(2): 55-64. (In Persian)
- Alkahemal, H., Zobeir, A., Alisoleiman, A., Almisned, F. and Alamin, M., 2011.** Toxicity bioassay of lead acetate and effects of its sublethal exposure on growth, haematological parameters and reproduction in *Clarias gariepinus*. *African Journal of Biotechnology*, 10(53):11039-11047. <http://doi.org/10.5897/ajb11.1463>
- Askary Sary, A., 2010.** The study of Heavy metals (Pb, Hg and Cd) in (*Barbus grypus*) and (*Liza abu*) in Karoon and Karkheh rivers. *Journal of Marine Biology*, 1(4):107-95. (In Persian)
- Askary Sary, A., Javahery Baboli, M., Mahjob, S. and Velayatzadeh, M., 2012.** The comparison of heavy metals (Hg, Cd, Pb) in the muscle of *Otolithes ruber* in Abadan and Bandar Abbas Ports, the Persian Gulf. *Iranian Scientific Fisheries Journal*, 21(3):99-106. (In Persian)
- Bagni, M., Archetti, L., Amadori, M. and Marino, G., 2000.** Effect of long-term oral administration of an immunostimulant diet on innate immunity in sea bass (*Dicentrarchus labrax*). *Journal of veterinary medicine. B, Infectious diseases and veterinary public health*, 47(10):745-51. DOI:10.1046/j.1439-0450.2000.00412.x.
- Bridges D.W., Cech, J.J. and Pedro, D.N., 1976.** Seasonal haematological changes in winter flounder, *Pseudopleuronectes americanus*. *Transaction of American Fisheries Society*, 5: 596-600.
- Calvert, J.B. 2004.** Mercury: the role of mercury, especially its uses in science and engineering. Available at: <http://www.du.edu/~jcalvert/phys/mercury.htm#pois> (Accessed on may2004.)
- Cicik, B. and Engin, K., 2005.** The effects of cadmium on levels of glucose in serum and glycogen reserves in the liver and muscle tissues of *Cyprinus carpio* (L., 1758). *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences*, 29(1): 113-117.
- Chen, Y.C. and Chen, M.H., 2001.** Heavy metal concentrations in nine species of fishes caught in coastal waters off Ann-Ping, S.W. Taiwan. *Food and Drug Analysis*, 9: 107-111.
- Cogun, H.Y., Yuzereroglu, T.A., Firat, O., Gok, G. and Kargin, F., 2006.** Metal concentrations in fish species from the Northeast Mediterranean Sea. *Journal of Environmental Monitoring and Assessment*, 121: 431-438. <http://doi.org/10.1007/s10661-005-9142-0>

- Dange, D.A., 2010.** Changes in carbohydrate metabolism in tilapia, *Oreochromis mossambicus*, during short-term exposure to different types of pollutants environmental pollution. *Journal of Animal and Veterinary*, 41(2):165-177.
- FAO, 2022.** The State of World Fisheries and Aquaculture 2020.FAO, Italy, 236 P.
- FAO/WHO, 2016.** Accumulation of heavy metals in fishes of freshwater. Available at: <https://www.slideshare.net>. (Accessed on 3 August 2021).
- Fatahi, S., Mahmoud Hafezieh, M. and Sharifian, M., 2022.** Compensatory growth of Asian sea bass (*Lates calcarifer*) following short term starvation periods and refeeding: effects on growth and feeding performances, body composition and blood biochemical parameters, *Journal of Animal Environment*, 14(3):261-268.
- Ghovati, N., Mohammadi, S. and Mohammadi, V., 2011.** Comparison and investigation of hardness and alkalinity changes with heavy metal poisoning in common carp. *Journal of Wetland Ecobiology*, (2):21-28. (In Persian)
- Gluth, G. and Hanke, W., 1985.** A comparison of physiological changes in carp, *Cyprinus carpio*, induced by several pollutants at sublethal concentrations. I. The dependency on exposure time. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 9(2):179-188.
- Gul, Y., Gao, Z.X., Qian, X.Q. and Wang, W.M., 2011.** Hematological and serum biochemical characterization and comparison of wild and cultured northern snakehead (*Channa argus* Cantor, 1842). *Journal of Applied Ichthyology*, 27: 122-128. <http://doi.org/10.1111/j.1439-0426.2010.01565.x>
- Khandanisharabi, T., Taghavi, L., Valinassab, T. and Aienjamshid, K., 2018.** Determination of heavy metals (Pb, Cd & Hg) Accumulation in *Nemipterus japonicas* in the Northern Persian Gulf and reveal health risks. *Journal of Animal Environment*, 9(4):183-192. (In Persian)
- Kohkan, O. and Shaybak, N., 2017.** Histopathological effects of heavy metals on fish liver and gill tissue. *Shipping and Maritime Technology*, 4(1):19-30. (In Persian)
- Koshafar, A. and Velayatzadeh, M., 2016.** Risk assessment to consumers from mercury in *Acanthopagrus latus*. *Journal of Food Hygiene*, 6(3):21-33. (In Persian)
- Liu, X.J., Luo, Z., Li, C.H., Xiong, B.X., Zhao, Y.H. and Li, X.D., 2011.** Antioxidant responses, hepatic intermediary metabolism, histology and ultrastructure in *Synechogobius hasta* exposed to water borne cadmium. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 74:1156-1163.
- Luskova, V., 1995.** Determination of normal values in fish. *Acta Universitatis Carolinae Biologica*. 39:191-200.
- MAFF, 1995.** Monitoring and surveillance of nonradioactive contaminants in the aquatic environment and activities regulating the disposal of wastes at sea, 1993. *Aquatic*

- Environment Monitoring Report No. 44. Direcorate of Fisheries Research, Lowestoft.
- Mazej, Z.S., Sayegh-Petkovšek, A. and Pokorný, B., 2010.** Heavy metal concentrations in food chain of lake Velenjsko jezero, Slovenia: an artificial lake from mining. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology*, 58:998-1007.
- Meshkiniy, S. and Rasooli Aghdam, H., 2019.** Comparing accumulation of some heavy metals (mercury, copper, zinc) in liver and muscle tissues of grown carp and sea carp. *Veterinary Research and Biological Products*, 32(2):75-83. (In Persian)
- Metwally, M., 2009.** Effect of garlic (*Allium sativum*) on some heavy metal (copper and zinc) induced alteration in serum lipid profile of *Oreochromis niloticus*. *World Journal of Fish and Marine Sciences*, 1:1-6.
- Mohiseni M., Asayesh S., Shafiee Bazarnoie S., Mohseni F., Moradi N., Matouri M. and Mirzaee, N., 2016.** Biochemical alteration induced by cadmium and lead in common carp via an experimental food chain. *Iranian Journal of Toxicology*, 10(4):25-32.
- Naseri, M., Afshar Naderi, A., Abedi, E. and Rezaei, M., 2005.** Measuring the amounts of some heavy elements (Iron, Copper, Zinc, Magnesium, Manganese, Mercury, Lead and Cadmium) in edible and non-edible tissues Green-backed mullet (*Liza dussumieri*) shores of Bushehr. *Journal of Marine Science and Technology*, 4(3-4):59-67. (In Persian)
- Norouzi, M., Sadeghi, M.M., Bagheri Tavani, M. and Zandavar, H., 2019.** Heavy Metal Accumulation in Tissues of Three Fish Species from the Persian Gulf. *Journal of Environmental Science and Technology*, 21(6):197-212. (In Persian)
- Oguzie, F.A. and Izerbigie, A.A., 2009.** Heavy Metals concentration in the organs of the silver Catfish, *Chrysichthys nigrodigitatus* (Lacèpéde) caught upstream of the Ikoba River and the reservoir in Benin City. *Bioscience Research Communications*, 21(4):189-197.
- Rabbitto, I.S., Costa, J.A., De Assis, H.S., Pelletier, E., Akaishi, F.M., Anjos, A. and Ribeiro, C.O., 2005.** Effects of dietary Pb (II) and tributyltin on neotropical fish, *Hoplias malabaricus*: histopathological and biochemical findings. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 60(2):147-156.
- Romeo, M., Siau, Y., Sidoumou, Z. and Genassia- Garelli, M., 1999.** Heavy metal distribution in different fish species from the Mauritania coaste. *Science of the Total Environment*, 232:169-175.
- Shahsavani, D., Movassaghi, A.R. and Omidzahir, SH., 2009.** Protective effect of thiamine on the induced lesions by experimental lead poisoning in gold fish (*Carassius auratus*). *Journal of Veterinary Research*. 64(3):237-242. (In Persian)
- Shahnava Khan, M., Javed, M., Rahman, M.D. and Iresh Ahmed, M.D., 2020.** Heavy metal pollution and risk assessment by the battery of toxicity tests, *Scientific Reports*, 10:16593. DOI:10.1038/s41598-020-73468-4
- Shakoori, M. and Abdali, S., 2017.** Effect of Lead on Some Biochemical Indices of Farmed Silver Carp (*Hypophthalmichthys*

- molitrix). *Journal of Marine Science & Technology Research*, 12(1):1-12. (In Persian)
- Soltani, M. and Khoshbavar Rostami, H., 2005.** The effect of diazinon on haematological indices and LC50 (96 h) of *Acipenser nudiventris*. *Iranian Scientific Fisheries Journal*, 14(3):49-60. (In Persian)
- Sweety, R.R., Sajwan, K.S. and Kumar, K.S., 2007.** Influence of zinc on cadmium induced hematological and biochemical responses in freshwater teleost fish *Catla catla*. *Fish Physiology and Biochemical Journal*, 34:169-174.
- Varanasi, U. and Markey, D., 1978.** Uptake and release of lead and cadmium in skin and mucus of Coho Salmon Comparative. Biochemistry and Physiology, 60, 187-192.
- Velma, V. and Tchounwou, P.B., 2010.** Chromium-induced biochemical, genotoxic and histopathologic effects in liver and kidney of goldfish, *Carassius auratus*. *Mutation Research*, 698:43-51.
- Wiener, J.G. and Spry, D.J., 1996.** Toxicological significance of mercury in freshwater fish. in: Beyer, W.N., Heinz, G.H., Rdmon-Norwood, A.W. (eds.). Environmental Contamination in wildlife: Interpreting Tissue Concentration. SETAC Special.
- World Health Organization (WHO), 1995.** Health risks from marine pollution in Mediterranean. Part I implications for policy makers, Switzerland. 255 P.
- Yousefi, M., Abtahi, B. and Abdian Kenari, A., 2011.** Hematological, serum biochemical parameters, and physiological responses to acute stress of Beluga sturgeon (*Huso huso*) juveniles fed dietary nucleotide. *Comparative Clinical Pathology Journal*, 18:1-6.
- Yousefi Jourdehi, A., 2006.** Determining the relationship of some blood and osmotic indicators in the process of sexual development of farmed ozone fish (*Acipenser stellatus*). Master's thesis. Islamic Azad University, Lahijan branch, Iran. (In Persian)
- Zhou, X., Li, M., Abbas, Kh. and Wang, W., 2009.** Comparison of hematology and serum biochemistry of cultured and wild Dojo loach *Misgurnus anguillicaudatus*. *Fish Physiology and Biochemical Journal*, 35:435-441. <http://doi.org/10.1007/s10695-008-9268-4>

Accumulation of heavy metals mercury and zinc in the gill tissue and their relationship with some blood biochemical parameters of Asian seabass (*Lates calcarifer*)

Yousefi Siahkalroodi S.^{1*}; Morshedi V.²; Mohebi derakhsh P.³; Yousefi Siahkalroodi M.⁴;
Asil Ghasem Mohammad S.⁵

1-Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Pishva, Iran

2- Persian Gulf Research Center, University of Persian Gulf, Bushehr

3-Iranian Fisheries Science Research Institute, Agriculture Research Education and Organization, Tehran, Iran

4-Faculty of Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

5-Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract

This research was conducted with the aim of measuring and investigating the relationship between heavy metals (mercury and zinc) and some biochemical factors of blood and gill tissue of sea bass (*Lates calcarifer*) grown in cages in fall of 2022, located in Kangan port. After fixing the samples with alcohol, they were transferred to the laboratory. The biometric indexes of the fish including weight in grams were measured using a scale and total length in centimeters using a biometric board. Then, a sample of the gills of each piece of fish was prepared and the concentration of each metal was obtained by flame atomic absorption spectrophotometry. To evaluate histological analysis, gill tissue samples were separated and stained by hematoxylin and eosin method. Blood biochemical factors were measured according to the instructions of the commercial kit. The results of this research showed that the average metal mercury and zinc were 0.1 and 7.5 microgram/g respectively in the fish blood serum of the samples. which was lower than WHO and FAO standards. The average concentration of cortisol, glucose, albumin, total protein, cholesterol and triglycerides were 50.55 ng/l, 154.33 mg/ dl, 1.19 g/dl, 3.36 g/dl, 194 mg/dl and 244 mg/dl were obtained, respectively. In the examination of the gill tissue sample of Asian seabass, complications such as hyperemia, bleeding, hyperplasia, cell necrosis and destruction of the epithelium layer of the primary and secondary strands of the gill were observed. The concentration of heavy metals mercury and zinc in the gill tissue of the studied seabass was lower than the standard limit determined by FAO and WHO.

Keywords: Asian seabass, Histopathology, Biochemical parameters, Mercury, Zinc

*Corresponding author