

اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونی بره‌های نر پرواری آمیخته زل

۱- رادمان بختیاری

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ایمیل: radman.bakh@gmail.com

شماره تماس: ۰۹۳۳۴۰۲۹۳۳۸

۲- یداله چاشنی دل (نویسنده مسئول)

دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ایمیل: yhashnidel2002@yahoo.com

شماره تماس: ۰۹۱۱۳۵۴۴۲۵۳

۳- اسداله تیموری یانسری

استاد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ایمیل: astymori@yahoo.com

شماره تماس: ۰۹۱۱۳۵۵۳۳۷۸

1- Radman Bakhtiari

Master of science student in animal nutrition, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources

2- Yadollah Chashnidel (Corresponding author)

Associate Professor, Department of Animal Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources

3- Asdollah Teymouri Yanesari

Professor, Department of Animal Sciences, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources

اثر منابع مختلف سلیوم در جیره بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های نر پرواری آمیخته نژاد زل

چکیده

جهت بررسی اثرات منابع مختلف مکمل‌های آلی و معدنی سلیوم در بره‌های نژاد آمیخته زل، آزمایشی با استفاده از تعداد ۲۵ رأس بره نر با سن ۴-۵ ماه و میانگین وزن بدن $(32/4 \pm 1/5)$ کیلوگرم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار به مدت ۸۴ روز انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱- جیره غذایی پایه بدون مکمل سلیوم (شاهد) ۲- جیره پایه + ۰/۵ میلی گرم سلیوم در کیلوگرم ماده خشک به شکل سلیوم گلايسين ۳- جیره پایه + ۰/۵ میلی گرم سلیوم در کیلوگرم ماده خشک به شکل سلیوم متیونین ۴- جیره پایه + ۰/۵ میلی گرم سلیوم در کیلوگرم ماده خشک به شکل سلیوم سیستین ۵- جیره پایه + ۰/۵ میلی گرم سلیوم در کیلوگرم ماده خشک به شکل سلیوم سدیم بودند. نتایج نشان داد که افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در بره‌های دریافت کننده مکمل‌های سلنومتیونین و سلنوسیستین نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری بهبود پیدا کردند ($P < 0/05$). غلظت سلیوم پلاسما در تمامی تیمارهای دریافت کننده سلیوم نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری افزایش یافت ($P < 0/05$). در تیمارهای حاوی مکمل‌های سلنومتیونین و سلنوسیستین، افزایش معنی داری در غلظت هورمون تری‌یدوتیرونین نسبت به گروه‌های سلیوم معدنی و شاهد مشاهده شد ($P < 0/05$). همچنین غلظت سرمی تترایدوتیرونین در تمامی بره‌های دریافت کننده مکمل سلیوم در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت ($P < 0/05$) و نسبت تترایدوتیرونین به تری‌یدوتیرونین در تیمارهای حاوی مکمل آلی سلیوم نسبت به گروه شاهد کمتر بود ($P < 0/05$). به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت، افزودن ۰/۵ میلی گرم سلیوم در کیلوگرم ماده خشک به جیره پایه از هر دو منبع آلی و معدنی، سبب بهبود عملکرد رشد بره‌های پرواری شد.

واژه‌های کلیدی: بره، سلیوم آلی، سلیوم معدنی

Effects of different dietary sources of selenium on growth performance and some blood parameters in crossbred Zel fattening male lambs

This study was conducted to investigate the effects of different sources of organic and inorganic selenium supplements in crossbred Zel lambs. Twenty-five male lambs aged 4-5 months and with average body weight (32.4 ± 1.5 kg) were assigned to 5 treatments with 5 repetitions, as a completely randomized design for 84 days. The experimental treatments were: 1) basal diet without selenium supplement (control); 2) basal diet + 0.5 mg Se/kg DM as selenium glycine; 3) basal diet + 0.5 mg Se/kg DM as selenium methionine; 4) basal diet + 0.5 mg Se/kg DM as selenium cysteine, and 5) basal diet + 0.5 mg Se/kg DM as sodium selenite. The results showed that daily weight gain and feed conversion ratio in lambs receiving selenium methionine and selenium cysteine supplements improved significantly compared to those in the control group ($P < 0.05$). Plasma selenium concentration increased significantly in all treatments supplemented with selenium compared to that in the control group ($P < 0.05$). In the treatments containing selenium methionine and selenium cysteine supplements, the concentration of triiodothyronine hormone increased significantly compared with the treatments containing inorganic selenium and the control group ($P < 0.05$). In addition, the serum concentration of tetraiodothyronine decreased in all lambs receiving selenium supplements compared to that in the control group ($P < 0.05$), and the tetraiodothyronine/triiodothyronine ratio was lower in the treatments containing organic selenium supplement than in the control group ($P < 0.05$). In general, it can be concluded that adding 0.5 mg Se/kg DM to the basic diet from both organic and inorganic sources improved the growth performance of fattening lambs.

Key words: Inorganic selenium, Lamb, Organic selenium.

مقدمه

مواد معدنی از جمله مواد مغذی مورد نیاز دام هستند، به طوری که یکی از عوامل بهبود دهنده متابولیسم در مسیرهای تولید و یا مصرف انرژی می باشد (Suttle، ۲۰۱۰). سلیوم یکی از مواد معدنی کم مصرف و ضروری در تغذیه دام می باشد که افزودن آن به جیره غذایی نشخوارکنندگانی مانند گوسفند می تواند بهبود عملکرد، سلامت و تولید مثل را به همراه داشته باشد (Pavel، ۲۰۱۵). سلیوم با شرکت در ساختمان سلنوپروتئین ها نقش مهمی در سیستم آنتی اکسیدانی بدن ایفا می نماید (Song و همکاران، ۲۰۱۵). سلیوم بخش مهمی از آنزیم گلوکاتایون پراکسیداز را تشکیل می دهد که به عنوان یک آنتی اکسیدان مسئول حفاظت از ساختار داخلی سلولی و غشاء در برابر رادیکال های آزاد بوده که فعالیت بهینه آن در غده تیروئید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد (Zubair و همکاران، ۲۰۱۵)، زیرا این آنزیم در خنثی نمودن پراکسید هیدروژن تولید شده طی متابولیسم و رادیکال های پراکسید حاصل از اکسیداسیون چربی ها مؤثر است (Zhang و همکاران، ۲۰۱۳). سلیوم برای بیوستز سلنوپروتئین های دارای سلنوسیستین از جمله یدوتیرونین دیودینازها و تیوردوکسین ردوکتازها که نقش مهمی در متابولیسم هورمون های تیروئیدی، تنظیم پتانسیل اکسیداسیون-احیا و جلوگیری از آسیب اکسیداتیو دارند، ضروری می باشد (Kachuee و همکاران، ۲۰۱۳). آنزیم یدوتیرونین دیودیناز در تبدیل شکل غیرفعال هورمون های

تیروئیدی (تیروکسین) به شکل فعال (تری‌یدوتیرونین)، نقش مهمی بر عهده دارد و با توجه به این که هورمون‌های تیروئیدی در ارتباط مستقیم با متابولیسم عمومی بدن می‌باشند، از این طریق افزایش غلظت و فعالیت آن‌ها می‌تواند رشد را تحت تأثیر قرار دهد (Suttle, 2010). همچنین استفاده از اشکال مختلف آلی و معدنی سلنیوم، بر میزان جذب آن در دستگاه گوارش تأثیر می‌گذارد. مقدار ۰/۲۲ تا ۰/۴۴ میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک، توصیه جداول NRC (2007) برای بره‌های در حال رشد می‌باشد. فعالیت زیستی سلنیت سدیم پایین می‌باشد و نیز مشارکت پایینی در فرآیندهای متابولیکی درون سلولی دارد (Suttle, 2010). سلنیوم مخمری به طور متوسط دارای ۶۰ درصد سلنومتیونین و ۴۰ درصد سلنوسیستین می‌باشد که سلنوسیستین توان ذخیره‌شوندگی پایین‌تری نسبت به سلنومتیونین دارد، در حالی که نوع معدنی سلنیوم دارای زیست‌فراهمی ۵۰ درصد است؛ این در حالی است که سلنیوم مخمری دارای زیست‌فراهمی ۷۵ الی ۹۵ درصد می‌باشد و زیست‌فراهمی برای نوع سلنومتیونین به بیش از ۹۵ درصد می‌رسد (Oskoueian و همکاران، 2021). علاوه بر موارد ذکر شده، نتایج متفاوتی از مکمل‌دهی منابع مختلف عنصر سلنیوم بر شاخص‌های عملکرد رشد، غلظت متابولیت‌های خون، غلظت سلنیوم خون و اثر متقابل آن با سایر عناصر معدنی، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و غلظت آنزیم‌های کبدی و همچنین غلظت هورمون‌های تیروئیدی در بره‌های پرواری بومی به دست آمده است (آل‌سعدی و همکاران، 1397؛ ابوالفضلی و همکاران، 1397؛ قربانی و همکاران، 2016؛ Mousaie و همکاران، 2014؛ Alimohamady و همکاران، 2013). با این حال مطالعات کمی در خصوص شناسایی بهترین منبع سلنیوم برای بره‌های بومی نژاد آمیخته زل صورت گرفته است، بنابراین تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثر مکمل‌دهی مقدار ۰/۵ میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک از منابع آلی این عنصر (سلنیوم گلایسین، سلنیوم متیونین و سلنیوم سیستین) با منبع معدنی (سلنیت سدیم) بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های خونی در بره‌های نر پرواری نژاد آمیخته زل به انجام رسید.

مواد و روش‌ها

این پژوهش در ایستگاه تحقیقات دامپروری گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری در پاییز سال ۱۴۰۱ انجام شد. بدین منظور از تعداد ۲۵ رأس بره نر نژاد آمیخته زل با سن ۴-۵ ماه و با میانگین وزن بدن $(32/4 \pm 1/5)$ کیلوگرم به مدت ۸۴ روز (۱۴ روز عادت‌پذیری و ۷۰ روز آزمایش) استفاده شد. بره‌ها با شروع دوره اصلی توزین شده تا وزن اولیه آن‌ها به دست آید. سپس به طور تصادفی به ۵ تیمار (هر تیمار شامل ۵ بره) در قفس‌های انفرادی تقسیم‌بندی شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱- جیره مصرفی پایه بدون مکمل سلنیوم (حاوی ۰/۰۷۳ میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک خوراک) به عنوان گروه شاهد؛ ۲- جیره پایه + ۰/۵ میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک خوراک به شکل سلنیوم گلایسین (با خلوص ۰/۱۸ درصد)؛ ۳- جیره پایه + ۰/۵ میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک خوراک به شکل سلنیوم متیونین (با خلوص ۰/۱۸ درصد)؛ ۴- جیره پایه + ۰/۵ میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک خوراک به شکل سلنیوم سیستین (با خلوص ۰/۲ درصد) و ۵- جیره پایه + ۰/۵ میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک خوراک به شکل سلنیت سدیم (با خلوص ۲ درصد) بودند. همچنین جهت اندازه‌گیری غلظت سلنیوم در کل جیره پایه از دستگاه جذب اتمی (مدل

Fx210، ساخت شرکت Rayleigh، چین) استفاده شد. در این پژوهش از سبوس گندم نیز به عنوان حامل مکمل‌ها استفاده گردید و جیره بره‌های پرواری در این پژوهش با نرم‌افزار SRNS تنظیم شد و اقلام خوراکی مورد استفاده به‌صورت جیره کاملاً مخلوط (TMR) حاوی علوفه و کنسانتره به‌نسبت ۷۰:۳۰ در اختیار حیوانات مورد آزمایش قرار گرفت. ترکیبات جیره غذایی در جدول (۱) نمایش داده شده است و جهت تعیین مقدار ترکیبات شیمیایی جیره از روش‌های استاندارد (AOAC، ۲۰۰۲؛ ون‌سوست و همکاران، ۱۹۹۱) استفاده شد.

جمع‌آوری نمونه‌ها و تجزیه آزمایشگاهی

روزانه مقدار مشخصی خوراک طبق نیاز بره‌های پرواری توزین شد (۱۰ درصد بیشتر از مقدار اشتهای دام‌ها در روز قبل) و در دو نوبت ۸ صبح و ۱۷ عصر در اختیار بره‌ها قرار گرفت. همچنین قبل از خوراک‌دهی، مقدار باقیمانده خوراک روز قبل توزین و از مجموع خوراک روز قبل کسر شد، تا مقدار مصرف خوراک هر یک از بره‌های آزمایشی در هر روز به‌دست آید. وزن‌کشی در ساعت مشخص و قبل از مصرف خوراک (با اعمال ۱۲ تا ۱۴ ساعت محرومیت از مصرف خوراک) هر ۲ هفته یک‌بار به وسیله باسکول دیجیتال (مدل SV7000، ساخت ایران) انجام شد. ضریب تبدیل غذایی در دوره‌های مختلف آزمایش از تقسیم میانگین مقدار خوراک مصرفی به میانگین افزایش وزن زنده بره‌های هر تیمار محاسبه شد.

در روز ۸۴ دوره پرواربندی خون‌گیری از دام‌ها قبل از مصرف وعده خوراک صبح (با اعمال ۱۲ ساعت محرومیت از مصرف خوراک) صورت گرفت. ۵ میلی‌لیتر خون از سیاهرگ گردنی هر بره دریافت شد و بلافاصله نمونه خون به دو لوله جداگانه یکی حاوی هپارین جهت به‌دست آوردن پلاسما و دیگری بدون هپارین جهت به‌دست آوردن سرم تخلیه شد و با رعایت اصول سرد نگه داشتن به‌سرعت به آزمایشگاه ارسال شد. سرم جهت تعیین مقدار متابولیت‌های خونی، هورمون‌های تیروئیدی و آنزیم‌های شاخص تخریب بافتی و پلاسما جهت تعیین غلظت عناصر معدنی مورد آزمایش قرار گرفتند. اندازه‌گیری غلظت گلوکز، کلسترول، تری‌گلیسیرید، پروتئین تام و نیتروژن اوره‌ای سرم خون توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر (مدل Alcyon 300، آمریکا) و به‌وسیله کیت‌های اختصاصی شرکت پارس آزمون انجام شد. اندازه‌گیری آلبومین با روش رنگ‌سنجی بروم‌کروزول‌گرین، توسط کیت پارس آزمون و با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر، طبق دستورالعمل کیت انجام شد. غلظت گلوبولین در هر یک از نمونه‌های سرم خون، از تفاضل غلظت پروتئین تام و آلبومین همان نمونه به‌دست آمد. غلظت هورمون‌های تیروئیدی سرم توسط دستگاه ایمونوآنالایزر (مدل Cobas-e411، ساخت کمپانی Roche آلمان) اندازه‌گیری شد. فعالیت آنزیم‌های آسپاراتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، کراتین فسفوکیناز و آلانین آمینوترانسفراز با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر (مدل Cobas Integra 400 plus، ساخت کمپانی Roche آلمان) تعیین شد. غلظت عناصر معدنی سلیوم، مس، آهن و روی پلاسما توسط دستگاه جذب اتمی (مدل SpectrAA220 FS، ساخت کمپانی Varian استرالیا) اندازه‌گیری شد.

طرح آماری

این آزمایش با استفاده از تعداد ۲۵ رأس بره نر پرواری (۵ تیمار و ۵ تکرار)، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی انجام گردید. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن با سطح احتمال خطای ۰/۰۵ انجام و با نرم‌افزار آماری SAS (9.1) و براساس مدل $Y_{ij} = \mu + T_i + e_{ij}$ تجزیه و تحلیل شد: مقدار مشاهده تیمار i ام در تکرار j ام؛ μ = اثر میانگین؛ T_i = اثر تیمار i ام؛ e_{ij} = اثر خطای آزمایش مربوط به تیمار i ام در تکرار j ام.

جدول ۱- مواد خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره آزمایشی (درصد ماده خشک) بدون افزودن مکمل‌های سلنیوم

مقدار (درصد)	اجزاء و ترکیبات شیمیایی جیره
۲۰	یونجه
۱۰	کاه گندم
۲۱	دانه جو
۱۷/۱۵	سبوس گندم
۱۴/۵	دانه ذرت
۱۰/۵	کنجاله سویا
۲/۵	تفاله چغندر قند
۱	بی‌کربنات سدیم
۱	کربنات کلسیم
۱	بنتونیت
۰/۷۵	پرمیکس دامی ^۱
۰/۵	نمک طعام
۰/۱	توکسین بایندر
۹۳/۱۰	ماده خشک
۹۱/۶۶	ماده آلی
۱۳/۳۸	پروتئین خام
۵/۸۹	عصاره اتری
۳۷/۶۲	فیبر نامحلول در شوینده خشی
۲۵/۸۴	فیبر نامحلول در شوینده اسیدی
۸/۳۴	خاکستر
۲/۴۲	انرژی قابل متابولیسم (مگا کالری در کیلو گرم ماده خشک)
۰/۰۷۳	سلنیوم (میلی گرم در کیلو گرم)

^۱ غلظت مواد معدنی و ویتامین‌ها در هر کیلو گرم مکمل (بدون اضافه کردن سلنیوم): کلسیم ۷۰، فسفر ۳۰، منیزیم ۱۹، روی ۳، آهن ۳ و منگنز ۲ گرم؛ مس ۲۸۰، کبالت ۱۰۰، ید ۱۰۰ و آنتی اکسیدان ۴۰۰ میلی گرم؛ ویتامین A ۵۰۰۰۰ واحد بین‌المللی، ویتامین D₃ ۱۰۰۰۰۰ واحد بین‌المللی و ویتامین E ۱۰۰ میلی گرم.

نتایج و بحث

عملکرد رشد

نتایج مربوط به عملکرد رشد بره‌ها در تیمارهای مختلف در جدول (۲) ارائه شده است. در تحقیق حاضر نتایج نشان داد که در بره‌های دریافت‌کننده مکمل‌های سلنیوم متیونین و سلنیوم سیستئین افزایش وزن کل نسبت به گروه شاهد به‌طور معنی‌داری بیشتر بود ($P=0/0456$) که در نتیجه باعث شد افزایش وزن روزانه این بره‌ها نسبت به بره‌های گروه شاهد به‌طور معنی‌داری بهبود پیدا کند ($P=0/0456$). مقدار ماده خشک مصرفی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ($P>0/05$). با وجود عدم تفاوت معنی‌دار در مصرف خوراک روزانه بین تیمارها، ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای دریافت‌کننده سلنیوم متیونین و سلنیوم سیستئین نسبت به گروه شاهد به‌طور معنی‌داری کاهش یافت ($P=0/0322$).

در رابطه با دلایل ایجاد اثرات مثبت سلنیوم بر عملکرد رشد می‌توان به نقش سلنیوم در افزایش متابولیسم با تبدیل هورمون T_4 به T_3 و افزایش فعالیت مسیرهای آنابولیک (Suttle, 2010) و همچنین افزایش فعالیت میکروبی در شکمبه و تغییر مسیر تولید اسیدهای چرب به سمت تولید پروپونات (Shi و همکاران, 2011) و افزایش قابلیت هضم مواد مغذی خوراک (Shi و همکاران, 2011; Wang و همکاران, 2009) اشاره کرد. مطابق با نتایج پژوهش حاضر، ابوالفضلی و همکاران (1397) در پژوهشی بر روی بزغاله‌های پرواری، با افزودن مقدار 0/15 و 0/3 میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک به‌شکل سلنیت سدیم به جیره پایه حاوی مقدار 0/05 میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم، گزارش کردند که ضریب تبدیل غذایی در تمامی بزهای دریافت‌کننده سلنیوم و میانگین افزایش وزن روزانه در تیمار دریافت‌کننده 0/3 میلی گرم سلنیوم، نسبت به گروه شاهد به‌طور معنی‌داری بهبود یافت. در پژوهشی با افزودن سلنیت سدیم، مخمر سلنیوم و نانوسلنیوم به‌میزان 0/3 میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم (جیره پایه حاوی 0/03 میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک) به جیره بزهای نر در حال رشد، گزارش کردند که وزن نهایی در تیمارهای دریافت‌کننده سلنیوم نسبت به گروه شاهد به‌طور معنی‌داری افزایش یافت و همچنین افزایش وزن روزانه در تیمارهای حاوی مخمر سلنیوم و نانوسلنیوم به‌طور معنی‌داری بیشتر از تیمار حاوی سلنیت سدیم و گروه شاهد بود (Shi و همکاران, 2011). Song و همکاران (2015) با تغذیه سطوح 0/1 تا 0/5 میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک به‌صورت سلنیوم متیونین در بزغاله‌های نژاد بوئر، بیان کردند که تیمارهای دریافت‌کننده سلنیوم علیرغم عدم تغییر در میانگین مصرف خوراک روزانه نسبت به گروه شاهد، عملکردشان به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه شاهد بهبود پیدا کرد.

برخلاف نتایج این تحقیق، در پژوهشی با افزودن مقدار 0/5 و 1 میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم به جیره پایه حاوی 0/05 میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک از مکمل سلنیوم متیونین در بره‌های کرمانی، گزارش کردند صفات عملکرد رشد تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. همچنین اظهار داشتند بره‌های دریافت‌کننده سطح 0/5 میلی گرم سلنیوم نسبت به سایر تیمارها عملکرد بهتری داشتند (آل‌سعدی و همکاران, 1397). علی‌عربی و همکاران (1393) با استفاده از سطوح 0/2 و 0/4 میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم (جیره پایه حاوی 0/06 میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک) به‌شکل مخمر سلنیوم و سلنیت سدیم در بره‌های نر مهربان، تأثیر آماری معنی‌داری بر صفات عملکرد رشد بره‌ها در تیمارهای مختلف مشاهده نکردند.

جدول ۲- تأثیر مکمل های سلنیوم بر عملکرد رشد بره ها در تیمارهای مختلف^۱

P-Value	SEM	تیمارهای آزمایشی ^۲					صفات مورد مطالعه
		۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۹۹۷	۰/۶۰۴	۳۲/۱۶	۳۲/۶۶	۳۲/۱۶	۳۲/۶۶	۳۲/۳۳	وزن اولیه (کیلو گرم)
۰/۶۸۵	۰/۶۴۰	۵۰/۳۳	۵۲/۳۳	۵۱/۵۰	۵۱/۱۶	۴۹/۵۰	وزن نهایی (کیلو گرم)
۰/۰۴۵	۰/۲۳۳	۱۸/۱۶ ^{ab}	۱۹/۶۶ ^a	۱۹/۳۳ ^a	۱۸/۵۰ ^{ab}	۱۷/۱۶ ^b	افزایش وزن کل (کیلو گرم)
۰/۰۴۵	۰/۰۰۲	۲۱۶ ^{ab}	۲۳۴ ^a	۲۳۰ ^a	۲۲۰ ^{ab}	۲۰۴ ^b	افزایش وزن روزانه (گرم)
۰/۵۱۷	۰/۰۰۳	۱/۴۸۰	۱/۴۸۶	۱/۴۹۲	۱/۴۸۲	۱/۴۹۶	ماده خشک مصرفی (کیلو گرم)
۰/۰۳۲	۰/۰۸۶	۶/۸۶ ^{ab}	۶/۳۵ ^b	۶/۴۹ ^b	۶/۷۳ ^{ab}	۷/۳۵ ^a	ضریب تبدیل غذایی

^۱ میانگین هایی که در هر ستون با حروف لاتین متفاوت نشان داده شده است دارای اختلاف معنی دار می باشند ($P < 0/05$).

^۲ تیمار (۱) شاهد (فاقد سلنیوم)، تیمار (۲) حاوی سلنیوم گلاپسین، تیمار (۳) حاوی سلنیوم متیونین، تیمار (۴) حاوی سلنیوم سیستین و تیمار (۵) حاوی سلنیت سدیم.

متابولیت های خون

یافته های مربوط به تأثیر تیمارهای مختلف بر متابولیت های خونی در جدول (۳) نشان داده شده است. استفاده از مکمل های آلی و معدنی سلنیوم تأثیر معنی داری بر روی غلظت متابولیت های خونی نداشتند ($P > 0/05$). با وجود عدم تفاوت معنی دار، در تیمارهای دریافت کننده سلنیوم غلظت گلوکز از نظر عددی بیشتر از گروه شاهد بود و غلظت کلسترول نسبت به گروه شاهد کاهش پیدا کرد. غلظت کلسترول سرم خون با اثر هورمون های تیروئیدی بر کبد کنترل می شود و هورمون تری یودوتیرونین (T_3) می تواند باعث کاهش غلظت کلسترول سرم خون شود (Ebrahimi و همکاران، ۲۰۰۹)، که دلیل کاهش غلظت کلسترول در تیمارهای حاوی مکمل سلنیوم را می توان ناشی از افزایش مقدار هورمون تری یودوتیرونین (T_3) دانست. استفاده از مکمل سلنیوم سبب تغییر در متابولیسم میکروبی شکمبه و افزایش تولید پروپیونات می شود (Xun و همکاران، ۲۰۱۲). با توجه به این که غلظت گلوکز خون در دام های نشخوار کننده کمتر به غلظت آن در جیره وابسته است و به طور عمده تحت تأثیر مقدار پروپیونات تولید شده در شکمبه می باشد و این اسید چرب منبع اصلی تولید گلوکز خون در دام های نشخوار کننده است (McDonald و همکاران، ۲۰۱۰). بنابراین افزایش غلظت گلوکز خون بره های تغذیه شده با ۰/۵ میلی گرم سلنیوم در پژوهش حاضر قابل انتظار است. عوامل مختلفی مانند نوع مکمل سلنیوم، مرحله رشد دام، غلظت سلنیوم جیره پایه و شرایط محیطی سبب تفاوت در نتایج پژوهش های مختلف در رابطه با تأثیر مکمل های سلنیوم بر فراسنجه های خونی شده است.

در تطابق با نتایج این تحقیق، در پژوهشی‌هایی با افزودن ۰/۳ میلی گرم سلیوم در کیلوگرم به صورت مکمل معدنی و آلی سلیوم به جیره بره‌های پرواری (Antunović و همکاران، ۲۰۱۴) و با استفاده از سطوح ۰/۲ و ۰/۴ میلی گرم سلیوم در کیلوگرم ماده خشک به شکل مخمر سلیوم و سلنیت سدیم در بره‌های نر پرواری مهربان (علی عربی و همکاران، ۱۳۹۳)، تأثیر معنی داری بر غلظت متابولیت‌های خون بره‌ها مشاهده نکردند. همچنین بیان کردند از لحاظ عددی مکمل‌های سلیوم سبب افزایش مقدار گلوکز و پروتئین تام نسبت به گروه شاهد شدند. Gabryszuk و همکاران (۲۰۰۷) بیان نمودند که در بره‌های دریافت کننده سلیوم، غلظت کلسترول پلاسما پایین تر از بره‌های تیمارهای دیگر بود، ولی غلظت تری گلیسیرید تغییر محسوسی نداشت. برخلاف نتایج این تحقیق، در پژوهشی با افزودن مقدار ۰/۵ و ۱ میلی گرم سلیوم در کیلوگرم ماده خشک از مکمل سلیوم متیونین به جیره بره‌های پرواری کرمانی، بیان کردند که تغذیه با ۱ میلی گرم در کیلوگرم سلیوم متیونین به طور معنی داری سبب افزایش غلظت گلوکز خون شد (آل سعدی و همکاران، ۱۳۹۷). Mousaie و همکاران (۲۰۱۴) با تغذیه سلیوم متیونین به میزان ۱/۵ میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک خوراک به بره‌های ماده نژاد بلوچی، گزارش کردند که سبب کاهش معنی دار غلظت گلوکز در تیمار حاوی مکمل سلیوم در مقایسه با گروه شاهد شد، ولی تفاوت معنی داری در غلظت سایر متابولیت‌های خون مشاهده نکردند. همچنین در پژوهشی دیگر بر روی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین، گزارش کردند که استفاده از مقدار ۰/۳ میلی گرم سلیوم در کیلوگرم به صورت مخمر سلیوم سبب کاهش معنی دار غلظت گلوکز پلاسما خون نسبت به گروه شاهد شد که دلیل آن را اثرات شبه انسولینی سلیوم بر تنظیم گلوکز خون بیان کردند (Ebrahimi و همکاران، ۲۰۰۹).

جدول ۳- تأثیر مکمل‌های سلیوم بر متابولیت‌های خون بره‌ها در تیمارهای مختلف^۱

P-Value	SEM	تیمارهای آزمایشی ^۲					صفات مورد مطالعه
		۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۹۲۶	۱/۳۷۸	۸۲/۰	۸۲/۵	۸۱/۰	۸۳/۰	۷۹/۵	گلوکز (میلی گرم/دسی لیتر)
۰/۴۲۷	۰/۹۸۹	۶۸/۰	۶۵/۵	۶۵/۰	۶۷/۵	۷۱/۰	کلسترول (میلی گرم/دسی لیتر)
۰/۳۴۳	۰/۷۲۱	۲۳/۵	۲۱/۵	۲۰/۵	۲۴/۵	۲۰/۰	تری گلیسیرید (میلی گرم/دسی لیتر)
۰/۴۷۳	۰/۰۶۸	۶/۸۰	۷/۱۵	۶/۹۰	۶/۸۵	۶/۷۵	پروتئین تام (گرم/دسی لیتر)
۰/۳۳۸	۰/۰۳۶	۴/۱۰	۴/۲۰	۴/۱۰	۴/۰۰	۳/۹۵	آلبومین (گرم/دسی لیتر)
۰/۶۵۹	۰/۰۵۰	۲/۷۰	۲/۹۵	۲/۸۰	۲/۸۵	۲/۸۰	گلوبولین (گرم/دسی لیتر)
۰/۶۱۸	۰/۰۲۴	۱/۵۱	۱/۴۲	۱/۴۶	۱/۴۰	۱/۴۱	آلبومین/گلوبولین

^۱ میانگین‌هایی که در هر ستون با حروف لاتین متفاوت نشان داده شده است دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند ($P < 0.05$).

^۲ تیمار (۱) شاهد (فاقد سلنیوم)، تیمار (۲) حاوی سلنیوم گلايسين، تیمار (۳) حاوی سلنیوم متیونین، تیمار (۴) حاوی سلنیوم سیستین و تیمار (۵) حاوی سلنیت سدیم.

غلظت عناصر معدنی پلاسما

نتایج مربوط به غلظت عناصر سلنیوم (Se)، مس (Cu)، آهن (Fe) و روی (Zn) پلاسما خون بره‌های مورد بررسی در این آزمایش در جدول (۴) ارائه شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که غلظت سلنیوم پلاسما در تمامی بره‌های دریافت‌کننده مکمل‌های آلی و معدنی سلنیوم نسبت به گروه شاهد به‌طور معنی‌داری افزایش یافت ($P = 0.0482$)، ولی تفاوت معنی‌داری در غلظت عناصر مس، آهن و روی پلاسما بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد ($P > 0.05$). با وجود عدم تفاوت معنی‌دار، افزودن سلنیوم باعث افزایش غلظت مس در بره‌های دریافت‌کننده سلنیوم نسبت به گروه شاهد شد که نشان‌دهنده همبستگی مثبت بین سلنیوم و مس پلاسما است (Cristaldi و همکاران، ۲۰۰۵). بین سلنیوم، مس، روی و آهن اثر متقابل وجود داشته به‌طوری که همبستگی مثبتی بین غلظت سلنیوم سرم با سطوح مس و آهن و همبستگی منفی بین سلنیوم و روی در میش‌های دریافت‌کننده مکمل سلنیوم گزارش شده است (Jalilian و همکاران، ۲۰۱۲).

همسو با نتایج این پژوهش، Alimohamady و همکاران (۲۰۱۳) با استفاده از سطوح ۰/۲ و ۰/۴ میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک به‌شکل مخمر سلنیوم و سلنیت سدیم در بره‌های نر پرواری مهربان و ابوالفضلی و همکاران (۱۳۹۷) در پژوهشی بر روی بزغاله‌های پرواری، با افزودن مقدار ۰/۱۵ و ۰/۳ میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم به‌شکل سلنیت سدیم به جیره پایه حاوی مقدار ۰/۰۵ میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک، گزارش کردند که اختلاف معنی‌داری در بین تیمارها از لحاظ غلظت عناصر معدنی روی، آهن و مس پلاسما خون وجود نداشت. همچنین این پژوهشگران بیان کردند تیمارهای آلی مقدار مس پلاسمای بیشتری نسبت به تیمارهای معدنی داشتند. همچنین Kachuee و همکاران (۲۰۱۳) با افزودن ۰/۳ میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم به جیره پایه حاوی ۰/۱۱ میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک به‌صورت سلنیوم متیونین و سلنیت سدیم در بزهای ماده نژاد مرغز و Antunovic و همکاران (۲۰۱۳) با استفاده از ۰/۳ میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم به‌صورت مکمل معدنی و آلی سلنیوم در بره‌های پرواری، گزارش کردند که در بزها و بره‌های دریافت‌کننده مکمل سلنیوم غلظت سلنیوم سرم نسبت به گروه شاهد به‌طور معنی‌داری افزایش یافت و همچنین غلظت سلنیوم سرم در تیمار حاوی سلنیوم آلی نسبت به تیمار حاوی سلنیوم معدنی به‌طور معنی‌داری بیشتر بود. برخلاف نتایج این پژوهش، Juniper و همکاران (۲۰۰۶) با استفاده از مخمر سلنیوم و سلنیت سدیم در گاوهای شیری هلشتاین و Mohri و همکاران (۲۰۱۱) با تزریق مقدار ۰/۲ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن سلنیوم و ویتامین E به‌صورت سلنیت سدیم در بره‌های در حال رشد نژاد بلوچی، اختلاف معنی‌داری در غلظت سلنیوم پلاسما در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نکردند. Kojouri و همکاران (۲۰۱۲) نیز بیان کردند که تزریق مکمل سلنیومی به‌صورت سلنیت سدیم به گوسفند نژاد لری-بختیاری، کاهش

غلظت آهن سرم را به همراه داشت. آن‌ها علت این امر را به اثر سلنیوم در افزایش بیان ژن ترانسفرین به عنوان ناقل آهن به درون سلول نسبت دادند.

جدول ۴- تأثیر مکمل‌های سلنیوم بر عناصر معدنی پلاسما خون بره‌ها در تیمارهای مختلف^۱

P-Value	SEM	تیمارهای آزمایشی ^۲					صفات مورد مطالعه
		۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۰۴۸	۱/۵۰۶	۱۱۸/۵ ^a	۱۲۱/۵ ^a	۱۲۳/۰ ^a	۱۲۵/۰ ^a	۱۰۵/۵ ^b	سلنیوم (میکروگرم/دسی لیتر)
۰/۳۶۶	۱/۳۲۲	۳۷/۵	۴۱/۰	۴۳/۰	۴۱/۵	۳۴/۵	مس (میکروگرم/دسی لیتر)
۰/۹۹۳	۷/۳۷۴	۲۱۲/۰	۲۰۶/۰	۲۰۴/۰	۲۱۰/۵	۲۱۲/۵	آهن (میکروگرم/دسی لیتر)
۰/۲۲۹	۰/۸۳۶	۱۲۶/۰	۱۲۰/۵	۱۲۳/۰	۱۲۲/۵	۱۲۷/۰	روی (میکروگرم/دسی لیتر)

^۱ میانگین‌هایی که در هر ستون با حروف لاتین متفاوت نشان داده شده است دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند ($P < 0.05$).

^۲ تیمار (۱) شاهد (فاقد سلنیوم)، تیمار (۲) حاوی سلنیوم گلايسين، تیمار (۳) حاوی سلنیوم متيونين، تیمار (۴) حاوی سلنیوم سيستئين و تیمار (۵) حاوی سلنیت سدیم.

غلظت هورمون‌های تیروئیدی

نتایج مربوط به اثر منابع مختلف سلنیوم بر غلظت هورمون‌های تیروئیدی سرم خون بره‌ها در جدول (۵) ارائه شده است. غلظت هورمون تری‌یدوتیرونین (T_3) در تیمارهای دریافت‌کننده سلنیوم متیونین و سلنیوم سیستین نسبت به تیمار حاوی سلنیوم معدنی و گروه شاهد افزایش معنی‌داری داشت ($P=0.0456$). همچنین غلظت سرمی هورمون تترا‌یدوتیرونین (T_4) در تمامی بره‌های دریافت‌کننده مکمل سلنیوم در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت ($P=0.0038$). نسبت تترا‌یدوتیرونین به تری‌یدوتیرونین در تیمارهای حاوی مکمل آلی سلنیوم نسبت به گروه شاهد کمتر بود ($P=0.0104$). تیمار دریافت‌کننده سلنیوم گلايسين در مقایسه با سایر مکمل‌های آلی سلنیوم بازده کمتری داشت، ولی نسبت به تیمار حاوی سلنیت سدیم و گروه شاهد به‌طور موثرتری باعث تبدیل شکل غیرفعال هورمون‌های تیروئیدی (T_4) به شکل فعال آن (T_3) شد. ارتباط بین سلنیوم و غده تیروئید نه تنها مرتبط با فعالیت پراکسیدازها در محافظت از تیروئید و ساخت هورمون‌های تیروئیدی است، بلکه با فعالیت دیدینازها که سلنوآنزیم‌های مسئول کاتالیز تبدیل T_4 به T_3 هستند نیز مرتبط است (Beckett و Arthur، ۲۰۰۵).

مطابق با نتایج این پژوهش، Alimohamady و همکاران (۲۰۱۳) با استفاده از سطوح ۰/۲ و ۰/۴ میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم ماده خشک به شکل مخمر سلنیوم و سلنیت سدیم در بره‌های نر پرواری مهربان و همچنین Ebrahimi و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی با استفاده از مقدار ۰/۳ میلی گرم سلنیوم در کیلوگرم به‌صورت مخمر سلنیوم در گوساله‌های شیرخوار هلستاین، گزارش کردند که در تمامی تیمارهای حاوی مکمل سلنیوم، افزایش معنی‌داری در غلظت هورمون T_3 و کاهش

معنی داری در غلظت هورمون T_4 و نسبت T_4 به T_3 سرم بره‌ها مشاهده شد. ابوالفضلی و همکاران (۱۳۹۷) در پژوهشی بر روی بزغاله‌های پرواری، با افزودن مقدار ۰/۱۵ و ۰/۳ میلی گرم سلیوم در کیلو گرم ماده خشک به شکل سلیت سدیم به جیره پایه حاوی مقدار ۰/۰۵ میلی گرم سلیوم در کیلو گرم، گزارش کردند که غلظت تری‌یدوتیرونین (T_3) در کل دوره در تیمارهای دریافت کننده سلیوم نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر بود و در تیمار دریافت کننده ۰/۳ میلی گرم سلیوم نسبت به گروه شاهد، غلظت تترا‌یدوتیرونین (T_4) کاهش و غلظت T_3 به T_4 افزایش معنی داری یافت. Antunovic و همکاران (۲۰۱۳) با استفاده از ۰/۳ میلی گرم سلیوم در کیلو گرم به صورت مکمل معدنی و آلی سلیوم در بره‌های پرواری، گزارش کردند که غلظت هورمون T_3 در تیمار دریافت کننده سلیوم آلی در مقایسه با تیمار حاوی سلیوم معدنی و گروه شاهد افزایش معنی داری داشت ولی تفاوت معنی داری در غلظت T_4 در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. برخلاف نتایج این پژوهش، Mousaie و همکاران (۲۰۱۴) با تغذیه سلیوم متیونین به میزان ۱/۵ میلی گرم در کیلو گرم ماده خشک خوراک به بره‌های ماده نژاد بلوچی و همچنین Kumar و همکاران (۲۰۰۹) با افزودن مقدار ۰/۱۵ میلی گرم سلیوم در کیلو گرم ماده خشک به صورت سلیت سدیم و سلیوم متیونین به جیره بره‌های پرواری، تفاوت معنی داری در غلظت T_3 ، T_4 و نسبت این دو هورمون در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نکردند. البته می‌توان دلیل این امر را ناشی از زیاده‌تر بودن مقدار سلیوم جیره پایه (۰/۱۹ میلی گرم) در تحقیق آن‌ها نسبت به آزمایش حاضر (۰/۰۷ میلی گرم) دانست.

جدول ۵- تأثیر مکمل‌های سلیوم بر هورمون‌های تیروئیدی سرم خون بره‌ها در تیمارهای مختلف^۱

P-Value	SEM	تیمارهای آزمایشی ^۲					صفات مورد مطالعه
		۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۰۴۵	۰/۰۳۶	۱/۷۸ ^b	۲/۲۰ ^a	۲/۱۸ ^a	۱/۹۶ ^{ab}	۱/۷۷ ^b	تری‌یدوتیرونین (T_3) (نانو گرم در میلی لیتر)
۰/۰۰۳	۰/۰۳۰	۹/۶۱ ^b	۹/۴۴ ^b	۹/۴۳ ^b	۹/۴۸ ^b	۱۰/۱۱ ^a	تترا‌یدوتیرونین (T_4) (میکرو گرم در دسی لیتر)
۰/۰۱۰	۰/۰۷۹	۵/۱۲ ^{ab}	۴/۲۹ ^c	۴/۳۲ ^c	۴/۸۳ ^{bc}	۵/۷۱ ^a	T_4/T_3

^۱ میانگین‌هایی که در هر ستون با حروف لاتین متفاوت نشان داده شده است دارای اختلاف معنی دار می‌باشند ($P < ۰/۰۵$).

^۲ تیمار (۱) شاهد (فاقد سلیوم)، تیمار (۲) حاوی سلیوم گلايسين، تیمار (۳) حاوی سلیوم متیونین، تیمار (۴) حاوی سلیوم سیستین و تیمار (۵) حاوی سلیت سدیم.

فعالیت آنزیم‌های سرم

نتایج مربوط به اثر منابع مختلف مکمل سلیوم بر غلظت آنزیم‌های شاخص تخریب بافتی در سرم خون بره‌ها در جدول (۶) ارائه شده است. در تحقیق حاضر استفاده از مکمل سلیوم به صورت آلی و معدنی، تأثیر معنی داری بر فعالیت آنزیم‌های آسپاراتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، کراتین فسفوکیناز (CPK) و آلکالین فسفاتاز (ALP) سرم خون بره‌ها نداشت ($P > ۰/۰۵$)، که نشان‌دهنده کافی بودن مقدار سلیوم جیره پایه و عاری بودن بره‌ها از استرس

به منظور پیشگیری از آسیب به بافت ماهیچه‌ها است. این آنزیم‌ها به طور طبیعی داخل سلولی هستند، اما با آسیب سلول‌ها (ناشی از استرس، عفونت و کمبود سلیوم) به خون آزاد شده و شاخصی از تخریب بافت‌ها به حساب می‌آیند؛ کمبود سلیوم، افزایش مقدار این آنزیم‌ها در خون را به دنبال داشت (Davis و همکاران، ۲۰۰۸).

مطابق با نتایج این پژوهش، Mousaie و همکاران (۲۰۱۴) با تغذیه سلیوم متیونین به میزان ۱/۵ میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک خوراک به بره‌های ماده نژاد بلوچی و Alimohamady و همکاران (۱۳۹۲) با استفاده از سطوح ۰/۲ و ۰/۴ میلی گرم سلیوم در کیلوگرم ماده خشک به شکل مخمر سلیوم و سلیت سدیم در بره‌های نر پرواری مهربان، گزارش کردند که تأثیر معنی‌داری بر غلظت آنزیم‌های آسپارات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، کراتین فسفوکیناز و آلانین آمینوترانسفراز سرم مشاهده نکردند ولی سبب کاهش مقدار عددی این آنزیم‌ها نسبت به گروه شاهد شد. همچنین نتایج حاضر با نتایج پژوهش‌هایی بر روی بره‌های نر پرواری با استفاده از ۰/۳ میلی گرم سلیوم در کیلوگرم به صورت مکمل معدنی و آلی سلیوم (Antunovic و همکاران، ۲۰۱۳) و بزغاله‌های پرواری با افزودن مقدار ۰/۱۵ و ۰/۳ میلی گرم سلیوم در کیلوگرم ماده خشک به شکل سلیت سدیم به جیره پایه حاوی مقدار ۰/۰۵ میلی گرم سلیوم در کیلوگرم (ابوالفضلی و همکاران، ۱۳۹۷) همخوانی دارد. برخلاف نتایج این پژوهش، Singh و همکاران (۲۰۱۴) در پژوهشی بر روی گاومیش، با مکمل‌دهی مقدار ۸/۵۴ میلی گرم سلیوم در کیلوگرم، افزایش فعالیت آنزیم آسپارات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز را گزارش کردند که احتمالاً دلیل آن را به اثر مقادیر بالاتر از نیاز و نزدیک به مقدار سمی سلیوم که موجب تخریب بافت‌ها می‌شود می‌توان نسبت داد. Faixova و همکاران (۲۰۰۷) با استفاده از ۰/۳ میلی گرم سلیوم در کیلوگرم ماده خشک به صورت مخمر سلیوم در بره‌ها، گزارش کردند که سبب کاهش معنی‌دار فعالیت آنزیم کراتین فسفوکیناز در تیمار حاوی مکمل سلیوم در مقایسه با گروه شاهد شد. Mohri و همکاران (۲۰۱۱) با تزریق مقدار ۰/۲ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن سلیوم و ویتامین E به صورت سلیت سدیم در بره‌های در حال رشد نژاد بلوچی، سبب کاهش معنی‌دار در فعالیت آنزیم‌های آسپارات آمینوترانسفراز و کراتین فسفوکیناز نسبت به گروه شاهد شد.

جدول ۶- تأثیر مکمل‌های سلیوم بر آنزیم‌های سرم خون بره‌ها در تیمارهای مختلف^۱ (واحد در لیتر)

P-Value	SEM	تیمارهای آزمایشی ^۲					صفات مورد مطالعه
		۵	۴	۳	۲	۱	
۰/۷۹۸	۶/۰۲۵	۱۶۵/۵	۱۵۵/۰	۱۵۹/۰	۱۵۵/۵	۱۷۵/۵	آسپارات آمینوترانسفراز
۰/۳۹۶	۱/۶۳۰	۲۳/۰	۲۷/۰	۲۲/۰	۲۰/۵	۳۰/۵	آلانین آمینوترانسفراز
۰/۹۸۹	۸/۰۷۸	۱۲۳/۵	۱۱۶/۰	۱۱۳/۵	۱۲۰/۰	۱۲۴/۰	کراتین فسفوکیناز
۰/۹۳۳	۱۵/۵۶۴	۳۳۹/۰	۳۰۲/۰	۳۱۶/۰	۳۳۳/۵	۳۳۱/۵	آلکالین فسفاتاز

^۱ میانگین‌هایی که در هر ستون با حروف لاتین متفاوت نشان داده شده است دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند ($P < ۰/۰۵$).

^۲ تیمار (۱) شاهد (فاقد سلنیوم)، تیمار (۲) حاوی سلنیوم گلايسين، تیمار (۳) حاوی سلنیوم متیونین، تیمار (۴) حاوی سلنیوم سیستئین و تیمار (۵) حاوی سلنیت سدیم.

نتیجه گیری کلی

نتایج نشان داد که جیره پایه از لحاظ سلنیوم (۰/۰۷۳ میلی گرم سلنیوم در کیلو گرم ماده خشک) کمبود داشته و استفاده از مکمل های سلنیوم به مقدار ۰/۵ میلی گرم سلنیوم در کیلو گرم ماده خشک، سبب بهبود عملکرد رشد، افزایش غلظت سلنیوم پلاسما و هورمون تری پتو تیرونین سرم خون بره های پرواری آمیخته زل شده است، ولی تأثیر معنی داری بر متابولیت های خون و آنزیم های کبدی نداشته است. همچنین از نظر نوع منبع، مکمل های آلی سلنیوم متیونین و سلنیوم سیستئین در مقایسه با سایر تیمارها بازده بهتری داشتند.

منابع

ابوالفضل، ف.، علی عربی، ح.، فرح آورو، ع.، احمدی، ا. & علیمحمدی، ر. (۱۳۹۷). اثر مقادیر مختلف سلنیوم بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در بزغاله های پرواری. *نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان*. ۶(۳)، ۵۶-۷۰.

آل سعدی، ح.، موسائی، ا.، اسماعیلی پور، ا. ع. & ضیایی، ن. (۱۳۹۷). تأثیر مکمل آلی سلنیوم بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و برخی متابولیت های خون بره های پرواری. *نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان*. ۶(۲)، ۱۷-۳۰.

علی عربی، ح.، علیمحمدی، ر.، بهاری، ع.، ا. & زمانی، پ. (۱۳۹۳). اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم بر رشد، فراسنجه های هماتولوژی و شکمبه در بره های پرواری مهربان. *نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان*. ۲(۳)، ۵۱-۶۸.

قربانی، ا.، نوریان سرور، م.، ا. & معینی، م. (۱۳۹۶). تأثیر مکمل های آلی روی و سلنیوم بر مصرف خوراک، قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در گوسفند. *علوم دامی*. ۳۰(۱۱۵)، ۱۷-۳۶.

- Alimohamady, R., Aliarabi, H., Bahari, A., & Dezfoulan, A. H. (2013). Influence of different amounts and sources of selenium supplementation on performance, some blood parameters, and nutrient digestibility in lambs. *Biological trace element research*, 154, 45-54. <https://doi.org/10.1007/s12011-013-9698-4>
- Antunović, Z., Novoselec, J., Šperanda, M., Klapac, T., Čavar, S., Mioč, B., ... & Vuković, R. (2014). Influence of Dietary Supplementation with Selenium on Blood Metabolic Profile and Thyroid Hormones Activities in Fattening Lambs. *Pakistan Veterinary Journal*, 34(2).
- AOAC (2002) Official Methods of Analysis, 16th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA, USA.
- Beckett, G. J., & Arthur, J. R. (2005). Selenium and endocrine systems. *Journal of endocrinology*, 184(3), 455-465.
- Cristaldi, L. A., McDowell, L. R., Buergelt, C. D., Davis, P. A., Wilkinson, N. S., & Martin, F. G. (2005). Tolerance of inorganic selenium in wether sheep. *Small Ruminant Research*, 56(1-3), 205-213. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2004.06.001>
- Davis, P. A., McDowell, L. R., Wilkinson, N. S., Buergelt, C. D., Van Alstyne, R., Weldon, R. N., ... & Matsuda-Fugisaki, E. Y. (2008). Comparative effects of various dietary levels of Se as sodium selenite or Se yeast on blood, wool, and tissue Se concentrations of wether sheep. *Small ruminant research*, 74(1-3), 149-158. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2007.05.003>
- Ebrahimi, M., Towhidi, A., & Nikkhah, A. (2009). Effect of organic selenium (Sel-Plex) on thermometabolism, blood chemical composition and weight gain in Holstein suckling calves. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 22(7), 984-992. <http://dx.doi.org/10.5713/ajas.2009.80698>

- Faixova, Z., Faix, Š., Leng, L., Vaczi, P., Makova, Z., & Szaboova, R. (2007). Haematological, blood and rumen chemistry changes in lambs following supplementation with Se-yeast. *Acta Veterinaria Brno*, 76(1), 3-8. <http://dx.doi.org/10.2754/avb200776010003>
- Gabryszuk, M., M. Czuderna, A. Baranowski, N. Strzałkowska, A. Jozwik1, and J. Krzyzewski. (2007). The effect of diet supplementation with Se, Zn and vitamin E on cholesterol, CLA and fatty acid contents of meat and liver of lambs. *Animal Science Papers and Reports*, 1:25-33.
- Jalilian, M. T., Moeini, M. M., & Karkodi, K. (2012). Effect of selenium and vitamin E supplementation during late pregnancy on colostrum and plasma Se, Cu, Zn and Fe concentrations of fat tail Sanjabi ewes and their lambs. *Acta Agriculturae Slovenica*, 100(2), 123-129. <https://doi.org/10.14720/aas.2012.100.2.14411>
- Kachuee, R., Moeini, M. M., & Souiri, M. (2013). The effect of dietary organic and inorganic selenium supplementation on serum Se, Cu, Fe and Zn status during the late pregnancy in Merghoz goats and their kids. *Small Ruminant Research*, 110(1), 20-27. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2012.08.010>
- Kojouri, G. A., Jahanabadi, S., Shakibaie, M., Ahadi, A. M., & Shahverdi, A. R. (2012). Effect of selenium supplementation with sodium selenite and selenium nanoparticles on iron homeostasis and transferrin gene expression in sheep: a preliminary study. *Research in veterinary science*, 93(1), 275-278. <https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2011.07.029>
- Kumar, N., Garg, A. K., Dass, R. S., Chaturvedi, V. K., Mudgal, V., & Varshney, V. P. (2009). Selenium supplementation influences growth performance, antioxidant status and immune response in lambs. *Animal Feed Science and Technology*, 153(1-2), 77-87. <https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2009.06.007>
- McDonald, P., R. A. Edwards, J. F. D. Greenhalgh, C. A. Morgan, L. A. Sinclair, and R. G. Wilkinson. 2010. *Animal Nutrition*. 7th Ed., Longman Scientific and Technical, New York. USA. 692pp.
- Mohri, M., Ehsani, A., Norouzian, M. A., Bami, M. H., & Seifi, H. A. (2011). Parenteral selenium and vitamin E supplementation to lambs: hematology, serum biochemistry, performance, and relationship with other trace elements. *Biological trace element research*, 139, 308-316. <https://doi.org/10.1007/s12011-010-8659-4>
- Mousaie, A., Valizadeh, R., Naserian, A. A., Heidarpour, M., & Mehrjerdi, H. K. (2014). Impacts of feeding selenium-methionine and chromium-methionine on performance, serum components, antioxidant status, and physiological responses to transportation stress of Baluchi ewe lambs. *Biological Trace Element Research*, 162, 113-123. <https://doi.org/10.1007/s12011-014-0162-x>
- NRC (2007) *Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids*. The National Academies Press, Washington, DC. USA.
- Pavel, H. (2015). Effect of selenium on its content in milk and performance of dairy cows in ecological farming. *Potravinarstvo*. <http://dx.doi.org/10.5219/492>
- Shi, L., Xun, W., Yue, W., Zhang, C., Ren, Y., Shi, L., ... & Lei, F. (2011). Effect of sodium selenite, Se-yeast and nano-elemental selenium on growth performance, Se concentration and antioxidant status in growing male goats. *Small Ruminant Research*, 96(1), 49-52. <https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2010.11.005>
- Singh, R., Randhawa, S. S., & Dhillon, K. S. (2014). Changes in blood biochemical and enzyme profile in experimental chronic selenosis in buffalo calves (*Bubalus bubalis*).
- Song, Y. X., Hou, J. X., Zhang, L., Wang, J. G., Liu, X. R., Zhou, Z. Q., & Cao, B. Y. (2015). Effect of dietary selenomethionine supplementation on growth performance, tissue Se concentration, and blood glutathione peroxidase activity in kid boer goats. *Biological Trace Element Research*, 167, 242-250. <https://doi.org/10.1007/s12011-015-0316-5>
- Suttle NF (2010) *Mineral Nutrition of Livestock*. 4th ed. CABI, Wallingford, Oxford shire, UK. 579 pp.

- Van Soest, P. V., Robertson, J. B., & Lewis, B. A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. *Journal of dairy science*, 74(10), 3583-3597. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(91\)78551-2](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(91)78551-2)
- Wang, C., Liu, Q., Yang, W.Z., Dong, Q., Yang, X.M., He, D.C., Zhang, P., Dong, K.H. and Huang, Y.X. (2009) "Effects of selenium yeast on rumen fermentation, lactation performance and feed digestibilities in lactating dairy cows". *Livestock Science*. 126:239-244. <https://doi.org/10.1016/j.livsci.2009.07.005>
- Xun, W., Shi, L., Yue, W., Zhang, C., Ren, Y., & Liu, Q. (2012). Effect of high-dose nano-selenium and selenium–yeast on feed digestibility, rumen fermentation, and purine derivatives in sheep. *Biological trace element research*, 150, 130-136. <https://doi.org/10.1007/s12011-012-9452-3>
- Zhang, L., Zhou, Z. Q., Li, G., & Fu, M. Z. (2013). The effect of deposition Se on the mRNA expression levels of GPxs in goats from a Se-enriched county of China. *Biological trace element research*, 156, 111-123. <https://doi.org/10.1007/s12011-013-9830-5>
- Zubair, M., Ali, M., Ahmad, M., Sajid, S. M., Ahmad, I., Gul, S. T., & Sajid, M. (2015). Effect of Selenium and Vitamin E on cryopreservation of semen and reproductive performance of animals (a review). *J. Entomol. Zool. Stud*, 3(1), 82-86.

