

خواص ضدمیکروبی، آنتیاکسیدانی، رادیکالزدایی سوپر اکساید آنیونی و ضدتیروسینازی (*Satureja hortensis* Bornm.) و مرزه زراعی

مهدى داداشپور^۱، ایرج رسولی^{۲*}، فاطمه سفیدکن^۳، الهه زاده حسینقلی^۴ و شکیبا درویش علیپور آستانه^۴

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران

۲- نویسنده مسئول، استاد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، پست الکترونیک: rasooli@shahed.ac.ir

۳- استاد، مؤسس تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

۴- دانشجوی دکتری، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد، تهران

تاریخ پذیرش: مرداد ۱۳۹۰

تاریخ اصلاح نهایی: تیر ۱۳۹۰

تاریخ دریافت: مهر ۱۳۸۹

چکیده

در این مطالعه فعالیت ضدبacterیایی اسانس های مرزه سهندي (*Satureja hortensis* Bornm.) و مرزه زراعي (S. *aureus*) در این مطالعه فعالیت ضدبacterیایی اسانس های مرزه سهندي (*Satureja hortensis* Bornm.) و مرزه زراعي (S. *aureus*) ارزیابی شد. نمای حساسیتی میکروارگانیسم ها در برابر اسانس مرزه سهندي و مرزه زراعي براساس حساسترين به مقاومترين بود. کمترین غلظت مهارکنندگی و کشنگی اسانس ها در طیف ۱۰/۰ تا ۱۰ mg/ml قرار داشت. فنل کل اسانس های مرزه سهندي و مرزه زراعي به ترتیب معادل $47/25 \pm 2/14$ و $47/05 \pm 8/05$ میکروگرم گالیک اسید در هر میلی گرم نمونه تعیین شد. سنجش خاصیت آنتیاکسیدانی اسانس ها با روش DPPH، نشان داد که قدرت رادیکالزدایی اسانس ها تقریباً برابر هم ولی به مراتب بیشتر از آنتیاکسیدان های استنتیک بود. فعالیت آنتیاکسیدانی با روش بتاکاروتین و قدرت احیای فریک اسانس مرزه سهندي قویتر از مرزه زراعي است. مقدار اسانس لازم برای ۵۰٪ رادیکالزدایی اسانس مرزه سهندي و مرزه زراعي به ترتیب $6/25$ و $5/82$ $\mu\text{g}/\text{ml}$ بود. قدرت احیای فریک (FRAP) اسانس مرزه بیش از اسانس مرزه زراعي بود. فعالیت رادیکالزدایی سوپر اکساید آنیونی اسانس مرزه سهندي و مرزه زراعي به ترتیب $1/16$ و $55/28 \pm 2/46$ درصد به ازاي $15\mu\text{g}/\text{ml}$ اسانس با IC_{50} معادل $9/4$ و $10/1$ میکروگرم تعیین گردید. درصد فعالیت ضدتیروسینازی به ازاي يك میکروگرم اسانس مرزه سهندي $1/33 \pm 47/88$ و به ازاي 15 میکروگرم اسانس مرزه زراعي $2/9 \pm 15/35$ بود. در مجموع، مطالعه خواص بیولوژیک اسانس مرزه سهندي نشان مى دهد که قابلیت خوبی برای بررسی کاربرد آن در صنعت غذا و دارو وجود دارد.

واژه های کلیدی: ضدمیکروبی، آنتیاکسیدان، رادیکالزدایی سوپر اکساید آنیونی، ضدتیروسینازی، روغن های انسانی، مرزه.

مقدمه

مرزه گیاه چند منظوره‌ای هستند که ویژگی‌های آروماتیک و پزشکی دارند. در پزشکی سنتی، برای درمان بیماری‌های مزمن، مثل قولنج، دردهای عضلانی، تهوع، سوءهاضمه، Gulluce *et al.*, 2003 اسهال و بیماری‌های عفونی استفاده می‌شده‌اند (Gulluce *et al.*, 2003). امروزه نیز مطالعاتی برای بررسی اثرهای دارویی و درمانی آن نظریر ضدنفخ، اثرهای گوارشی، ضدتشنج، خلطآور، قارچ‌کشی، ضداسهال، مسکن و آنتی‌اکسیدانی انجام شده‌است (Skocibusic *et al.*, 2006). اهمیت آن در سلامتی انسان به دلیل وجود مواد تریترپنوتئیدی (Escudero Thomas-Barberan *et al.*, 1985) و فلاونوتئیدی (Thomas-Barberan *et al.*, 1985) آن است. روغن‌های انسانی جدا شده از گونه‌های مختلف مرزه خصوصیات زیستی خاصی مثل اثر ضدمیکروبی (Bezbradica *et al.*, 2005; Azaz *et al.*, 2005; Yamasaki *et al.*, 2005), ضد HIV-1 (Gulluce *et al.*, 2003; Abad *et al.*, 1998)، ضدویروسی (Radonic & Esquived *et al.*, 1999)، آنتی‌اکسیدانی (Hajhashemi *et al.*, 2003; Milos, 2003)، ضدتشنج و ضداسهال (Skocibusic *et al.*, 2006; 2000)، ضد میکروبی و ضداسهال روغن‌های انسانی، به دلیل فنلهای موجود در انسان است (Sefidkon *et al.*, 2004). در ایران گونه‌های مرزه در قسمت‌های کوهستانی شمال و غرب ایران وجود دارند. *S. intermedia* C. A. Mey یک گونه نادر و بومی ایران (تالش) است. این گیاه چند ساله بوده و از سنگ‌ها سر برآورده است. *S. mutica* Fisch & C. A. Mey دیگری است که روی سنگ‌های آهکی، در شمال شرق ایران رشد می‌کند. *S. macrantha* C. A. Mey درختچه

از زمان‌های قدیم گیاهان و چاشنی‌ها برای بهبود طعم و خاصیت organoleptic به انواع مختلف غذاها اضافه می‌شدند. بسیاری از ترکیب‌های طبیعی بدست آمده از گیاهان دارای طیف وسیعی از فعالیت‌های زیستی هستند. بین انواع مختلف مواد اولیه، عوامل طبیعی بالقوه‌ای مانند روغن‌های انسانی استخراج شده از گیاهان آروماتیک و پزشکی (گیاهان که مصارف پزشکی دارند) دارای خواص ضدمیکروبی، ضدقارچی، آنتی‌اکسیدانی هستند. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر فشار قابل توجهی از طرف مصرف‌کننده‌ها برای کاهش یا محدود کردن استفاده از افروزدنی‌های سنتیک در غذاهای اشان، اعمال می‌شود، یک راه جدید برای جلوگیری از تکثیر میکروارگانیسم‌ها و گسترش عوامل بیماری‌زا استفاده از این ترکیب‌ها به عنوان نگهدارنده در مواد غذایی است. روغن‌های انسانی دارای تأثیرهای مختلف دارویی مانند برطرف‌کنندگی انقباض عضلات، ضدنفخ، محافظت از کبد، ضدویروسی و ضدسرطانی نیز هستند (Lahlou, 2004; Lambert *et al.*, 2001; Satureja Soliman & Badeaa, 2002) (خانواده Nepetoideae, زیرخانواده Lamiaceae) حدوداً ۲۰۰ گونه گیاهی و درختچه‌ای است. گیاهان این جنس آروماتیک، یک‌ساله یا همیشگی، نیمه‌انبوه و اغلب آروماتیک بوده و به طور گسترده‌ای در مناطق خشک، آفتابی، سنگلاخی و صخره‌ای مدیترانه، آسیا و آمریکای شمالی رشد می‌کنند (Catino *et al.*, 1992). به علت محتوای فنلی زیاد، طعم و بوی این گیاه مشابه آویشن و پونه کوهی زراعی است (Skocibusic *et al.*, 2006). خیلی از اعضای جنس

(Ruberto & Baratta, 2000) لینالول و بتا-کاریوفیلن هستند. مطالعه گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که بین ترکیب‌های شیمیایی انسانس گونه‌های مختلف *Satureja* گوناگونی وجود دارد (Sefidkon et al., 2007). ترکیب‌های اصلی روغن‌های انسانسی ۸ جمعیت از *S. sahandica* Bornm که به روش تقطیر با آب جدا شده و توسط کروماتوگرافی گازی طیف‌سنجی جرمی آنالیز شده‌اند شامل: تیمول (۴۱/۷٪)، پاراسیمین (۵۴/۵٪) و گاما-ترپین (Sefidkon & Ahmadi, 2000) بوده است (۱۲/۸٪). چون ترکیب‌های شیمیایی در خواص بیولوژیک انسانس‌ها تأثیر دارند و تابه‌حال خواص بیولوژیک این گونه از گیاه مرزه مطالعه نشده، بنابراین در این مطالعه بر آن شدیدم تا برخی از این خواص را بررسی کنیم.

مواد و روشها

انسانس مرزه

مرزه سهندی با نام علمی *Satureja sahendica* Bornm. در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور شناسایی و انسانس‌گیری شد. انسانس زراعی مرزه از منابع تولیدی داخل کشور که در داروخانه‌ها به فروش می‌رسد تهیه گردید.

سویه‌های میکروبی

میکرووارگانیسم‌های مورد مطالعه به شرح زیر بودند: *E. coli* (ATCC25922), *S. aureus* (ATCC 25923), *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC8830), *Candida albicans* (ATCC 5027).

بررسی اثر ضد میکروبی

اثر ضد میکروبی با روش یادگاری‌نیا و همکاران (۲۰۰۶) انجام شد. برای مطالعه اثر ضد میکروبی از دو روش انتشار

کوچکی است که در غرب و شمال غربی ایران وجود دارد *Satureja sahendica* Bornm. گونه (Rechinger, 1982) یک گونه بومی ایران است که در شمال، غرب و شرق ایران وجود دارد. این گونه دیر گل می‌دهد (آخر تابستان و پاییز) و روی دیوارهای سنگی و سرازیری‌های سنگی رشد می‌کند (Rechinger, 1982).

اکسیژن و نیتروژن واکنش‌دهنده (رادیکالی) ROS/RNS به طور مداوم در بدن انسان تولید می‌شوند و توسط آنزیم‌های داخلی (سوپراکسید دسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز) کنترل می‌شوند. زمانی که تولید این رادیکال‌ها بیش از حد باشد، سوبستراها در معرض اکسیداسیون قرار می‌گیرند، مکانیزم‌های دفاعی بدن ناتوان می‌شوند و تخرب مولکول‌های زیستی (DNA، لیپید و پروتئین) اتفاق می‌افتد (Oke et al., 2009). برخی آنتی اکسیدان‌ها می‌توانند از خطر اکسیداتیو توسط ROS/RNS، بروز بیماریهای خاصی مثل سرطان و روند پیری جلوگیری کنند. آنها می‌توانند از طریق فرایند اکسیداسیون، واکنش با رادیکال‌های آزاد، شلاته کردن فلزات و همچنین واکنش به عنوان رادیکال‌زداینده اکسیژن، مداخله کنند (Oke et al., 2009). تحقیقات اخیر کشف آنتی اکسیدان‌های طبیعی از گیاهان را نشان می‌دهد. استفاده از گونه‌ها و گیاهان به عنوان آنتی اکسیدان‌ها در فرایندهای غذایی، امیدی برای استفاده از آنها به جای آنتی اکسیدان‌های سنتیک است. گزارش‌ها نشان می‌دهد با توجه به فعالیت آنتی اکسیدانی گونه، مصرف آنها به عنوان افزودنی‌های طبیعی افزایش یافته است (Lindberg Madsen & Bertelsen, 1995).

روغن‌های انسانسی مرزه حاوی ترکیب‌های آنتی اکسیدانی قوی نظیر کارواکرول، پارا-سیمین، و گاما-ترپین، تیمول،

تهیه و تأثیر آنها روی میکروب‌های مورد مطالعه با روش‌های انتشار و رقت آزمایش شد. البته متانول و DMSO (Dimethyl Sulfoxide) تأثیر ضدمیکروبی نداشتند و مورد استفاده رقیق‌سازی قرار گرفتند. در کلیه مراحل آزمایشها از DMSO به عنوان شاهد مواد ضدمیکروبی استفاده شد.

تعیین محتوای کل فنل (TPC) (Total phenolic content) با استفاده از روش Kakhonen و همکاران (۱۹۹۹) فنل اسانس‌ها به شرح زیر سنجیده شد: ۳۰۰ میکرولیتر از نمونه در لوله آزمایش ریخته شد و Folin-Ciocalteau's reagent (10x dilution) ۱/۵ میلی‌لیتر و ۱/۲ میلی‌لیتر کربنات‌سدیم ۷/۵٪ ریخته شد و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار داده و جذب در ۷۶۵nm سنجیده شد. فنل کل براساس معادل میلی‌گرم گالیک‌اسید در هر ۱۰۰ گرم نمونه بیان شد (y= 0.0111x-0.0148; r²= 0.9998).

تعیین خواص آنتی‌اکسیدانی اسانس خواص آنتی‌اکسیدانی با روش‌های بتاکاروتین‌زدایی، تعیین قدرت رادیکال‌زدایی DPPH، سنجش قدرت احیا فریک (FRAP) و رادیکال‌زدایی سوپراکساید آئیون با روش‌های استاندارد انجام شد.

روش بتاکاروتین‌زدایی

در روش بتاکاروتین‌زدایی فعالیت آنتی‌اکسیدانی با استفاده از مهار ترکیب‌های آلی فرآر و conjugated diene hydroperoxides روش توصیف شده به وسیله‌ی Shahidi و Miraliakbari (۲۰۰۸) با اصلاح جزئی

(Diffusion test) و رقت (Dilution test) استفاده شد که از میان روش‌های انتشار از روش دیسک پلیت (Disk-plate method) و از میان روش‌های رقت از روش رقت لوله‌ای استفاده شد. مقدار ۱ml اسانس با رقت‌های ۱/۸، ۱/۴، ۱/۲ و ۱ در ۵ میلی‌لیتر سوسپانسیون میکروبی ریخته و پس از همزدن در انکوباتور به مدت ۱۸-۲۴ ساعت قرار داده شد و بعد به وسیله اسپکتروفتومتر جمعیت میکروبی تعیین و در نتیجه حداقل غلظت مهارکنندگی (Minimal Inhibitory concentration) مشخص گردید، سپس از هر کدام از لوله‌ها که رشد جمعیت نشان نداده بودند ۰/۱ میلی‌لیتر روی پلیت حاوی نوترینت آگار کشت داده شد و حداقل غلظت کشنندگی (Minimal Bactericidal concentration) ماده ضدمیکروبی تعیین گردید. برای مطالعه سیستیک میکروب‌کشی اسانس پس از تعیین MBC از سوسپانسیون‌های میکروبی محتوی ۱۰۶ سلول میکروبی تهیه و مقدار ۱ml ۵۰ اسانس در ۵ml سوسپانسیون ریخته و در فواصل زمانی معین، مقدار ۱ml ۱۰ از هر لوله برداشته و پس از رقیق‌سازی بر سطح محیط نوترینت آگار به طور یکنواخت گسترد و به مدت ۲۴ ساعت داخل انکوباتور گذاشته و بعد تعداد کلی‌ها با کلنی کانتر شمارش و با ضرب عکس رقت در تعداد کلی‌ها تعداد باکتری‌های زنده در هر میلی‌لیتر سوسپانسیون تعیین گردید. با استفاده از سیستیک مرگ میکروبی ارزش D (Decimal Reduction Value) براساس زمان لازم برای کاهش ۹۰٪ جمعیت میکروبی در نمونه محاسبه شد.

حاللهای مختلف که در اسانس‌گیری یا رقیق‌سازی اسانس مورد استفاده قرار می‌گیرند قبلًا در رقت‌های مختلف

دماه ۵۰ درجه سانتی گراد همراه با دو تا بلانک گذاشته شدند که یکی از آنها دارای آنتی اکسیدان BHT به عنوان کنترل مثبت و دیگری حاوی DMSO به جای اسانس به عنوان کنترل منفی بودند. لوله‌ی دارای BHT در طول انکوباسیون رنگ خودش را حفظ کرد. جذب در طول موج ۴۷۰ نانومتر اندازه‌گیری شد. فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه‌ها (درصد ممانعت کنندگی) با استفاده از فرمول زیر بدست آمد.

$$I\% = (\text{A}\beta\text{-carotene after 2h assay}/\text{Ainitial }\beta\text{-carotene}) \times 100$$

فعالیت رادیکال زدایی اسانس با فرمول زیر و براساس درصد ممانعت DPPH محاسبه گردید:

$$\text{Inhibition percentage (IP)} = [(AB-AA)/AB] \times 100$$

AB= Absorbance value of blank checked after 70 minutes

AA= Absorbance value of sample checked after 70 minutes

سنجهش قدرت احیا فریک (FRAP) assay

یک میلی لیتر از رقت‌های مختلف اسانس به ۲/۵ میلی لیتر بافر ۰/۲M فسفات پتابسیم با pH ۶/۶ و ۲/۵ میلی لیتر پتابسیم فری سیانید ۱٪ اضافه شده و در دماه ۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ دقیقه انکوبه گردید. سپس ۲/۵ میلی لیتر تری کلرواستیک اسید ۱۰٪ به آن اضافه شد. این ترکیب به چند بخش ۲/۵ میلی لیتری تقسیم و با ۲/۵ میلی لیتر آب دی یونیزه مخلوط گردید. ۰/۵ میلی لیتر FeCl₃ (وزن/حجم) به هر کدام اضافه شده و پس از ۳۰ دقیقه جذب در 700nm سنجیده شد

به صورت معادل FRAP (Lim et al., 2009)

استفاده شد. محلول استوک بتا-کاروتون و لینولئک اسید با ۰/۵ میلی گرم بتا-کاروتون در ۱ میلی لیتر کلروفرم، ۲۵ میکرو لیتر لینولئک اسید و ۲۰۰ میلی گرم توئین ۴۰ آماده شد و کلروفرم در خلاً تبخیر شد و به آن ۱۰۰ میلی لیتر از آب هوادهی شده اضافه شد. نمونه‌ها (۲ گرم/لیتر) حل شد و ۳۵۰ میکرو لیتر از آن به ۲/۵ میلی لیتر از مخلوط بالا موجود در لوله‌ها افزوده شد. لوله‌های آزمایش به مدت ۲ ساعت در حمام آب گرم با

A-βcarotene after 2 h assay ۲ ساعت باقی ماندن در نمونه‌ها و جذب بتا-کاروتون در شروع آزمایشها می‌باشد. تمام آزمون‌ها سه بار تکرار شده و درصد ممانعت کنندگی با انحراف معیار سه‌تایی گزارش شد.

تعیین فعالیت رادیکال زدایی با آزمون DPPH ۱۰ µl اسانس را با ۱۰۰ میکرو لیتر (pH 7.4) ۱۰۰mM Tris-HCl ۴۰ میکرو لیتر اتانول و ۵۰ میکرو لیتر TWEEN 20 (0.5% w/w) یک میکرو لیتر (0.5 mM=0.2 mg/ml) DPPH در اتانول اضافه گردید. مخلوط را به شدت هم زده و جذب فوراً با طول موج 517nm ثبت گردید. ثبت تا ۷۰ دقیقه ادامه یافت و نوسانها یادداشت گردید تا جایی که دیگر نوسانی دیده نشد. برای شاهد به جای اسانس از آب مقطر استفاده شد و Trolox (1mM) به عنوان آنتی اکسیدان پایدار استفاده شد.

محاسبه می‌شود و نیز ارزش IC₅₀ تعیین می‌گردد.

$$\text{Inhibition}(\%) = [(A_{\text{control}} - A_{\text{sample}})/A_{\text{control}}] \times 100$$

Tyrosinase inhibition بازدارندگی تیروسینازی اسانس‌های فعالیت بازدارندگی تیروسینازی اسانس‌ها با روش اسپکتروفوتومتری (Chan *et al.*, 2008) و با استفاده از روش dopachrome با استفاده از L-DOPA به عنوان سوبسترا سنجیده شد. مقدار ۵ میلی‌گرم اسانس در ۲ میلی‌لیتر ۵۰% DMSO حل شده مقدار ۱۰۰ µl از نمونه به ۸۰ µl بافر فسفات ۰.۰۲ mg/ml pH ۶.۸ اضافه و ۴۰ µl از ۰.۱ M tyrosinase در یک چاهک از ۴۰ µl و ۴۰ µl از L-DOPA از پلیت ۹۶ چاهکی ریخته شد. نمونه‌ها در دمای ۳۷°C به مدت ۳۰ دقیقه انکوبه شدند. هر نمونه همزمان با یک بلانکی که همه ترکیب‌های فوق بجز L-DOPA را دارد، بود. جذب در طول موج ۴۷۵nm با استفاده از طول موج ۷۰۰nm به عنوان رفرانس، اندازه‌گیری می‌شود. نتایج با یک کنترل و بلانک محتوی ۵۰% DMSO مقایسه می‌شوند. در صد ممانعت تیروسیناز با فرمول زیر محاسبه شد:

$$\text{Tyrosinase inhibition}(\%) = [(A_{\text{control}} - A_{\text{sample}})/A_{\text{control}}] \times 100$$

غلهای مهارکنندگی و کشنندگی اسانس‌ها در طیف ۰/۵ تا ۱۰ mg/ml قرار داشت. در رقت‌های تعیین شده در آزمایش MBC در برابر سوسپانسیون میکروبی قرار داده شدند تا Decimal Reduction (D_{Value}) بدست آید (جدول ۱).

گالیک اسید (GAE) در mg/g نمونه محاسبه شد.
 $y = 16.66x + 0.0038; r^2 = 0.999$

سنجریکال‌زدایی سوپراکساید آنیون Superoxide anion radical scavenging

قدر رادیکال‌زدایی سوپراکساید آنیون اسانس‌ها با روش استاندارد (Lee *et al.*, 2002) انجام شد. به مقدار ۱۰۰ µl از رقت‌های هر اسانس محلول زیر افروده شد:

۱۰۰ µl (30 mmol/l) Na₂EDTA, 100 µl (3 mmol/l) hypoxanthine in 50 mmol/l NaOH and 200 µl (1.42 mmol/l) nitroblue tetrazolium (NBT) in NaH₂PO₄-NaOH (50 mmol/l, pH 7.4).

پس از ۳ دقیقه مقدار ۱۰۰ µl (0.5 U/ml) xanthine oxidase در بافر NaH₂PO₄-NaOH اضافه شده و ۲/۴ ml بافر NaH₂PO₄-NaOH اضافه شد. محلول حاصل در دمای ۵۶۰nm اتاق به مدت ۲۰ دقیقه نگهداری شده و جذب در ۲۹۳nm اندازه‌گیری گردید. همچنین جذب در ۵۶۰nm اندازه‌گیری شد تا چنانچه اسانس مانع تولید اسید اوریک شده باشد مشخص شود. وقتی که از عدم تشکیل اسید اوریک اطمینان حاصل شد در صد ممانعت در ۵۶۰nm با فرمول زیر

نتایج

نمای حساسیتی میکروارگانیسم‌ها در برابر اسانس مژه سهندی و مژه زراعی براساس حساسترین به مقاومترین *Candida albicans* > *E. coli* > *S. aureus* > *P. aeruginosa* بود. اسانس‌ها خاصیت کشنندگی و مهارکنندگی میکروبی خوبی نشان دادند (جدول ۱). کمترین

گزارش شده است. میزان minimum inhibitory concentration (MIC) برای باکتریهایی که به روغن انسانی *S. cuneifolia* حساس هستند در حد ۶۰۰-۱۴۰۰ µg/ml بوده است (Oke *et al.*, 2009). در مطالعه حاضر کمترین غلظت مهارکنندگی و کشنده‌گی انسان‌ها در طیف ۱۰۰۰-۵۰۰ µg/ml قرار داشت. نتایج مطالعه فعالیت ضدباکتریایی انسان‌ها نشان داده است که انسان‌های مرزه دارای پتانسیل‌های ضدمیکروبی بالایی بر علیه ۱۳ باکتری و ۹ قارچ بوده و باکتریهای گرم مثبت به روغن‌های انسانی حساس‌ترند (Skocibusic *et al.*, 2006). در این مطالعه کاندیدا آلیکننس حساس‌ترین میکرووارگانیسم با ارزش ۴/۲۹D و ۷/۴۳ به ترتیب در برابر انسان‌های مرزه سهندي و مرزه زراعي بود (جدول ۱). پس از آن باکتری گرم منفی *E. coli* حساس‌تر از باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس بود. این تفاوت‌ها نشان می‌دهند که علاوه‌بر نوع میکرووارگانیسم‌ها ترکیب شیمیایی انسان‌ها تأثیر معنی‌داری در خواص ضدمیکروبی آنها دارند.

غربال‌گری خاصیت ضدمیکروبی با استفاده از روش انتشار دیسک از روغن‌های فرآر تقطیر شده از قسمت‌های *Satureja subspicata* و *Satureja montana* L. هواپی. در بوسنی و هرزه‌گووین، بر علیه باکتریهای Bartl. ex Vis. سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس آورئوس و اشرشیاکلی انجام شده و نتایج حکایت از توقف رشد تمام Cavar *et al.*, (2008). مطالعه حاضر مؤید تأثیر مشابه مرزه سهندي و مرزه زراعي ساخت ایران است. با توجه به این نتایج می‌توان گفت که گونه‌های مرزه می‌توانند به عنوان یک منبع ضدباکتریایی برای صنایع غذایی مورد استفاده قرار گیرند.

فنل کل انسان‌های مرزه سهندي و مرزه زراعي به ترتیب معادل $۸/۵۳ \pm ۱۷/۰/۵$ و $۲/۱۴ \pm ۴/۷/۲۵$ میکروگرم گالیک‌اسید در هر میلی‌گرم نمونه تعیین شد (جدول ۲). خاصیت آنتی اکسیدانی انسان با روش بتا-کاروتزن‌زدایی نیز انجام و نتایج مقایسه‌ای آنها با آنتی اکسیدان‌های سنتیک استاندارد در جدول ۲ نشان داده شده است. بازدارندگی پراکسیداسیون لیپید به‌وسیله هر دو انسان قابل توجه بود (جدول ۲). مقدار انسان لازم برای ۵۰٪ رادیکال‌زدایی انسان مرزه سهندي و مرزه زراعي به ترتیب $۶/۲۵ \pm ۵/۸۲$ µg/ml بود. قدرت احیای فریک (FRAP) انسان مرزه به مراتب بیش از انسان مرزه زراعي بود (جدول ۲). فعالیت رادیکال‌زدایی سوپراکساید آئیونی انسان مرزه سهندي و مرزه زراعي به ترتیب $۱/۱۶ \pm ۵/۵/۲۸$ و IC50 $۲/۴۶ \pm ۲/۸۱$ درصد به‌ازای ۱۵ µg/ml انسان با معادل $۹/۴ \pm ۱۰/۱/۲$ و ۱۰۱ میکروگرم تعیین گردید. درصد فعالیت ضدتیروسینازی به‌ازای یک میکروگرم انسان مرزه سهندي $۱/۱۳۳ \pm ۴/۷/۸۸$ و به‌ازای ۱۵ میکروگرم انسان مرزه زراعي $۲/۹ \pm ۱۵/۳۵$ بود. مقدار IC50 برای فعالیت ضدتیروسینازی انسان‌های مرزه سهندي و مرزه زراعي به ترتیب ۲ و ۱۲۵ میکروگرم محاسبه شد (جدول ۳).

بحث

در این مطالعه فعالیت ضدباکتریایی انسان‌های مرزه سهندي و مرزه زراعي توسط روش‌های انتشار در آگار و رقت‌های مایع ارزیابی شد و نتایج نشان داد که انسان‌ها دارای پتانسیل‌های ضدمیکروبی بالایی هستند (جدول ۱). فعالیت ضدمیکروبی روغن انسانی بعضی از گونه‌های مرزه مانند *S. cuneifolia* بر علیه خیلی از باکتریهای مولد فساد و مسمومیت‌های غذایی

جدول ۱- تأثیر ضدمیکروبی اسانس مرزه بر اساس ایجاد هاله عدم رشد

<i>Candida albicans</i>		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		<i>S. aureus</i>		<i>E. coli</i>	
اسانس	اسانس	اسانس	اسانس	اسانس	اسانس	اسانس	اسانس
زراعی	خالص	زراعی	خالص	زراعی	خالص	زراعی	خالص
۳۵ ± ۱	۵۳/۶ ± ۱/۵	۱۲/۶ ± ۱/۱	۱۸/۳ ± ۰/۵	۱۶/۳ ± ۱/۵	۲۸/۶ ± ۱/۱	۱۸/۶ ± ۱/۱	۴۰/۱
۲۸/۶ ± ۱/۱	۴۳/۶ ± ۱/۵	۱۰/۶ ± ۰/۵	۱۴/۳ ± ۱/۵	۱۴ ± ۲	۱۸/۶ ± ۱/۱	۱۱ ± ۱	۳۱/۱
۲۰/۳ ± ۱/۵	۳۵/۶ ± ۲/۱	۷/۳ ± ۰/۵	۱۱ ± ۱	۸/۶ ± ۱/۱	۱۴/۳ ± ۲/۱	۸/۶ ± ۰/۵	۱۹/۱
۱-۲/۵	۰/۵-۱	۵-۱۰	۲/۵-۵	۲/۵-۵	۱-۲/۵	۵-۱۰	
۶/۴۳	۴/۲۹	۱۷/۱۴	۱۷/۱۴	۱۲/۸۶	۸/۵۷	۸/۵۷	

جدول ۲- محتوای فنلی و فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی اسانس‌های مرزه و آنتی‌اکسیدان‌های استاندارد

محتوای فنلی ($\mu\text{g}/\text{mg GAE}$)	قدرت احیای فریک (FRAP) معادل گالیک اسید (میلی‌گرم در گرم نمونه)	فعالیت آنتی‌اکسیدانی (%) با روش بتاکاروتین (مقدار اسانس)	IC_{50} (μg)	DPPH (ننس)
۱۷۰/۵ ± ۸/۵۳	۰/۵۵ ± ۱۲/۵۶	۶۳/۶۶ ± ۴/۰۶ (۰/۶۲۵mg/ml)	۷/۲۵	۶۳/۱ (۱)
۴۷/۲۵ ± ۲/۱۴	۰/۰۷ ± ۰/۸۲	۴۴/۰۱ ± ۲/۳۴ (۰/۶۲۵mg/ml)	۵/۸۲	۶۹/۱ (۱)

جدول ۳- فعالیت‌های رادیکال‌زدایی سوپراکساید آنیون و درصد فعالیت ضد تیروسینازی انسانس‌های مرзе

اسانس	سوپراکساید آنیون (مقدار انسانس)	درصد رادیکال‌زدایی درصد رادیکال‌زدایی IC_{50} (μg)	درصد فعالیت ضد تیروسینازی (مقدار انسانس)	معادل quercetin در هر گرم نمونه	(μg) IC_{50}
مرزه سهندي	۵۵/۲۸ ± ۱/۱۶ (۱۵μg/ml)	۴۷/۸۸ ± ۱/۳۳ (۱μg)	۹/۴	۲	۱۲۵
مرزه زراعي	۲۱/۸۱ ± ۲/۴۶ (۱۵μg/ml)	۱۰۱/۲	۱۵/۳۵ ± ۲/۹ (۱۵μg)		

رادیکال‌زدایی سوپراکساید آنیون انسانس‌ها نشان داد که انسانس مرزه سهندي دارای IC_{50} معادل ۹/۴ میکروگرم در برابر ۱۰۱/۲ میکروگرم IC_{50} انسانس زراعي مرزه است (جدول ۳). فنل‌ها و فلاونوئيدهای گیاهی ممانعت پراکسیداسيون لیپید را با فرونشاني رادیکال‌های پروکسی و احیا یا کلاته کردن آهن در آنزیم لیپوکسیژناز و نهایتاً ممانعت از شروع واکنش پراکسیداسيون لیپید را انجام می‌دهند (Torel *et al.*, 1986). تفاوت در فعالیت آنتی اکسیدانی می‌تواند مربوط به توانایی زدودن رادیکال‌های پروکسی، رادیکال‌های آزاد DPPH و رادیکال‌های هیدروکسی باشد (Singh *et al.*, 2005). نتایج نشان‌دهنده ارزش غذایی این گونه گیاهان به‌ویژه قابلیت تیمول که براساس گزارش Sefidkon و همکاران (۲۰۰۴) از ترکیب‌های اصلی مرزه سهندي است، در پیشگیری از تشکیل محصولات سمی از راه نیتروژن واکنشگر (RNS) بوده‌اند (Cavar *et al.*, 2008). بازدارنده‌های تیرسیناز آن دسته از مواد شیمیایی هستند که واکنش‌های شیمیایی مانند تیره شدن رنگ غذا یا پوست انسان (ملاتیزاسیون) را احیا می‌کنند، بنابراین دارای پتانسیل خوبی با دیدگاه صنعتی هستند. در

زمینه تحقیقات جالبی پیرامون ترکیب‌های شیمیایی و ویژگی‌های زیستی روغن‌های انسانسی مرزه وجود دارد. مطالعه مقالات نشان می‌دهد که تعداد کمی گزارش در خصوص خواص آنتی اکسیدانی مرزه وجود دارد و انسانس مرزه سهندي و انسانس زراعي آن تاکنون مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. در مقالات دیگران خواص آنتی اکسیدانی *S. montana* M. (Radonic & Milos, 2003) Koleva *et al.*, 2002) سنجش خاصیت آنتی اکسیدانی انسانس‌ها با روش DPPH نشان داد که قدرت رادیکال‌زدایی انسانس‌ها تقریباً برابر هم ولی به مراتب بیشتر از آنتی اکسیدان‌های سنتیک بود. فعالیت آنتی اکسیدانی با روش بتاکاروتین و قدرت احیای فریک انسانس‌ها نشان می‌دهد که انسانس مرزه سهندي با محتوای فنلی بالاتر، قوی‌تر از مرزه زراعي است (جدول ۲). نتایج سنجش خاصیت آنتی اکسیدانی روغن‌های فرار Satureja montana L. تقطیر شده از قسمت‌های هوایی *Satureja subspicata* Bartl. ex Vis. بوسنی و هرزه‌گووین با روش DPPH، نتایج قابل مقایسه‌ای را در مقایسه با تیمول (Cavar *et al.*, 2008) به عنوان پروب مثبت نشان داده است.

- Escudero, J., Lopez, J.C., Rabanol, R.M. and Valverde, S., 1985. Secondary metabolites from *Satureja* species-new triterpenoid from *Satureja acinos*. *Journal of Natural Products*, 48: 128-132.
- Esquivel, M.M., Ribeiro, M.A. and Bernardo-Gil, M.G., 1999. Supercritical extraction of savory oils: study of antioxidant activity and extract characterisation. *Journal Supercritical Fluids*, 14(2): 129-138.
- Gulluce, M., Sokmen, M., Daferera, D., Agar, G., Ozkan, H., Kartal, N., Polissiou, M., Sokmen, A. and Sahin, F., 2003. In vitro antibacterial, antifungal, and antioxidant activities of the essential oil and methanol extracts of herbal parts and callus cultures of *Satureja hortensis* L. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 51(14): 3958-3965.
- Hajhashemi, V., Sadraei, H., Ghannadi, A.R. and Mohseni, M., 2000. Antispasmodic and anti-diarrhoeal effect of *Satureja hortensis* L. essential oil. *Journal of Ethnopharmacology*, 71: 187-192.
- Kahkonen, M.P., Hopia, A.I., Vuorela, H.J., Rauha, J.P., Pihlaja, K., Kujala, T.S. and Heinonen, M., 1999. Antioxidant activity of plant extracts containing phenolic compounds. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 47(10): 3954-3962.
- Koleva, I.I., Van Beek, T.A., Linssen, J.P.H., De Groot, A. and Evstatieva, L.N., 2002. Screening of plant extracts for antioxidant activity: A comparative study on three testing methods. *Phytochemical Analysis*, 13: 8-17.
- Lahllou, M., 2004. Essential oils and fragrance compounds: Bioactivity and mechanisms of action. *Flavour and Fragrance Journal*, 19: 159-165.
- Lambert, R.J.W., Skandamis, P.N., Coote, P.J. and Nychas, G.J.E., 2001. A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol. *Journal of Applied Microbiology*, 91(3): 453-462.
- Lee, J.C., Kim, H.R., Kim, J. and Jang, Y.S., 2002. Antioxidant property of an ethanol extract of the stem of *Opuntia ficus-indica* var. saboten. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 50(22): 6490-6496.
- Lim, T.Y., Lim, Y.Y. and Yule, C.M., 2009. Evaluation of antioxidant, antibacterial and anti-tyrosinase activities of four Macaranga species. *Food Chemistry*, 114(2): 594-599.
- Lindberg Madsen, H. and Bertelsen, G., 1995. Spices as antioxidants. *Trends in Food Science and Technology*, 6(8): 271-277.
- Miraliakbari, H. and Shahidi, F., 2008. Antioxidant activity of minor components of tree nut oils. *Food Chemistry*, 111(2): 421-427.

این مطالعه مرزه سهندی بازدارندگی بسیار قوی با IC50 برابر ۲ میکروگرم نشان داد (جدول ۳). در مجموع مطالعه خواص بیولوژیک انسانس مرزه سهندی نشان می‌دهد که قابلیت خوبی برای بررسی کاربرد آن در صنعت غذا و دارو وجود دارد.

سپاسگزاری

بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد که با تأمین هزینه‌های این طرح امکان عملی شدن آن را فراهم آوردند اعلام می‌داریم.

منابع مورد استفاده

- Abad, M.J., Bermejo, P., Gonzales, E., Iglesias, I., Irurzun, A. and Carrasco, L., 1999. Antiviral activity of Bolivian plant extracts. *General Pharmacology: The Vascular System*, 32(4): 499-503.
- Azaz, A.D., Kurkcuoglu, M., Satil, F., Baser, K.H.C. and Tumen, G., 2005. In vitro antimicrobial activity and chemical composition of some *Satureja* essential oils. *Flavour and Fragrance Journal*, 20(6): 587-591.
- Bezbradica, D.I., Tomovic, J.M., Vukasinovic, M.S., Siler-Marinkovic, S. and Ristic, M.M., 2005. Composition and antimicrobial activity of essential oil of *Satureja montana* L. collected in Serbia and Montenegro. *Journal of Essential Oil Research*, 17(4): 462-465.
- Catino, P.D., Harley, R.M. and Wagstaff, S.J., 1992. Genera of Labiateae: Status and Classification. 511-522. In: Harley, R.M. and Reynolds, T., (Eds.). *Advances in Labiateae Science*. Royal Botanical Gardens, Kew, 872p.
- Cavar, S., Maksimovic, M., Solic, M.E., Jerkovic-Mujkic, A. and Besta, R., 2008. Chemical composition and antioxidant and antimicrobial activity of two *Satureja* essential oils. *Food Chemistry*, 111(3): 648-653.
- Chan, E.W.C., Lim, Y.Y., Wong, L.F., Liانتو, F.S., Wong, S.K., Lim, K.K., Joe, C.E. and Lim, T.Y., 2008. Antioxidant and tyrosinase inhibition properties of leaves and rhizomes of ginger species. *Food Chemistry*, 109(3): 477-483.

- Sefidkon, F., Jamzad, Z. and Mirza, M., 2004. Chemical variation in the essential oil of *Satureja sahendica* from Iran. Food Chemistry, 88(3): 325-328.
- Singh, G., Marimuthu, P., Murali, H.S. and Bawa, A.S., 2005. Antioxidative and antibacterial potentials of essential oils and extracts isolated from various spice materials. Journal of Food Safety, 25(2): 130-145.
- Skocibusic, M., Bezic, N. and Dunkic, V., 2006. Phytochemical composition and antimicrobial activities of the essential oils from *Satureja subspicata* Vis. growing in Croatia. Food Chemistry, 96: 20-28.
- Soliman, K.M. and Badeaa, R.I., 2002. Effect of oil extracted from some medicinal plants on different mycotoxicogenic fungi. Food and Chemical Toxicology, 40(3): 1669-1675.
- Thomas-Barberan, F.A., Huisain, S.Z. and Gil, M.J., 1987. The distribution of methylated flavones in the Lamiaceae. Biochemical Systematics and Ecology, 16: 43-46.
- Torel, J., Cillard, J. and Cillard, P., 1986. Antioxidant activity of flavonoids and reactivity with peroxy radical. Phytochemistry, 25(2): 383-385.
- Yamasaki, K., Nakano, M., Kawahata, T., Mori, H., Otake, T., Ueba, N., Oishi, I., Inami, R., Yamane, M., Nakamura, M., Murata, H. and Nakanishi, T., 1998. Anti-HIV-1 activity of herbs in Labiateae. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 21(8): 829-833.
- Oke, F., Aslim, B., Ozturk, S. and Altundag, S., 2009. Essential oil composition, antimicrobial and antioxidant activities of *Satureja cuneifolia* Ten. Food Chemistry, 112(4): 874-879.
- Prieto, J.M., Iacopini, P., Cioni, P. and Chericoni, S., 2007. In vitro activity of the essential oils of *Origanum vulgare*, *Satureja montana* and their main constituents in peroxynitrite-induced oxidative processes. Food Chemistry, 104(3): 889-895.
- Radonic, A. and Milos, M., 2003. Chemical composition and in vitro evaluation of antioxidant effect of free volatile compounds from *Satureja montana* L. Free Radical Research, 37(6): 673-679.
- Rechinger, K.H., 1982. *Satureja* in: Flora Iranica. No. 150, Akademische Druck-u Verlagsanstalt.
- Ruberto, G. and Baratta, M.T., 2000. Antioxidant activity of selected essential oil components in two lipid model systems. Food Chemistry, 69(2): 167-174.
- Sefidkon, F. and Ahmadi, S., 2000. Essential oil of *Satureja khuzestanica* Jamzad. Journal of Essential Oil Research, 12: 427-428.
- Sefidkon, F., Abbasi, K., Jamzad, Z. and Ahmadi, S., 2007. The effect of distillation methods and stage of plant growth on the essential oil content and composition of *Satureja rechingeri* Jamzad. Food Chemistry, 100(3): 1054-1058.

Antimicrobial, antioxidative, superoxide anion radical scavenging and anti tyrosinase properties of *Satureja sahendica* Bornm. and *Satureja hortensis* L. essential oils

M. Dadashpour¹, I. Rasooli^{2*}, F. Sefidkon³, E. Zaad Hosseingholi⁴ and Sh. Darvish Alipour Astaneh⁴

1- MSc. Student, College of Basic Sciences, Shahed University, Tehran, Iran

2*- Corresponding author, Department of Biology, College of Basic Sciences, Shahed University, Tehran, Iran

E-mail: rasooli@shahed.ac.ir

3- Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran

4- Ph.D Student, College of Basic Sciences, Shahed University, Tehran, Iran

Received: October 2010

Revised: August 2011

Accepted: August 2011

Abstract

In the present study, the antimicrobial properties of *Satureja sahendica* Bornm. and summer savory (*Satureja hortensis* L.) essential oils were studied. The bacterial strains sensitive to the oils were in *Candida albicans*> *E. coli*> *S. aureus*> *P. aeruginosa* order. Minimum inhibitory and bactericidal concentrations were observed in the range of 0.5-10mg/ml. Total phenolics of *S. sahendica* and the *S. hortensis* were 170.5±8.53 and 47.25±2.14 µg Gallic acid equivalent per mg sample. Antioxidative property of the oils was carried out using DPPH free radical scavenging and beta-carotene bleaching tests and the results were compared with the standard synthetic antioxidants. Lipid peroxidation inhibitions were comparable to or higher than the synthetic antioxidants. The concentrations from *S. sahendica* and *S. hortensis* oils required for 50% free radical scavenging (IC50) were 6.25 and 5.82 µg/ml respectively. Ferric-reducing antioxidant power (FRAP) of *S. sahendica* oil was greater than that of the *S. hortensis* oil. The superoxide anion radical scavenging activities of *S. sahendica* and *S. hortensis* oils were 55.28%±1.16 and 21.81%±2.46 at 15µg/ml oil with an IC50 of 9.4 and 101.2 µg respectively. Tyrosinase activity of one µg *S. sahendica* oil was 47.88%±1.33 while that of the *S. hortensis* oil at 15 µg level was 15.35%±2.9. In conclusion, the results from biological properties of *Satureja sahendica* are indicative of its potentials for food and drug industries applications.

Key words: Antimicrobial, antioxidant, superoxide anion radical scavenging, antityrosinase, essential oils, *Satureja*.